

BLANCARD
LEX. MED.

TOM. I

11686



VERSANTUR HIS TRIBUS



Pharmacopœi Parisienses

ex Dono Domini
De Fourcy
Pharmacopœi


1764











Nota. Dat desen boeck moct gebonden worden in twee deelen; het tweede deel beginnende met *letter* N. Pag. 589. om dat hy niet geclopt magh worden maer wel sterck geperst.

Nota. *Que cette livre doit être reliée en deux volumes, la seconde commençans au lettre N. Pag. 589. parce qu'il ne peut pas être frappé mais fortement mise dans la Presse.*

STEPH. BLANCARDI
LEXICON

MEDICUM RENOVATUM,
In quo totius artis Medicæ termini, in
ANATOME, CHIRURGIA,
PHARMACIA, CHYMIA,
RE BOTANICA ETC.

Usitati, dilucidè & breviter exponuntur juxta
NEOTERICORUM tum **PRACTICORUM**
tum **MECHANICORUM** placita & verè
demonstrata principia.

*Hiscæ adjungitur GRÆCARUM vocum Etymologia; tum
earum BELGICA, GERMANICA, GALLICA,
ANGLICA &c. interpretatio; cum
indicibus locupletissimis.*

Editio novissima, & ob additiones à Viro Celeberrimo
JOANNE HENR. SCHULZIO

Desumptas cæteris longè auctior & perfectior.



L O V A N I I,
Apud **JOAN. FRANC. VAN OVERBEKE,**
Sub Signo Lampadis Aureæ 1754.

Cum Approbatione & Privilegio.

Ms. B. 1. 2. 3.

1. The first part of the manuscript
contains a list of names and
addresses of the members of the
committee.

2. The second part of the manuscript
contains a list of names and
addresses of the members of the
committee.

3. The third part of the manuscript
contains a list of names and
addresses of the members of the
committee.

4. The fourth part of the manuscript
contains a list of names and
addresses of the members of the
committee.

S. BLANCARDI LEXICON MEDICUM,

In quo exhibentur termini artis in
Anatomia, Chirurgia, Pharmacia,
Chymia, Botania & Praxi
vulgo usitati. &c.

A.

Sive ã, vide *Ana*.

A, ãã vide *Ana*.

ABAPTISTON, videatur *Modiolus*,
derivatur ab α, priv. & βαπτίζω immer-
go, quia immergi non potest.

ABARTICULATIO, vide *Diarthro-*
sis.

ABDOMEN, *Juvenali Sūmen, Aqualiculus*. Est Ven-
ter infimus, Hepar, Lienem, Ventriculum, intestina,
&c. continens. Intus membranâ *Peritonæum* dictâ succin-
gitur: antè in Epigastrium, Hypochondrium dextrum
& sinistrum, Umbilicumque dividitur: inferior regio
Hypogastrii nomine venit, nomen accepisse videtur quod
abdit, seu abscondit viscera. Græcis ὑπογάστριον, ἡττον,
ὑπὲρ τριον, ἐπίσχιον, λαπάρα, ὑποκόιλιον. B. Onderbuike.
G. der unterbauch, Schmerbauch. Gall. *Le bas ventre*.
inferieur. A. The belly, or Panch.

ABELMOSCH: Semen est Belmoschi Ægyptiaci, pu-
sillum, reniforme, umbilico albicante, parallelis sulcis
striatum, colore extus gryseo, intus albo, odorem mos-
chi spirans: vox arabica composita ex ab, el & mosch,
quod sit moschus Arabum, hi enim semen pulverisatum
potui

potui coffee pro gratia addunt. Gall. *Ambrette ou graine musquée.*

ABDUCTORES MUSCULI, sunt illi, qui brachium, crus, oculos &c. abducunt, quorum oppositi, *Adductores*, dicuntur. B. *Afthalende Spieren.* G. *Hinweg fuchrender Mauff.* Gall. *Les muscles abducteurs.* A. te extending muscles.

ABIES, est arbor semper virens, altè excrescens, & imprimis montibus gaudet Saxosis, cortex ejus politus, resinofus, præsertim in regionibus calidis, albescens, folia habet longa, Taxi similia, sparsim solitaria in ramis; flos mas, amentaceus, apiculis constans uno loco; fructus nascitur alio loco inter foliola squammatim spicam formantia, estque fructus squammosus, strobilus vel conus dictus, Gr. *Ελάτη*, dici putatur, quòd arbor altius excrescat, quàm cæteræ arbores. Vocatur etiam *Sapinus*. Ex hac educitur Terebinthina. B. *Denne-boom / Mast-boom* / G. *Dhannen-baum*, Danne. Gall. *Sapin*, A. The Fir-tree.

ABIGA HERBA, ab abigendo partu : vel quòd ejus folia abieti sint similia : unde & Chamæpitys dicitur. Vocatur & *Ajuga*, *Arthetica*, *Arthritica*, *Iva Arthetica* vide hæc cognomina suis locis.

ABLACTATIO, dicitur quando infans, annum agens unum aut alterum, à lactatione arcetur. Gr. *Απογαλακτισμός.* B. *Speeningen / spenen.* G. *Von der Milch stoffung*, Entwehrung. Gall. *Sevrer.* A. a weaning.

ABLUENTIA, vide *Abstergentia*.

ABLUTIO, Chymicis est, cùm Medicamenta impura, mediante aquæ affusione abluuntur, ut lixivium à sua terra; vel quando acrimonia à quavis calce aquam affundendo & decantando abluitur. B. *En wassinge.* G. *Abwæschung.* Gall. *Lavement*, *Lotion.* A. A. Washing, or rinsing.

ABOMASUM, In ruminantibus quatuor numerantur ventriculi : Primus dicitur, *Venter*, deinde *Reticulum*, *Omasus* & *Abomasus*. Gr. *Ηνυστρον.* B. *De agterpens.* G. Ein Feisterdarm, Feist eingeweydt. Gall. *Pance*, *Le gras boyau.* A. The Read.

ABORTIVA sunt medicamenta, quæ uterum aperiunt, Foetumque & Placentam expellunt. Gall. *remedes abortifs.*

ABOR-

ABORTUS, ABORSUS, ABORTIO & ABORTIVUM indiscriminatim accipitur. Estque foetus imminaturus ante debitum partus tempus, in lucem editio : cujus causæ sunt vel in Matre, vel in foetu ; in genere sunt omnes causæ, quæ Placentam ab utero solvunt ; hinc omnes nimii motus sive à mente sive à corpore producti, plethora, debilitas, convulsiones &c., uteri mala conformatio, vel status morbosus, foetus si ægrotat vel mortuus est ; &c. Foetus abortivus *Sueton.* Abortus *Cic.* Exterricinius *Festo*, hujus generis est, quasi matre exterrita ante tempus natus. Ἡ λιτόμνη Græci dicunt. Ἐκτρώμα Ἐκβολή *Empir.* Κύνμα ἀναιμία, Ἀμβλωμα, Ἀμβλυωσμός *Hipp.* Ἀποφθορὰ *Eid.* Ἀμβλωρεΐδιον, Ἀμβλωσις, Ἐκτρωσις, Ἐκτρωσμός *Aristot.* Ἐξάμβλωμα. **B.** Misbal / Misdragt / Misbaazring / Wanbugt / Mishkraam. **G.** Ein unzeitige Geburt, Mißgeburt. *Gall.* *Avortement, Fausse-couche*, **A.** An untimely birth, an Abortion.

ABRASA, ἀποσύματα græcis dicta, sunt ulcera, quæ mollem & suspensam habent cuticulam : Vel est quoque locus desquamatus, & frustulum, in ulceribus à partis ulceratæ substantia abrasum. *Gall.* *ulcerations, Ecorchures.* **A.** Schaved away.

ABRASIO INTESTINORUM est ulceratio partium superficialiarum in Intestinis, quâ earundem partium ramenta educuntur unâ cum fœcibus. *Gall.* *ulceration des intestins.* **A.** A Schaving off of y Intestines.

ABROTANUM, est vox origine Græcâ, διὰ τὸ πρὸς τῷ ψιν φαίνεσθαι ἄσπερον καὶ ἀπαλόν, quod aspectu sit molle & tenerum, vel dicitur ab Africa urbe ad mare mediterraneum. Planta officinalis est, gymnomonosperma, flore composito, semine non papposo, foliis tenuissimè divisis, odore forti, aromatico & acri, flores & semina referunt satis Absinthium, radix lignosa, caulis multifidus, durus, fragilis, ramosus, medulla alba repletus. **B.** Averoone Avearuit. **G.** Stab-wurtz, Gert-wurtz, Gart haglen, Schorwurtz, Kuttel-kraut, Affrusch. *Gall.* *Aurone.* **A.** Sothernwood.

ABSCCESSUS, vide *Apostema*.

ABSCISSIO, est ablatio partis mollis vitiatæ vel corruptæ, ope Instrumenti acuti secantis. **B.** een assnyding. *Gall.* *Separation, coupure.*

ABSINTHIUM, est officinalis planta, habens flores
A 2 flos.

flosculosos deorsum vergentes, caulem lignosum, ramosum, albescentem, folia incana, amara insigniter, odoris aromatici, semina parva, non papposa: nomen græcum ortum ab ἀψιθραι, id est, contrectando, per antiphrasin deflexerunt, quòd nullum animal, ob eximiam amaritiam, hanc herbam attingat. Veteres Græci comici ἀπένθειον quoque consimili Etymo, quasi impotabilem dixerunt, quòd hanc nemo, propter insignem amarorem bibere possit. Vel dicitur à populis Absinthiis, juxta Pontum habitantibus, ubi Absinthium amarissimum crescit. Ex α priv. & πίνω bibo vel ex a privativo, & ψιθρα delectatio, quasi planta, quæ ob magnam amaritiam, nullam delectationem præbet. B. *Alst/ Alsem.* G. Wuermtd, Wermuetb. Gall. *Alvine, Absinthe.* A. worme-wood.

ABSORBENTIA, Medicamenta sunt ex Fossilibus, animalibus, metallicis, vel plerumque ex terrestribus petita, quæ vim habent acidum in corpore humano in se trahendi, sibi associandi & enervandi; dum interea nullam ipsa acrimoniam habent, quâ corpori nocere possunt, unde aliis sæpe præferri solent, uno tamen hoc damnosa, si, inertis pituita mista, mole nocent & pondere. Dicuntur & *Temperantia, Concentrantia & Saturantia.* B. *Zuurbrekende middelen.* G. Saur-brechende mittlen. Gall. *Absorbans, Remedes qui temperent l'Aigre.* A. Absorbens sive Absorbing medecines.

ABSORBENTIA, vasa sunt minima, quæ, quasi introfugendo exterius applicata, ea corpori invehunt, & liquidis admiscunt: Talia sunt ubique in corpore, ubi membranæ liberè in cavitates hiant, & per hæc Mercurius & Emplastra & alia penetrabilia corpora externè applicata intrant in corpus: dicuntur quoque *Resorbentia.* Gall. *Vaisseaux absorbans.* A. Absorbent vessels.

ABSTEMIUS, est propriè, qui Vino abstinet, latè sumitur pro eo qui cibo & potu à Medico interdicto se abstinet. Compositum ex abs & temetum. Gr. Ἀστω. B. *die zig onthoud.* G. Der Sieg enthælt van Wein. Gall. *Qui ne boit point de vin.* A. Temperate in diet.

ABSTERGENTIA, sunt quæ diluentibus, solventibus, & saponaceis particulis fluida glutinosa, vel semicorrupta solida auferunt ex locis, quibus suâ tenacitate adhærebant, non lædendo loca quibus conjuncta fuerant.

Gr.

Gr. *ῥύποντα*, *Ἀποπλύνοντα*. B. *Abtragende middelen*. G. *Abstreichende*, wund reinigende mittlen. Gall. *Remedes abstergents*. A. Absterfive medecines sée detergent.

ACACIA, Gr. *Ἀκακία* : Habet folia pinnata numerosis foliolis, flores monopetalos infundibuliformes, campanulatos, multis staminibus donatos, in capitulum congestos, siliquam longam, in plures foveas divisam, recondentem semina subrotunda ut plurimum reniformia; Ex Acaciæ Ægyptiæ filiquis immaturis exprimitur succus, qui coctus & inspissatus, saporis acerbi, austri & adstringentis est, qui tantum nominis meruit ad adstringendum; in Ægyptia multum adhibetur in Peste & dysenteria, morbis ibi familiaribus, ille succus cum sit pretiosissimus, & raro ad nos deferatur, hinc Germani illum extrahunt ex fructibus Pruni Sylvestris : Belgicè *Sleedoorn*; qui succus expressus, coctione leni inspissatus, nigricans, solo colore ab Ægyptiaco differt, saporis similiter est acidi, austri, adstringentis, nomen ab *ἀκή* seu *ἀκωκή* mucrone, cuspidē, spina enim est Ægyptia pungens : nam *ἀκάζω* est acuo, unde *acacia*, vel potius *Acatia*. B. *Sleepruitmen*. G. Schlehendorn. Gall. *Acacia*, *Prunier sauvage*. A. The Sloe-tree, or Thorn-tree. Ex ipsius arboris prunis succus colligitur, qui in consistentiam spissam evaporatus, *Rob Acaciæ* officinis dicitur.

ACAMATOS, est optima corporis humani constitutio & figuratio. Item non laborans, indefessus. ex *α* priv. & *κάμνω* laboro, lacesso. Gall. *qui est infatigable*.

ACANACEA, omnes Cardui Spinosi & Capitati sic appellantur, ab *ἀκάζω* acuo.

ACANOS, est herba vel frutex spinosus & aculeatus, ab *ἀκάζω* acuo.

ACANTHUS, vide Branca Ursina.

ACANTHABOLUS est instrumentum Chirurgicum *Vol-sella* dictum, quo spinæ œsophago inhærentes, eximuntur : Item frustula ossis corrupta & mobilia; spicula item & globuli eorumque fragmenta, turundæ, atque pili, aliæque extraneæ, quæ in vulneribus reperiuntur, eodem instrumento eximuntur : sic quoque appellantur instrumenta cosmetica, quæ evellendis pilis è superciliis destinantur. ex *ἄκανθα* spina, & *βάλλω* jacio. B. *Doozn-tang* / *Trek-tang* / *Gaat-tang*. G. Græt-Zænglein Gall. *Pincette*

tes pour tirer les Epines ou d'autres corps étrangers hors de la gorge ou de l'oesophage. A. A pair of Pincers or nippers.

ACANTHA seu ῥάχις, est Vertebrarum protuberantia posterior, vulgo *Spina Dorfi* appellata. B. *rugge-graat*. G. Ruck-Grad. Gall. *l'Epine du dos, ou l'Echine*. A The posterioir processs or spines of the back bone. *Acantha*, est arborum aut plantarum pars acuta *Spina* dicta & in genere significat spinam qualemcunque. Derivatur ex ἀκή culpis, ἀκίζω acuo. B. *Θόρον*. G. Stachel, Dorn. Gall. *une Epine*. A. a thorn.

ACANTHIUM, idem quod *Acanthus*.

ACANTHUS, *Acanthium* & *Acantha*, est spina, arbor vel herba spinosa, Cardui species ab Ἀκανθίω vel Ἀκανθίζω spinosum vel aculeatum reddo. Gall. *Especie de Char-don*.

ACANTHUS, ἄκανθος, seu Brancha ursina, planta est flore monopetalo, anomalo, quæ habet folia ampla, mollia, villosa, profundi incisa, repentia, ex radice erumpentia, & succum glutinosum habentia; florem monopetalum, anomalum, versùs anteriora bifidum, versùs posteriora succedit vasculum feminale instar gladii, obvolutum plerumque ipso calice, fructum habet glandiformem, disangeion polyspermum, semina oblonga, radicem, extus nigram, intus albam; dicitur ab ἄκαντος, ex ἀκή, spina; quòd spinis, sylvestris tamen potius quàm domestica, donata sit, à similitudine foliorum cum pedibus Ursi dicitur. B. *Werenklaaw*. Gall. *Acante, Branc-Ursine*. A. Brank-Ursine.

ACARNA, five Acorna, Planta est Cardui species, incana, spinosa, gymnomonosperma, flore composito, capitato, squammoso. vox græca à Theophrasto usurpata, qui hanc plantam inter φυλλάκαντα reposuit, quasi habens φύλλα ἄκαντα folia spinis donata. A. Fishthistle.

ACARON, vocatur Brusca & Myrtus Sylvestris. Ex à priv. & κόρη caput. Est vox minus usitata.

ACARUS, ab α, & κείρω, tondeo, feco, quòd sit animalculum parvitate insectile. Gall. *un Ciron*. B. *Cen* *rept*.

ACATALIS, vox græca; estque Juniperi bacca.

ACATERA, est Juniperus major.

ACCELERATORES vocantur musculi penis duo, qui car-

carnei orti à superiori parte urethræ sub offe Pubis , ambientes bulbum urethræ , inferius juncti , decurrunt , & ſecedentes inferuntur utrimque membranæ forti corporum cavernosorum penis. Hinc agendo , conſtringunt Urethræ partem poſteriorem , quo urinam ex urethra , ſed præcipuè in coitu , vi magnâ ſemen expellunt. B. *Waterboort-
Dyverſ.* Gall. *Muscles Accelerateurs.*

ACCESSIO, idem quod *Paroxyſmus.*

ACCIDENS, idem quod *Symptoma.*

ACCIPITRINA, eſt herba , quæ nomen ab ave accipitre mutuatur. Vide *Hieracium.*

ACCIPITER, quaſi *ὄξυπτερος* , ex *ὄξυς* , celer , & *πτερον* , ala , vel ab accipiendo , quod aves accipiat. Gall. *Eprevier.* B. *een Vadi.* A. a Hawk.

ACCYSETUM, eſt Alyſſi ſpecies.

ACER, vel ut apud *Solinum* legitur ACERIS : eſt arbor glandifera , ſatis procera flore roſaceo , piſtillo frugifero , tricapſulari , in alam foliaceam deſinente , foliis laciniatis : Hujus cortex eſt rubicundus , lignum durum & ſatis fragile : Ex hujus arboris ſucco ſaccarum præparant Canadenſes , uti conſtat ex Aët. anglic. philoſ. n. 171. p. 988. dicta fortè ab arcu , quia ex ipſius ligno Arcus fiebant. Gr. *Σφένδαμνος* à *σφιδανός* , à robore , vehementia , duritie : à *σπείδω* feſtino , incito. B. *Boog-hout.* G. A-horn, Maſz holder baum. Gall. *Erable* , A. The Malple tree.

ACERBUM, ab *ἀκὴ* , acies , acumen ; quia , quod guſtatu acerbum , id linguam conſtringit & exaſperat. Gall. *Apré.* A. Scharp.

ACERIDES, ſunt Emplaſtra , quæ carent Cera.

ACERVUS, eſt magna collectio & accumulatio rerum ſupra ſe invicem poſitarum : quaſi agervus , ab agerendo dictus : vel ab *ἀκίς* , cuſpis , quod acervus ſit ſaſtigiatuſ , vel *ἀγείρω* , congreſſo. B. *een Hoop.* Gall. *un Monceau* , *amas.* A. a Heap.

ACETABULUM , idem quod *Umbilicus Veneris.* Folium habet rotundum & in ſummitate depreſſum , à ſimilitudine ſcutellarum dictum , in quibus acetum olim menſæ ſolebat apponi. Gr. *κῆπε* *Ἀφροδίτης* , id eſt , *Hortus Veneris.* item *τῆς ὀμφαλῆς* , Terræ umbilicus ; *κοτυληδών* , umbilicus Veneris. B. *Venus-nabel-kruud.* G. Nabelkraut.

kraut. Gall. *Eſcuellès*, *Nombril de Venus*. A. Venus-na-
vel-wort : vel Pony-wort.

ACETABULUM, in genere denotat offis cavitatem, alterius offis caput profundius excipientem; & in ſpecie applicatur cavitati; quæ eſt in extrema cervicis ſcapulæ parte, & caput brachii excipit; & inprimis cavitati magnæ, formatae in concurſu externo trium oſſium, Ilii, Iſchii, & Pubis; capiti oſſis femoris recipiendo dicatae: nomen ab accipiendo habet, quia capit aliquid; dicitur quoque Pyxis & *κοτύλη*. B. *Gen' holligheid des heupen-beens*. G. Die Schuiffel, vel hoele darin Sich die beine-fugen. Gall. *la Boîte ou grande cavité formée par les os des Iſles, Iſchion & Pubis, pour recevoir la tête de l'os de la cuiffe*. A. The great cavity in the glipbone. Item glandulæ quædam in Chorio, Acetabula vocantur, de quibus vide *Cotyledones*.

ACETABULUM, eſt etiam Veterum menſura, continens vini uncias duas cum ſemiſſe, ſed olei uncias duas & dragmas duas; aliis erat liquidorum ſeſquicyathus. Gall. *Acetabule* (*petite meſure qui contenoit la quatrieme partie de l'Hemine, ou deux onces & demie de liqueurs, ou de matiere ſèche, ſuivant le rapport de Plin.*

ACETARIA, ſunt ex vegetabilibus obſonia vel condimenta, quæ cruda cum aceto, oleo, & ſale manducantur. B. *Salat*. G. *Salade*. A. Salets. pertinet hoc nomen, vel ad vaſculum, in quod acetum infundebatur ad intingendos cibos, vel ad menſuras, cotylæ quartam partem, id eſt 24 drachmas denotans.

ACETOSA, eſt planta flore apetalò, ſemine triangulari capſulâ obvoluto, quæ conficitur ex tribus foliis calicis: habet folia oblonga, viridia, ſplendentia, ſuccum acidum habentia, cætera ut in Lapathò, niſi quod ſapor acidus ſit in caule & foliis: Radix fibroſa, lutea, ſtrenue ſiccante & adſtringente ſapore. Saporis eſt acidi, unde ei nomen impoſitum. Gr. *ὄξαλις* & *ὄξύλεπας*, quia inter Lapathi ſpecies recenſetur. B. *Zuuring* / *Durkel*. G. *Saur ampſler*. Gall. *Ozeille*. A. *Sorrel*.

ACETOSELLA, eſt minor Acetoſæ ſpecies, & ejuſdem originis dicitur & Alleluja, Lujula, Oxys, Acetoſum trifolium Oxytriphyllum. B. *Wilaaverzuuring* / *Wochkoeks-wrood*. Gall. *l'Alleluja*. A. *Wood-forrel*.

ACETUM, eſt liquor acidus, vegetabilis, tenuis, pe-

netrans, subpinguis, ignem & flammam exstinguens : in genere autem liquorem quemcumque acidum notat, unde nonnullis spiritus salis, nitri, vitrioli, & similes, *Acetum* dicuntur. Verum tamen in officinis liquorem solum acidum denotat, ex potulentis succis factum & κατ' ἰξον ex vino seu uvis : & hoc recipiendum est, quoties *Aceti* simpliciter fit mentio. Aliud est *Simplex*; aliud *Destillatum*, cum vel sine Medicamentis; aliud est *Compositum*, ut *Acetum Calendulae, Rosarum, Sambuci, Scilliticum*. Gr. τὸ ἰξόν. B. 𐌹𐌿𐌶𐌹𐌸 / 𐌺𐌹𐌳𐌴. G. Essig. Gall. *Vinaigre*. A. Vinegar.

ACETUM ALCALISATUM, est acetum destillatum, quod ipsius proprio sale alcali est saturatum & acuatum.

ACETUM PHILOSOPHICUM, est acidum ex melle destillatum, vel est aqua mercurialis, quam alias lac virgineum appellant, quo metalla solvi perhibent. Gr. ἰδαρ σοφῶν.

ACETUM RADICATUM, est liquor acerrimus aceti, abstracto phlegmate, cum proprio suo sale conjunctum, & hac de causa etiam *Acetum alcalisatum* appellatur.

ACHAMENIS, est Polii species assurgens : Fortè ab α priv. & χαμαι humi.

ACHATES, vel *ACHATITES LAPIS*, Est genus inter opacos lapides, & gemmas, ita medium ut semiopacum vocari queat : coloribus & rerum imaginibus quas ab ipsa natura formatas, repræsentat, valde varians. Ab Achate fluvio Siciliae, ubi primum inventus est; vel ἀπὸ τοῦ ἄχης, id est à cura, quam, ut animi molestiam discutere dicitur. B. 𐌹𐌿𐌶𐌹𐌸. Gall. *Agathe*. A. an Agat.

ACHILAEIS, est hordei species, putatur ab Achille quodam rustico nomen habuisse.

ACHILLEA & *ACHILLEUS*, vide *Millefolium*. Sic dicitur, quia ferunt Achillem Chironis discipulum primum invenisse. Gall. *Millefeuille* (*Herbe & fleur, qui guerit les playes & qui a été trouvée, a ce que l'on dit, par Achille*). A. Yarrow.

ACHLYS, significat aëris caliginem, & turbationem, cujus crassamentum est medium inter nebulam & nubem, crassius nebula, & nube tenuius; & in specie ita dicitur oculi quoddam vitium caliginosum ob cicatriculam tenuis.

nuissimam à superficiali corneæ exulceratione factam, nigrum pupillæ occupantem. Recensetur inter species *Amblyopie*, ab ἀλῶς obtenebror. Gall. *Brouillard*, à cause que la vue se trouve comme obscurcie par un léger ulcere, qui est superficiel sur la cornée transparente.

ACHOR, seu *Cerea*, est crustosa scabiei Capitis seu Herpetis species: sunt ulcera in capitis superficie pluribus exiguis foraminibus aperta, sanie liquida manantia, fætida, putrilaginosa & cadaverosa, alias livida, alias flava, fœdis ac tuberosis crustis tecta, pruriginosa; orta à quocunque acri glandulas cutis obsidente. Derivatur ex α priv. & χῶρε locus, quia parvum locum occupat. Differentia Achoris & Favi hæc est, quod in Achoribus foramina sint minora & visum quandoque effugientia: in Favis verò majora & manifesta. Dic. etiam crusta lactea. *Lactumia* & *Tinea* præsertim, si Achores diutius durent, & tardius ad curationem disponantur. Gr. Ἀχὼρ, *Saphati* Arabibus. B. *Schurftheid des hoofds*. G. *Reudigkeit des Haupts*. Gall. *Teigne ou Gale de tête*. A. *Runing fores of the head*.

ACHROI, sunt homines decolores, ut Melancholici, Cachectici & Chlorosi vel lètero laborantes vel exsanguies ex α priv. & χεῶς color. B. *Wankoleurig*. G. *Entfärbt*, uebel gefärbt. Gall. *Une Mauvaise couleur*. A. Ill coloured.

ACIA Celsi, idem quod *Fibula Chirurgorum*.

ACIDA Dyspepsia, vide *Dyspepsia*.

ACIDITATIO vocatur symptoma ventriculi; quando vino assumptum in illo acorem contrahit, quod Hypochondriacis quibusdam satis familiare est.

ACIDULÆ, sub aquis mineralibus comprehenduntur, & sunt propriè tantum aquæ spiritu acido imprægnatæ, quarum vires differunt pro natura metalli vel mineralis ab hoc acido corrosi ut sunt spadaneæ &c. vide *Balanæum*.

ACIDUM, est sal fixus, aut volatilis: cognoscitur, 1º. ex ortu suo, nativo, fermentatione, igne. 2º. ex materie sua vegetabili, fossili. 3º. Effectu effervescentiæ, cum alcalinis, terrestribus, Ostracodermatis, Coralliis, &c. Præcipationis, coalitis in neutrum cum alcalicis, terrestribusque; solutionis inprimis partis metallicæ mercurialis; Mutationis coloris Heliotropii, Rosarum, violarum, in rubrum; saporis; odoris; doloris rodentis lanci-

cinantis, excitatione : ab *ἀκίς*, acies, acumen : quòd acida linguam pungendo vellicent. B. *Zuur*. G. *Acide*. A. Acid.

ACINESIA, est totius corporis aut partis alicujus immobilitas, ut in Paralyfi, Apoplexia, Syncope &c. ex *ἀκίνητος* priv. & *κινέω* moveo. B. *Onbeweegtheit*. G. *Unbeweeglichkeit*. Gall. *Immobilitéé*. A. *Immobility*.

ACINI, sunt granula minutiora sive per se crescant, ut acini, id est, baccæ sambuci, sive aliis inclusa, ut acini uvarum, quin & ipsas uvas integras sonant. *Acinus* etiam *Columella* appellatur : ut & minutissimæ glandulæ in hepate, cute, &c. quæ ferè visum fugiunt, quoque *Acini glandulosi* appellantur. Gr. *ῥαζή*. B. *ῥαζή*. G. Koernlein. Gall. *des Grains comme ceux de raisin, de Lierre*. A. Akernel, or Grain.

ACINIFORMIS TUNICA, idem quod *Oculi Tunica* *uvea*, dicitur quoque acinosa tunica, vel Gr. *παγοειδής*.

ACINUS vel ACINOS, est Ocimastrum ; an ab *ἀκίς* medeor ? Exponitur res vilis, & nullius pretii.

ACIPENSER, genus piscis, ab accipiendo, quod frequens mensis accipiat. Gall. *Sorte de Poisson, qu'on croit être l'Eturgeon*.

ACMASTICA FEBRIS, idem quod *Synochus* ab *ἀκμάζω* invalesco, vigeo. vide *Homotonos*.

ACME, est morborum vigor, seu status & summum : morbi plerique quatuor tempora habent : primum dicitur *Ἀρχή*, id est, *Principium*, seu *Invasio*, sive cum morbus primo invadit. 2. *Ἀνάστασις*, sive *Augmentum*, estque tempus inter principium & vigorem. 3. *Ἀκμή*, seu morbi *Vigor*, cum morbi symptomata maximè urgent ; in quo æger, si vires deficiant, moritur. 4. *Παρακμή* seu *Declinatio*, quando morbus deferbuit, & æger extra noxam judicatur, nemo enim in declinatione moritur, ab *ἀκμάζω* vigeo. B. *Het hoogste der ziekte of gezondheid / stilstand / top / 't hoogst*. G. *Wann die Kranchheit am heftigsten ist*. Gall. *le plus haut degré, ou point de la maladie*. A. The height of a disease. Est & Athletarum supremus vigor.

ACONITUM, est Herba, cujus denominationem derivant ab *ἀκονίς* vertex montium, quia rupes & loca petrosa amat ; crescit enim in montibus circa Alpes ; *Aconitus* enim est collis circa Heracleam Ponticam : vel *ἀπὸ τοῦ*

τοῦ ἀκόνων a cautibus : planta est , quæ caulem habet exiguum , rotundum , in multos ramos divisum ; folia in ambitu ferè rotunda , ampla , laciniata habet , & florem pentapetalon anomalum , caput humanum cucullâ monachi testum referentem , pistillum abut in filiquas multas univalves , dehiscences , quæ recondunt semina angulosa , nigra ; radix fibrosa ; vis deletaria magna inest , hinc *Lycostoni* cognomen habet à λύκος lupus , & κτείνω occido. B. *Wolfs-wortel*. G. Dolwurtz , Narren-kappen , Ehsenhuettelein , Wolffs-kraut , Gist-kraut. Gall. *Aconit* , *Tuë Loup* , A. *Wolfsbane* , Monks hood or Libbards bane.

ACOPUM , est medicamentum , quod lassitudinem è vehementiore motu corporis contractam , illitu sopit , & dolores levat : è calefacientibus , emollientibusque conflatum. ex α priv. & κοπέω lassio. B. *Salve voor vermoeitheid* / *versris-salf*. G. Eine Salbe vor Muedticit. Gall. *Onguent ou medicamens* , dont on se sert pour oter la lassitude du corps. A. Medicines against weariness.

ACOR est acidus ructus ex cibis acrescentibus non benè digestis in ventriculo. B. *Zuure oprisping*. Gall. *Rapport aigre* , *aigreur*. A. *Sowerness*.

ACORNA , vide *Acarna*.

ACORUM & ACORUS , Est calamus aromaticus officinarum : est duplex *Indicus* vel *Nostros* ; præstat prior fragrantia : in usu radix , quæ oblonga , paululum compressa , in superficie quasi geniculata , externè ex flavo rubescens , intus alba , fungosa , saporis acris , suaviter amaricantis , & aromatici , odoris fragrantis ; in paludibus crescit , eminet tota ex aqua , & tota semper decurrit horizontaliter supra aquam , in limo riparum , & fibræ inhaerent aquæ. Dicitur , quod τὰς ἀράαις , id est , pupillæ seu aciei oculorum caliginosæ medeatur. B. *Calmoes*. A. *Sweet flag* or *Calamus*.

ACOSMIA , est status sanitatis perversus cum faciei decoloratione , vide *Achroi*. Idem quod *Ataxia*. ex ἀκοσμία non orno. B. *Verkleurtheid*. G. Veränderte farbe , uebel gefärbt. Gall. *une mauvaise couleur*. A. *Siekness accompanied with an ill coloured face*.

ACOUSTICA , sunt medicamenta auditum juvantia. ab ακούω audio. B. *Gehoor-middelen*. G. *Gehoer-Mittelen*. Gall. *Remedes contre la surdité*. A. Medicines against deafness.

ACRA-

ACRASIA, est **INTEMPERIES** five qualitatum in mixtione excessus, ex α priv. & κέρανυμι tempero. B. Ongetempertheid onmatigheid. G. Unmaessighkeit. Gall. *Intemperie*. A. Intemperate.

ACRISIA, est turbulentus morborum status, adeo ut nullum, difficile, malumque judicium aut crisis sumi vix possit, ex α priv. & κρίνω judico. B. De ziekteus stilstant wanneer men nauwopks bonnis geven kan. G. Unruhigkeit im Kranckheit. Gall. *Etat de la maladie, ou l'on ne peut porter aucun jugement à son égard*.

ACROCHIR, Gr. ἀκρόχειρ, est summa & extrema manus, cujus termini sunt ulna cum radio, & extremi digitorum apices: dividitur in tres partes minores, carpum seu Brachiale, metacarpum seu post brachiale, & in digitos.

ACROCHEIRESIS dicitur species luctæ vel exercitationis, quando duo homines summis manibus inter se colluctantur, & sese raptant.

ACROCHORDUM, est verrucarum species, dolens est, orbiculari figurâ cum angusta basi, & pensilis verruca appellatur. Vel est verruca sub cute durior, asperior, callosa, & plerumque teres, cuti concolor, infra tenuis, ad cutim latior, Juniores maximè infestans: sic dicta, vel quòd vertice suo similis sit resectæ chordæ, secundum extremitatem, vel quòd in imo adeo angusta sit, ut pendere videatur. ex ἀκρὴ summa & χορδή fides. B. Een wartte / werde. G. eine Wartze. Gall. *Verrue, cor, Porreau, durillon (qui se forme sous la peau aux pieds & aux mains)*.

A. A hanging wart.

ACROMIUM, est scapulæ processus superior, five humeri summitas, ubi cum scapulis claviculæ committuntur; dicitur & humeri micro & summus humerus, ex ἀκρὸς summus, & ὤμος humerus ἀκρόμιον *Ruso*. ἰ πομὶς *Entrip*. ὤμος κεφαλῇ. B. Het Schouder-beens hoofd / uitsteekzel / schouder top. G. Overste theil des Schulterblats. Gall. *l'Acromion, Eminence de l'épaule*. A. A. Sinus at the end of the shoulder-blade.

ACROMPHALUM, vel **ACROMPHALIUM**, est umbilici medium, five umbo, cui funiculus umbilicalis antepartum adhærebat; dicitur & Μεσόμφαλον, Μετομφάλιον, ex ἀκρὸς summus & ὄμφαλός umbilicus. B. Het midden des

des nabels. G. Das mittelst van der nabel. Gall. *Le milieu du nombril.* A. The middle of the navel.

ACROS, significat summum, extremum ita dicitur de naso, de ossium prominentiis, digitorum extremitatibus : & herbarum summitatibus, dicitur idem de Athletarum & morborum vigore, vel ab ἀκρῶς, quod summum notat : vel ab ἀκρῆζω excelsa perambulo. Gall. *Extermitez.*

ACROTERIASMOS dicitur extremarum corporis partium, videlicet manuum & pedum, vel putrescentium, vel quorum ossa perierunt, per ferram resectio.

ΑΚΤΕ, est *Sambucus*. Α'κτὴ Græcis, fortè à littore Attico, quod ad mare : Sambucus quippe aquas amat; ἀκτὴ porrò littus est. Vide *Sambucus*.

ACTIO, est operatio sive Functio, definiti motûs definita exercitatio : solent distingui in vitales, animales, naturales, sexus, Privatas, Publicas : *Vitalis* dicitur omnis motus inseparabilis à vita, ac proin motus cordis, pulmonis, cerebelli. *Animalis* dicitur motus, in quo mens conscia simul concurrit, ac proin sensuum motus, & muscutorum voluntariorum. *Naturalis*, est motus, qui heterogenea assumpta mutat sic, ut abeant in naturam nostram modo positam, quales sunt actiones viscerum & vasorum. *Sexus*, est actio quæ viro vel mulieri propria, ut semen conficiendi vel suscipiendi. *Privata* actio est, quæ modo uni inservit parti, uti est vesicæ urinariæ. *Publica* actio est quæ toti corpori inservit, uti est actio ventriculi. B. *Werkunge/ Bedieninge des Lighaams.* G. Wuerckung. Gall. *Action.* A. An. action, operation, or function.

ACTUALIS IGNIS, vide *Ignis actualis*.

ACULEI, Vegetabilium quæcunque duriuscula in cuspidem turbinata punctionem infligunt spiculatorum modo, nominantur. Gr. ἀκῦραι. B. *Dornen.* G. Dorn, Stachel. Gall. *Espines, Pointes, des piquants.* A. Thorns, or Pricks.

ACUERE, Chymicis est, quando liquor debilis, ab alio fortiori, ad dissolvendum penetrantior redditur. Sic sp. salis acuit succum citri, spiritus nitri acetum destill. ad solutionem pro conficiendis magisteriis. Sic suppositoria acuuntur scammonio, aliisve rebus. B. *Werscherpen.* G. scharpfen. Gall. *Aiguifer.* A. Go Scharpen.

ACULA, est diminutivum ab *Acus*.

ACUS;

ACUS, sunt frumenti purgati fordes levissimæ plerumque pelliculis thecam granorum efformantibus constantes, quæ ventilabris ejaculantur. Gr. σκόλας, ἄχυρον. B. Itaf. G. Sprey, Klev. Gall. *Paille, Balle*. A. Chaff.

ACUS, instrumentum est tenue, oblongum in extremis latibus habens acutiem & rimam, cujus ope partes in unionem solutæ consuuntur, vel uniuntur. B. *En naalde*. Gall. *Une Aiguille*. A. Needle.

ACUS EXPLORATORIÆ, pertinent ad docimasticen Metallicam, & sunt exiles latiusculæ virgulæ metallicæ, quæ lapidi Lydio affricatæ, testantur depuritate metallorum & monetarum.

ACUS INTERPUNCTORIA, dicitur illa, qua utuntur in suffusionibus sive cataractis in oculo removendis. Gall. *Aiguille à cataracte*.

ACUTELLA, est *Ononis*; sic ab acutis spinis dicta.

ACUTUS MORBUS est, qui cum magno periculo, brevi tempore decurrit: estque vel *Perperacutus* sive *Percutissimus*, qui tertio vel quarto die terminatur: vel *Percutissimus*, qui usque ad septimum diem extenditur: vel *Acutus simpliciter*, qui ad decimum quartum vel vigesimum diem ad summum durat: vel *Acutus ex accidentia*, qui quadragesimum diem pro summo termino habet. *Præcipitem* non malè cum *Scribonio* dicas; vel *Celerem* cum *Aureliano*; *Pernicialis* *Livio* dicitur, qui *celeriter* necat aut liberat hominem. Gr. ὅζον νόσημα καὶ πᾶσι. B. *En scherpe haastige ziekte*. G. Gefährliche vel geschwinde Kranckheit. Gall. *Maladie aigue*. A. an acute disease.

ADAMAS, verus; est lapis purissimus; durissimus; solidissimus; liquidissimus; refulgentissimus; pretiosissimus; gemmarum crystalli fortè perfectissimæ simillimus, singularis lucis percussu omne corpus superans. Igni summo, tempore longissimo indomitus resistens; ἀδάμας, ab α privat. & δαμῶ, domo; quòd propter insignem duritiem lapis ille sit ferè indomabilis. B. *en Diamant*. Gall. *un Diamant*.

ADDITAMENTUM, vid. Epiphysis.

ADDUCTORES MUSCULI, sunt illi, qui brachium, crus, pollicem, indicem digitum, oculos &c. adducunt, versùs corpus, quorum Antagonistæ *Abductores* nuncupantur. B. *De nahalende spieren*. G. Herzufuehrende Mausz. Gall. *Muscles adducteurs*. A. The contracting muscles.

ADEN-

A DEN, idem quod *Glandula*.

A DEN OS US **ABSCESSUS**, vocatur tuberculum, crudum, durum, atque omninò contumax discissu, glandulam mentiens, etiam circa loca glandularum expertia enatum.

A DE PHA G I A, est puerorum voracitas, qui subinde alios cibos, prioribus nondum concoctis vel digestis, assument, Græcis componitur ex ἀδδην largiter & φάγω comedo. **B. Gulzig eten / gulzigheid.** **G. Frässligkeit.** **Gall. Voracité, Goulu.** **A. Gréedineess.**

A DE PS, Gr. Στιας, est pars sanguinis oleosa, albicans, in parvis vesiculis membranosis collecta, fovendis & inungendis partibus inserviens: ab Anatomicis à pinguedine distinguitur, cum adeps sit crasior, durior, calore difficilius solvatur & promptè coëat; & hinc in homine vix reperitur, sed modo in brutis: Quomodo hoc sanguinis oleum per vasa peculiaria in vesiculas appropriatas fluit, observatione *Malpighii* constat. Videantur Institutiones nostræ & Anatomia. **B. Smeer / vet / ongel.** **G. Feiszte, Fett, Schmeer, Schmalz.** **Gall. Graisse, sein,** **A. Graef. or fat.**

A DE PT I, dicuntur à Chymicis, qui artem Chymicam benè norunt, & inter Chymicorum Philosophos relati sunt. Vel qui omnem laborem in arcano universali acquirendo impendunt, & in hanc metam adspirant; sic etiam vocantur adeptos qui specialem scientiam crederent se habere sive in Medicina sive in Chirurgia pro sanandis ægris. **B. Angenomene.** **G. Sehr erfahren in der Ehimie.** **Gall. Adeptes.** **A. Skilfull in Chymistry.**

A DI AN THUM, nomen ab eventu accepit, quòd folium ejus aquâ perfusum διαίνεται, id est, non madeat, sicco semper simile. Διαινίπω & διαινίζω est perluo, abluo. Atque hoc potissimum accipiendum de imbre in illam plantam decidente, cujus stillicidium foliis ejus non infidet. Vel quod interioribus puteorum parietibus & fontium marginibus, quas coronat, adhæret: dictum est *Adiantum*, quòd nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen adit & respuit, quærat. **B. Vrouwen hair / Venus hair.** **G. Frauwen haar.** **Gall. Rue de muraille, Capillaire, Adiante.** **A. Maiden-hair.**

A DI AP NE US T I A, est impedita, per insensibiles corporis poros, perspiratio, α priv. & διαπνέω perspiro. **B. Belette doorwaaseming.** **G. Verhinderte Aufllauff der Dunsten.** **Gall.**

Gall. *Transpiration supprimée*. A. Hindred perspiration.

ADIPOSI DUCTUS, vide *Sacculi adiposi*.

Ἀδίψοι, ab α privativo & διψα, sitis, quod sitim sedat.

ADJUTORIUM OS, vide *Humerus*. Sic dicitur, quia in elevando brachio juvat. B. *Hulp-bren*.

ADNATA TUNICA, est membrana oculi extima, orta à Periosteo, ex ambitu exteriori orbitæ, ibidem laxa; mobilis est; vasculosa; toti anteriori oculo obducitur, pellucida, solida est, hac firmatur oculi bulbus; in medio relinquit foramen rotundum pro tunica Cornea, per quam transparet oculi iris & pupilla. Vocatur & conjunctiva. B. *Det aangelwaassen oogvlies*. G. Das angewachsene Häutlein. Gall. *La membrane conjonctive*. A. The outmost coat of the eye.

ADNATA vel ADNASCENTIA, five *Appendices*; ramuli dicuntur, quos caulis nonnunquam ex se mittit, quasi novam adscititiamque prolem. Sic autem vocantur; quod quasi cauli adnascantur & superaccedant. Gr. Παράφυλλοι, quod circum caulem erumpentes accrescant, apellârunt. B. *Wangroeiſel*. G. Angewachsen, Anhang. Gall. *Excroissance*.

ADOLESCENTIA vid. *Ætas*:

ADONIS FLOS, planta est Ranunculi species, cujus caulis rotundus, villosus, intus excavatus, & in multos ramos divisus, folia tenuiter incisa, saporis acris, coloris viridis, flores rosacei, purpurei, qui sustinentur à pedunculo satis longo; radix minima, alba, simplex, saporis ingrati & herbacei; nomen accepit ab Adone veneris Amasio, dicitur & Eranthemum, ab ἐρυθρῷ ruber, & ἄνθος flos, quia hujus plantæ flos est ruber, quibusdam dicitur φλῶξ à floris flammeo igneoque colore. B. *Winnettchen* / *Wuibels-oog*. G. Jeldroslein, Adonis Blum. Gall. *Fleur d'Adonis, espece de Renoncule*. A. Adonis Flower, Red Maithes.

ADOR, *Zea*.

AD PONDUS OMNIUM, significat, quod ultimum in formula præscriptum medicamentum tantum debeat pendere, quantum omnia illa superius præscripta simul.

ADRA RHIZA, est radix dura, & crassa, diciturque de Aristolochia, ἀδρῆς enim est abundans, multus, opulentus, crassus.

ADRACHNE, vide *Andrachne*.

ADSTRICTORIA, vide *Adstringentia*.

ADULTERATIO, significat in Pharmaceuticis medicamentorum fraudulentam corruptionem sub specie genuina. A. Adulteration.

ÆGAGROPILA, sunt pilæ Rupicaprarum seu Damarum oblonga frequentius, & rarius rotunda figura donatæ, quæ in primo aut secundo ventriculo horum animalium reperiuntur; pondere etiam, cum maximæ habentur, levissimæ, & quali ex flocculis lancis confectæ: duplici constant substantiâ, quarum interior gemina, aut fibras radicum, aut filamenta & plantarum cauliculos succo concreto & exsiccatione in pulverem subtilem faciente compacta refert; exterior coriaceam cutim; interdum tamen lignosum corticem quendam, rarissimè crustam lapideam æmulatur, coloris ut plurimum aut cineritii, aut nigri, aut etiam ex luteo obscuri; & magnitudinis variæ, quæ tamen manum in pugnum contractam vix unquam excedat; dicuntur in variis affectibus singulari cum emolumento à Medicis exhibitæ in certa dosi; loco Bezoar Orientalis utuntur. Ab Ægagros Rupicapra & *πίλα* pila. Gall. *Agropille*.

ÆGER, infirmus morbo, ab *αἰ* voce doloris; unde *αἰνάζω*, lugeo.

ÆGIAS, Notat apud Hippocratem concretionem albicantem, quæ pupillæ oculi inhærescit, aciei caliginem offendit, eamque obscurat.

ÆGILOPS, & *Anchylops*, sic dicitur, quia hoc laborantes caprarum in modum intuentur, vel quia hoc affectu capræ sæpe laborant; estque propriè tuberculum, ut plurimum cum inflammatione, à caruncula lachrymali affecta ortum, majorem oculi canthum obsidens; sæpe *Anchylops* & *Ægilops* confunduntur; Quidam tamen distinctionis gratiâ dicunt, quòd *Anchylops* sit, quando illud tuberculum nondum est apertum; *Ægilops* verò ubi abscessus factus est, & ruptus, quòd, si tempestivè non aperiatur, os subjectum cariem contrahit, dicitur & fistula lachrymalis. vide *Anchylops*. B. *Gen geiten-oog / traan fistel*. G. Geisz-Aug. Gall. *Oeil de chèvre*, *Fistule lachrymale*. A. A swelling in the corner of the eye. Sumitur quandoque pro *Lachrymali Fistula*. B. *Oog-fistel*. G. Aug-Flusz,

Flusz, Auegen-Fistel. Gall. *Fistule à l'Oeil*. A. Lachrymal
Fistule. Item est species graminis hordeum euecans, ex
αἰζ caper, & ὠψ oculus, facies, vultus. B. *Dravich / ge-
baarde ebene*. G. Dravich, wilder Haber, Hasen-Brot.
Gall. *Coquiole*. A. Bearded wild Oats or klaver.

ÆGILOPS, est Cerris vel Festuca. Ex αἰζ caper & ὠψ
oculus. Sic dicitur quia putatur hæc herbâ oculorum mor-
bis, qui dicuntur Ægilops, mederi posse. Gall. *fétu*.

ÆGOCEROS, fœnum Græcum esse putatur. Ex αἰζ
caper, & κίρας cornu, quasi diceret capricornus. Ipsius
enim filiquæ, capri referunt cornu.

ÆGOLETHRON, est Ranunculus, qui dicitur Flam-
mula : sic vocatur, quòd quadrupedes & præsertim capri
inde facilè moriantur. Ex αἰζ caper & ὀλεθρον exitium.

ÆGYPTIACUM UNGUENTUM, est compositio
valde deterfiva, improprie unguentum appellatur, nam
neque oleum neque pingue quid illud ingreditur; nomen
ab Ægypti regione traxisse videtur. Gall. *Onguent Ægyp-
tiac*.

ÆIPATHIA, idem quod *Aipathia*.

ÆREOLUS seu *Chalcus*, est Veterum Græcorum pon-
dus, pendens grana duo nostratium.

ÆRUGINOSA BILIS, vide *Bilis*.

ÆRUGO, five VIRIDE ÆRIS, est æris, five cupri,
mediante quovis acido, in friabile & viride corpus redu-
ctio. Gr. ῥὸς χαλκῆς. B. *Spaans-groen / Koper-roest*.
G. Kupffer-gruen, Span-gruen, Gruen-Span. Gall. *Vert-
de-gris, verdet*. A. Verdugrease.

Æs, metallum est, quod in igne quidem fixum satis,
tamen fumans, & aliquâ parte volatile, ductile sub mal-
leo, & in fila subtilia distractile, valde elasticum & tin-
niens, ignitur ante fusionem, solvitur facilè ab omni Sale,
viridescens, cærulescens, & dimisso temerè solvente in
sordes abit informes, pristina coloris pulcritudine amissa,
unde in aëre & aqua florescit, adeoque in parvos crystal-
los mutatur, facillimè cum plumbo & antimonio in Sco-
rias vitrumve versum, à testa in fumos, vel per testam
abit, coloris est sanguinei ad flavedinem tendentis, & gra-
vitatis respectu aquæ, velut 8843. ad 1000. B. *Koper*.
G. Kupffer. Gall. *Cuivre*. A. Copper.

ÆSCHYNOMENE, sic vocatur herba impatiens, seu

noli me tangere, quia tactum humanum non fert, ab αἰσχρονομαί pudefacio. Gall. *la sensitive*.

ÆSCULUS, potius *Esculus*, est arbor glandifera incertæ speciei, dicta, quia ejus fructus seu glandes comeduntur, fortè ab αἰσὶ semper, & ἔδω edo.

ÆSTUARIUM, idem quod *Vaporarium*.

ÆSTUS, idem quod ardor, ustio, notat quoslibet fer-vores, sive sint externi à sole, pharmaco, igne; sive interni à febribus & inflammationibus; dicitur etiam de aëris fervoribus. Gall. *Ardeur*. A. Heat.

ÆTAS, est certus temporis decursus, quem id, quod vivit, transigit, & quo evidentem mutationem subiit. Estque sextuplex, *Pueritia* nempe ad annum quintum, quæ distinguitur in tempus ante, in, & post dentitionem. 2. *Adolescentia* ad annum decimum octavum, & adolescentia propriè dicta ad vigesimum quintum. 3. *Juventus*, à vigesimo quinto ad trigessimum quintum. 4. *Virilis ætas*, à trigesimo quinto ad quinquagesimum. 5. *Senectus*, à quinquagesimo ad sexagesimum. 6. Hanc sequitur *Decrepita ætas*, quæ tandem in mortem terminatur. Gr. Ἡλικία. B. *Olderdom*. G. Alter, Alterthun. Gall. *Age*. A. Age.

ÆTHALES, est sempervivum, sic dicitur quoniam semper viret. Ex αἰσὶ semper & τάλλω vireo, pullulo.

ÆTHIOPIS, est herba foliis valde lanuginosis, sic dicta, quia ex Æthiopia huc allata.

ÆTHIOPS MINERALIS, est præparatio ex Mercurio, quando nempe duæ florum sulphuris partes cum unica parte argenti vivi miscentur: deinde mixtum accenditur & pulvis niger remanet: vel paratur, sumendo florum sulphuris optimorum drachmam unam, & Mercurii drachmas tres, conteruntur in mortario vitreo, diu, fortiter, donec dispareat argentum vivum, & fiat pulvis niger; Pulvis hic inodorus, insipidus nullo modo acer, nulli rei facile misceri integrè potest: datus intra corpus, non valet vasa absorbentia venosa, vel Chylifera vel lymphatica, ingredi, si fortunatò operatur, vermibus fortè, necatis, ano exit, decipiuntur ergo, qui illum ut anti-venereum exhibent, vel alios effectus ab ipso sperant, damnosos fortè producit nimiam copiâ datus infantibus, puellis & tenuioribus, quia est massa tantum insulsa, iners, fossilis, naturæ indomita à summa nigredine Æthio-

thiopis nomen meruit. Gall. *Æthiops mineral.* A. *Æthiops mineral.*

ÆTIOLOGIA est causæ explicatio seu ratio de rebus medicam artem spectantibus. Unde *Ætiologica* pars Medicinæ est, quæ causas morborum & sanitatis exponit. Ex *αἰτία* causa, & *λόγος* ratio.

ÆR, Est fluidum valde elasticum, & compressile, grave, infinita & varia in se continens corpora. B. *de Lugt.* Gall. *l'Air.* A. Air.

ÆR INGENITUS, sive *Innatus*, veteribus dicebatur, qui in cavo tympani in aure hæret, verum per recentiores detectum est, quod renovetur per Tubam Eustachianam. B. *Ungewore logt.* G. Die mitgeborhne Lufft. Gall. *l'Air qu'on trouve dans l'interieur de l'oreille derriere le Tympan.* A. Innate air.

ÆTITES, lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante: hujus genera pro diversitate superficiei, (scabræ sc. vel lævis) colorum, tum materiæ inibi contentæ, constituuntur quatuor. Primum est exterius, scabrum colore vario, plerumque nigricante: continet in se lapidem *Collimum* dictum. Secundum cinerei coloris est, ac in se argillam vel margam continet. Tertium terram in se concludit. Quartum præter hos addit *Plinius* nomine *Taphusium*, qui nostratibus incognitus. Primus orientalis est, raroque pruni magnitudinem superat. Secundus & Tertius etiam in Germania juxta Sweinfurtum reperiuntur, pugni que magnitudinem sæpe æquant. Dicitur & *Lapis Aquila*, quod in Aquilæ nido reperiatur, ad promovendum, ut fabulantur, partum ab aquila eò deportatus, ab *αἰτὸς* aquila. B. *Ären-steen / Adelaer-steen.* G. Adler-Stein, Klapper-Stein. Gall. *Pierre d'Aigle.* A. The Eaglestone.

AFFECTIO COELIACA, vide *Cæliaca passio*.

AFFECTIO COLICA, vide *Colicus dolor*.

AFFECTIO HYPOCHONDRIACA, vide *Hypochondriacus affectus*.

AFFECTIO HYSTERICA, vide *Hysterica passio*.

AFFECTIO NEPHRITICA, vide *Nephritis*.

AFION, idem quod *opium*: dicitur & *Offium*: est & nomen Electuarii ab Indis Orientalibus in Bantam parati ad excitandam venerem & ferociam.

AFFLICTIO, est ægritudo animi cum vexatione corporis conjuncta. Gall. *Affliction.* B 3 *AFRI-*

AFRICANUS FLOS, vide *Tunetanus Flos*.

AGALACTIA, est lactis defectus, ex α priv. & γαλακ. B. *Gebrek van zög*. G. Gebrech von Milch. Gall. *defaut de lait*. A. Want of milk.

AGALLOCHUM, sive *lignum Aloës*, Gr. *εὐλαλόη*: est lignum, cujus frusta rarò magna ad nos adferuntur, ut plurimùm enim in fragmentis nobis transmittuntur, nam ex integra arbore sæpe, quæ quercu magnitudine non inferior est, vix lib. sem. ligni laudabilioris eruitur, hæcque optima crescunt nigro-purpurea, venis cinerei coloris intersecta, amara, ponderosa, liquorem, si prunis, candentive ferro imponantur, exsulantia; aromaticum & suavem fumum, si incendantur, præbentia, bullulasque simul post se relinquentia, haud ita faciliè disparentes; his adde haud postremum bonitatis signum, si aquæ supernatârint. Dicitur & *Lignum Paradisi*. Nascitur in Sumatra, Champac vicina Chinæ Regno regione, & in Cochin China. B. *Aloë-hout / Paradijs-hout*. G. *Paradies Aloes-Holtz*. Gall. *Bois d'Aloë, ou de perroquet*. A. Wood of Aloës. Indis, Calambac. Gr. *Ἀγάλλοχον*, ab *ἀγάλλομαι*, exulto, glorior, quod insignem suavemque in fustitu spiret odorem; nec non oris gratissimum præstet halitum, viresque roboret. Hinc Chineses maximè ejus odoratu delectantur, & quo gratior amicus, eo meliorem portionem ipsi offerunt. De *Agallocho* vide quoque *Rhodium Lignum*.

AGARICUS vel AGARICUM, est Excrefcentia formâ fungi nata in trunco aut magnis ramis plurimarum arborum, ut Laricis & veteris Quercûs, duæ sunt species Agarici, una vocatur fœmina, quæ est alba, levis, friabilis, & tenera, habetque rectas intus, pectinum modo, venas & incisuras; saporis statim post assumptionem dulcis, sed mox in amaritudinem transit, odoris est penetrantis; hæc est optima species; altera species, quam vocârunt mas, est flava, compacta, gravis, lignosa, & tenax; hæc nihil valet, crescit plerumque in veteri trunco Quercûs. Venit ex Italia, nascitur in Sarmatiæ regione, quæ Agaria dicitur, indeque nomen accepissè perhibent; vel ab Agaro, quem & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolomæus. B. *Λορκεν-ζωανιμ*. G. *Lerchenschwam*. Gall. *Agaric*. & A. Agarick. Gr. *Ἀγαρικόν*.
AGE-

AGERATUM, est planta flore monopetalo, personato, infernè tubulato, supernè in duo labia diviso, colore luteo, folia germinat multa, parva, oblonga, incisa, repentia, saporis amari; semina reconduntur in capsula membranosa; radix ejus fibrosa, parva, flavescentia, crevit in montibus & locis ficcis: officinalis est, vox fit ex *a* priv. & *γῆρας* senectus, quòd Flos colore vix senescat. B. *Rhijn-bloemen* / *Motten-kruid*. G. Rheyne-blumen, Jungling, Motten-blume, Motten-kraut. Gall. *Ageraton*. A. Maudling or Maadling Tanfy.

AGERAZIA, est infenscencia. ex *a* priv. & *γῆρας*, senectus. B. *Jeugdigheid in oude jaren*. G. Gruenend alter. Gall. *Fleurissante vieillesse*.

AGGLUTINANTIA, vocantur quæ vulnere labia deducta conjungunt, & ad perfectam unionem deducunt, qualia sunt adstringentia & exsiccantia. B. *aan malkanden lymende of hegtende Medicamenten*. Gall. *Remedes agglutinatifs*.

AGGREGATIVÆ PILULÆ, dicuntur ab aggregare: quia ut inventor Mesue putabat, illis omnes humores aggregantur.

AGNATA TUNICA, idem quod *Adnata*.

AGNINA TUNICA, idem quod Amnios tunica quam v.

AGNUS CASTUS, est *virex*. Agnus dicitur, quasi *ἄγνος*, sine semine: quòd crederent, ab illo Veneris impetum cohiberi, adeoque semen in viro infecundum reddi, & ne quidem generari, his enim foliis cubitus castitatis ergo sternebant. Sed *ἄγνός*, Lat. est castus, & unicam vocem bis nominant, semel nempe græcè, & semel latinè. B. *Kuss-boom*. G. Schaffinule & Keusch-baum. Gall. *L'Aiguel chaste*. A. The Chast-tree.

AGOMPIASIS, vide *Gomphiasis*.

AGON certamen; significat sæpe summum vitæ periculum ex morbo. A. a Shiveing.

AGONIA, est timor & animi contristatio ab *αγωνία*, anxius sum, sive potius illam horrendam hominis conditionem, quâ summâ anxietate oppressus, semet ipsum perferre non potest, & morti quam proximus est. B. *Woefheid*. G. Traurigkeit, unmuth. Gall. *Agonie*, *combat*, *Angoisse*. A. An Agony.

AGONIA seu *Atecnia*, est sterilitas, quæ est mulieris viro utentis

tentis ad concipiendum ineptitudo, dicitur & ἀφορία ab ἀprivat. & φέρω fero, porto; si à parte Viri, fit vel ex vitio membri genitalis, vel seminis ipsius malâ qualitate, vel defectu, in foeminis à mala uteri vel aliarum partium conceptui inservientium mala dispositione vel conformatione. B. Onbevrigtheid / Zadeloosheid. G. Unfruchtbarkeit. Gall. Sterilité. A. Barneest, unfruit-fulness.

AGONIZARE, dicuntur, qui ex superante vi morbi & viribus vitæ prostratis efflando animam proximi sunt ab ἄγων certamen. Gall. Agonizer.

AGRESTA, vide *Omphacium*.

AGRIA, est *Agrifolium*.

AGRICANTHA, est Cardui feri sylvestris species, ab ἀγρίος ferus, & ἀκάνθα carduus.

AGRIELÆA, est Olea sylvestris, ex ἀγρίος sylvestris, & ἐλαία Olea.

AGRIFOLIUM five Aquifolium, est frutex qui crescit sæpe ad arboris altitudinem, ejus truncus & rami sunt flexiles, habentque duplicem corticem, viscosum griseum aut viridem externè, pallidum internè, odoris ingrati; lignum est durum, compactum, ponderosum, album in sua substantia, in interiori parte nigricans; habet folia in ambitu longa, Laurum referentia, acuta, rigidis spinis armata, semper virentia, baccas parvas, rotundas, rubras, quaterna semina triquetra continentes: Fortè ab ἀγρεῖον venor, quia ejus glutine aves capiuntur. Vel ab ἀγρίος ferus sum, idque propter folia spinis acutis horrida. Referunt Cæsalpinus & Dodonæus, quod frutices hi, ubi veterascunt, aculeos deponunt, & folia horum loco producunt similia Lauri foliis. B. Hulst. G. Walddisiell, Stechpalmen. Gall. Houx. A. The Holly-Tree.

AGRIMONIA, five Eupatorium Græcorum, est herba officinalis cum foliis pinnatis, nervosis, rugosis instar Pimpinellæ; floribus hexapetalis rosaceis, in spicam congestis; florem fructus sequitur exiguus, qui binum vel solitarium semen continet. Radix perennis est, longa, mediocriter crassa, nigricans: nomen accepisse videtur, quia sibi in agris alimoniam quærit, vel quod nomen obtinuit ab Argemone, cujus etymon vide in *Argemone*. B. Agrimone / leber-kruid. G. Ondermeuig, Bruchwurtz. Gall. Agrimoine. A. Agrimony.

AGRI-

AGRIMONOIDES, est Agrimoniae species, ex Agrimonia, & ἄλδο forma differt verò, quòd flos non sit ita congestus, neque fructus ita hispidus, & non duo uti in illa dantur, saltem unus.

AGRIOCARDAMUM, est Nasturtii aquatici species; ex ἄγριον sylvestre, & nasturtium, vide Iberis.

AGRIOCASTANUM, est Bulbocastanum, ex ἄγριον sylvestre, & κάστανον castanea.

AGRIOCINARA, est Articocalus sylvestris ex ἄγριον sylvestris, & cinara.

AGRIOCOCCIMELEA, est Prunus sylvestris, ex ἄγρια sylvestris, κόκκον bacca, Prunus, & μηλιά malus.

AGRIOMELEA, est Mali Cydonii species sylvestris, ex ἄγρια sylvestris, & μηλιά malus.

AGRION, dicitur Peucedanum. ἄγριον sylvestre est, quia fortè sylvestria, & montosa amat loca.

AGRIOPASTINACA, est Saxifraga Candiae, ex ἄγρια sylvestris, & pastinaca.

AGRIOPHYLLON, dicitur Peucedanum, ex ἄγριον sylvestre, & φύλλον folium.

AGRIORIGANUM, est Origanum sylvestre, ex ἄγριον sylvestre, & origanum.

AGRIOSELINUM, est Ranunculi species, ex ἄγριον sylvestre, & selinum.

AGRIOSTARI, est frumenti sylvestris species, ex ἄγριον sylvestre, & σάιζ farina triticea aqua subacta.

AGROSTIS, graminis species, ab ἀγρός rus, ager, ita dicta, quod ibi proveniat.

AGRIPPA, quasi ÆGRIPPA, ab ægro partu dicuntur, quorum nascendo non caput, sed pedes primi exierunt. Fuerunt autem multi sic appellati, quorum unus fuit Menius Romanus cognomento Lanatus. Alter Sylvius Agrippa duodecimus Latinorum Rex; etiam Marcus Agrippa, Augusti genere, & Herodes Agrippa, Herodis primi Judæorum Regis filius. B. Een kind / dat in't ba-
ren met de voeten vooz komt. G. Ein Kind dasz mit dem fueßsen vor auff komt. Gall. Un enfant qui se presente dans l'accouchement par les pieds. A. A. Child that is with te feets for out borne.

AGRYPNIA, five PERVIGILIUM, aut VIGILIÆ NI-
MIÆ, & COMA VIGIL, est cum somnus diu inter-
rum,

rumpitur, per aliquot dies, vel per aliquot menses, vel ut dicitur, Annos. Alii ex fomno irrequieto sapius evigilant, & per aliquot temporis spatium redormire non possunt. Sunt quoque sani, qui parumper dormiunt, diu vigiles: at in omni penè dolore vigiliæ urgent, & in ple-
risque febribus & morbis aut pervigilium est, aut irriquei-
tus somnus; inprimis ubi levissimæ inflammationis cere-
bri prima initia, quibus auctis in coma mutatur sæpe; se-
nes item sæpe molestis vigiliis fatigantur, quas etiam effi-
ciunt ira, tristitia, sollicitudo, gaudium, meditatio, me-
tus, lusus &c. B. *Waken / Waking / Slapeloosheid.* G. Wen man nicht schlaffen kan. Gall. *Insomnies.* A. Wat-
ching, Waking. Componitur vox Græca ex α priv. ὕπνῳ
somnia.

AGRYPNOCOMA, ex ὕπνῳ somnus, & κῶμα sopor
inordinatus, idem quod *Coma vigil.*

AGYNOS, est Agnus Castus. Ex α priv. & γύνῃ fœmina:
hoc est, qui sine uxore aut concubina vitam cælebs tranfigit.

AIGINE, idem quod Caprifolium, ab αἶζ caper.

AIGIROS, est arbor Populus dicta, ab ἀίρειν experge
facio; quia folia, ob tremulum motum vigilare semper vi-
dentur.

AGYRTA, CIRCULATOR, five CIRCUMFORA-
NEUS qui medicamentis empiricis vendendis se dicat, ea-
que morbo cuivis absque ratione ulla expellendo valere
jactat, hincque lucri gratiâ populum in foro congregat,
ab ἀγροω, populum congrego; olim ita vocabantur Præ-
stigiatores, qui divinâ quâdam virtute, carminibus, & sa-
crificiorum mysteriis, se morbos infligere; inflictos quo-
que curare, & si quid sceleris esset commissum à diviti-
bus, eorumque proavis, id magicâ sacrificiorum celebri-
tate, suffimentorumque odore expiare, eorumque inimi-
cos, tam fontes quàm insontes, carminibus oblâdere pos-
se, gloriabantur. B. *Een Quakzalver / Brun-haas / een*
Tan potagic / etc. G. Landsfâhrer, Landfireicher. Gall. *un*
charlatan, un basteleur. A. A quak-salver, a mountebanke.

AHENUM, est vas cupreum, vel ferreum, medicamen-
tis coquendis & destillandis destinatum, dicitur & *Cucu-*
ma. B. *Een ketel.* G. Ein Kessel. Gall. *une chaudiere,*
un coquemar, un chaudron. A. A. Bras-kettle.

AIPathia, vel ÆIPATHIA, est perpetua passio,
seu

seu continua patientia, ab αἰσῇ semper, & πάθος passio.

AISTHESIS, sive sensus, estque *externus*, ut visus, auditus, odoratus, gustus & tactus, hisce addunt sitim, famem, & coëundi appetitum. Vel *internus*, ut vulgò sensus communis, phantasia, memoria, judicium, rationum &c. *Aisthesis* cum externus est sensus, est receptio, quâ motus à corpore aliquo objecto, fibrillis nervorum impressus, sensorio communi, seu animæ, medianibus spiritibus animalibus in nervis existentibus, communicatur, ab αἰσθάνομαι sentio. B. *De zin/ bevatting.* G. Die sinn, empfindlichkeit. Gall. *Sens, ou sensations.* A. The sense.

AISTHETERIUM, est sensorium commune, ab *Aristotele* dicitur τὸ πρῶτον αἰσθητήριον, quod *Cartesius*, alique hujus affectu plures glandulam pinealem esse volunt: verum sensorium commune debet esse, ubi sensuum externorum nervi terminantur, qui non in glandulam pinealem, sed (ut ingeniosiss. *Th. Willisus* demonstravit) circa initium medullæ oblongatæ in corpore striato, suum terminum consequuntur; vel si nervos continuationes ramorum arteriarum juxta nonnullos ponamus, ad eorum exortum communem sensorii sedes ponenda erit, adeoque ubicunque cerebri corticalis substantia est, erit aistheterium. Et si rectius philosophari velimus, erit anima nostra ipse sensuum terminus. Gr. ab αἰσθάνομαι, sentio. B. *De geniesne zin-plaats.* G. Allgemeine platz der Sinnen. Gall. *le sensor commun.* A. The common sensory.

AJUGA, est *Chamæpytis*, dicitur & abiga. Fortè, quasi sine jugo, quia abortum concitat. Vide *Iva* & *Abiga*.

AIZOON, est *Telephii* & *Sempervivi* species, quæ diu in vivis persistunt, ex αἰσῇ semper, & ζῶν vivum.

AL, est particula Arabica, quæ nominibus in principio sæpe apponitur, ad rem nempe exaltandam, ut in *Alcali*, *Alchymia*, *Alhandal*, *Alkekengi*, &c. idem sonat ac *Hebræorum Ha* & *Belgarum De/ het*. G. Das, die. Gall. *Le, la.* A. A, the &c.

ALABASTRI, sunt folia illa viridia herbacea, quæ flores nondum explicitos sepiunt. B. *Knoppen.* G. Knoepffe. Gall. *Boutons.* A. Button. In *Mineralogia Alabastrer* seu *Alabastrites* lapidem certum denotat, qui & unguentum *Alabastridis* ingreditur. Vide *Alabastrites*.

ALA.

ALABASTRITES, est species marmoris, verum ipso mollior. Hic est ita mollis, ut cultro scindi possit, & est id lapidis genus, è quo varia torno finguntur vasa. Unguentum ingreditur Alabastrinum. Gr. *Ἀλαβαστρίτης*, Alabastrum. B. *Alabaster*. G. Alabafter-stein. Gall. *de l'Albâtre*. A. Alabaster.

ALANA TERRA, vide Tripolis.

ALÆ, dicuntur nasi Latera. B. *De Neus-bleugels*. G. Beyde seitlein zue unterst ander-Nazen. Gall. *les Cotés des Nârines, ou les Ailes du Nez*. A. Winge of the nose. Item Nympharum pinnulæ, seu labia pudendi muliebris, *πτερυγάματα, μυρτόχαιλα, κρημνοί*. B. *De Drouwelijchheid Lippen*. G. Die lippen an der Frauwen scham. Gall. *Ailes des parties honteuses de la femme, les levres*. A. The wing of the privie parts of a womam. *Alæ*, etiam dicuntur pulmonum lobi. Gall. *les lobes du Poumon*. Item, superior auris pars elata. B. *Het opperste des Oors*. G. Das Ohr-läplein, fluegel des ohrs. Gall. *l'Aile de l'oreille ou la partie supérieure*. A. The wing of the eare. Item axillæ. Gr. *μασχάλα & μάλη*. B. *De orel*. G. Die achsel. Gall. *Aisselle*. A. The armhole, the armpit. Item processus ossis sphæ-noidis. B. *De vlcugeis wyse uitsteekfels*. G. Die Flugeln von das keilbein. Gall. *Ailes des Apophyses de l'os sphé-noide*. A. The wings of the wedgebone. Item alæ vesper-tilionum alis similes, vide *Vespertilionum alæ*. Item *My-staces*, vide *Mystax*. Item plantarum cavi inter caulem & ramulos anfractus, unde sinuatim nova proles egreditur, factâ ab humanis translatione, dicuntur.

ALARES MUSCULI, vide *Pterygoides*.

ALARIA OSSA, sunt processus Pterygoides ossis Sphæ-noidis. Gall. *Apophyses Pterygoides*.

ALANTOIDES, vide *Allantoides*.

ALATERNUS, est arbuscula semper virens, cujus folia alterna, semper virentia, oblonga, satis magna; calix tubulosus profundè, quinquifidus, instar stellæ expansus; ex parte interna calicis ex interstitiis segmentorum, flos monopetalus, infundibuliformis, quinque partitus, quasi stellæ in modum expansis segmentis: ovarium in fundo imi calicis, donatum tuba erecta trifida, fit bacca mollis, succulenta, post maturitatem nigra, facta ternis seminibus gibbis ab una parte, ab altera angula-tis;

tis : an derivetur ex Italico fermone *a*, id est ad, & *Lih-terno*, Italiæ fluvio, cui fortè adnascitur ; vel ab alterno, quia folia ejus alterno ordine in caulibus sunt disposita. Gall. *Alaterne*.

ALBADARA, est arabica vox, significatque officulum majus pollicis articulo ad metatarli ossis caput appositum.

ALBA PITUITA, idem quod *Leucophlegmatia*.

ALBARAS NIGRA, vide *Lepra Græcorum*. *Albaras alba*, vide *Leuce*.

ALBINUM, est Gnaphalium marinum, sic à lanugine alba, dictum.

ALBUGINEA oculi, Est membrana, quæ obducit partem anteriorem & hemisphæricam oculi, scleroti firmiter adhæret, videtur tantum esse expansionem tendinosam quatuor muscutorum oculi, quæ circa Corneam valde attenuatur, & in ipsa quasi evanescit, an sit eadem, quæ adnata, videantur Anatomici : datur & altera similis membrana Albuginea dicta, testem obvolvens immediatè, robusta est, arctè cum substantia testis cohærens, vasa spermatica recipit, & ad testes transmittit. B. *'t Witte vlies*. G. Das Weiße augen hautlein. Gall. *Membrane albuginée*. A. The white coat of the eye.

ALBUGO oculi, idem quod Album oculi. Item macula alba in tunica cornea, vel ab humoribus, vel à cicatrice aut exulceratione, excitata. Gr. *λευκωμα*, & *αίγίς*. B. *Gen witte oog-vlek*. G. dar weiße augenfell. Gall. *Une tache blanche à l'œil*. A. White spots in the eyes.

ALBUM CANIS, est stercus album canis, quod sub Canis sydere legebatur æstivis summis ardoribus. vel dicitur *Album Græcum*. uti stercus murium dicitur *Album Nigrum*.

ALBUM OCULI, dicitur, ubi tunica adnata seu albuginea scleroti tunicæ adnascitur. B. *Het wit van 't oog*. G. Das weiße in augen. Gall. *Le blanc de l'œil*. A. The white of the eye.

ALBUM RHASIS, unguentum est, ita dictum à colore albo, & ab Autoris nomine. Rhasis enim insignis fuit Medicus ex Arabum familia.

ALBUMEN OCULI, vel ALBUGO, *λογὰς, σφειδνη, κυκλώπιον*. Idem quod *Album oculi*.

ALBUMEN OVI, liquor albus, lentus, vitellum undique

que cingens, externè duabus tunicis investitus, membranis in plurimos orbiculos separatos distinctus, veluti cæpæ bulbis, per quos chalazæ dispersæ, nutrimentum pullo adferunt, recens si est, igne concrefcit in duram materiam, sed incubatu redditur fluidissimus, tenuissimus, volatu exhalans, non concrefcens igne, sed putrescens, fitque sic aptus alendo fœtui. B. *Wit van het Eyp.* Gall. *le Blanc ou le glaire de l'œuf.*

ALBURNUM, est mollis, ac pessima ligni pars cortici proxima, ab Albore dicta est Plinio, adipi in homine respondet. B. *Spint.* Gall. *l'Aubour, ou Aubier (le blanc & la partie la plus tendre entre l'Ecorce & l'Arbre.*

ALCAHEST vel ALKAHEST, ac si diceres *Alcali est.* Describunt esse generale resolvens, perenne & immutabile, quod reducit omne corpus visibile in liquorem sui concreti, servatâ seminum potestate, forma essentiali & nativa integra. Magni nominis, si modo paris effectûs, quem quisque suo processui tribuit. Nonnulli in mercurio variè præparato illud quærunt, alii in Tartaro, ejusve præparatis: in alcali fixato nitri, ut Glauberus, vel in acerrimo aceti spiritu ab æruginè destillato, ut Zwelferus, & alii in aliis, sed talem dari liquorem, vel universale menstruum omninò impossibile videtur. B. *Ein allgemein scheidefeucht.* Gall. *Un Alcabest, dissolvant universel, un Menstrue universel.* A. A generall dissolvent.

ALCALI, Est sal, fixus, aut volatilis. Quod extrahitur è cineribus vegetabilium vel animalium aperto igne combustorum, vel calce cujusdam materiæ per lixivium elixatum, cognoscitur. 1º. Ex ortu suo ignis, putrefactionis, naturæ ope. 2º. Ex materie sua, vegetabili, Animalis, Fossili. 3. Effectu effervescentiæ cum acidis; præcipitationis; coalitûs cum oleis, solutionis imprimis sulphuris: mutationis coloris Heliotropii, Rosarum, violarum, in viridem colorem, qui cum acidis in rubrum, sapore ipso, doloris urentis excitatione. Sal illud Alkali nomen ab herba *kali* accepisse affirmatur, cujus sale *Ægyptii* ut & nostrates vitrum conficiunt, Vitriariis *fouda* appellatur. Alkali triplex accipitur. Nempè *Alcali Volatile*, uti conficiuntur ex animalibus, sal sc. cornu cervi, urinæ &c. *Fixum*, quod ex cineribus plantarum elicitur,

citur, uti fal absinthii, tartari &c. *Metallicum & Petrosum*. Metalla enim & lapides cum acidis menstruis effervescent, & dissolvuntur & hoc respectu hæc cum alcali tantum congruunt, inde tamen alcalia non dicenda. Hisce addunt Alcalia mixta, ut sunt nitrum, alumen, vitrioli genera, sal fossile & marinum &c. quæ ex acido & alcali participant. B. *Zuiver Zout*. G. *Asschen-Saltz*, *Kalck-Saltz*, *Sæuber-Saltz*. Gall. *Sel alcali*. A. Alkali.

ALCALISATIO, est, quando verbi gratiâ spiritus vini alcali quovis imprægnatur, ut menstruum evadat magis dissolvens.

ALCANNA, est Anchusæ Monspessulanæ floribus puniceis radix tenuis, longa, lignosa, rubra, roseo colore tingens, saporis adstringentis. Ex radice Indi cum calce viva extrahunt Tincturam, cum qua dentes & ungues rubro colore tingunt, etiam crines equorum, in aquosis non facile extrahitur ejus color, sed in oleosis dat colorem seu tincturam rubram. B. *Alkanne Doxtel*. Gall. *l'Orcanette*. A. *Gastern privet*.

ALCE, ALCES, Gr. ἀλκή, id est vis & robur. Nomen animalis robustissimi, cervo majoris, cujus ungula in usu Medico est. Gall. *Elan*, ou *suirant d'autres une Ane sauvage*. A. an Alk.

ALCEA, est Herba, cujus caules villosi, asperi, medullam fungosam habentes, folia malvæ, magis divisa, villosa, caulibus longis adhærentia; semina latiora, in capitula congesta; reliqua Malvis communia. Dicitur ab ἀλκή robore, auxilio, remedio, quod fortiter dysentericis ac ruptis medeatur impositum. B. *Sigmaarts-fruid*. G. *Sigmars-Kraut*, *Sigmunds-Wurtz*. Gall. *Mauve sauvage ou Alcée*. A. *Vervain Mallow*. Dicitur etiam *Simeonis herba*.

ALCEDO, ἀπὸ τοῦ ἐν ἡλὶ κύειν, quod in mari pariat illa avis species. Gall. *Alcyon*, *petit Oyseau qui fait son nid sur la Mer par un temps calme*.

ALCHEMIA, idem quod *Alchymia*, vide *Chymia*.

ALCHIMILLA, est planta cujus folia ex radice erumpunt, caulibus longis adhærent, & serrata sunt; calix in octo vel novem segmenta fissus superius, inferius tubulosus est satisque amplus, segmenta quatuor majora, quatuor minora, in stellam expansa; caules parvi, rotundi, villosi,

loſi , ramoſi ; flores in ſummis caulibus habent ſtamina quatuor , & in umbellam diſpoſiti ſunt ; ovarium in fundo Calicis tubam emittit apice ſphærico donatam ; calix fit capsula continens bina plerumque ſemina , parva , rotunda , flava ; Radix longa , digitum craſſa , externè nigra , fibris inſtructa. Vocatur *Pes Leonis* & *Stellaria* , ſic appellatur , quòd Alchimiftarum præconiis fit celebrata. *Pes Leonis* dicitur , quòd folia habeat inſtar Leonini pedis lata & rotunda. B. *Onzer Drouwen Mantel* , *Leeuwen-boet*. G. Synnauw , Leuwen-Fuſz. Gall. *Pié de Lion*. A. Ladies mantell.

ALCHYMIA, ſeu ALCHEMIA, eſt propriè illa, Chymia pars , quæ agit de metallorum tranſmutatione , ſive depuratione , quâ metalla ignobiliora (cruda & immatura juxta Chemicos) in nobiliora & matura ope artis rediguntur. Venit ex *Al* particula intensiva & *χῡμα* fundo. Gall. *Alchymie*. A. Alchymy.

ALCIBIADIUM & ALCIBIUM , eſt Echium , ſic dictum , quod Alcibiſ quidam primò herbam illam adverſus viperarum morſus invenerit.

ALCOCALUM , eſt *Cinara* ſive *Articocalus* , fortè ab ἄλκη robore & κόκκαλον pini fructus ; idque ob pini fructus figuram & ungues ſquamofos.

ALCOHOL, ALCHOOL, ALCOOL, ALKOL, ALCOL, vox origine Arabicâ , eſt purior ſubſtantia rei ſegregata ab impuritate ſua. *Alcohol* ſignificat pulverem ſubtiliſſimum & impalpabilem. Interdum ſpiritum fermentatione productum , rectificatiſſimum , ita dephlegmatum , ut accenſus ardeat , donec totus conſumatur , nihilque ſæcum , aut phlegmatis in fundo remaneat. B. 't *Subtyleſte* / en 't pit van ietg. G. Das feinſte von ein Ding. Gall. *l'Alcohol* , *Le plus ſubtil de quelque choſe*. A. The purer ſubſtance of any thing.

ALCOL, idem quod *Alcohol*.

ALCOOL, idem quod *Alcohol*.

ALDABARAM, vocantur duo officula ſub pollice pedis poſita & minori fabæ quadantenus ſimilia.

ALECTORIUS, eſt lapis , qui in ventriculis vel Hepate Galli gallinacei reperitur.

ALECTOROLOPHOS, eſt herba pratensis, cui nomen *Chriſta galli*. Ex ἀλέκτωρ gallus , & λόφος criſta , dicitur quoque

quoque *Fistularia*, *Pedicularis*, & *Mimulus*. B. *Hand-
len* / *Hane-Hammekens*. G. Rodel, Leuz Kraut. Gall.
Crête de coq. A. Cocks-comb, or yellow Rattle.

ALEMBICUS seu ALEMBICUM, vel CAPITEL-
LUM, seu GALEA. Putatur derivari ab articulo Ara-
bico *Al*, & Græca voce *ἀμβίξ*, vasis species : est instru-
mentum chymicum, quod cucurbitis & vesicis destillato-
riis operculi vice superimponitur : habet formam galeæ,
intus concavam, extus convexam. Circa infimam par-
tem rostrum habet cubitale, per quod vapores descendunt.
Si sine rostro fuerint, usum potius in vasis circulatoriis
obtinent, & *Alembici cæci* vocantur. Gall. *Le rencontre*.
Conficiuntur ex ære, stanno; vel vitro. Alii pro ipsa
cucurbita sumunt : iterum alii pro cucurbita capitello si-
mul juncta. B. *Gen helm / een alembek*. G. Alembick,
Helm, Rosenhuet. Gall. *Alambic*. A. An Alembick or
Still.

ALEPHANGINÆ, vel ALOEPHANGINÆ PILU-
LÆ, est vox Arabica, significans rem odoram; compo-
nuntur enim hæ pilulæ, in officinis prostantes, ex Aloë,
& plurimis aromatis.

ALTERCUM, herba venenata, ab altercationibus,
quas animo inducit, dicta. Vide *Hyoscyamus*.

ALEXICACON, est Amuletum venenis resistens. Ex
ἀλέξω opem fero & *κακόν* malum.

ALEXIPHARMACA, *ἀντιδοτα*; *ἀντιδοτοι*, *Ἀλεξίφαρμακα*,
Ἀλεξίθέρια, *θερίακα*, dicuntur medicamenta, quæ valent
inertes reddere qualitates veneni cujuscunque, quibus no-
cet corpori, licet hæ minùs cognitæ; sed nulla talia A-
lexipharmaca generalia dari posse patet evidenter ex hi-
storia venenorum : sunt tamen ut plurimum ea, quæ ob-
liniunt suâ oleositate, diluunt suâ aquâ, vel immutant
veneni partes peculiari virtute, vel quæ sanguinem attē-
nuant, ne à veneno coaguletur, ut volatilia omnia & aci-
dum concentrantia, ab *ἀλέξω* arceo & *φάρμακον* venenum.
B. *Gen Tegen-gift*. dicitur etiam *Antidotus* & *Ale-
xiterium*. G. Artzney wider Gift. Gall. *Preservatif, con-
trepoison, antidote*. A. Medecines or Antidotes against
poyson.

ALEXIPYRETICUM, & ALEXIPYRETUM, &
ANTIPYRETUM, idem quod *Antipyreticum*.

ALEXITERIUM, est remedium, ne venenum suscipiatur, corpus conservans, ab ἀλέξω arceo, & τερῶ conseruo, vel ut aliis placet ἀθήξω fera, quod moribus animalium medeatur. Idem notat, quod Alexipharmacum, illa terminatio Græca τήριον in multis aliis nominibus Græcis occurrit, & merè est paronymica nullam compositionis speciem constituens. B. *En tegen-gift* G. *Arkney wider Gift*. Gall. *Preservatif, contrepoison, antidote*. A. *Medecines or Antidotes against poyson*.

ALGA sive **FUCUS**, est vegetabile marinum & palustre, cujus variæ dantur species, quædam habent folia instar graminis, aliæ instar capillorum; usitatio verò habet folia pedem unum vel alterum longa, mollia, tenuia plus minùsve, alba, vel rubra, aliquando viridia; reperiuntur ut plurimum circa littora maris, & imprimis Mediteranei. Dicitur vel ab aquæ algore, sive quod pedes alliget, quia crassa est, & foliis ex parte supernatet: vel quod se ad conchas lapidesve alligat, ab alligando. Gr. φύκος θαλάσσιος, vide *Fucus*. B. *Wiert*. G. *Meer-Grafz*. Gall. *Algue*. A. *Grasse wrack-Seaweed*.

Ἀλφειτῖδον, ab ἀλφειτον, farina, est ossium fractura in modum farinæ.

ALGEMA, & **ALGEMATODES**, ab ἀλγῆω doleo; Idem quod *Dolor*.

ALGEROTH est pulvis albus, insipidus, ponderosus, factus ex butyro vel oleo liquefacto, depurato, Antimoni, quod aquæ puræ instillatum, præcipitatur in talem pulverem; qui nihil habet omnino Mercurii in se, sed purissimum stibii Regulum; datus ad grana duo vel tria violenter emeticus, est. Gall. *Poudre d'Algaroth, ou Mercure de Vie*.

ALHANDAL, vide *Colocynthis*. *Alhandal* est nomen Arabicum Colocynthidis, quod imponitur Trochiscis de Colocynthide.

ALHASEF, idem quod *Hydroa*.

ALICA, potionis genus est, quod etiam χλινδρον dicitur, ab alendo, quod multum nutriat. Significat in genere granum, sed quid propriè sit, an res factitia an nativa aliqua feminis species, non adeo planum est, Hippocrates factitium quid esse innuere videtur cum Alicam & Ptisanam junxit, & inter sorbitiones fortiores retulit.

Gall,

Gall. *Sorte de breuvage, ou de mets, fait avec une espèce de froment appelé Zea. De la fromentée, comme qui diroit du Ris & du Gruau.*

ALIFORMIS, est epitheton processuum binorum ossis cuneiformis ad palati latera occurrentium, à similitudine alarum vespertilionum vid. Ala & Pterygoïdes.

ALIFORMES MUSCULI, seu ALARES, & PTERYGOIDEI, dividuntur in externos & internos; vide Pterygoïdes. B. *De Blengel-pieren.* G. *Der Fluegeln Mausf.* Gall. *Muscles pterygoïdes.* A. *The Pterygoide muscles.*

ALIFORMES PROCESSUS, vide *Pterygoïdes.*

ALIMENTUM dicitur *Potus & Cibus.* Estque talis materia, cujus particulæ minimæ assimilatae nostris liquidis animalibus & inquilinis, facile canaliculos nostri corporis subire, permeare, lateribus applicari, & adhærere iis possunt, totumque corpus restituere quoad Solida & Fluida, ac proin nutrire. Respectu graduum, ab Hippocrate tripliciter accipitur; unum *Futurum* alimentum; quod ab ore in ventriculum delabitur: aliud *Quasi* alimentum, nimirum sanguis arteriosus & succi cerebrales seu nervosi. Tertium, *Verè* alimentum, quod appositum partibus agglutinatur, & tandem assimilatur. Gr. *Τροφή.* B. *Spjze / vordsel.* G. *Nahrung, Erhaltung, Ernèhrung.* Gall. *Nourriture, Aliment.* A. *Meate, nourishment or food.*

ALINDESIS, est Corporis exercitatio, quâ oleo uncti se in pulvere olim volutabant, ab ἀλειδέω volvo, vel ab ἀλείω voluto.

ALIPTA, vocabatur olim ille, qui Athletas inungebat.

ALIPASMA, est pulvisculus, qui oleo commixtus, ad cohibendos sudores inungitur, ab ἀλείφω inungo.

ALISMA, est *Saponaria*, sed aliis *Plantago aquatica* vel potiùs *Doronic* species. Dicitur quasi ἰσμη τῆς ἄλης quòd virus venenatorum animalium debellare novit; vel παρὰ τὸ ἀλείειν καὶ ἰσμη; quòd sciat propulsare venenum leporis marini & ranæ rubetæ, opiique. Gall. *Plaintain des Montagnes.*

ALITES, seu volucres, ab alis gerendis, vel ab alis eundo dictæ.

ALITURA, est actio corporis vivi, quâ perpetuus &

fanguinis, spiritûs, substantiæque defluxus, ope succi alimentarii novi, præparati & in partes alendas impulsus, continuo instauratur. Gr. $\Theta\gamma\epsilon\psi\iota\varsigma$. B. **Doeding.** G. Das Ernähren. Gall. *la Nutrition*. A. Nourishment or Food.

ALKAHEST, vide *Alcabeſt*.

ALKALI, vide *Alcali*.

ALKERMES, est Confectio composita ex variis simplicibus, gratissima, magno hodiè in usu, viribus Cardiacis famosa, fit cum vel sine Moscho, illa viris, hæc mulieribus convenientior, fit quoque sine Ambra.

ALKEKENGİ, sive solanum vesicarium, Halicacabum vulgare, habet caules exiguos, rotundos, rubicundos, in multos ramos exiguos divisos, folia solani, sed majora; calicem tubulosum, campaniformem quinquifidum, instar vesicæ supra conniventis, excreſcentem, qui per maturitatem fit pericarpium; flores monopetalos, rotatos, quinquifidos, staminibus quinque præditos; ovarium ex Placenta ad finem pedunculi, intra calicem natum, tubâ longâ, gracili, apice globoso præditâ instructum, fit fructus mollis cerasi formâ (qui tectus latet in vesica membranacea ex calice dilatato) per maturitatem rubens, saporis acidiusculi aliquantulum amari, continens sub tenui pellicula pulpam globosam, & flavescentem, in qua hærent semina compressa, subrotunda, rugosa, plana, saporis subacris, subamari, odoris nullius evidentis: Radix parva, alba, repens. Alkekengi vox Arabica. B. *Winter Cherry*. Gall. *le Coqueret, ou l'Alkekenge*. A.

ALLANTOIDES, est tunica urinaria, *Farciminalis dicta*, inter amnion & chorion collocata, est tenuissima, tenerior Amnio, multo pellucidior, ad tactum delicatior, aëris flatui minimo cedens, figuræ ovalis, nullis vasis sanguineis huc usque visis prædita; totum fœtum non obvolvitur, sed solam partem Chorion respicit; neque ad totam Placentam extenditur; protendi enim nequit, ultra margines Placentæ, ubi Amnios & Chorion tam arctè fibris connectuntur, ut nulla membrana inter eas adesse possit; recipit liquorem urinosum, à fœtu secretum, & in ea sensim manantem ex vesica per umbilicum & urachum, ab ἀλλὰς farcimen, & ἄλδος forma: nam in plerisque brutis farciminis instar figuratur; Latinis *Farcimi-*

cinnaminalis tunica. B. **Pis-blies** / **Wozst-blies**. G. Harn-Häutlein, Wurst-Häutlein. Gall. *Membrane Alantoide*. A. The urinary membrane so called.

ALLELUJA, est *Oxytriphylum* sive *Trifolium acetosum*, sic appellatur, quia quando primum è terra folia emitit, eo tempore in Ecclesiis canticum Alleluja cantari solebat. B. **Kockockx-bzood** **Klaber-zuring**. G. Saurer-Klee, Buch-Ampfier, Gruckgauch-Klee, Hasen-Klee, Mæhler-Kraut. Gall. *Pain de Coucou*, *Alleluia*. A. Wood-forrel. vid. Acetofella.

ALLIARIA & ALLIARIS, est herba, quæ trita Allium olet, vide *Allium*. B. **Look zonder Look**. G. Knoblauch-Kraut, Leuchel, Safft-Kraut. Gall. *Herbe des aulx*, vel *Alliaire*. A. Sauce alone, vel jacke by the Hedge.

ALLIUM, est Planta Bulbosa grave olens : quæ habet folia longa, plana, non cava ; caulem rotundum, politum ; florem hexapetalum, pedunculo longo sustentatum, in fasciculum globosum collectum, parvum, sæpè destitutum ovario, si modò mas sit, aliquando ovarii specie & tubâ instructum : Ovarium intra florem sit fructus, subrotundus, trilocularis, plenus seminibus subrotundis, sæpe autem ovarium solitarium globosum, pellicula obvolutum, specie bulbi hæret ad unum pedunculum floris, masculi factor est olidus in omni parte plantæ : Radix hujus plantæ est tunicata, bulbosa, ex multis nucleis constans : integer bulbus nondum fractus, nullum odorem spargit, sed demùm ubi fractæ squammulæ sunt, odorem acrem fundunt : venit à Græco verbo ἄλλισθαι exilire, quod nimium exiliendo crescat, vel ab ἀλάσσω muto, quod anhelitum mutet, & alterare faciat, gravem enim odorem spirat. Gr. Ἀγρίδιον, Σκόροδον, Ὀλκον, vide *Scorodon*. B. **Look**. G. Knoblauch. Gall. *Ail*. A. Garlick.

ALLIOTICUM, est medicamentum Galenicum sanguinem alterans & purificans ; coctum ut plurimum ex *rad. taraxici*, *cichorei*, *fœniculi*, *passulis*, *Herb. endiv. bellid. lactuc. acetos. fumar. &c.* ab ἁλλίσω, altero, vario. Lat. *Decoctum alterans*. B. **Gen verander-dzank** / **Mei-dzank** / **bloedzuiberende dzank**. G. Ein Blut-reinigend Dranck. Gall. *Potion alterante pour purifier le sang*. A. The altering potion.

ALNUS, est arbor mediocris magnitudinis, erecta, cujus

cujus truncus habet corticem asperum, fragilem, nigricantem, lignum tenerum, flexile, rubicundum, leve, facile in terra corrumpens, sed ferè nunquam in aqua, unde pro fundamentis aedificiorum optimè inservit; ramos molles, teneros, cortice externè griseo, internè flavescente tectos, saporis amari, ingrati cum quadam adstrictione; folia subrotunda, dentata, viridia, splendens, viscosa; fructus squamosus est, sub squammis recondens semina rubicunda & compressa: crescit hæc arbor in locis paludosis. Dicta ita quòd amne alatur. Vel ab ἄλς palus, quia juxta paludes succrescat. Gr. κλήθρη & κλήρεα ab κλέω, frango: Vel ab alendo, quòd facile alatur, & in altitudinem assurgat. B. *Elzenboom*. G. *Ellern-Baum*, *Erlen-Baum*. Gall. *Aune*. A. *The Alder-tree*.

ALOE, est planta, exotica, crescens in Arabia, Persia, America, Africa, & Ceylon, quæ habet folia longa, integra, semper virentia, arcuè crassitie suæ, sibi mutuo juncta, plerumque succulenta, crassa, carnosæ, crenatæ, in margine acuta, sedis ferè accedentia; flos est monopetalus, tubulatus, infra prominens in ventrem, supra angustior, & in sex segmenta ibi scissus, nudus, clavo hyacinthino affixus, sex staminibus præditus; fructus oblongus, trilocularis, cylindricus, hexagonus, repletus seminibus sibi mutuo impositis planis, ad loculamentum suum accommodatis; radix perennis, fibrosa vel & tuberosa: hujus plantæ succus ex foliis expressis vel incisis spontè emanans, solis calore inspissatus, saporis amari, aromatici, nauseosi Aloë quoque dicitur, qui ex Arabia & Ægypto ad nos pellibus involutus affertur. Ejus species hodiè in officinis quatuor in usu sunt, quæ tamen non nisi puritate & impuritate ab invicem discrepant. Scilicet Aloë succotrina, hepatica, caballina & quarta lucida dicitur; Aloë succotrina, est succus gummosus, & resinosus, ex fusco nigricans, dum fractus in lamellas, splendens & pellucidus, in pulverem reductus citrini est coloris, ex foliis imò & ex plantis transversim versùs radicem dissectis, sponte suâ verè, ubi succi nutritiæ luxuriant, in suppositas patinas amplas destillans, in quibus à sole condensatur, & exsiccat; inde ulteriùs inspissatur, & quo exactiùs hæc fiunt, eo Aloë pellucidior & nobilior; hic succus spontè se in duas partes separat, 1^o. in spissiore fundum petentem,

20. in tenuiorem supernatantem; Aloë optima cognoscitur ex splendore, friabilitate, solutione in aqua, quod in fundo remanet id Aloën Caballinam constituit, quæ est similiter succus istius plantæ gummosus, & resinofus nigricans, priori ponderosior, crassior ac impurior, expressus ex foliis Aloës, in sole concretus, saporis subacris, amari, neuseosi, odoris graveolenti, quasi Piceæ & Myrrhati; Aloës Hepatica est similis succus ac Aloës succotrina, quoad virtutes & qualitates, & differt tantum ab ea, quod hæc in China, prior in insula succotra educitur, hinc differunt tantum loco natali; ubi Aloës tam pura, ut pellucida sit instar vitri dicitur lucida. Leniter purgat. Gr. ἀλόη. Nomen accepisse videtur, à fale vel salo sive mari, cujus afflatu maximè gaudet: ἄλς enim est sal: vel ut aliis placet, quod falsedinis foris nonnihil contineat, ut cæteræ maritimæ plantæ; sed hujus vocis Etymon potius deducendum à voce Arabica, vel Hebraica; mirum quod hæc planta, quæ succum continet tam amarum, in omnibus ferè suis partibus, habeat in cotylis petalorum sui floris mellitum liquorem. B. G. Gall. & A. Aloë.

ALOEDARIA vel ALOETICA, sunt Medicamenta, quæ magnam vel modicam Aloes quantitatem recipiunt.

ALOGOTROPHIA, est improporcionata nutritio, ita ut una pars corporis majus incrementum accipiat, quam altera, ut in *Rachitide*, ab ἀλογος rationis expertus, & τρεφω nutrio. B. Een ongelijke voeding. G. Ungeleiche Ernährung. Gall. Nutrition imparfaite ou inegale. A. Unequall nourishment.

ALOPECIA, est Plin. *Capillorum defluvium*, à lue venerea, Phthisi, virium corporis collapsu, vel aliunde excitatum, ex ἀλώπηξ vulpis, & πίπτω cado; à vulpe, cujus lotium effæta dicitur reddere loca in anum, ut *Callimachi* Scholiastes annotat: vel à malo, vulpi peculiari. Vocatur etiam ὀφίασσις à figura, quod partes glabræ & pilis destitutæ tortuosæ instar serpentum videntur. Utrique huic affectui commune est, quod areatim pili decidunt; unde etiam ingenere hoc malum *Area* vocatur. B. uit vallen des hairs / Hoofdzugt / Haireloosheid. G. Autzfällen des Haars. Gall. Alopecie, Cheute des Cheveux. A. Out falling of ones hair.

ALOPECUROIDES GRAMEN, est gramen vulpinum, ex ἀλώπηξ vulpes & ἄλσος forma. B. Vossstaarten-gras.

G. Fuechfen-Schwanz Grafz. Gall. *l'Herbe de queue de Renard*. A. Foxtailgrafe.

ALOSA PISCIS, vel ALAUSA, ab alendo, Latinis Clupea. B. *Elft*. Gall. *Alofe*.

ALPHENIC, nomen Arabicum, Penidium, seu faccharum hordeatum significans.

ALPHITIDON, est fractura ossis in multas tenues partes farinae instar. Gr. *ἄλφιτον* farina. B. *Dergrupzing van't Beem*.

ALPHUS, Lat. *Vitiligo*, ita describitur à *Celfo*; dicitur *ἄλφου*, ubi color albus est, ferè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur in cute. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. *Alphus* etiam appellatur *Morphæa*, procul dubio à *Μορφῇ*, quod scilicet cutis color in album, vel nigrum mutetur, & si niger est color, & umbræ similis, vocatur *μέλας*, cætera eadem sunt. *λέυνη* habet quiddam simile *Alpho*, sed magis albida est, & altius descendit, quàm *Alphus*, in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt: sed in aliis celerius, in aliis tardius *Alphus* & *Melas* in quibusdam variis temporibus oriuntur & desinunt. Locum, quem occupavit, non faciliè dimittit. *ἄλφου* dicitur ab *ἀλφαίνω* muto, ut *Aëtio* placet. Alii ab *Alpibus*, Italiae montibus albis, derivant: B. *Gen witte Haseri*. G. Das weisse Malszen, Mehl-Fleck. Gall. *Lepre blanche*. A. The white leprosie. Arab. *Baras*.

ALSINE, est planta habens folia parva, oblonga, sibi invicem opposita, bina cauli adhærentia; calicem magnum, oblongum, in quatuor vel quinque segmenta divisum; florem rosaceum, polupetalon, prout calix vel est quadrisfidus vel quinquifidus; his floribus succedit fructus parvus, membranaceus includens semina exigua, obrotunda ferè, rubra aut fusca; radix parva, fibrosa; est planta sylvestris, & nulla est sylva, ubi non crescit: ab *ἄλση* lucus ubi nascitur: dicitur quoque auricula Muris: quod parietibus accrescat: & Morfus Gallinæ, quia ab iis amatur, B. *Vogel-kruid / Muur & Muur-kruid*. G. Huenerdarm, Huenerbisz, Vogel-kraut. Gall. *Mouyon, Morgeline*. A. Chick-weed. Hen-bit.

ALTERANTIA, idem quod *Alliotica*.

ALTERATIO SANGUINIS, significat sæpè sanguinis per

per medicamenta depurationem. Vide *Alliotica*. B. *Blodd-zuivering*. G. Blutsauberung. Gall. *Purification du sang*. A. A purifying of the blood.

ALTHÆA, *Ebiscus*, vel *Ibiscus*. Officinæ, quæ ut plurimum barbaricis vocibus gaudent, *Bismalvam*, *Malvaviscum* & simpliciter *Eviscum* nominant. *Malvavisci* autem vox corrupta est, Malva nimirum & Evisco composita; quasi dicat aliquis Malva-Ebiscus. Planta est semine nudo, polysperma, feminibus caseosis, floribus octopetalis, folio longiori serrato, mollecule, tomentoso, radix oblonga, digiti crassitie, in ramos divaricata, foris pallide cinerea, intus pallida, ex siccitate rugosa, saporis mucilaginosi, & lenti, odoris nullius evidentis, discissa tactu est glutinosa; & decocta cum aqua, ipsam reddit mucilaginosam. *Althæa* appellatur à multiplici remediorum potestate & usu; vel Plinio Authore, ab effectus excellentia: nam *Ἀλθαίων* mederi est, & *ἰλθός*, sanatio. B. *Heemst / witte Maluwe / Quemst*. G. Ibisch, Eibisch-Kraut, groß oder wild Papeln. Gall. *Guimauve ordinaire*. A. Marsh mallows.

ALUDEL, vel *ALUDELLI*, sunt vitra sublimatoria, & ollæ fundocarentes, sibi quæ invicem impositæ, quæ ollæ suppositæ, adaptantur: quæ sublimationibus inserviunt. B. *Sublimeer-glazen of potten*. G. Ein Sublimier-Glasz. Gall. *Aludel, vaisseaux pour sublimer*. A. Subliming-glass.

ALVEARIUM, est cavitas auris internæ, five meatus auditorius, ubi sordes flavæ & amaræ gignuntur, & soni inferuntur. B. *Het oor-gat*. G. Das Hoehle der Ohren. Gall. *Le trou de l'oreille*. A. The inmost cavity of the Ear.

ALVEOLI DENTII, seu *Mœnia*, utriusque Maxillæ cavitates sunt, quibus dentes per gomphosin inferuntur. B. *Kassen der tanden*. G. Hoehle der Zahnen. Gall. *L'Alveole des dents*. A. The Sockets of the reeth.

ALUMEN, falsis fossilis species, quod ex saxo profundè sub terra sito, duro, fissili, bitumine & sulphure pleno, facillè incendiendo, eruitur; vel ex terra bituminosa, combustili, & flammam nidore sulphureo noxiam emittente. Hæc materies, aëri mensis spatio exposita, in pulverem fatiscit, alumini gignendo apta redditur, prius illi inepta. si ex Saxo, materies, aëri exposita prius, igne exurit, flammam tunc capiens, sulphuris præsentiam testatur. Sic paratâ aëre, & si è saxo aëre & igne, materies aqua

solvitur, affusu alcali fixi vel volatilis præcipitatur cum effervescentia : sic exsuperans acidum unitum alcalino, facit salem novum, ex aëre, alcali, & fossili natum. Præcipitata materies à lixivio supernatante separata, aquâ bulliente soluta, in vase plumbeo inspissata, dolio immisâ, quiescens, dat cryсталlos albas, vel rubellas, octoedras, saporis dulcis, austeriusculi, haud facîle liquecentes in aëre, requirentes decies quatuor aquæ pondus, ut solvantur. Hujus acidum, vi ignis expressum, sulphuris incensi collecto vaporì acido idem omni ferè dote. Relicta inde, expulso acido, sœx terram levem, subtilem, bolo similem, exhibet copia larga. Cum carbonariæ inflammabilis materiæ triplo exusta, phosphorum Hombergianum dat : adeoque virtutem singularem excitando cum aëre igni videtur possidere. Aluminis species usitatiores in officinis quinque nobis exhibent. Primum locum tenet *Alumen Rupeum*, Gall. *Alun de Roche*. B. *Alip-Aluin*. A. Common Alum. Alterum, est *Plumæum*, seu *Plumosum*, quod vide. Tertium, *Scissile* Σχιση, quod glebarum instar est & plumosum oblongum vocatur. Quartum est *Zuccarinum*, sive *Saccharinum*, ex Alumine rupeo, albumine ovorum & aqua rosacea. Quintum dicitur *Alumen catinum*. Si simpliciter præscribatur, *Rupeum* semper accipiendum est : Invenitur vel in venis per se ; vel excoquitur ex aquis mineralibus vel ex terra & lapidibus, aliisve mineralibus extrahitur. Dicitur autem *Rupeum*, quia ex rupe seu faxis confici solet. Item *Glaciale* ; quia glaciei conforme est. *Alumen Catinum*, propriè alumen non est, sed sal ex cineribus lignorum quorundam extractum, optimèque reverberatum B. *Potasch*. Est & aliud *Alumen*, *Romanum* dictum, rupeo simile, sed pallidè rubens. Gr. Στυπτηρις. Arab. *Sceb*. sive *Seb*. B. *Aluin* / *Kotz-aluin*. G. *Alaun*, Alat. Gall. *Alun*. A. *Roch-alum*.

ALUMEN PLUMOSUM, est substantia ferè lapidea ex incano viridis, pinguis, attritu in tenuia filamenta solubilis, eruta ex fodinis, quæ in ignem coniecta exurit, saporis adstringentis & acris. Gall. *Alun de plume*.

ALUSMOS, ab ἀλῶω, resolvo, intelligitur Hipp. anxietas, aut incontinens corporis jactatio.

ALVIDUCA, Medicamenta sunt, quibus alvus liquida

da & leniter fluida fit. Gr. *ἰκκοπροστικὰ*. vid. ibid. B. *Buik-week makende middelen*. G. Laxierende Mittelen. Gall. *Remedes laxatifs*. A. The laxative medecines.

ALVUS, Gr. *κοιλία* & *γάσῃ*, est abdominis cavitas, quâ ventriculus, intestina, hepar, lien, renes, vesica &c. continentur, vel & locus per quem fæcum & excrementorum crassorum naturalis fit excretio. B. *Buik*. G. Der Bauch. Gall. *Le Ventre, les intestins, les entrailles*. A. The belly, Panch.

ALVUS ASTRICTA, dicitur, cùm quis rarò per secessum fæces ex intestinis, & tantùm valdè compactas & cum difficultate deponit. B. *Hardlijbigheid*. G. Hartleibig. Gall. *Durété de ventre, le ventre constipé & paresseux*. A. Bound in body, vel belly. Idem quod *Coprostasia*.

ALVUS FLUIDA, est, cùm quis liquida stercora, idque facillimè deponit. B. *Weekbuikigheid*. G. Weichleibig. Gall. *le ventre libre ou lache*. A. Loosneff.

ALVI FLUXUS, Idem quod *Diarrhæa*.

ALYPON, est herbæ nomen, & dicitur turbith album: vocatur & *Alypia*, ex *a* priv. & *ἄπνη* dolor; Herba dolorem quasi auferens. A. Gut-Wort.

ALYSSON, est planta, quæ habet caules repentes, longos, duros, lignosos, rubicundos, tortuosos, in multos ramos divisos, lanuginem albam habentes; Folia oblonga, aspera, albescentia; Flores in umbellam extremitati ramorum adhærentes, quadrifidos, flavos; semper post unumquemque florem nascitur filicula unica compressa, rotunda, quæ constat duabus membranulis, & septo medio, illa membrana valva dicitur; valvæ hæ vel contra septum illud complicantur, vel parallele, vel perpendiculariter; semina sunt ovalia, compressa, rubicunda; Radix est longa, lignosa, alba, fibrosa, lanuginem habens; crescit hæc planta in locis montanis. Herba hæc sic appellatur, quòd à cane commorsos rabiem sentire non patiatur, & commorsis medeatur, singultum quoque sanat, ex *a* priv. & *λύσσα* rabies, singultus.

AMALGAMA, unde AMALGAMATIO, est alicujus metalli cum mercurio commixtio. B. *Metaal-menging met quik*. G. Zernagung des Metals mit Quick-Silber. Gall. *Amalgame*. A. The reducing of Metal by Mercury into a past.

AMA-

AMARACUM, est herba odorifera, ab Amaraco puero regio dicta. Amaracus Cynaræ Regis Cypri, Unguentarius fuit, qui casu lapsus, dum ferret unguenta, fracto alabastro, majorem ex confusione odorem creavit. Unde optima unguenta amaracina dicuntur; Hic postea, cum nimio odore contabuiſſet, in herbam Sampſucum mutatus est, quæ postea ab ejus nomine Amaracum appellata est: Folia Bliti habet, sed acutiora & magis polita, coloris viridis, subfufci, in margine rubicundi, saporis insipidi. Gall. *espece de Marjolaine*. vid. Majorana.

AMARANTHUS, planta est floris comam speciosam & non macrescentem habens, variis coloribus ornatam; unde ejus nomen: Hinc hyeme & æstate ex illa gestant Puellæ immarcidas corollas, ex α priv. & μαραινω marcesco. Gall. *Amarante, ou fleur de jalousie; fleur qui ne fleurit point, & d'une couleur pourprée*. Medicis & Herbariis nostræ ætatis ex *Amore* & *Anthos* dictionem componi credentibus *Flos Amoris* vocatur. B. *fluwert-bloemen*. G. Sammet-Blumen, Taufentschoen, Floer-Amor. Gall. *Passe velours*. A. Flower gentle.

AMARELLA, est Polygalæ species, atque sic ab amaritudine à Gesnero appellatur.

AMAUROSIS, est in rebus eminens, & cominus positus, visus abolitio, ita tamen ut nullum vitium externum in oculo vel accuratè inspicienti appareat; Idemque ejus vitium in nervi optici obstructione consistat: hic pupilla est integra, humores sunt integri; causa est omne illud quod illæso spectabili bulbo facultates visus ineptas reddere potest; hinc oritur vel à vitio in tunica Retina, vel si afficitur Nervus opticus aliquo in loco à Retina ad thalamos nervorum ophthalmicorum; si ipsa medulla cerebri malè se habeat in illa parte suæ substantiæ, unde fit nervus opticus, vel si ipse cortex, unde producit illa pars substantiæ medulloſæ, quæ Nervo optico inservit, vitiatus sit. Vocatur etiam *Gutta serena*, ab ἀμαυρω obscure. B. *Verdonkertheid des Gezigts/ steke Blindheid/ heldere drop*. G. Helter-Dropff, der schwartze Staar. Gall. *Goutte seréine*. A. Dimness of sight.

AMBARVALIS, flos est herbæ, quæ viget, quo tempore circum arva fiunt processiones, ex ambire vias dicitur.

AMBE, in genere notat superciliosam eminentiam, quæ

quæ est in ora alicujus rei vel ambitu, unde eminentia, ossium superficiaria ita etiam dicitur. Item, instrumentum Chirurgicum, quo brachia dearticulata restituantur.

AMBLOSIS, idem quod *Abortus*.

AMBLOTICA sunt medicamenta abortum facientia, ut sunt diuretica omnia, & quæ uterum aperiunt, foetumque & placentam expellunt. Ab ἀμβλώσχω abortio, unde ἀμβλωσις & ἀμβλωμα, abortus. B. *Middelen die een Misshraam maken*. G. *Miszgeburt verursachender Mittelen*. Gall. *Remedes Avortifs*. A. *Medecines which cause Abortion*.

AMBLYOPIA, est visus obscuritas: quæ est quadruplex: *Mynopia*, *Presbytia*, *Nyctalopia* & *Amaurosis*, de quibus suo loco; ex ἀμβλῦς obtusus, hebes, & ὀπτουσι video. B. *Een donker gezigt* / *Oogen-schemering*. G. *Dunkelheit der Augen*. Gall. *Lavette obscure*. A. *Dulness of sight*.

AMBONÆ, idem quod *Ambe*.

AMBRA GRYSEA bituminis quædam species est, inflammabilis, pinguis, odoris suavissimi, quod procellosis fluctibus ex fundo maris excussum & ad littus cruciatum est. Rectè censetur ex destillatione, Ambram recenseri inter succina, & fossiles resinas, licet etiam in cetis reperiatur, qui fortè illam devorârunt, eaque delectantur. Invenitur in Japonia, insulis Moluccanis, Mauritii, Neicotarres, in Sumatra ad Occidentem, in Borneo, & Caap Commeriis propè Malabar sitis. Optima censetur Grysea, seu coloris cinerei seu grysei, à fordibus purgata & odorata, lævis, quæque acu perfossa succum pinguem resudat; notat Cl. *Kæmpfferus*, quod nulla sit melior bonitatis & constantior nota, quàm si candenti laminæ ejus granula aliquot imponantur, quo ipso suffitus prodit adulterium, & cineris paucitas bonitatem. Improbatur *nigra* & *candida* valde, procul dubio adulterata; sæpius enim solet adulterari, notante eodem *Kæmpffero*, qui dicit, quòd cum recens in littus deponitur, massa farinaceæ instar & adulterio recipiendo aptissima est. Nihil verò eidem faciliùs ingeritur, (prout ipsi adulteratores auctori facti sunt;) quàm gluma oryzae in pollinem redacta, nam hæc & levitatem & colorem glaucum ei conciliat; sed quam fraudem teredines, illatâ carie, possessori detegunt &c. B. *Ambergris*. G. *Amber*. Gall. *Ambre gris*. A. *Amber grise*.

AM.

AMBROSIA, est Herba quædam Botrys dicta : ab α priv. & $\beta\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ mortalis, interposito μ vocalitatis gratiâ ; vel quod mortales eam non edant, vel quod qui eam comederint, immortales evadant : ideoque τὸ τοῦ Θεῶν βρῶμα Deorum cibus dicitur, eximiæ fragrantiae gratia Diis expetita : habet caulem unicum, in multos ramos divisum; folia incisa, albescentia; Flores flosculosos, plurimis scilicet flosculis sterilibus calice comprehensis, constantes; fructus est clavæ æmulus, echinatus, monospermus, fætûs semine nigricante & oblongo tubâ bifidâ instructus, alio loco plantæ; radix longa, lignosa, tenuis. Tota planta habet odorem suavem, saporem aromaticum, aliquantulum amarum, sed gratum, colitur in hortis. Gall. *Ambrosie*. A. The Jerusalem Oak.

AMBROSIA, est medicamentum solidum, sed ea, quâ fieri potest gratitudine, præparatum : à Deorum cibo denominari videtur, quia solis Diis, *Ambrosia* in cibum facescit, ut *Nectar* in potum, ex α priv. & $\beta\epsilon\tau\epsilon\varsigma$ mortalis. B. *Goden spijs / een aangenaam geneesmiddel*. G. Der Goetter-Speisz. Gall. *Viande des Dieux*. A. The meat of the Gods.

AMBULATIO, Chirurgis dicitur, quando pars quædam inflammatione, gangrænâ, aut sphacelo corripitur, & in ambitu plagæ malum ulteriùs proserpit. B. *Het ambuleert / 't quaad kruipt voort*. G. Umb sich fressende Geschwure. Gall. *Gangrène ambulante*. A. A spreading gangreen.

AMBUSTIO, est continui solutio, à materia externa adurente (igne actuali vel potentiali sc.) causata, cuticulam semper, cutim plerùmque, nonnunquam etiam musculos, venas, arterias, nervos atque tendines lædens. Gr. περικαυσίς. B. *Gebzandheid*. G. Brand, Verbrennung. Gall. *Brûlure*. A. Burning or Scalding.

AMELLUS, dicitur à Mella fluvio Galliæ, juxtâ quem herba hæc plurima nascitur.

AMENTUM, Idem quod *Alumen plumeum*, vide *A-mianthus*.

AMETHODICUM, est quod sine methodica & dogmatica ratione fit, ut solent Empirici, ex α priv. & $\mu\epsilon\theta\omicron\delta\omicron\varsigma$, ratio ad invenienda auxilia.

AMETHYSTUS, est gemma pellucida purpurei seu violæ,

violacei coloris, aliquando ad flavedinem inclinantis, huius color videtur deberi pigmento metallico inprimis, aut & alteri cuidam fixo & fossilii principio, in ipsa earum nativitate, quam intimè permixto, unitoque: evincit hoc huius & aliarum similium gemmarum colorum similitudo, atque artificiosa harum confectio, dividitur in Orientalem & Occidentalem, atque hinc reperitur in India Orientali, Arabia petrea, Armenia, Ægypto, Galatia, Tharso, Cypro, Bohemia &c. B. *Amethyſt*. G. Amethyſt, Ametiſt. Gall. *Ametiſte*. A. The Amethyſt.

AMIANTHUS, eſt lapis alumini plumoſo ſimilis, ſed abſque ſapore & in igne non combuſtilis, in quo ab alumine plumoſo differt, coloris varii, & in filamenta deductilis; inde veteres induſias aliaque, præparare noverunt, quæ ubi fordida, igni tradebantur & pura evadebant: duplici formâ diverſa reperitur, ſub ſpecie filamentorum majorum alumine plumoſo, & vocatur hæc linum incombuſtile, altera ſpecies ſub forma lapidis fuſci, vel nigri, duri, malleo extenſilis. Græcis Ἀμιάνθος. Quòd Elychnia ex eodem ſiant incombuſtibia. B. *Pluim-aluin*. G. Federweiſz, Steinſlachs, Schiefer-Weiſz, Stein-Dacht. Gall. *L'Amiante*. A. Eart-flax, or Plicimons Alum.

AMMA, ſive SUBLIGACULUM, aut BRACHERIUM, eſt vinculum Hernioſis utile, quod vel ex lintea faſcia, vel orbiculo metallico inferius abdomen ambiente conficitur, & protuberantia eminente interiùs donato, applicatur in inguine ad proceſſum peritonæi ubi per muſculos tranſit, & annulum comprimens, retinet inteſtina in abdomen reducta, quæ per hunc annulum cæteroquin elaberentur, ab ἄνω connecto. *Bracherium* nomen accepiſſe videtur à cingulis, quæ lumbis & renibus adaptantur, ab *Iſidoro Brachiale Monachorum* vocatum, *Succinatorium*; *Brachile* ſeu *Brachiale* dicitur, quamvis non brachiorum ſed renum ſit cingulum. *Rebrachiatorium Caſſiano*, unde procul dubio natum *Bracherium* Chirurgorum, cingulum nempè herniam inteſtinalem ſubſtringens. B. *Gen Bruch-band*. G. Bruch-Band. Gall. *Un brayer, des eſtreintes*, *Bandage Reſtreintif*, *Ceinture*. A. A girdle for the ruptures, or a Trieff.

AMMI, ſunt ſemina exigua, ſabuli grana referentia, ſtriata, globola, ſuaviter aromatica, ſaporis amari, acris,
odoris

odoris fragrantis ferè ut origani vel thymi ; optima defcuntur ex Alexandria vel Candia, ubi producuntur, Planta, unde crefcit, fatis eft procera, ramofa, Amnioselinum dicta, folia habens Anethi fimilia, in longas & anguftas diffeftas lacinias abeuntia, crenas habentia ad coftas ; nomen ab ἀμνίς matula, quafi cogens homines ad matulam, vel fecundùm alios ob ἄμμου arena, ob fimilitudinem quam habent cum granis fabuli. Eft Cuminum Æthiopicum feu Regium, à voce ammi, fortè cammi & cummi, unde Cuminum, vel vice verfâ à Cumino vox Ammi.

AMMONIACUM GUMMI, feu HAMMONIACUM, eft lachryma ex Ferula Africana juxta delubrum Hammonis nascente, unde & nomen : gummi inftar Thuris grumofum eft, fubalbicans, cui femina, Angelicæ inftar, interperfa funt ; odor eft ferè caftoreus, & gravis, faporque aromaticus & amarefcens. B. *Gom Ammoniac*. G. Ammoniack. Gall. *Gomme Ammoniac*. A. Gum Ammoniack.

AMMONIACUM SAL, vide *Armoniacum*.

AMNION CHARTA VIRGINEA, eft membrana foetum in utero proximè obvolvens, & molliter excipiens ; quæ etiam cum reliquis fecundinis poft partum expellitur, chorio longè albicantior atque tenuior eft. Ipsi Chorion blanditer accumbens, non tamen nifi fuperiore parte adnexâ ; hæc, figuræ ferè ovalis, maximè tenuis & fimplex eft ; mollis eft, lævior ac politior parte internâ, externâ inæqualior, candida & pellucida, laxo intervallo à foetu diftans, nullis vafis fanguineis hætenùs demonftratis donata ; exterius membrana Urinaria & Chorion investitur, quæ fibi invicem aliquando fatis tenaciter adhærent ab hac parte, ita ut vix avelli queant, continet non tantùm foetum, fed & humorum nutritium, quo factus, per os & gulam alimentum fibi fugit : vid. liquor. Amnii. Α'μνιον, Α'μνίον Græcis dicitur, Latinis amiculum, indufium, quòd amicè foetum obvolvât, vel ut alii volunt ab ἀμνός agnus, fic ab ejus teneritudine dicta & mollitie, vel μένος animus, & quafi ἀμνιον, id eft ἀνυσ μίνος καὶ αἷματ, vel ἀμνίον, tanquam vas inter facrificandum, fanguinem excipiens. B. *Het binnenfte vlies van de Dageboorte / 't Lam-vlies*. G. Schaaffen-Häutlein. Gall.

Gall. *L'Amnios, Membrane des Eaux.* A. The Amnion.

AMOLYNTUM, est Medicamentum, quo tractato, manus non inquinantur, ab ἀμολύνω non inquinari.

AMOMUM, Veterum quodnam sit, adhuc sub iudice lis est. Sunt enim, qui Rosam Hierichontis esse velint: Alii aliud quid esse contendunt. Officinæ duplex semen sub Amomi nomine monstrant, quorum alterum majus nigrum rotundumque est instar granorum piperis rotundi vel cubebarum, gustu minimè acre, quod videtur veterum esse *Sison, Sinon*, &c. Alterum minutum semen & pallidum; utrumque rarò in usu, locoque Amomi Veterum recipitur Acorus. Ingreditur Theriacam. *Amomum & Cardamomum minus*, quæ in officinis prostant: putant nonnulli fructus esse plantarum genere convenientium, specie verò saltem differentium; & quoniam illa differentia in fructuum duntaxat forma, hoc est, rotunda aut triangulari consistat, folia autem convenient, nec fructus hac in regione unquam producantur, hanc plantam pro utrisque spectandam exhibent. Dicitur ab odore bono, qui reprehendi minimè queat, vel, dictum putant, quod veluti odorem cinnamomi referat. μῶμ⊕ enim est reprehensio, & ἀμωμ⊕ reprehensioni non obnoxius. Gall. *Amome*.

AMPBLOPRASUM, est Porrum, circa vites nascens. Ex ἀμπελ⊕ vitis, & πρᾶσον porrum. B. *Wjngaard-parsci*. G. *Acker-Knoblauch*. Gall. *Ail poireau*. A. Bears garlic.

AMPHIBIUM, est omne animal, æquè in aquis ac in terris vivens. Ex ἀμφι ambo, & βίω vivo.

AMPHEMERINUS, est morbus quotidianus, unde πυρετὸς ἀμφήμερ⊕ febris quotidiana, ex ἀμφι circum, & ἡμέρα dies.

AMPHISBÆNA, ex ἀμφις, utrinque, & βίω, gradior: Serpentis genus est, nunc in anteriorem, nunc in posteriorem progrediens partem.

AMPHIBLESTROIDES, sive TUNICA RETINA oculi, mollis est alba mucosaque substantia, cui nomen inditum, quod projecta in aquas reticulum æmuletur. Protenditur ab ipso nervi optici centro, supraque vitreum humorem expansa, ad ligamentum ciliare porrigitur: hæc tunica siquidem albida & medullaris, ab ipsa nervi

optici substantia medullosa, ac fibrosa procedit; ut sit fibrarum nervearum, quæ illic in unam fasciam colliguntur, quasi in velum retiforme expansio. Reverâ si integer oculus pro flore, qui cerebro per nervum opticum, velut caudicem accrescit, sumatur, tunica retina erit flos ipse, ac duæ priores tantum calicis vicem præstabunt. Habent se intra oculi thalamum velut paries albus, qui species visibiles per foramen camerae atratae admissas excipit repræsentatque, cui species sensibiles imprimuntur, & à quo eadem *πρώτῳ αἰσθητηρίῳ* communicantur, ex ἀμφιβλεστρον rete, & εἶδος forma. B. *Net Net-blies des oogs*. G. Spinnewebs Netlein. Gall. *La Rétine*. A. The Retina of the eye.

AMPHIBRANCHIA, sunt loca circa tonsillas, ex ἀμφι circum, & βράχυν rauco.

AMPHIDÆUM, est caput oris uteri, labris cucurbitarum simile. Græcis Ἀμφιδαιον, Ὀσχιον, Λήγρια.

AMPHISMELA, est cultellus anceps Anatomicus utrinque acie præditus, secandisque cadaveribus utilis, ex ἀμφι utrinque, & μερίζω membranatim concido, μέλα est specillum. B. *Een Mes aan beide zijden snijvend*. G. Ein Messer dasz an beyden Seithen schneidet. Gall. *Conteau tranchant de deux côtés*. A. A dissecting knife that cuts on both sides.

AMPHORA, est vas cum duobus ansis, capit duas urnas, seu octo congios: est mensura liquidorum apud Viteros. Italis continet libras septuaginta duas. Attica verò dimidium amphoræ circiter supra Italicam Amphoram continebat. Secundum hodiernam computationem, capit vini libras octoginta, & olei circiter septuaginta. Gall. *Amphors*.

AMPULLA, est vitrum rotundum, cui collum in summitate est. B. *Kinderglas / Watrol / Fioolglas*. G. Ein rund Fläschlein. Gall. *Phiole, Ampouille*. A. A viol. A Glas-bottle.

AMULETUM PERIAMMA, *Periapton*, est monile, quod è collo suspensum & gestatum, vel in annulo, dicitur occultâ quâdam virtute remedium præsentaneum adversus febres, venena & fascinationes.

AMURCA, dicitur sedimentum vel recrementum olivarum expressarum, fax Olei. Gr. Ἀμύργη ab ἀμύρω, exugo oleas, & amurcam exprimo. B. *Droesem van Olie*. G.

G. Trufen vel Hefen von Dele. Gall. *fèces ou la Lie de l'huile*. A. The Lees vel Mother of oyl.

AMYGDALÆ, idem quod *Antias & Parislbmia*.

AMYGDALUS, est arbor, quæ habet folia longa, angusta, acuta, saporis amari, grati: calix est monophyllus, quinquifidus; flos rosaceus, pentapelatus, flaminibus multis præditus; ovarium in fundo calicis instructum tubâ longâ donatâ apice globofo, quod sit fructus, callo pulvinato, minus spisso, ticcioze condens osficulum rugis minus profundis ornatum, in quo nucleus oblongus; plerumque unus, pediculo brevissimo; Fructus vocantur Amygdalæ, quæ sunt dulces vel amaræ, & sapore tantum à se invicem differunt. Sic vocatam volunt, quod fructus post viride putamen, alterum, quod subest, multis scatet rimosis scarificationibus, quas Græci Ἀμυγδαῖς appellant. B. *Amandel-boom*. G. Mandel-Baum. Gall. *Amandier*. A. The Almond-tree.

AMYGDALATUM, est lac artificiale, seu *Emulsio* ex Amygdalis aliisque seminibus parata, ab ἀμυγδαλήν, Amygdalæ fructus. B. *Amandel-melk*. G. Mandel-Milch. Gall. *Lait d'Amandes*. A. Almond-milk.

AMYLUM, est flos tritici aut filiginis subtilissimus, albissimus, multiplici aquæ affusione ex farina extractus, & in exiguas massulas exsiccando coactus. Sic dicitur, quod sine mola paretur. Ex α priv. & μόλη mola. B. *Stpfel Ameldonk*. G. Ammel-Mehl, Krafft-Mehl. Gall. *Amidon*. A. White Starch.

AMYON, dicitur membrum emusculatum hoc est ita extenuatum, ut musculi vix appareant amplius.

ANA, est æqualis variorum Medicamentorum, unâ formulâ præscriptorum, portio. Vulgò simplici ã vel duplici ãã brevitatis gratiâ scribitur. B. *Evenveel Gewicht*. G. Gleiche Theile. Gall. *Quantité égale, Egale Portion*. A. An Equal Portion.

ANABASIS, est morborum invalescentia. Vide *Acme*: ab ἀναβαίω ascendo.

ANABOLE, materiæ rejectionem per superiora significat:

ANABROCHISMUS, est, cum immixtis vinculis aliquid supervacanei tabefactum tollitur. Item modus extrahendi pilos palpebrarum inversos, oculumque pungentes, immisso per foramen acus tenuissimo bysso: per

cujus duplicatam ansam pilus trajectus vellitur.

ANABROSIS, est partis alicujus in corpore, ab humoribus acribus, erosio. Idem quod *Diabrosis*, ab ἀνα-βρώσκω peredo, corrodo. B. *Gen dooz-cting*. Zernagung, Berzehrung. Gall. *Corrosion*, *Rongement*. A. Corrosion.

ANACARDIUM, duplex est *Orientale* & *Occidentale*. *Orientale*, est fructus arboris Malabaribus Oepata dictæ, qui est cordiformis cum cuspidē in vertice, niger, splendens, includens sub duplici involucro à se separato mellaginē crassiusculam, lentam, cerasorum colore, sub qua nucleum pallidum amygdalæ saporis. *Occidentale* est quasi ossiculum reni leporis figura; foris fuscum, durum, & gerens nucleum album amygdalæ saporis. Magna est ejus in Cananor copia, tum in Calecut, & aliis Indiæ locis, veluti in Cambaya & Decan. Gr. Ἀνακαρδίων, Veteribus incognitum fuit. Arab. *Balador*; Indis *Bybo*. Lusit. *Facca de Malaqua*, quod viridis & in arbore pendens similis sit nostrati majori fabæ, major tamen, sic ob cordis similitudinem, vocatur. Ex ἀνὰ ad sc. Formam vel similitudinem, & καρδία. B. *Anacarde*. G. Elephanten-Laufz. Gall. *Anacarde*. A. Anacardum or Malacca beans.

ANACATHARTICA, sunt Medicamenta vomitoria, quæ per superiora purgant, ex ἄνω supra, & καθαίρειν purgo. Idem quod *Emetica*.

ANACATHARSIS, est medicamentum per superiora purgans; ut Vomitorium, Sternutatorium, Errhinum, Masticatorium, Salivatio, &c. ab ἀνακαθαίρειν per superiora purgo. Idem quod *Emeticum*. & in specie apud Hippocratem significat purgationem per sputa.

ANACOLLEMA, est linimentum aut aliud Medicamentum ficcum, quod fronti & naribus ad oculorum vitia & Hæmorrhagiam sistendam admovetur. Idem Remedium incarnans & conglutinans, ab ἀνακολλάω conglutino; unde κόλλα gluten.

ANACTORION, est planta, cui nomen *Gladiolus*: ab Ἀνάκτωρ Herus vel Dominus, cui soli gladii jus est.

ANADENDROMALACHE, est Malva rosacea fruticosa; ex ἀνά ad δένδρον arbor, & μαλάχη Malva.

ANADENDRON, est Althæa, ex ἀνά ad (formam) & δένδρον, arbor: quia arboris in modum se erigit.

ANA-

ANADIPLOSIS, est frequens febrium reduplicatio
ab ἀναδιπλόω reduplico.

ANADOSIS, est omne, quod in corpore fursùm tendit, ut chyli distributio, vel vomitus, ex ἀνω supra, & διωμι do.

ANADROME, est fursùm alimenti latio, vel reflexus humorum ad superiora, ab ἀνάδρομος, cursus, & τρέχω, curro.

ANAGALLIS, Officinalis est planta, folia habens ex adverso bina & flosculos foliorum alis insidentes in quinque laciniis divisi, coloris rubri, pedunculis longis, his floribus succedit fructus sphaericus, membranaceus, per maturitatem in duas partes dissiliens, semina plerumque angulosa, minima: Radix fibrosa est, alba; dicta videtur ab ἀνά & γάλλω, quod æquè reprimat ac reponat sedem prociduum: ὁ γάλλω denotat enim, cui amputata sunt virilia, vel ut aliis placet, ἀπὸ τοῦ ἀναγωγεῖν τὰς ψυχὰς, animas evocare ac elicere. Magica enim putatur herba, unde nostris *Guichelheil*. Nam in limine vestibuli suspensa maleficia arcere creditur. Alii derivant ab ἀγάλλω, orno, insignio, decore, quod ubique vias lætè flosculis suis ornet. G. Gauchel, Colmar-Kraut. Gall. *Mouron*, *Mousson*, *Morgeline*. A. Pimpernel.

ANAGYRIS, à natali solo hæc arbuscula nomen accepit: Anagyris enim est civitas Attica: est arbuscula valde ramosa, habens corticem viridi-fuscum, lignum flavescentis aut pallidum; folia terna, oblonga, acuta, in parte superiori viridia, in inferiori albescentia, odoris adeo fortis & fætidus, ut contusa, capitis dolorem producant; flores flavi, papilionacei, cujus vexillum brevius est cæteris petalis: flori succedit siliqua longa, cartilaginosa, Phaseloli siliquæ æmula, fæta seminibus reniformibus, in initio albis, dein purpureis, tandem post maturitatem cæruleis & nigricantibus; crescit in regionibus calidis, ubi fœtorem, Asam fœtidam superantem excitat.

ANARHINON, vide *Antirrhinon*, ex ἀνά per, ad, & ῥίς nasus, quasi adversus nasum.

ANAISTHESIA, est facultas ablata percipiendi actiones objectorum sensibilibus in organa sensuum externorum, ut paralyticis & sphacelo laborantibus contingit, ex a priv. & ἀισθάνομαι, sentio. B. *Ongevoeligheid*. G.

Unempfindlichkeit. Gall. *Insensibilité*. A. Insensible.

ANALEPTICA, sunt Medicamenta, quæ vires resocillant; item pars Hygieinæ, quâ valetudinarii reficiuntur, ab ἀναλαμνάνω, iterum resocillo. A. Analeptiks.

ANALGESIA, est indolentia sive doloris defectus, ab ἀναλγίω, non doleo.

ANALOGISMUS, est comparatio & perceptio causarum morbificarum & medicamentorum juvantium per similitudines, ab ἀναλογίζομαι, comparo: *Analogia* est Comparatio.

ANALYSIS, est alicujus corporis, in sua principia per Chymiam, reductio. Item partium corporis humani demonstratio Anatomica, quæ per partes instituitur, ab ἀναλύω dissolvo. B. *Gen ontdoeninge / ontleding / ontbinding*. G. Aueflossung. Gall. *Analise, Dissolution, Solution, Separation*. A. An analyzing of any thing.

ANAMNESTICA, Remedia, quæ memoriam restaurant, ut sunt spirituosâ omnia, ab ἀναμνάομαι reminiscor. Item sic signa quædam dicuntur ad Diagnostica pertinentia, quæ corporis vel morbi statum prægressum in memoriam revocant. Gall. *Remedes qui retablissent la memoire*.

ANAPHALANTIASIS est defluvium pilorum in superciliis. B. *Het uytvallen der Winkbraauwen*.

ANANAS est planta flore monopetalo infundibuli formi tripartito, fructu carnoso, turbinato succi pleno, sæto feminibus exiguis reniformibus: fructus maturus in deliciis habetur apud Brasilienses, ubi quoque *Yayama* audit. Gall. *Ananas*.

ANAPHRODISIA dicitur impotentia venerea, sive ineptitudo ad congressus venereos. Gall. *Impuissance*.

ANAPHROMELI, est mel despumatum, ex ἀνὰ de ἀφρός spuma & μέλι mel.

ANAPLEROSIS, in genere significat repletionem; alias specialiter ita dicitur Chirurgiæ pars, quâ ea, quæ in corpore deficiunt vel casu perierunt, arte restituantur, ab ἀναπληρόω impleo. Unde *Plerotica Medicamenta*, quæ partes restituant.

ANAPLEROTICA, sunt Medicamenta vulnera carne implentia, & deficiencia in corpore, quantum possibile, restituentia.

ANAR-

ANARRHOPUS, idem quod *Anadosis*, ab ἄνω supra, & ἔγω vergo, serpo.

ANASARCA, est totius corporis exterioris, aut quadrandam ejus partium tumor albus, mollis, tactui cedens, & foveam à compressione relinquens. Causa est lymphæ nimis tenax, vires vitæ imminutæ, & sanguis viscidus, quibus vasorum extremitates obstruuntur & vesiculæ adiposæ implentur; hinc fit, quod major lymphæ copia in corpore aggeritur, quàm per vascula reducentia ablegatur, adeoque est primum Hydropis initium. Si humores nimis viscidus fuerint, *Leucophlegmatia* appellatur. Item, Ὑποσαρκιδις, κατὰ σάρκα. *Heraclide σαρκίτις*, *Intercus*, *Aqua inter cutem* &c. ex ἀνα per, & σάρξ caro. B. *r* *Ulfwater / tusschen bei en blees leggende water / le-*
den-zugt. G. Leibwasser. Gall. *Hydropisie anasarca*. A. A species of a Dropie so called.

ANASTOICHIASIS, est corporum Chymica resolutio, ab ἀναστοιχίω in sua principia redigo, unde στοιχίον Elementum,

ANASTOMOSIS, duas habet significationes, 1. Ubi extrema oscula vasorum nimis dilatata emittunt sua liquida naturaliter retinenda & tum dicitur. B. *Ontstuiting der vaten*. G. Eroeffnung der Aderen. Gall. *dilatation des orifices des vaisseaux*. A. Opening of Vessels. 2. Est mutua inosculatio ultimi finis vasis arteriosi in principium venosi, sive id fiat recto modo continuato tramite, sive per laterales ramos ex Arteria in venam hiantes, quales in vasis spermaticis demonstravit Lealis &c. ex ἀνα per, & σπασ os. B. *Inmondig der vaten / tus-vaten*. G. Die reumte zwischen den Gefäßen. Gall. *Abouchement ou inosculatation des Vaisseaux, ou Anastomose*. A. A Mutual opening of vessels in to one another.

ANASTOMOTICA, sunt Medicamenta poros & meatus aperientia, ut sunt deobstruentia, cathartica, sudorifera, diuretica, &c. ex ἀνα per, & σπασ os. B. *Openende Middelen*. G. Eroeffnende Mittlen. Gall. *Remedes aperitifs*. A. Aperitive Medecines.

ANATASIS, est corporis extensio versùs superiora, ab ἀνατίω sursum tendo. B. *uittrekking*. G. Aufsteigung. Gall. *extension*. A. A Stretching out.

ANATHYMIASIS, est vapor, exhalatio, suffitus, halitus &c. ab ἄνω sursum & θυμιάω suffio. B. *steking*. G.

Beræuchung. Gall. *Parfum*. A. Perfuming, Fumigation, ANATICA PORTIO, vide *Ana*.

ANATOMIA, est animalis, præsertim hominis, con-
cinna dissectio, quâ partium materia, figura, structura,
nexus, ad usum Medicum & Physicum, demonstrantur,
ab ἀνατέμνω dissecto. B. *Anatomie / snp-konst / ontle-*
ding. G. Anatomie, Aufschneidung. Gall. *Anatomie*,
Dissection. A. Anatomie, Cuttingup of Bodies.

ANATOMICUS, est qui dissecandis cadaveribus aptus,
ab ἀνατέμνω perfeco. B. *Gen ontleeder / Ontleedkundi-*
ge. G. Anatomist. Gall. *Un Anatomiste*. A. An Anatomist,
One Skilful in anatomy.

ANATRIPSIS, est contritio calculi aut ossis commi-
nutio, ab ἀνατρίβω contero. B. *Verbzuzelinge / vermor-*
zeling. G. Zermalung. Gall. *Broyement, Ecrasement*,
A. Bruising, Comminution.

ANAXYRIS, fortè ab ἀναξύνω, abstergo, scalpo : Ace-
tosa enim est, quæ alvum lubricando abstergit, cuiusque
radices scabiei medentur.

ANCHIA, idem quod coxa.

ANCHORALIS processus, vide *Ancyroides*.

ANCHUSA, est planta, quæ caulem habet repentem,
folia Buglossi sylvestris, longa, aspera; radicem longam,
mediocriter crassam, foris rubicundam, interius albam lig-
nosam, colore rubro inficientem, saporis, dum recens
est paululum adstringentis, & insipidi, odoris nullius.
Hanc dictam quidam volunt ἀπὸ τοῦ ἀγκυραίν, strangulando,
quod vim strangulatoriam ac suffocatoriam habeat; dicunt
enim eâ serpentes strangulari. Alii ab ἀγκυρῆν deducunt,
quod est fucare, colorare formam, quia illius radicis facies
rubore inficitur. B. *Osse-tong / Schaaps-tong*. G.
Ochsen-zung. Gall. *Orcanette*. A. Alkanet.

ANCHYLE, est articuli contractio, ut & genu poste-
rior pars, ab ἀγκυλόω contractiōne articulorum laboro.
Gall. *Anchylose*. Vide *Contractura*. A. Constriction upon
the Joints.

ANCHYLOPS, est abscessus & collectio humoris len-
ti & melli aut puliculæ similis, inter maiorem oculi an-
gulum & nasum. Hic tunicâ ut plurimum continetur,
nec infert dolorem, subito autem accipit incrementum,
producitur tamen sæpe ab inflammatione prægressâ ca-
run-

runculæ lachrymalis, quæ in abscessum terminatur, qui si rumatur, exulcereturque, non amplius Ἀγχίλωψ vocatur, sed mutat nomen, & Ἀγίλωψ appellatur. Ab ἀγχὲ propè & ὠψ oculus, quod propè oculum oriatur. Vide *Ægilops*.

ANCHYLOSIS, idem quod *Anchyle*.

ANCHYROIDES, vide *Ancyroides*.

ANCON, five Cubiti caput, strictius sumitur pro posteriore Ulnæ processu majori: Unde *Anconæus musculus*, Cubiti extensor, ἀπὸ τοῦ ἀγκυῖσθαι ἐτέρω τὸ ὀπίσσω, quod superjaceat unum os alteri. B. Elleboog. G. Elnbogen, Gall. *Conde*. A. The Elbow.

ANCONÆUS, vide in *Ancon*.

ANCORALIS, vide *Ancyroides*.

ANCTERES dicuntur fibulæ, quibus vulnere labia longius dissita junguntur, quæ operatio propterea ancteriafmos, infibulatio dicitur; parantur ex emplastris fortissimè adhærentibus: in specie etiam dicta fuit, quando histrionibus & comædis per præputium trajiciebatur fibula.

ANCYLE, est Poplitis contractio, vide *Anchyle*.

ANCYLO BLEPHARUM, est palpebræ cum tunica alba vel cornea concretio; vel cum interdum utræque palpebræ sibi invicem concresecunt; sequitur ille affectus oculorum inflammationes & palpebrarum: Ea concretio aliquando ante partum contingit, & tunc vitium nativitatis existit, dicitur ex ἀγκύλη hamus, & βλέφαρον palpebra. B. *Aanwas der oogschelen*. G. Anwachsung der augliedern. Gall. *concretion des Paupieres*. A. A growing to of the eye-lids.

ANCYLOGLOSSUM, est frænuli sub lingua, connexionis strictioris vitium, locutionem difficilem causans, & μογιγάλλω rectè vocatur, ab ἀγκύλη hamus, & γλῶσσα lingua. B. *Tong-riems aanwas / span-ader*. G. Anwachsung des zung-riems. Gall. *le Filet trop avancé vers la pointe de la langue*. A. A looser connexion of the ligament under the tongue.

ANCYLOGLOSSUS, est, qui frænulum prælongum habet, & ab eo nonnunquam sectus fuerit, ex ἀγκύλη hamus, & γλῶσσα lingua. B. *Ten / die met de tong-riem belemmert is*. G. Dem die zung nicht frey ist. Gall. *Quis a le Filet*. A. Tongue-tied.

ANCYLOSIS, est immobilitas articulationis cum tumore duriori, orta ex callo ad articulum ossis fracti, vel ligamentis rigescentibus, vel exostosi ad juncturas, vel inipillato muco glandularum illiniente.

ANCYLOTOMUS, est scalpellum, quo linguæ frænulum rescinditur; in genere accipitur pro cultello aciem incurvam habente. B. *En Mes om de tong-riem te snyden*. G. Ein Zung-riems Messerlein. Gall. *Ancylotome*, *Coutelet pour couper le Filet*. A. small knife for cutting the ligament under the tongue.

ANCYROIDES, est Scapulæ processus rostriformis, qui *Coracoides*, *Anchoralis*, & *Cornicularis* vocatur, ab ἀγκυρα anchora, ῥύγχος rostrum, & ἴδιον forma. B. *Het anker gelyke uitsteeksel*. G. Das anker gleiche aufwasch des schulterblats. Gall. *L'Eminence ou Apophyse Coracoide*. A. A. Process on the scapula like an Anchor.

ANDRACHINE, vocatur Portulaca: dicitur ἀνδράχνη inferto, quod primum teneritudine quâdam lætâ & carnosâ luxurient ramuli, foliaque albicent, spumosâque quâdam fuligine, sive tenui quâpiam aspergine cinereâ obductâ videantur, ἄχνη enim Græcis spuma est, ἀδὲρ plenum, letum, crassum, pingue. Spuma autem in marina portulaca multò evidentius conspicitur, quàm fativa. B. *Porcellein*. G. Burtzelkraut. Gall. *Pourpier*, *Porcelaine*. A. Purslain.

ANDROGYNUS, sive **HERMAPHRODITUS**, est, qui membra virilia & muliebria simul habet. Item, quibus excisa sunt membra virilia. Item effceminatus, ex ἀνὴρ vir, & γυνή mulier. B. *En Man-Wijf*. G. Halb Mann und halb Weib. Gall. *Hermaphrodite*. A. An Hermaphrodite.

ANDROSACE est planta flore monopetalo, hypocra-
teri formi, fructu globofo, foliis nervosis longis, & amplis, lanuginosis & in margine incisis, in orbem repentibus; calix est valdè amplus & expansus; vasculum feminine exiguum per maturitatem in quinque partes dehiscit: habet in medio Placentam cui plurima adnascuntur femina oblonga, rubicunda; radix est fibrosa, & minima, crescit in locis maritimis, dicitur quasi ἀνδρὶ ἄκρον φέρεσα, quod viris remedia suo nomine polliceatur, vel ἀνδρὶ σάκον, quod folliculi membranacei scutum exiguum

guum referant coriaceum. Alii ἀνδροσακες, quod ἰδρόσα·
κες dici æstimant; quòd ducendo urinam hydropicis pro-
fit.

ANDROSOEMUM est officinalis planta flore rosaceo,
calice polyphylo, fructu ovato unicapsulari, character
ejus ferè ac Hyperici; differt in eo quòd planta sit valdè
ramosa referens arbusculam: dicitur, ἀπὸ τοῦ ἀνδρός à viro, &
ab αἷμα sanguis; nomen est *Viri sanguis*: sic dicitur, quia
folia contrita sanguinem colorem præbent; dicitur & to-
ta sana. B. *Mansbloed*. G. Johans-Kraut. Gall. *comme
qui diroit sang d'homme; toute saine*. Quasi Græcè dicas
Thrasibula. A. St. Johns wort, Tutfan or Park leaves.

ANEMIUS FURNUS, est, qui cæteris majorem ignis
vim destillandis, liquandisve rebus largitur. Ab ἀνέμῳ
ventus. B. *Wind-oven*. G. Wind ofen. Gall. *Fournau à
vent*. A. A wind-furnace.

ANEMONE, flos venti, ab ἀνέμῳ ventus: quia flores
sefe nunquam aperiunt, nisi flante vento, ut testatur *Pli-
nius*. Sed fortè ab ἀνέμῳ ventus, & ὅλλω seu ὅλλυμι, quòd
flos facilè à ventis dejiciatur ac perdat. Hinc Pulsatilla
aliquando vocatur, quia à ventis facilè propellitur; vide-
tur esse flos Adonis veterum. B. *Wind-bloem*. G. Wind-
blum. Gall. *Anemone, Coquerourdes, Cocles, Passefleur*.
A. Wind-flower.

ANETHUM, planta est umbellifera, foliis tenuissimè
divisis, viribus medicis pollens; Radix annua, reliqua ut
in fœniculo, semina foliacea, plana, membranacea, ova-
ta, orbicularia, compressa, in parte exteriori tribus striis
vel sulcis notata. Quibusdam παρά τὸ ἀνέθειν, quòd cito
crescat. Aliis quasi ἀνέκθηον quasi *inviatum*, ab ἀ priv. &
νικάω vinco, quòd cibi excitat appetentiam, nonnulli no-
men impositum volunt, quòd Anethi esus laceffat ad ve-
nerem: alii à puero pulcherrimo in plantam sui nominis
converso. ἀνέθειν enim congressus, familiaritas, coitio Ve-
nerea dicitur. B. *Dil*. G. Dyllen-hoch-kraut. Gall. *Anet*.
A. Dill or Anat.

ANEURISMA, est duplex *verum* vel *spurium*. *Verum*
est tumor p.n. ab arteriarum interioris tunicæ runtura
& exterioris dilatatione, pulsans, rubens, compressu ce-
dens, laxatus redeuns. *Spurium* est ubi tunicæ ruptæ li-
quorem effuderint in partes vicinas, unde tumor conti-
nuo

nuò auctus, mollis, vix pulsans, lividus, compressu vix evanescens, brevi putrescens; ab ἀνευρόνω dilato. B. **Gen flag-ader-bzuck.** G. Der puls adren ausspannung. Gall. *Aneurisme, Dilatation de l'Artere.* A. An Aneurisme, or a Dilatation of the Arterie.

ANGEIOTOMIA, est vasorum dissectio, ut in Venæ sectione, & Arteriotomia; ab ἀγγεῖον vas, & τέμνω seco. B. **Opening der vaten.** G. Eroeffnung dergesäßen. Gall. *Saignée ou Ouverture des Vaisseaux.* A. Blood-letting.

ANGELICA est officinalis planta foliis latissimis, dentatis ferè ramosis, seminibus striatis, floribus umbelliferis, radice aliquantulum resinosa, oblonga, crassa, in fibras tenuiores divisa, foris ex flavo rubescente, medulla interiori alba, saporis acris, suaviter amaricantis, cum quadam blanda dulcedine, odoris fragrantis, tota planta habet odorem & saporem aromaticum. Hæc planta crescit multis in locis, quæ autem in montanis Bohemiæ locis reperitur, præ aliis laudatur; crescit & in Alpibus, & satis feliciter in hortis colitur: fortè sic dicta, quòd contra venena angelicas præstet virtutes, ideo & Spiritus Sancti radix vocatur. **Engel-wortel.** G. Angelick wurtz, Brust wurtz, Engel wurtz. Gall. *Angelique.* A. Angelica.

ANGIGLOSSI, sunt, qui difficulter pronunciant L. R. K. atque in loquendo resistentes loquelam præcipitant, ab ἀγκύλη hamus & γλῶσσα lingua. B. **Belemmert van taal.** G. Der schwerlich reden kan. Gall. *Difficulté de parler.* A. A difficulty in speaking.

ANGINA, Lat. ab angendo, quia guttur vel fauces anguntur, sic ab ἄγγειν, strangulare, angere: Vel ut alii ab ἀγγόνη laqueus, vel ἀσπείρειν, quòd spiritum cohibendo respirationem inhibeat, uti *Aurelianus* vult. Est impedita valdè, dolens admodum vel & impedita & dolens simul deglutitio atque respiratio, orta à causâ morbosa supra pulmones & stomachum positas partes afficiente, quæ his functionibus dicatæ sunt. Estque *externa* seu *Spuria* vel *Notha* vulgò dicta, dicitur & *Alba Angina*. G. Der weisse ansatz. Quæ ab externis causis venit, à frigore externo, potu frigidus, spinis & officulis œsophago inhaerentibus. Sed ea levis est & sine febre, nisi ab interna ortum sumat, hoc est, quæ in cute ad collum exterius micat, atque hæc sæpe subito oritur post internam, eamque

que tollit & ægrum liberat ab insigni molestia vitæque discrimine : huc accedit *Volans*, quæ subito disparet, & mox oritur de novo, aut per *Metastasin*, ut vocant, cum à faucibus abit vel ad pulmones vel ad cerebri meninges. Vel *Interna* est, quæ ab interna causa ortum habet, hoc est à febris præcedanea, & febrem acutam comitem habet, quæ à loco diverso, juxta ac inflammatio propior est cælophago, tonsillis, epiglottidi, laryngi, cervici incumbit; varia sortitur nomina, uti *Synanche*, fortè à suspendii similitudine cum laqueo. *Parasynanche*, *Cynanche*, seu *Λυαγγχη* quòd canes aut lupos frequenter afficiat : & *Paracynanche*. De quibus suo loco. B. *En quade keel / worg-gezwel / ontsteking der keel / gumanatie*. G. Hals und Kelen geschwulst, Halsgeschær, Entzündung des halses. Gall. *Esquinancie*. A. A quinsy, or Squinancy.

ANGINA LINI, est Cuscuta, quòd linum circumligando suffocet.

ANGIOLOGIA, ex ἀγγειον, vas, & λόγος, fermo, seu descriptio systematis vasorum corpus humanum perrepantium, quoad situm, ortum, fabricam, finem & usum eorum.

ANGLICUS SUDOR, vide *Sudor Anglicus*.

ANGUILLA, ab anguis, ob similitudinem cum angue, seu serpente : piscis est oblonga, rotunda, in deliciis habita. B. *Hal / Paaling*. Gall. *Anguille*.

ANGUIS, Animal quod complicari, & contorqueri potest, atque semper sit angulosum, vel quòd angat, & premat.

ANGULUS oculi, V. Canthus.

ANGURIA, Planta est è Cucurbitaceorum genere, folia habens magna, villosa, aspera in profundas lacinias dissecta, flores flavos, campaniformes, quinquifidos, quibus succedit fructus obrotundus, carnosus edulis, habens corticem satis durum, sed politum varii coloris; caro cucumeris satis similis est, alba aut rubicunda, saporis dulcis & grati continet pulpam medullosam, in qua latent semina oblonga, ampla, compressa, rugosa, nigra, rufa, aut rubra, seminis cortex est valdè durus, & cortice ablato, invenitur amygdala parva, alba, medullosa, saporis dulcis & grati; derivari posset ab ἀγγιον concepta-

culum, vel vas quodlibet, quia evacuatâ medullâ, vinò impleri possit, quod Americani scitè norunt. Vocatur etiam Citrullus à citreo colore. B. *Watermeloen* / *Kiehezen* / *Citrullen*. G. Gurchen, Citrullen. Gall. *Citrouille*. A. Citruls.

ANGUSTATIO, dicitur de vasis & meatibus, quando præternaturaliter coarctantur & angustiores redduntur.

ANHALTINA, dicuntur remedia, quæ respirationem faciunt, ut sunt plantæ vulnerariæ, & præparata quædam ex Sulphure &c.

ANHELATIO, est respiratio difficilis, parva, sed concitata, quæ sanis, sed maximè debilibus, evenit, in omni vehementi exercitio, præcipuè cum in altum ascendunt, aut cum currunt, vel saltant, quâ plerumque laborant obesi, qui viscera abdominis tam magna, & tantâ pinguedine onusta habent, ut venter sit tumidus & protuberans: alias etiam à repletionem stomachi, cibis præsertim crudioribus, & flatulentis copiosè sumptis mox anhelatio, vel sedentibus vel decumbentibus, & magis adhuc currentibus, aut ascendentibus, & gravissimè, si ætas fuerit, oboritur. At in Febribus, Hydrope, Tumoribus viscerum in ventre, in pleuritide, Cardialgia, & Asthmate semper urget quædam Anhelatio: Est igitur Anhelatio convulsivi motus species. Gr. *Ἀσθματικὴς Πνεύματος*. B. *Opging na adem* / *Hambozstigheid*. G. Ein schwere athem, Angbrustig. Gall. *difficulté de respirer*, *courte haleine*. A. Shortness of breath.

ANI PROCIDENTIA, vide *Procidentia ani*.

ANIMA HEPATIS, est Vitriolum sive sal Martis, nomen à chymicis impositum, quia hoc medicamine morbis Hepatis medetur.

ANIMÆ GUMMI seu RESINA, quæ est pellucida ex albo citrinescens, fragilis in nova Hispaniola ex arboribus quibusdam proceris incisis exstillans prunis imposita gratissimi odoris, Thuri simillima, quo tamen majora grana refert; quid sub hoc nomine intelligatur, non adeo constat; cum hoc Gummi aut confunditur Cancanum, aut sæpissimè substituitur, ab aliis verò utrumque Gummi ab invicem distinguitur; Putatur etiam ex Æthiopia & India Orientali ad nos deferri. Gall. *Gomme Animé*.

ANIMALIS FACULTAS, est actio, quâ homo, sensum, motum, & principes animi functiones exercet: suntque tres Imaginatio, Ratiocinatio, & Memoria. B. *De Lighamelyke Ziel-werking*. G. Wuerckung vonder Seele. Gall. *La Faculté animale*. A. The animal faculty.

ANIMI DEFECTUS, vide *Deliquium Animi*, *Lipothymia*.

ANISCALPTOR MUSCULUS, aliàs LATISSIMUS DORSI: Brachium retrò deorsum trahit, oritur principio membranoso & latissimo, à vertebrarum spinâ apicibus, ab ossè sacro illoque usque ad sextam thoracis vertebram: inseritur inter pectoralem & rotundum valido, brevi & lato tendine, figura est triangularis. B. *Den Aars-krabber / Breedste spier van den rug*. G. Aarskratzer. Gall. *le Grand dorsal*. A. The Scratcher of the arse.

ANISUM, est planta umbellifera, foliis tenuissimè divisis semen aromaticum & carminativum proferens. Est & in usu Medico semen *Anisi* Indici, quod ex China affertur, figuram stellæ refert, componitur ex 6 vel 7. nucleis particularibus radiorum more in Centro coeuntibus, continentibus semen singulare, oblongum, colore feminis Lini. Fortè dicitur ab urbe Siciliæ, quæ Anisum appellatur. Vel à flumine ejus nominis in Austria. Alii *άνισον* quasi *ἀνίητον* dictum volunt: quod cibi appetentiam præstet: vel ὅτι ἀνίησι τὰς ἐμπνευματώσεις, quod remittat ac laxet tensiones flatulentas internas & externas. Verisimile tamen sic vocata, quasi τὸ μὴ ὄν ἴσον. Suidas *Ἄνισον τὸ μὴ ὄν ἴσον. σημαίνει δὲ καὶ εἶδος βοτάνης*: Anisum quasi inæquale, denotat etiam herbam. Nomen illud impositum, vel ab inæqualitate seminum, vel quod folia dissimilia ferat. B. *Άνῆς*. G. Anys, Anisz. Gall. *Anis*. A. Anise.

ANNULARIS CARTILAGO, vide *Cricoides Cartilago*.

ANNULARIS DIGITUS, est is, qui intra minimum & medium locum habet. Vide *Digitus*.

ANNULARIS PROTUBERANTIA, sive Pons Varolij à figura dicta; est quædam pars cerebri tuberosa, intra cerebellum & testes cerebri. B. *Ringwijs uitstrekfel*. G. Der ring gleiche aufz wachs. Gall. *Protuberance annulaire*. A. The annular protuberance.

ANNULUS ABDOMINIS, est perforatio in parte inferiore musculi oblique descendentis, ascendentis & transversalis; pro transitu processuum Peritonæi & vasorum spermaticorum in viris; in mulieribus ligamenta uteri rotunda transmittit, in herniis verò intestina & omentum.

ANNULUS OSSEUS, in foetu tantum reperitur, & quidem præcisè ad ostium tympani locatus, qui facilè ab ossè temporum separabilis est, nudusque apparet cum membrana tympani, quando auris cum ejus meatu est avulsa: Annulus hic, ad dimidiæ circiter lineæ spatium interruptus est, in parte sua superiori propè eum locum; ubi caput mallei, & pars solida incudis in tympanum conduntur. Interruptio hæc etiam in adultis videri potest, & eo loco membrana tympani immediatè adhæret extremitati meatûs ossæ auris externæ. Annuli hujus pars interior, paululum excavata est in tota sua circumferentia interna, & ita crenam efficit, in quam, membrana tympani impacta est; in superiori quoque ejus parte, sinuositas parva observatur, super quam musculus externus mallei porrigitur, & hæc sinuositas in adultis quoque permanet. Quamvis autem parvus iste annulus distinctus sit, & facilè separabilis in infantibus recens natis, in adultis tamen evanescit, & cum unum idemque cum meatu ossæ corpus constituat, ab eo separari amplius non potest. In ætate trium & quatuor etiamnum annorum distingui potest, sed ossi temporum jam tum tam firmiter adhæret, ut amplius separari non possit. Notatur, quòd incipiat adhærescere per duas extremitates, & paulatim per totam circumferentiam reliquam. *B. de becnagtigen ring. Gall. le cercle osseux.*

ANNULUS plumbeus vel æneus, Chirurghi eo utuntur ad firmandum oculum, pro excisione Pterygii, aliisque operationibus in oculo peragendis:

ANNUS CLIMACTERICUS, est annus 63. 81. in quibus annis vana opinio est, quod semper homines tunc temporis mori necesse sit. Illi anni semper incidunt in novum annum, ut septies novem, constituunt tria & sexaginta. Ita novies novem efficiunt octoginta & unum. Nulla ratio, nec ulla experientia nobis persuadere potest, cur homines illis annis magis essent morti obnoxii, quam

quàm aliis : Imò tantus mortuorum sexagenariorum affertur numerus, quàm eorum, qui obierunt sexagesimo tertio aut octogesimo primo. Ergo ejusmodi nugæ ad cæteros errores remittendæ. Vide *Climætericus annus*. B. *ἑξοχδ-jaar*. G. Mord-jahr. Gall. *Année Climæterique*. A. The terms of important changes in the bodies of men.

ANODYNUM, in genere, est Medicamentum dolorem tollens, & quatuor Medicamentorum species complectitur; 1°. Paregorica, quæ dolorem tollunt demulcendo; 2°. Hypnotica, quæ dolorem tollunt somnum conciliando; 3°. Narcotica, quæ dolorem tollunt stuporem inducendo; 4°. Nepenthes, quod propriè notat Medicamentum dolorem auferens. Ex α priv. & $\acute{\alpha}\delta\upsilon\nu\alpha$ doleo. Gr. *Ἀνάδυνον*; *Παρηγορικὸν*, *Λυσιπόνιον*, *Πενυτικόν*, *Πέντε πνεύματιον*, *Πέντε πόνον*. B. *Gen pijnstillend middel*. G. Schmerz stillende mittlen. Gall. *Anodin*. A. Any Medicine that allays pain.

ANOEA; est amentia five imaginationis & judicii abolitio, ex α priv. & $\nu\acute{o}\epsilon\alpha$ cogito. B. *Verstandeloozhyrd, ontzinnigheid*. G. Unsinnigkeit. Gall. *Egarement, ou alienation d'Esprit*. A. Madneß.

ANOMEOMERES, idem quod *Heterogeneum*, five id, quod ex aliis & inter se diversis particulis constat, ex α priv. $\acute{\alpha}\mu\omicron\iota\omicron\nu$ simile, & $\mu\acute{\epsilon}\rho\omicron$ pars. B. *se eerdzaamtighheid/beeldeelighheid*. G. Viel gestaltig. Gall. *Heterogene*. A. Heterogeneous or of another kind.

ANONIS five ONONIS, est herba spinosa, flore pileonaceo: habet caulem tenuem, rotundum, lignosum, villosum, rubicundum, spinis longis & duris instructum; folia oblonga, nigricantia, villosa, glutinosa, dentata, odoris ingrati, saporis leguminosi; flores leguminosos, purpureos, raro albos; flori succedit filiqua turgens, longior, breviorve, bivalvis, instar vesiculæ inflata, in qua hærent semina reniformia; saporis viciæ; radix est longa, lignosa, fibrosa, alba, repens, fractu difficilis: σ^{\prime} $\tau\alpha\upsilon\iota\varsigma$ quidam deducunt $\acute{\alpha}\pi\omicron$ τοῦ $\acute{\alpha}\nu\epsilon$ & $\acute{\alpha}\nu\eta\mu\epsilon\iota$, quasi dicas asini oblectamentum: nam ex Græcis quidam affirmant, asinos in ea se volutare, & dorsum sub aculeis ejus herbæ libenter exterere. Aliis vocatur $\acute{\alpha}$ non juvando, quod inutilis sit, aratro enim ipsisque aratoribus

inimica. Nam non tantum suo ramorum & radicum intplexu aratra, invitis bubulcis, in mediis ramorum fulcis remoratur (unde & ipsi *Restæ* seu *Arrestæ bovis*, remoræ aratri nomen impositum, quod arantes boves in opere sistat) sed etiam messores, foenisecæ, ac aratores spinis suis acutis admodum lædat; vivax præterea nimis fruges opprimit, iisque aculeis nocet. Ex α priv. & ἀνός immitis, rudis, durus, crudelis, sævus. Vel ab ἐνέω vitupero, quia duris & lentis radicibus aratrum remoratur. B. *Drang-wortel* / *stal-kruid* / *osse-breke* / *Ezel-kruid*. G. Hamhechel, stal-kraut, ochsen-brech. Gall. *Arrestebœuf*, *bugrande*, *Bourande*. A. Cammock, rest-barrow, pettywhin.

ANONYMUS, melius *Euonymus*; est arbuscula mali quasi nominis ex α priv. & ὄνομα nomen. Ita quoque appellantur plantæ, quarum nomina incognita sunt. vid. *Euonymos*. Gall. *Fusain*, ou *Bonnet de Prêtre*.

ANOREXIA, est cibi fastidium, cum vel sine nausea, ex α priv. & ἀρεσθῶ appeto, cupio. B. *Spyswalging* / *Hongerloosheid* / *onlust tot eten*. G. Eckel. Gall. *Dégout*. A. Loathing, or Nauseousness.

ANSERINA seu ARGENTINA, est herba sic dicta, quod anseres eâ vescantur: dicitur porro *Potentilla*, *Argemone*, *Agrimonia Sylvestris*, & *Tanacetum sylvestre*. vid. *Pentaphylloides*. B. *Zilber-kruid* / *Zilver-schoon* / *Ganserph*. G. Grensich, Genferich. Gall. *Argentine*, *Becq d'Oye*. A. Silver weed, Wild-tansy.

ANTACIDA, sunt Medicamenta acidum domantia ut sunt absorbentia, de quibus suo loco; diluentia ut aqua & aquosa, vel obtundentia, quæ molli suo lentore inviscant acria ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum simul defendunt membranas ne offendantur à spiculis acidis; unde & effecta horum jam impressa tollunt: obsunt tantum quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur; vel sunt quæ acidum immutant, talia sunt quæ, cum acidis mixta, statim cum hisce effervescent, itaque motum cient, stimulant, agitantque, fibras; postea verò, ipsis cum acidis unita, constituunt novam salis speciem, in qua vis stimulans, diaphoretica, diuretica, resolvens, adhuc superest: Malè cedunt tantum his, quibus nimius motus adest infestus. Ac proinde sunt

sunt antacida medicamenta, vel Terrestria, vel Metallica, vel aquosa, vel alcalia volatilia, vel fixa, vel oleosa. Est vox mixta, origine Græca & Latina. B. *Zuur-matigende Middelen*. G. Mittelen gegen das Saur. Gall. *Remedes contre l'Acidité ou les Aigreurs*. A. Medicines against Acids.

ANTAGONISTA, est musculus alteri musculo in actione oppositus: ut adductor & abductor oculi, brachii, &c. ex ἀντί contra, & ἀγανίζω certo, oppono. B. *Tegenstander*. G. Segen-Ständer. Gall. *Antagoniste*. A. An Antagonist.

ANTAPHRODITICA, sunt Medicamenta adversus nimiam Veneris libidinem: imò contra luem veneream sumuntur, ex ἀντί contra & ἀφρός spuma, orta mari Venus ex spuma. Vocantur quoque *Antaphrodisiaca*.

ANTARTHRITICUM, est Medicamentum adversus Arthritim, ex ἀντί contra, & ἀρθρίτις morbus articularis. B. *Pierocijn Middelen*. G. Gicht stillende Mittelen. Gall. *Remedes contre la Goute*. A. Medecines against the gout.

ANTASTHMATICA, sunt Medicamenta, quæ ab asthmaticis usurpantur, ex ἀντί contra & ἀσθμαζω anhelio.

ANTECEDENS CAUSA, vide *Proëgumena*.

ANTECEDENTIA, signa sunt, quæ ante morbum observantur, ut prava sanguinis dispositio, quæ infinitis morbis causa antecedens existit. Gall. *signes antecedens*.

ANTEMETICA, sunt Medicamenta, quæ vomitum nimium impediunt & inhibent, ex ἀντί contra & ἐμῶ vomo. B. *Braken belettende Dingen*. G. Mittelen gegen das Brechen. Gall. *Rémedes contre le vomissement*. A. Medecines against vomiting.

ANTENDEIXIS, est *Contra indicatio*, sive indicatio-
num contradictio, quæ impedit, quod à prima indicatio-
ne suggeritur: ut Pleuritis inflammatoria venæ sectionem
indicat, cui contraindicant vires debiles, ex ἀντί contra
& ἐνδείκνυμι ostendo.

ANTEPILEPTICA, sunt medicamenta contra mor-
bum caducum, ex ἀντί contra, & ἐπιλαμβάνω invado.

ANTHELIX, est altera auriculæ protuberantia Helicæ
multo brevior, latior, crassior, depressior, non intorta,
eique versùs interiora opposita, bipartito, mediante cavi-
tate, principio orta in auriculæ parte anteriori & superio-
ri sub intorta Helicæ, dein unita, incurvo processu

deorsum vergens gracilescit, subsidet & definit, videtur anfractuosa ipsius Helicis continuatio, quæ sic quasi unâ lineâ spirali in se ipsam recurrit, ex ἀντι anti, & λῆξ volumen. B. Gegen Slangentrek der ooren. G. Der Gegen-Craytz am Ohr. Gall. la fosse ou la grosse eminence oblongue, qui est entourée du pli de l'oreille. A. The inmost ring of the eare.

ANTHELMINTICA, sunt Remedia intestinorum vermes enecantia, ex ἀντι & ἑλμινς vermis.

ANTHEMIS, & ANTHEMON, est nomen, quo varii flores denominantur: derivatur enim ab ἀνθ flos.

ANTHERA, dicuntur summitates seu cacuminula in florum medietate capillamentis incumbentia; & imprimis quando illa sunt crocea vel rubra, ut in liliis, croco &c. ut & Medicamenta ex metallicis imprimis composita floridum colorem & præcipuè rubrum habentia, ut sunt croci Chymici: ab ἀνθ flos vel ἀνθηρὸν, floridum, prærubrum, sanguineum.

ANTHOPYLLI, & quibusdam ANTOPHYLLI, & ANTOPHALA, sunt grandes Caryophylli, qui ad maturitatem pervenerunt, nucleo intus duro bilidoque; sapore non tam acres, ut Caryophylli, præterquam in superficie. Ex ἀνθ flos & φύλλον folium, quamvis sit fructus Caryophyllorum maturus. B. Moernagelen / Antoffels. G. Mutter-Næglen. Gall. Grands Geroffles, Mere de Geroffles. A. Mother cloves. Arab. Carumfel vel Calafur, ut & Arumfel. in Java Syanke vel Chanque. in Malaja Synken. Antophyllus est quasi floris folium. ex ἀνθ flos & φύλλον folium, vide Caryophylli.

ANTHORA, est Napelli species, Remedium adversus Thoram, venenum pessimum, ex ἀντι adversus, & φθίω corrumpo. Gall. espece d'Aconit.

ANTHOS, flos, sed per excellentiam sic vocatur Flos Rosmarini: applicatur etiam hæc vox sputis cruentis, & sanguineis fibris quasi intertextis, & tandem ad mineralia transfertur, in Chymicis notat quintam essentiam, sive Elixir auri, item Medicinam extractam ex perlis; sic anthos Philosophorum dicitur modus quidam transmutandi metalla, qui fit per vitriolum.

ANTHRACOSIS OCULI, est crustosa & corrosiva oculi ulceratio, cum tumore totius corporis, præsertim circa

circa oculos. Causa quandoque est inflammatio oculi. B. *Gen brand-oog*. G. Brand in Auge. Gall. *ulcere de l'œil caustique ou brulant*. A. A corrosive ulcer of the Eye.

ANTHRAX, est inflammatio valdè ardens & acrem fuscitans dolorem, cum tumore elevato sed non latè diffuso, cum pustulis igneis circum se acerrimis, variis in corporis locis absque suppuratione emergens; Caro quasi crusta inuritur, color ex rubro ad lividum, nigrumque, id est inflammatio ad gangrænam vergit. Jam quia vel pestis adest, vel non, Anthracis duas constituunt species, quarum altera *pestilentialis*, altera non. Dicitur & *Carbo*, *Carbunculus*, *Pruna*, *Ignis persicus* &c. B. *Gen pest-kool / negen-oog*. Quia novem aliquando pustulæ conspiciuntur. G. Kohl oder ein Carbunckel-Blat, ein Pest-Kohl, Pestilentz Blätter, Carbunckel, ein Kohle. Gall. *Anthrax*, *Charbon*. A. A kind of bile drawing quickly to a scab, coale, carbuncle.

ANTHROPOLOGIA, est de homine doctrina: quæ à *Bartolino* in geminas dispescitur partes: *Anatomiam* nempe; quæ de corpore, ejusque partibus agit: & *Physiologiam*, quæ de anima. B. *Gen Mensch-beschreibung*. Ex *ἄνθρωπος*, Homo, & *λέγω* dico. G. Beschreibung der Menschen. Gall. *Description de l'Homme*. A. A. description of a man.

ANTHROPOMORPHOS, Mandragora vocatur, cujus radix hominem refert, quod arte fieri potest ex *ἄνθρωπος* homo, & *μορφή* forma, figura.

ANTHYPNOTICA, seu medicamenta somnum abigentia, ex *ἀντί* contra, & *ὕπνῳ* dormio. Gall. *Remedes contre le sommeil ou le dormir*.

ANTHYPOCHONDRIACA, Remedia sunt adversus mala, circa Hypochondria contingentia. Gall. *Remedes contre l'Hypochondrie*.

ANTHYSTERICA, sunt Medicamenta contra Hystericam passionem, ex *ἀντί* adversus, & *ὕστερα* uterus, matrix. Gall. *Remedes contre les Vapeurs*.

ANTIARTHRITICA, sunt Medicamenta, quibus arthritis curatur, ex *ἀντί* & *ἄρτηρις* dolor articularis. Gall. *Remedes contre la Goute*.

ANTIAS, pl. ANTIADES, TONSILLÆ, Cic. *Plin*. GLANDULÆ COLLI, vulgo *Amygdalæ*, quas &

tamen non adeo accuratè referunt. Ἀντιάδεις, μῆλα à malorum figura παρίσθμια, σπογγοὶ Hipp. quòd spongiorum in modum humores imbibant. Sunt glandulæ duæ conglobatæ, quæ reverà unum corpus constituunt, ad latera uvulæ confitæ. *Substantiâ* glandulosæ, colore subflavo; tactui molles: sinum habent utrinque unum communem amplum & ovalem in os apertum, intra cujus fimbriam duos majores & plures minores sinulos obtinent. *Usus* est, materiam mucosam colligere, eaque vicinas partes humectare. Sunt etiam tonsillarum inflammationes. B. *Gezwolte Mandelen*. G. Entzündung der Mandlen. Gall. *les Amygdales enflammées*. A. Inflaming of Almonds. Vide *Paristhmia*. Ab ἀντιάω occurro, quia sibi ex adverso in oris termino utrinque respondent. B. *d'Amandelen*. G. Mandeln, Half-Mandlen, Mandlen. Gall. *Les Amygdales*. A. The Almonds.

ANTIBALLOMENA, sive SUCCEDANEA, sunt Medicamenta viribus similia, quæ alterius defectu quandoque substituuntur: à Pharmacopœis dicuntur *Quid pro quo, & substituta*. Ex ἀντί contra, & βάλλω jacio, ἀντιβάλλω in alterius locum sufficio.

ANTICACHECTICA, sunt Remedia malè constitutum sanguinem corrigentia, ex ἀντί contra, κακὸν malum, & ὄζις habitus. Gall. *Remedes contre la Cachexie*.

ANTICARDIUM, est cavitas externa infra mammas in medio pectoris sterno insculpta, ex ἀντί ante, & καρδιά cor. B. *Het herte putjen*. G. Grueblein auff der Brust. Gall. *Le Creux de la Pôitrine*. A. The cavity just below the sternon.

ANTICIPANS & ANTICIPATIO, dicitur de morbis, quorum Paroxysmorum periodi citius veniunt indies. B. *Der vroege van de ziekte*. Gall. *Paroxysme qui avance*.

ANTICNEMIUM, est anterior tibiæ pars, ex ἀντί ante, & κνήμη tibia. Vide *Gastrocnemium*.

ANTICOLICA, sunt Medicamenta adversus dolorem colicum, ex ἀντί contra, & κοιλία venter, alvus, Gall. *Remedes contre la Colique*.

ANTIDINICA, Remedia, quibus vertigines curantur, ex ἀντί adversus, & διὰ gyrus. Gall. *Remedes contre les vertiges*.

ANTIDOTUM, est Medicamentum contra lethale

venenum, & quod adversus venena epota datur, ex ἀντί contra & δίδωμι do. B. *Gen tegengift / tegen vergift.* G. Artzney wider Gift. Gall *Preservatif, contrepoison, antidote.* A. An Antidote, or a preservative against poison.

ANTIDYSENTERICA, sunt Remedia adversus dysenteriam, ex ἀντί contra δὲ difficile, ἐντερον intestinum, & ῥεω fluo. Gall. *Remedes contre la dysenterie.* 3

ANTIFEBRILE, vide *Antipyreticum.*

ANTIHECTICA, sunt Remedia adversus tabem, ab ἀντί contra & ἕξις habitus. Gall. *Remedes contre la consumption.*

ANTIHELMINTICA sunt Medicamenta, quæ vermes in intestinis hospitantes necant & expellunt. B. *Wurmkruid.* Gall. *Remedes contre les vers.*

ANTILOBIUM, dicitur pars illa exigua in Auricula, quæ infimæ parti, quem lobum appellant, superposita est Gr. ἀντιλόβιον.

ANTILOIMICA, Remedia pestem arcuentia : λοιμός enim pestis est. Gall. *Remedes qui préservent de la Peste.*

ANTILYSSUS, est compositio adversus rabiem, ex ἀντί contra, & λύσσα rabies.

ANTIMONIUM, est minerale, metallis affine, constans primò ex sulphure minerali, partim purissimo & solari, eoque in rubedine fundato, partim combustibili, instar alterius sulphuris. *Secundo*, ex copioso Mercurio metallico indigesto, fuliginoso, (coagulato tamen, magisque cocto, quàm est Hydrargyrum,) participante de Saturno. *Tertio*, ex substantia quadam terrestri & salina perpauca. Quod in officinis prostat, liquefactione ex minera est fusum, inque formas pyramidales ut plurimum effusum. Minera in Officinis rarò prostat. Invenitur in Germania, Hungaria, & Transsylvania, dicitur & stibium: est propriè substantia metallica, solida, ponderosa obicuri, cærulei, plumbei coloris, Striasque habet splendentes & longas. Componitur ex vero sulphure fossili, & parte metallo quàm simillima cui si malleabilitas conciliari posset, vera metallica indoles inesset; foretque septimum metallum ductile. Hanc verò rationem purificandi stibii ignotam hætenus fatentur; licet Boyleus verum, fluidum, Mercurium arte secretâ inde electum asserat, idque vel Tirones hodierni & Thraſones, in arte

jactent se posse. Fusile in igne, quin & cæteris facilio-
rem fusionem fossilibus conciliat. Ut verò fragile ipsum,
ita & admistu suo ductilia ipsa fragilia reddit. Quin imò
& volatile ipsa cæterum fixa vi ignis, si permiscetur, fa-
cit volatilia, vix ullo perfectè excepto. Auri fulgorem
pulcherrimè promovet. Denique Arsenico albo assimilè
ingenium videtur possidere. B. *Antimonie / Spiesglas /
Spitsglas*. G. Spiesz-Glasz. Gall. *Antimoine*. A. Anti-
mony. Hebræis *Zaddah*. Gr. *σιμμι*, *σιβι*. Arab. *Aitmad
& Antimad*. Latini quoque *Stibium* appellant. A. Chy-
micis etiam varia sortitur nomina.

ANTINEPHRITICA, sunt Medicamenta morbis re-
num medentia. Ex *ἀντι* contra, adversus, & *νεφρός* ren.
Gall. *Remedes contre les maladies des Reins*.

ANTIPARALYTICA, sunt Medicamenta tam inter-
na, quàm externa contra Paralyfin probata. Gall. *Reme-
des contre la Paralyfie*.

ANTIPATHIA, est contrarietas & repugnantia in cor-
pore per se, vel Medicamentis. Item fastidium & ab-
horrentia alicujus rei sine manifesta causa. Ex *ἀντι* con-
tra, *πάθος* affectus. B. *Tegenstrydigheid*. G. Wider-
wertigkeit gegen ein Ding. Gall. *Antipathie*. A. Antipa-
thie.

ANTIPERISTASIS, est aëris circumfistentia, quem-
admodum in fæno, madidè nimis in metam aggesto. Ita
aër frigidus corpora nostra ambit, effluvia decedentia in-
tùs tenet, ex *ἀντι* contra, & *περίστυμι* circumfistito. B. *Gen-
rond-onbezetting / tegen-djang*. G. Pressueng desz
Luffts. Gall. *Antiperistase*. A. A repulsion on every part.

ANTIPIARMACUM, est Remedium venenis adver-
sum. Significat quoque Remedium contra quemvis mor-
bum: ex *ἀντι* contra, *φάρμακον* Venenum, Remedium.
B. *Gen tegen-gift*. G. Wider-Gift. Gall. *Contrepoison,
Antidote*. A. An Antidote, or a preservative against poy-
son.

ANTIPHTHISICA, Medicamenta Phthisi seu tabi ad-
versantia. Ex *ἀντι* contra, & *φθίσις* tabes. Gall. *Remedes
contre la Phthisie*.

ANTIPTHORA, est Napelli vel Thoræ species, sic
vocata, quòd adversetur phthoræ; ex *ἀντι* adversus, &
φθορά corruptio, à *φθίω* corrumpo,

ANTIPLEURITICUM, est Medicamentum pleuriticum seu adversus morbum Lateralem, ex ἀντι ante, & πλευρίτις Morbus Lateralis. Gall. *Remede contre la Pleurésie.*

ANTIPODAGRICA, Idem quod *Antiarthritica*.

ANTIPYREUTICUM, seu **ANTIPYRETICUM**, est Medicamentum febrim temperans & profligens. Ex ἀντι contra, & πυρόω incendo. B. *Gen tegen-koozsig nuidel.* G. Feder-Kraut, Mittlen vor Fieber. Gall. *Febrifuge.* A. A Febrifuge.

ANTIQUARTANARIUM, & **ANTIQUARTIUM**, Medicamentum est adversus febrim quartanam. Gall. *Remede contre la sievre quarte.*

ANTIQUI MORBI, sunt, qui ultra quadragesimum diem ad annos sæpe plurimos extenduntur, ideoque & inveterati dicuntur. B. *Verouderde ziekte.* G. Langwirige Kranckheit. Gall. *Maladie inveterée.* A. Old Diseases.

ANTIRRHINUM, est planta, quæ Folia habet Linariæ latiora, flores monopetalos, personatos, parte posticâ caudâ carentes, bilabiatos, labio superiori erecto, inferiori trifido, vultum Leonis formante; totus flos, si à suo calice auferatur caput refert vitulinum, post singulos flores pistillum floris calicis quinquifidi fit capsula; quæ per maturitatem refert perfectissimè caput canis vel suis, quæ continet semina exigua, nigra; radix est alba & lignosa; hæc planta ab una parte nempè posteriori perfectè caput vituli refert, ab altera rictum Leonis. Dicit volunt quod florem ferat tanquam nares vituli; ex ἀντι, & ρίς nāsūs, nares: vocatur & Cynocephalos à κυνός canis, & κεφαλή caput, quia ejus fructus canis caput refert. B. *Orant / Alpen-hoofd / Linaptandekens-kruid / kalfs-snuut / gaperkens / kalfs-bek / kalfs-muil / kalfs-nens.* G. Kalb-Schnabel, Lewen-Maul. Gall. *Mouron violet, Musle de veau œil de chat, teste de veau, gueule de veau.* A. Calfes Snoute, Snap dragon.

ANTISCOLICA, sive *Anthelmintica*, sunt Remedia vermes necantia. Ex ἀντι adversus, & σκόληξ vermis. Gall. *Remedes qui tuent les vers.*

ANTISCORBUTICA, sunt Remedia, quibus scorbutus sanatur. Gall. *Remedes contre le scorbut.*

ANTISCORODON, est Alii species. Ex ἀντι ante, adversus & σκάρδοον allium.

ANTISPASIS, Veteribus dicebatur *sanguinis revulsio*. Quæ fiebat, quando humores in partem aliquam ruentes in contrarium, per venam, in parte opposita vel satis remota, incisam, avertiebantur. Sic accipi potest revulsio, in æquali sanguinis periodo, cum in capitis dolore nimium ruat ad caput, & per supplantalia avertatur; ab ἀντισπᾶω in contrarium traho. B. *Afstrekinge*. G. *Ableitung*. Gall. & A. *Revulsion*.

ANTIPASMODICUM, est Medicamentum contractiones & spasmos inhibens, ab ἀντισπᾶω contraho. Gall. *Remedes contre les convulsions*.

ANTISPASTICUM, idem quod *Antispasfis*.

ANTITASIS, seu **CONTRAEXTENSIO**, est partium in corpore opposita locatio, ut est inter Hepar & Lienem: est quoque ossis fracti in oppositum tractio vel extensio, ita ut alter extendat, alter verò contra extendat. B. *Gegentrekking*. G. *Gegen-Streckung*. Gall. *Contre extension*. Ab ἀντιπᾶσσω ex adverso ordine.

ANTITHENAR, five **Adductor**, est unus ex musculis pollicem manus vel pedis extendentibus, qui ad pollicem manus reperitur, oritur ab ossè Metacarpi digiti medii, & inferitur phalangæ primæ & secundæ; qui verò est in pede oritur ab ossè cuneiformi tertio, & inferitur in ossè scaphoideum internum. ex ἀντὶ contra, & θέναι vola.

ANTITHORA, Idem quod *Anthora* & eâdem origine.

ANTITRAGUS, est prominentia auris externæ ab Helice oriunda, trago opposita ad finem Anthelicis sita, eique terminum figens, satis elevata. Ex ἀντὶ contra, & τράγος hircus. B. *De tegen bok*. G. *Der gegen Bock*. Gall. *Le bouton posterior qui est au dessus de l'extremité inferieure de l'Anthelix*. A. Protuberance opposite to the Hrangus.

ANTIVENEREA, Medicamina ad Luem Veneream. Gall. *Remedes contre la verole*.

Ἀνθραπόμορφος, *Mandragora*, ex ἄνθρωπος, homo, & μορφή, figura, quo ejus radix effigiem hominis repræsentet.

ANTRUM BUCCINOSUM, idem quod *Cochlea*.

ANUS, **PODEX** & **CULUS**, est intestini recti extrema pars, constat ex tribus musculis, duobus nempe levatoribus, anum tempore necessitatis relaxantibus, & uno sphin-

sphinctere sive constrictore, qui anum claudit & occlusum servat. *Item* cavitas in cerebro, ex contactu quatuor truncorum spinalis medullæ, orta. *Item* cutis superans umbilicum, cujus rugæ senii indicium faciunt. *Corrugata vetula* à Barbaris. Gr. *πρωκτός*. B. *Den Mars*. G. *Ariz*, der Hinder. Gall. *l'Anus*, *le Fondement*, *le trou du derrière*. A. The arse, or Fundament.

ANYDRON, vocatur species Solani maniaci, dicta fortè, quòd qui eam gustaverint, sitiant. ex α priv. & ἰδωρ aqua.

AORTA, sive ARTERIA MAGNA, est vas quod circulari orificio ex sinistro ventriculo cordis oritur, adscendit, superato pericardio fursùm parùm it, mox retrorsùm, paulò sinistrorsùm, in arcum se flectit versùs spinam, descendit deinde; ramos ascendentes ex ipso arcu tres habet, unum Innominatum, & duas carotides, quæ omnes partibus superioribus prospiciunt, ramus ille Innominatus, ubi ad pollicare circiter spatium adscendit, bifidus evadit, sic ut unus ramus lateraliter dextrorsùm sub claviculam dextram tendens subclavia vocetur dextra, atque ad Axillam tendat; alter carotis dextra vocatur. Inferiùs per truncum descendens, visceribus ramificationibus prospicit: Ulteriùs deinde factâ descensione ad femora & pedes terminum consequitur. Tota hæc arteria similis est reliquis arteriis, nisi quòd habeat membranas & fibras fortiores, ab ἀήρ aër, & τήλω servo, quia antiquis persuasum erat, in ea aërem contineri. B. *De groote slag ader*. G. Die große Pulsz-Ader. Gall. *l'Aorte*, *la grande artère*. A. The great artery.

ΑΡΑΓΜΑ, est ossis vel alterius partis, de loco proprio abductio, ex α priv. & πινύω compingo.

ΑΡΑΝΘΙΣΜΟΣ, est obliteratio alicujus partis in corpore, ita ut prius vestigium amplius reperiri non possit; quod canaliculo arterioso circa cor & Venæ in Hepate Fætus existenti, dum postea adolescit, contingit, ab ἀπαθίω defloreo. B. *Der wassfinge*. G. *Verwachsung*. Gall. & A. *Obliteration*.

ΑΡΑΡΙΝΗ, seu Asperugo est planta quæ habet caulem tenuem, debilem, quadrangularem, flexilem, aliis plantis adhærentem, asperum, viridem; folia parva, lata, oblonga, viridia, Rubiam referentia, caulem stel-

læ forma ambientia, horridis suis spinis vestibis adhærentia; Flores parvos, in spicas congestos, in quatuor partes divisos; Bacca post florem succedit, duo semina ferè sphaerica, sibi invicem adhærentia, continens, hæc semina in medio parùm sunt excavata, cutim siccam, nigram, & pulpam albam continentem, habentia; Radix est valde parva. Gr. *ἀραιρινή ρίνη* enim est lima. Gr. *ὀμφαλόκαρπος*, & *φιλάνθρωπος*, vide suo loco. B. *Kleef-kruid*. G. *Klebkraut*. Gall. *Reble*, *Grateron*. A. Cleavers or Goosegrass.

APATHIA, est affectuum vacuitas, ex α priv. & πάσχω patior.

APELLA, vel RECUTITUS, est is, cujus præputium est abscissum; qualis mos Hebræis, Turcis, Ægyptiis &c. familiaris est. B. *Besneden*. G. *Beschnitten*. Gall. *Circoncis*. A. Circumcised. Sic etiam dicitur cujus præputium ita contractum est, ut glandem tegere nequeat.

APEPSIA, est abolita ciborum in ventriculo concoctio, ex α priv. & πέπω coquo. B. *Onvertering / verterloosheid*. G. *Verhinderte Kochung der speisen*. Gall. *Apepsie*, *Indigestion*. A. Indigestion.

APERIENTIA, sunt medicamenta, quæ tenuibus particulis profunda penetrando ea quæ occludunt meatus & crassa sunt attenuando & expellendo, corporis poros, atque meatus aperiunt: horum tres classes sunt, quarum prima continet ea, quæ vasa laxant, 2º. quæ liquida attenuant, resolvunt, ac diluunt. 3º. quidquid, postquam vasa laxata sunt, & liquidum attenuatum, utraque in motum agit, & circulationem promovet. B. *Openende dinggen*. G. *Oeffnende mitlen*. Gall. *Remedes desoppilatifs*, ou *Apertifs*. A. Apertitive medecins.

APERISTATOS, est ulcus cavum non magnum, nec ulli graviori noxæ conjunctum, ex α priv. & περίσχη circumlito. Unde *Galenus* Ἀ'περίστατα ἕλκη ulcera cava. B. *Holle zuweren*. Hoele geschwær. Gall. *Ulcère Creux*. A. hollow ulcer.

Α'πέχημα, ab ἀπό τῆς ἡχῆς, seu à resonitu, quod sit fractura cranii parte, ei quæ percussa est contraria: dicitur etiam infortunium.

APES, sunt volitantia animalcula Mel & Ceram ex plantis colligentia, quod sine pedibus primò esse dicantur.

tur. B. *Bpe.* Gall. *Mouches à miel, Abeilles.*

APHACE, est leguminis species. Habet hæc planta folia triangularia, integra, ex adverso bina ex nodis caulium, ex quorum alis prodeunt claviculæ; siliqua est fieta feminibus subrotundis; radix annua, fibrosa. Ex α priv. & φὰς lens, quòd lentem minimè referat. Dicitur etiam *Os Munda.*

APHÆRESIS, est Chirurgiæ pars, superflua auferens, ab ἀφαίρεσις tollo.

APHONIA, sive *Loquela abolita*, unde *muti*; quales primò sunt qui surdi, & ideo quoque *Muti* nascuntur. *Secundò* infantes, qui etsi non in lucem prodeunt surdi, ad tempus tamen muti sunt, donec fari & loqui didicerint. Sed *Tertiò*, si linguas varias, quæ homines, quos una conjunxerat ratio, diversâ oratione distinxit, spectemus. Nemo, etiamsi vel loquacissimus, non erit mutus. Jam *Quartò*, senes, qui solent bis pueri esse, inter alia muti ex parte fiunt. Sed *Quintò*, qui Apoplexiâ, somno qualicunque, Epilepsiâ, Paraplegiâ, Hemiplegiâ, Syncope, Suffocatione Hypochondriacâ & aliis morbis laborant, ad tempus muti sunt, aut si placet, obmutescences, uti etiam, si graviter consternuntur, contristantur, metuunt, irascuntur, sæpe obmutescere solent, denique qui moriuntur in articulo saltem mortis muti sunt; sed alius quoque casus reperitur, si quis cæteroquin non admodum æger, mutus evadit, aut aliquandiu aut semper manet: Atque ex his constat mutum quem esse, aut obmutescere in morbis soporosis, paralyti spinalis medullæ, in lingua obstructa, in augmentibus faucibus &c. Ex α priv. & φωνή vox. B. *Sprakeloosheid / Stemmeloosheid.* G. Sprachlosigkeit. Gall. *Muet.* A. Dumbness.

APHORISMUS, est oratio, quæ omnes proprietates brevissimis verbis circumscribit, ab ἀφορίζω determino. B. *Schei-regel / kortbondige spreek.* G. Kurtzer Spruch. Gall. *Aphorisme, Sentence.* A. A Short Sentence.

APHRODISIA PHRENITIS, ab Aphrodita sive Venere, dictus est insanus & ardens amor in puellam. B. *Dolle verlieftheid.* G. Wuetende liefde. Gall. *Rage d'Amour, Amour furieux.* A. A Raging desire after Vener.

APHRODISIUS MORBUS, idem quod *Lues venerea* & *Aphrodisia.*

APHRO-

APHRONITRUM, est Nitri spuma, ab ἀφρός spuma, & νίτρο, nitrum. B. *Salpeter-schium*. G. *Salpeter-schaum*. Gall. *Ecume ou fleur de Nitre*. A. Scum of the Niter or saltpeter.

APHTÆ, sunt parva, rotunda, superficiaria ulcuscula, occupantia os internum, fauces, oesophagum, ventriculum, intestina tenuia; variè colorata, alba, flava, fusca, livida, nigra; videntur esse exulcerationes tenuissimorum ductuum salivoforum & mucosorum, factæ ex obturatione ejus ductus extremi per humorem lentum viscidumque eo delatum: Solent frustulatim decidere, & aliquando recrescere; imprimis observantur in Infantibus, vel in adultis, morbis acutis & viscerum inflammatione laborantibus. Oscedo *Sereno & Isidoro*. Alcola *Arabibus*. Item Bothor, ab ἀφθόρευν locum occupare: aliis ab ἀπύρεσθαι incendi. B. *De Sprouw*. G. *Saar, Schwämme*, & propter albedinem quasi os totum albâ farinâ esset confpersum, den meel-hund appellatur. Gall. *La Pepie*. A. The Pipp.

APHYLANTHES, quasi diceret flos non foliatus, ex α priv. φύλλον folium & άνθος flos.

APIASTRUM, est Melissa, sic vocata, quia ab apibus adamatur. Vide *Melissophyllum*. Item *Ranunculus* est, vide *Batrachium*.

APICES, seu ANTHERA, quæ in medio calicis seu folliculi quo flos clauditur, erumpunt, *Stamina* sunt, quæ veluti filamenta ab intimo floris sinu profiliunt. Habent Apices sæpius in summo quidpiam crassiusculum, à quâ similitudine nomen acceperunt, dicuntur & capitula, quæ geminis constant oculis aut cistellis cavis capsula membranacea per medium in duos recessus divisas, qui coloratum plerumque pulverem continent: cujus granula (ut ex optimis observationibus constat) in qualibet plantarum specie definitam ut plurimum formam assument: hæc autem capitula partim ab apparente illorum figura, partim ab eo, quo funguntur, officio, non ineptè testiculos appellant recentiores Botanici; planta enim, ablatis, antequam sua subierunt munia, capitulis, producere pergit semina, quæ; quamquam apparent pulcherrima, nunquam tamen evadunt prolifera, eodem perfectè modo, ut in subventaneis animalium ovis contingit; unde

talia hujusmodi plantarum semina ex analogia non foecundatis animalium ovis comparari possunt. Vide *Anthera*. B. *Doppen*. G. *Sipfels*. Gall. *Sommets*, *Bourgeons*. A. The Chives.

APINTHION, vide *Abinthium*.

APIOS, Tithymali species est; caulis ejus scandens; folia bina, quasi conjugata ad costam in folium impar definitum; pistillum vaginâ obvolutum, abit in siliquam tricapsularem, quarum singula continet semen oblongum; radix tuberosa est, pyrum referens, latior à parte superiori quàm ab inferiori, externè nigra, intus alba, plurimum lactis continens. ἰσχας, χαμαβάλαν, Lat. *Raphanus Sylvestris*, vulgò *Hard-noot*. Ita dixerunt græci quod radice extremum in pyri formam turbinatur. Eadem etiam ratione *Ischas* & *Chamabalanos* ab iisdem nominata est, quod in ficus & glandis effigiem radice extremum turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etiam *Glans* aut *Ficus*, seu *Carica Sylvestris* nominabitur: ἰχὰς enim est *Carica*, quia ἰσχνή, siccando gracilis facta. χαμαβάλαν venit à χαμαὶ humi, in terra, & βάλλας nux, glans.

APIUM, est planta culinaria, quæ habet caulem crassum, striatum, excavatum, & viridem; folia Petroselinii, sed majora, viridia, splendentia, polita, succum odoris penetrantis, & ingrati habentia, præsertim si folia contunduntur saporis fortis & ingrati. Flos umbelliferus, albus vel luteus, cujus calix abit in duo semina striata, curta, crassiuscula, grisea, saporis acris & ingrati; radices in pluribus edules, carnosæ, crassæ, rectæ, albæ, profundè in terra repentes, in multos ramos plerumque divisæ; in omnibus excepto aniso satis longæ, à cicuta distinguendæ odore & sapore, in plerisque radix est annua, sed tamen non in omnibus, sapor aromaticus quodammodo. Crescit hæc planta in fossis & humidis locis: Apium dicitur ab apice, quia olim apices id est capita victorum in certaminibus eo coronabantur; alii ab apibus dictum volunt, quod apes apio & petroselino delectentur. Σέλινον à Lunæ dominio vocatur, Eleoselinum ab ἑλῶ palus & Σέλινον Apium. B. *Eppe* / *Tussrouw* merk. G. *Epff*, *Eppich*, *Epffich*. Gall. *De l'Ache*, *Apium*, *Persil des marais*. A. Parsley, Smallage.

APIUM RISUS, vide *Risus Apium*.

APIUM SYLVESTRE, idem quod *Batrachium*.

APNOEA, est respiratio ad sensum, vel in totum abolita, ex α priv. & πνέω respiro.

APOCHYLISMA, SUCCAGO; ROBUR, ROB, & ROHOB, est succi cujusunque ex vegetabilibus, cum saccharo aut melle, in duriusculam sapæ consistentiam coctio & inspissatio, hinc *Rob Ribesiorum*. ab ἀποχυρίζω succum extraho. B. *Conserve / een sjelei / eengelp*. G. *Conserf*. Gall. *Conserve*. A. A *Conserve*.

APOCLASMA, est partis cujusvis in corpore abruptio, ab ἀποκλάω abrumpo, defringo.

APOCOPE, est partis abscissio, ab ἀποκόπτω abscindo. Vide *Extirpatio*. B. *Een extirpatie / afzettinge*. G. *Ab-schneidung*. Gall. *Extirpation*. A. A *Cutting of, an extirpation*.

APOCRISIS & APOCRISIA, est id quod ex abundantia quasi è corpore eliminatur, ab ἀπό ab. & κρίνω ferno.

APOCRUSTICUM, est auxilium constringendi (secundum Veteres & non ad Neotericorum mentem) & repellendi vim obtinens. Ast nulli repelluntur succi, ob sanguinis periodum, ab ἀποκρῆω repello. B. *Een te samen en te rug trekkend middel*. G. *Zurueck treibend mittel*. Gall. *Remede Repellent*. A. *Repelling Medecines*.

APOCYNUM, est planta quæ crescit ut arbusculâ, dimittens ramos rectos ad altitudinem circiter trium pedum; folia habet oblonga, ampla, crassa, instar Aloës caulibus adversa, alba, succum lacteum continentia, amarum & acrem: flores nascuntur ad foliorum extremitates instar aristæ, sunt campaniformes, quinquifidi, flavi; radix longa, fibrosa, fortis: hæc planta crescit in Ægypto, ubi vocatur ossar, & fructus ejus, qui pugni magnitudinis est, & oblongus dicitur, Beidel-sar, quasi Beidel-ossar, quod Arabicè notat ovum ossar; in ejus fructu reperitur lanugo, quâ utuntur incolæ ad inferendum inter stragula & in culcitris. Hæc planta omnes quadrupedes & præsertim canes in cibum data necare traditur, componitur ex α priv. significans ab, & κύων canis. B. *Honden-dood*. G. *Hunds-todt*. Gall. *Apocyn*. A. *Dogs-bane*.

APO-

APODACRYTICUM, est Medicamentum lachrymas excitans : sed aliis est collyrium lachrymarum effusio- nem desiccans & cohibens, ab ἀποδακρύνω lachrymas ex- cito.

APOLEPSIA & APOLEPSIS, est spirituum anima- lium & sanguinis interceptio. Vel est medius status inter Apoplexiam & Paralylin, vel est Apoplexiæ species, sive subitanea & fugax vocis interceptio cum sensus & motus omnimoda frustratione, ab ἀπολαμβάνω interceptio. Idem quod *Catalepsis*.

APOMELI, est oxymel, seu decoctum ex aceto & melle, ab ἀπὸ de, & μέλι mel, quasi de melle coctum.

APONEUROSIS, est finis, cauda seu chorda muscu- lorum; dicitur etiam tendo, ex ἀπὸ de, & νεῦρον nervus; nec male, cum Musculus totus constare ex nervis vide- tur, quorum finis est Tendo. B. *Ein Pörrze*. G. Spann- ader. Gall. *Aponeurose*. A. A Tendon.

APOPHLEGMATICA, videatur *Apophlegmatismus*.

APOPHLEGMATISMUS, vocatur medicamentum, quod lentam, subalbam, pituitosam materiam, secretans ex membrana pituitaria, nares earumque officula, sinus frontales, maxillares, ossis cuneiformis &c. investiente, generat, dissolvit, eliminat : sive id fiat specie Errhino- rum, Gargariini, Masticatorii, Collutorii, Linctuum, vel fumi, hinc apophlegmatismus reducitur ad Ptarmica sive Errhina, & sialagoga, sive salivam moventia, quia hæc omnia, quæ pituitam educunt, agunt vel per nares eliciendo vel per os; hinc apophlegmatismus dicitur φλογ- μα pituita, & φλέγω ardeo, quia veteres videbant sangui- nem ustulatum fieri densam pituitam, unde similiter in corpore animali pituitam provenire putabant. B. *Ein spm-zuwerend middel*. G. Schleim austreibende mit- tel. Gall. *Masticatoire*. A. A Masticatory.

APOPTHORA, est abortus, sive foetus immaturi in lu- cem editio, ab ἀποφθίω corrumpo. Vide *Abortus*.

APOPHYSIS, PROBOLE, ECHYSIS, PROCES- SUS, PRODUCTIO, PROJECTURA & PROTUBE- RANTIA, est pars ossis non contigua ut Epiphysis, sed cum osse continua, & ultra planam superficiem protube- rans. Ut processus Pterygoideus, Mammiiformis, &c. Ab ἀποφύω produco. B. *uitwasschen, uitsteeksel*. G. *Aufz wachs*.

Gall. *Eminence de l'os ou Apophyse*. A. Processies of bones.

APOPLECTICÆ VENÆ, sunt venæ jugulares, malè, ab Antiquis *Soporaies dictæ*.

APOPLECTICA, sunt Medicamenta adversus Apoplexiam. Gall. *Remedes contre l'Apoplexie*.

APOPLEXIA, ATTONITUS STUPOR MORBUS ATTONITUS & SIDERATIO dicitur. Est sopor in quo ægri subito concidunt, & jam prostrati, neque movere, neque loqui, neque si pungantur, quod sentiant, testari possunt, jacentes supini flaccidis membris ut in paralyti, cum respiratione parva ac difficili sive anhelatione, stertentes ac si dormirent vel moverentur, palpebris clausis aut contractis; sed pulsus & faciei color remanent, nisi gravis sit Apoplexia, jam deliquis & morti manum porrigens, sed ore etiam patulo, & hiantè, ex quo humor, & spuma effluunt, aëris subsidium quasi petunt; denique urina, alvi fæces & semen solent exire, atque nisi in Paralytin mutetur Apoplexia, aut aliter solvatur, mors brevi instat, quando cum respiratione pulsus magis magisque deficit, & extrema frigere incipiunt; facies quoque ruborem cum pallore mutare, & stertor qui ab initio adest primum major fieri, deinde minui & cessare, atque ita actum est. Oritur à quacunque causâ impediende spirituum animalium affluxum & effluxum ex Cerebro per organa sensuum & voluntatis, superstitè Cerebello libero, ab ἀποπληξία percutio. B. *De popelspe / geraaktheid / be-roertheid / de hand Gods*. G. Der schlag, tropf, Gottes hand. Gall. *Apoplexie*. A. An Apoplexy.

APORRHŌÆ, sunt effluvia sulphurea & vaporosa, per corporis poros & spiracula cætera, exhalantia ab ἀπορρίω defluo. B. *uitbloeijs*. G. *Auffsteigung der dunsten*. Gall. *Exhalations*. A. Exhalations.

APOSITIA, est alimentorum fastidium, ex ἀπό de, & σίτη cibis. B. *Een spijswalg / hongerloosheid*. G. Sckel, unlust zum essen. Gall. *Degout*. A. Nauseousness.

APOSPASMA nominatur, si partium organicarum & compositarum unitas solvatur & quæ diversi generis contra communem ordinem inter se compacta sint, atque coaluerint, disjungantur, divisas & abruptis ligamentis, filamentisque illis fibrosis, quibus conjungebantur: Ut cum cutis à membrana, membrana à musculis, musculus

lus à musculo, atque omnino partes, quæ prorsus inter se cohærebant, disjungantur. *Ἀποσπασμάτιον* est particula avulsa, ab *ἀποσπᾶω* detraho. B. *Dan censchewing*. G. *Abreißung*, abtrennung. Gall. *Solution*. A. A separation.

APOSCEPARNISMUS, est fracturæ cranii species, quando pars quædam planissimè est elevata, ab *ἀπὸ* ab, & *ἐκίπαρον* ascia, dolabra.

APOSTASIS, vide *Apostema*.

APOSTEMA *Plinio*, **APOSTASIS** *Hippocr.* **METASTASIS**, & **ABSCCESSUS** *Celso*. Est exulceratio sæpe post crisin relicta: verum *Apostasis* & *Metastasis* in eo quandoque differunt, quod *Apostasis* de accurata crisi: (Ut vocant,) *Metastasis* verò de translatione materiæ ab una parte in aliam dicitur, ab *ἀπίσκει* vel *μετίσκει*, transfero, sejungo, abstinere facio. Notat propriè tumorem purè impletum, quod cavitate quâdam non limitatâ continetur; intra partes solidas corporis vi morbo facta; triplici generatur modo in quadam parte, 1°. Ex præcedenti inflammatione istius partis in suppurationem conversa, 2°. Si alicubi in corpore ex factò abscessu aliundè deponatur pus. vel 3°. Si materia morbum faciens, priùs per totum corpus dispersa, in unum locum colligatur, & in pus conversa reperiatur; hæc duo ultima genera *Metastases* dicuntur, aut crises per abscessum. B. *Een Aposteunie / een verzweringe / etter-gezwel*. G. Ein geschwær, apostem. Gall. *Aposthume*, *abcès*, *suppuration*. A. An *Apostume*, an *impostume*.

APOSTOLORUM UNGUENTUM, sic dictum à duodecim ingredientibus, quod numero Apostolorum responderet: est vulnerarium.

APOSURMA, est ossis vel cutis abrasio, ab *ἀποσύρω* detraho, abrado.

APOTHECA, est vas aut capsula in qua medicamenta conservantur: ita etiam officinæ pharmaceuticæ appellantur; ex *ἀπὸ* de, & *τίθημι* pono, hinc.

APOTHECARIUS, qui Medicamenta præparat.

APOTHERAPIA, est curatio seu medela: Item exercitatio, quæ & excrementa purgat & à lassitudine tutum reddit, in genere notare potest curationem absolutam, si-ve ad finem perductam; ab *ἀποθεραπεία* medeor; vel finem perfectæ exercitationis significat, & postremam partem.

quando adhiberi solet vel frictio, vel unctio, vel balneum, ad lassitudinem tollendam. Ea pars quoque medicinae, quae hoc docet Apotherapeutica propterea dicitur.

APOTHERMUS, est condimentum acre, cujusmodi est, quod ex Sinapi, oleo & aceto, vel aceto solo fit.

APOZEMA, DECOCTUM *Plin. ἀφέψημα*. Decoctus *Plin.* Pharmacopaei *decoctionem* nominant. Est decoctio ex *Radicibus, Lignis, Corticibus, Herbis, Floribus, Fructibus, Seminibus* &c. Quae in aqua aliove liquido coquantur ad remanentiam ut plurimum unciarum duodecim, quindecim, vel viginti. Estque purgans, laxans, alterans, exsiccans, cephalicum, stomachicum, diureticum, splenicum, hepaticum &c. ab ἀποζέω deservio. **B. Een Apozema / een drank / afzietfel / kookfel.** **G. Ein Getrænck aus wasser und gewurtz gefotten.** **Gall. Aposême, Decoction.** **A. An Apozeme or decoction.**

APPARATUS MAJOR & MINOR. Lithotomis loquendi formula est; duas enim calculum extrahendi methodos habent: Una fit apparatu plurimorum instrumentorum, eaque tantum in adultis instituitur, & *Apparatus Major* ideo vocatur. Altera verò minori cum apparatu fit, & in puerulis, & nonnunquam in adultis adhibetur. vid. *Lithotomia*. **B. 't Groot en 't klein beslag.** **G. Der grofse und kleine zuruestung.** **Gall. Le grand & petit Appareil.** **A. Great & little preparation.**

APPENDICULA VERMIFORMIS, est propendens quoddam corpusculum juxta intestinum caecum quatuor ut plurimum digitorum transversorum longitudine, crassitie minimi digiti, cavitaeque quantâ est caeci scriptorii. **B. 't Worm gewijze ahangfel.** **G. Wurm-gleiche anhang.** **Gall. Appendice vermiculaire.** **A. The wormlike appendage, or blind gutt.**

APPENDIX & APPENDICULA. Vide *Epiphysis*.

APPETITUS ALIMENTARIUS, est phantasiae quaedam constitutio, ex motu nervi paris vagi & intercostalis, ob defectum alimenti, inordinatus in ventriculo moti, orta; per quam impellimur, ob spiritus animales, in certo modo, ad motus membrorum, alimento prosequendo idoneos. Cietur in quantum spiritus animales quovis modo circa cerebri meditullium conciti, illinc
exte-

exteriùs versùs systēma nervosum tendunt. Vel sic, appetitus alimentarius, est stimulus alimenta petendi ab existente acido, in ventriculo, fermento ortus, quo nervi vellicantur, per quos cerebro communicatur defectus alimentarius, quorum defectum supplendum dijudicat vicissim cerebrum. vide *potius Fames*. B. *Spys-lust / appetijt*. G. Lust und begierde zum essen. Gall. *Apetit*. A. *Ap-petit or hunger*.

APPETITUS CANINUS, idem quod *Cynodes Orexis*.

APSYCHIA, est summum animi deliquium. Vide *Deliquium animi*, ex α priv. & ψυχή anima.

APTYSTUS, est salivæ defectus, ita ut quis spuerere nequeat, ex α priv. & πτύω spuo.

APYREXIA, est febrium intermissio, sive deslagratio; ejus causa est, quòd omnis materia morbilica uno paroxysmo ferè diffatur, & eousque extenditur earum intermissio, donec reliquæ de novo ad plenitudinem aggestæ sint, & incalescere incipiant: Latinis *Integritas*. Græc. παραμυχή ex α priv. & πυρίσσω febricito. B. *Tusschen-tyd der kooztsen / vrye tyd / buiten koozsigheid*. G. Ablasung von Fieber. Gall. *Intermission, Discontinuation de la fièvre*. A. The remission of a fever.

APYROTHIUM, est sulphur vivum, à contrario nomen impositum videtur. Ex α priv. & πῦρ ignis.

AQUA, est liquor valdè fluidus, inodorus, insipidus, pellucidus, excolor, qui in certo gradu frigoris in glaciem fragilem, duram, vitream, congelascit. B. *Waeter*. Gall. *l'Eau*. A. Water.

AQUA, Arabibus idem est ac *Suffusio*, vide *Cataracta*.

AQUA DESTILLATA, seu STILLATITIA, est lymphæ, seu liquor destillatione ex quavis re elicitus; estque vel per se simpliciter, vel cum Herbis, aliisve rebus prolectus. B. *Oedisteleert water*. G. Distilliert wasser. Gall. *l'Eau distillée*. A. Distilled water.

AQUÆ DUCTUS, est anterior Tympani meatus osseus, qui ab aure ad palatum tendit; sic dicitur non tantum ob formam, quæ canalem refert, sed & quòd transitum sæpe præbere possit limo, vel aliis humoribus extraneis, qui sæpe in hac tympani cavitate colliguntur. Hæc descriptio si exactè foret, convenit ductui palatino sive Tubæ Eustachianæ, non verò Aquæ ductui Falloppii;

qui est foramen ossis Temporalis proprium, inter processum mastoideum, & styloidem, portionem duram nervi auditorii transmittens. B. *De waterloop*. G. Wallerdohl, wasser gang. Gall. *Aqueduc*. A. An aqueduct.

AQUÆ DUCTUS NUCKII, ita perperam dicti; cum sint continuationes vasorum sanguiferorum scleroticam perrepantes & perforantes.

AQUA FLORUM OMNIUM, est aqua ex stercore bovino, gramine vespente, destillata: sic dicta videtur, quod omnibus pratorum floribus pascantur. Gall. *Eau de mille fleurs*.

AQUA INTER CUTIM, Idem quod *Anasarca*.

AQUA PERICARDII, est liquor serosus, qui in cordis sacculo colligitur; exigua plerumque copia, reperitur; videturque pro cordis humectatione, motusque facilitate (qui liberrimus hic requiritur) inservire; quod ne deficiat, in capsula sive sacculo hoc colligitur; num à glandulis basi cordis incumbentibus is humor delabatur, ac per vasa lymphatica in ductum Chyliferum relegitur, merito dubitatur, quia hæ non demonstratæ hactenus sunt, nec modus qui in ductum Chyliferum deferatur; credendum potius ab extremis osculis arteriarum ibi stillari, & per vasa resorbentia introsumi rursus, & misceri sanguini. Dicitur & *Urina cordis seu Pericardii & Hydrocardia*. B. *Herte water*. G. Hertz wasser. Gall. *Eau qu'on trouve dans le pericarde*. A. The water in the pericardium.

AQUALICULUS, seu **INFIMUS VENTER**, idem quod *Epiflon, Hypogastrium & Abdomen*.

AQUEUS HUMOR, vide *Humores oculi*.

AQUIFOLIUM, idem quod *Agrifolium*, ab acus & folium. Gall. *Houx*.

AQUILA ALBA, Chymicis est *Mercurius dulcis*.

AQUILÆ LAPIS, vide *Ætites*.

AQUILEIA, **AQUILINA**, vel **AQUILEGIUM**, est planta quæ habet caulem exiguum, rubicundum, villosum, ramosum; folia Chelidoniæ majoris, lobata, profunde incisa, caulibus longis adhærentia; florem planè anomalum, figuram aviculæ repræsentantem, coloris cærulei, vel rubicundi; pistillum floris abito in multas filiquas membranosas, caput referentes, includentes semina exigua, com-

compressa, polita, nigra, obrotunda; radix instar pollicis crassa, alba, fibrosa, saporis subdulcis; crescit in montibus & sylvis. Nomen accepit à florum mucronibus aduncis instar aquilarum unguibus. B. *Akelepen*. G. Agley, Ageley, Aceley, Tyriaks-kraut. Gall. *Ancolie*. A. Columbine.

AQUILINA, vide *Aquilegia*.

AQUULA, idem quod *Hydatis*.

ARABICUM GUMMI, officinarum, Galeno *Thebaicum*, nonnullis *Babylonicum* dicitur; alii arbusculam esse Acaciæ dicunt. Duas constituunt species; prior recta assurgens virgulta profert lignosa, spinis exertis & duris hinc inde stipata: Folia longa, quasi ex multis foliolis coherentia composita, flores albidos odores, siliquas breves, planas lupinorum more; semen glabrum & splendens. Altera Acacia in Cappadocia & Ponto provenit, priore minor, tenerior, humilior, folia habens rutæ. Istud gummi pellucidum est instar vitri & glutinosum, facile in aqua solvitur, rotundum est, & externè quasi à vermiculis sæpe exesum: saporis aquei viscosi lenti, odoris nullius. Ob copiam quam hic habemus adfertur non tantum ex Arabia, sed & ex Senegallia. B. *Arabische Gomi*. G. Arabischer Gum. Gall. *Gomme Arabique*. A. Gum Arabick.

ARABIS, est draba, *Βράβη*, videtur D. vel B. in A. mutatum esse: fortè *βραβόβειν* quòd hæc herba palmam ferat, superetque suâ substantiâ reliquas plantas oblonio dicatas: est quippè Nasturtii species. Gall. *Drave*.

ARACHIDNA, vel ARACIDNA, videtur dicta ἀπὸ τοῦ ἀράχης, ob similitudinem aliquam, quam cum Araco habet, & ἰδιον, terræ tuber, cujusmodi similitudinem quandam habent radices.

ARACHIS, vel ARACHUS, est Leguminis species. Putant derivari ab ἄραρον, colore nempe luteo, quam habet ochra. Gall. *Vesse sauvage, ou Vesseron*.

ARACHNOIDES TUNICA, seu ARANEA TUNICA, vel AMPHIBLESTROIDES, est membrana ita dicta ob summam, quam habet tenuitatem, intra duram & piam matrem sita, quæ in superiori cerebri parte, cum pia matre & cerebro strictè connectitur, in inferiori vero parte, præsertim circa cerebellum, medullam oblongatam,

gatam, & spinalem, laxè : ita ut ibidem facilè & abundè conspici queat. Item tunica oculi crySTALLINA, à similitudine aranear telæ dicta, quæ obtegit nervos visorios adhuc nudos in cerebro, antequam hi orbitas ingrediantur & non solum eos extrinsecus involvit, sed etiam inter omnes minimas fibrillulas nervos constituentes, se innuat, prospiciens, ne inter se agglutinentur, sed distinctæ, ut in ortu maneat, hæc membrana cellulosa totius corporis perquam similis; num verò hæc sit ipsa Arachnoidea, nondum demonstratum. Ex ἀράχνη aranea, & αἶμα forma. B. *Uet Spinnewebs-vlie*. G. Das Spinnewebs-häuslein. Gall. *l'Arachnoide*. A. Theat coat containing the Crystalline humor.

ARÆOTICA, vide *Rarefacientia*, ab ἀραιῶ rarefacio.

ARANEA, est *Herba Paris*, sic dicta quod ejus uva Araneam referat, vide *Paris Herba*.

ARANEA TUNICA, idem quod, ARACHNOIDES.

ARANEA, est insectum, olim à Medicis usurpatum in febribus, ab ἀραα, apto, quod telas ad muscarum aucupium, præparet. B. *En Spinneshop*. Gall. *Araignée*, ou *Aragne*. A. The Spider.

ARANTIA, idem quod *Aurantium*.

ARBOR, & ARBOS, Gr. Δένδρον & Δένδρεον, quia δένει δένεται; graviter & molestè decorticatur: vel à δῖμος ſtruo, ædifico, quia arborum ope domus, &c. ædificantur. Arbor est quidquid à radice statim simplici caudice, brachiatum ramis, fulculosum, dissolutuque contumax assurgit. B. *En Boom*. G. Ein Baum. Gall. *Arbre*. A. à Tree.

ARBOR DIANÆ, est quædam crystallisatio Mercurii, & Argenti in aqua forti dissoluti, fruticis speciem acquirens.

ARBOR VITÆ, est Cedri species semper virescens, fructu conifero, oblongo, squammoso, sic dicta, quia ipsa arbor diutissimè vivit. B. *Boom des Lebens*. G. Lebens-baum. Gall. *Arbre de Vie*. A. The Tree of life.

ARBUTUS, est Arbuscula, cujus truncus habet corticem asperum & striatum, in superiori parte rami sunt rubicundi; folia oblonga, lata instar Lauri, subrotunda, polita, viridia, dentata, vel ferrata; florem monopetalum, campaniformem, globosum, in urceolum formatum;

tum; Pistillum calicis fit fructus globosus, carnosus, edulis, ante maturitatem flavus, postea ruber, facie externâ Fragi, quinque locularis, in singulis loculis semina plura placentæ accreta; hæc arbuscula sæpe ad maximarum arborum altitudinem crescit in Flandria; fructus ejus Memæcydon aut unedo vocatur, quia, si homo plus ex his quàm unum comedat, creditur illum se inde malè habere; folia & cortices sunt adstringentes, hinc conducunt in diarrhœa. Sic fortè dicta, quod inter arbuta crescat: vel ut aliis placet ab arbor. Gr. κόμαρα, an à κομάω comatus sum? B. *Haag-appel-boom* / *Hardbesie-boom*. G. Hagapffel-baum. Gall. *Arbousier*. A. The Crabtree. T. Strawberrytree.

ARCANUM, nominatur aliquod Medicamentum, quod tanquam aliquid secreti habetur, tum in ejus præparatione, tum in ejus administratione dextra. Theophrasti Arcanum est Quinta rei essentia summè exaltata, sed ut ait idem, est virtus rei millecuplâ exaltatione emendata. Quatuor imprimis arcana jactitat. 1. Arcanum primæ materiæ. 2. Lapidis Philosophorum. 3. Mercurii vitæ. 4. Tincturæ. Aliis est extractum in specie sic dictum, fortè quod in arcis fervetur. B. *Geheim*. G. Geheimnus. Gall. & A. A Secret, Mystery.

ARCEUTOS, est *Juniperus*: dicitur παρὰ τὸ τὴν ἀρὰν κεῖσθαι, quod celet noxam. ἀρὰ enim est noxa, & κεῖσθαι celò. Ἀρκευθὶς est Juniperi bacca: vel διὰ τὸ ἔχειν τὰς ἀκανθὰς κεκρυμμένας, quod spinas habet occultas, vide *Juniperus*.

ARCHANGELICA, est Angelica aquatica, ab ἀρχῇ principatus, & Angelica: de qua antea, sic dicta, quod cæteris major sit, vide *Angelica*. Gall. *Archangelique*.

ARCHE, est morbi initium, ab ἀρχῇ incipio. Vide *Acme*.

ARCHEUS, est (ut Chymici loquuntur) summus, exaltatus, & invisibilis spiritus, qui separatur à corporibus, exaltatur & adscendit, occulta rerum virtus generalis omnibus, Artifex, & Medicus. Item Archiatros supremus rerum Medicus, qui rei cuique suum *Archæum* peculiarem, & membro cuilibet occultè per *Aërem* distribuit. Item *Archæus* primus in rebus, vis est occultissima res omnes producens, ex *Iliasse*, divinâ virtutē nimirum

fuffulta duntaxat : vocabulum est Helmontio frequentiffimum. B. *Kracht* / *elementfcheider* / *geest*. G. *Furnemfte krafft*, vel subthilefte Geift. Gall. *Esprit*, *vertu*, *qui fepare les elements*. A. A moft fubtle Spirit.

ARCHIATER, est Medicus supremus ; vel qui caput & dux aliorum Medicorum est : Ideoque Primarius vel Senior dicitur. Ita Principum & Magnatum Medici *καθ' ἑξῆς* Archiatri vocantur, ex *ἀρχή* principium & *ιατρός* Medicus. B. *Gen Opper-genees-heer* / *Stads-Doctoor* / *Stads-genees-heer*. G. *Statt-artz*, *fuernemfter-artz*. Gall. *Archiatre*, *le premier Medecin*. A. The Chiefest Physician.

ARCHIGENI MORBI, feu acuti, ab *ἀρχή* principatus, *γενάω* gigno ; quòd nempè imperium in fanitatem teneant.

ARTOSCORDON, est *Allium ursinum* ; ex *ἄρκτιος*, urfus, & *σκόροδον* allium. B. *Beer-en-look* / *das-look*. G. *Wald-knob-lauch*, *Ver-lauch*, *Hund-knob-lauch*. Gall. *Aux d'ours*. A. Ramsons.

ARCTOSTAPHYLOS, est urfi uva, feu Vaccinium rubrum, ex *ἄρκτιος* urfus, & *σταφύλη* uva.

ARCUALIA ossa, dicuntur aliis *ossa syncipitis*, aliis *ossa Temporum* : hinc *futura arcualis* est eadem, quæ *coronalis*.

ARCUATIO, à quibusdam dicitur *Gibbositas anterior*, quando accidit cum ossium communitate. B. *Geboggelt*. G. *Gebochelt*. Gall. *Voute*. A. Crookedness.

ARCUATUS MORBUS, vide *Icterus*.

ARDEA AVIS, est species avis aquaticæ, fissipedis : dicitur ex arduo, quia volat in altum. Gall. *Heron*.

ARDENTES FEBRES, sunt, in quibus præter alia symptomata, magnus æstus, ardor & sitis deprehenduntur, ut in *Causo* & *Lipyriis*, vide *Causus*.

ARDOR, seu *Æstus*, est calor in corpore nostro intense acutus. B. *Hitte*. G. *Hitze*. Gall. *Chaleur*, *Ardeur*. A. Vehement or parching heat.

ARDOR VENTRICULI, doloris ventriculi peculiaris species est, quæ tamen simul etiam oesophagum molestat, quam *τοῦ στομάχου καύσωνα*, *ardorem stomachi* & nonnulli *Ebullitionem* *Ardoremque* *stomachi ebullientem* nominant, quibusdam *Soda*. Quando ardens quidam dolor

in ventriculo & gula percipitur, qui urendo quasi molestat; malum hoc sanis etiam sæpe familiare est, tum cibum sumentibus, tum jejunis; Imprimis cum eructant, intus incluso quasi flatu igneo & erumpere non valente. Nonnunquam tamen & in febribus accidit. *Causa* mali est effervescencia quædam à particulis oleosis aut biliosis, unde ebullitio sive ardor ventriculi ebulliens persentitur: vel potius ab acri quocunque sive acido sive alcalino moleste os ventriculi afficiente, & sæpe à defectu muci ventriculum obducentis. B. *De 3ode*. G. Hitze des Magens, Sode. Gall. *l'Ardeur d'Estomac*. A. The heart-burn.

ARDOR URINÆ, vide *Dysuria*.

AREA, *Celsò* arcarum duo genera sunt. Commune utique est, quod emortua summa pellicula, pili primum extenuantur; deinde excidunt, ac si ictus is locus fuerit, sanguis exit liquidus, & mali odoris: increfcitque in aliis celeriter, in aliis tardè. Pejus est, quod densam cutim, & subpinguem, & ex toto glabram facit. Sed ea, quæ ἀλοπηκία nominatur, sub qualibet figura dilatatur. Fit & in capillo, & in barba. Id verò, à serpentis similitudine ὀφίαςις appellatur, incipit ab occipitio; duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud vix unquam sine curatione, hoc per se sæpe finitur. B. *Hair-uitvalsing / haircloosheid*. G. Aufzfallen des Haars. Gall. *la chute des cheveux de la tête & du poil de la barbe*. A. The falling off ones hair.

AREA, est inter musculos, glandulas &c. quædam intercapedo seu spatium, à circumjacentibus partibus relictum. B. *Tusschen-ruimte*. G. Zwischen-Weite. Gall. *Espace*. A. An empty space.

ARECON, est Unguentum resolutivum relaxans & attenuans, ab ἀρέχων auxiliior, opem fero.

ARENA, in corpore humano, res est extoto genere aliena ab arena terrestri, nam illa est plurimo sale volatili, pauco oleo & terra, genita; ex qua sæpe calculi concrefcunt. Gr. ἄμμον & ἄμμος. B. *Gravelige Zandigheid*. Lat. *Sabulum* dicitur. G. Sand, Griesz. Gall. *Sable, Greve, Sablon, Gravier*. A. Sand, Gravel.

ARE;

ARENARIA, est Coronopi species, sic dicta, quòd arenosa loca amet.

ARENATIO, est species Balnei ficci, cùm æger pedibus arenæ calidæ insidet: ut in Hydroke fit. B. *Sandbat.* G. Sand Bad. Gall. *Bain de Sable.* A. A Sandbath.

AREOLA PAPILLARIS, vocatur circulus papillam ambiens. B. *De Namschpf.* G. Der Wærtzlein-Kreis an der Brust. Gall. *l'Areole.* A. The Circle that cirrounds the nipple.

ARESTA BOVIS, vide *Anonis.*

ARGEMON, est ulcusculum oculi album in iridis circulo, comprehendens partem albi & nigri. ex ἀργός albus, & ἔχω habeo.

ARGEMONE Mexicana, five papaver spinosum C.B. est planta officinalis, quæ habet caulem rotundum, ramosum, spinas exiguas, & quæ medullam albam in se continet; folia ex radice primo erumpentia, oblonga, & angusta sunt, sed quæ caulibus adhærent, sunt longa, laciniosa, non villosa, sed mollia, in spinas abeuntia; flores in summitate ramorum crescentes, coloris flavi, rosacei, quinquifidi, odoris Chelidonii majoris; post florem succedit fructus, oblongus, spinosus, includens semina subrotunda, nigra; radix exigua est, satis longa, fibrosa; hæc planta crescit in hortis: dicitur à vi, quâ pollet: sanatur enim ἀργεμῶν seu oculorum ulcuscula & nubeculas, quæ oculi albo adveniunt; ideoque ab ἀργός albus, vulgò *Argentina*, & *Potentilla*, ob potentes vires in sistendo sanguine. Vide *Anserina.*

ARGENTINA, idem quod *Argemone.*

ARGENTUM, & Gr. ἀργυρὸν ejusdem significationis, est metallum coloris candidi, sonorum, post aurum maximè ductile, in igne fixissimum, ita ut nihil ferè perdat, si purissimum fuerit; simulac ignitur, funditur, aquâ fortissimè solâ solvitur, specificæ gravitatis ad aquam, 10535. ad 100. depuratur plumbo, eique resistit, in scorias abito cum antimonio & volatile fit. B. *Silber.* Gall. *Argent.* A. Silver.

ARGENTUM VIVUM, idem quod *Mercurius.*

ARGILLA, Gr. ἀργιλός, ab ἀργός, albus; quia plerumque illa terra alba est; accipitur quandoque latius, varii coloris species comprehendens, ut nigram, luteam, pumil-

pumiceam, purpuream, viridem, cæruleam, cineritiam.
B. *tiltp.* Gall. *Argille ou Terre glaise.*

ARGYROCOME, est Gnaphalii species, dicta ob argenteos seu albos flosculos, ex ἄργυρος argentum, & κόμα coma, pili.

ARGYROPÆA est ars, quæ docet modum conficiendi argentum è metallis & mineralibus perfectioribus, tam quæ in argentifodinis exercetur, quam quæ ope lapidis philosophorum.

ARIDURA, TABES est seu ATROPHIA particularis, quâ corpus, vel membrum aliquod planè consumitur, fortè ab arescere. B. *uitteringe.* G. *Verfallung*, *Doerrung.* Gall. *Phthisie, Consomption.* A. The blasting of the body by a planet.

ARILLI, Idem quod *Acini.*

ARISARUM, videtur diminutivum ab *Arum*, quia minor species est, vel ab ἄρον ἰσρον. Vide *Arum.*

ARISTALTHÆA, est Althæa vulgaris, ab ἄριστον bonum, & Althæa.

ARISTOLOCHIA, est planta officinalis, quæ habet caules sarmentitios, debiles, flexiles, folia alterna, ferè rotunda, mollia, saporis amari, viridescencia; flores monopetalos, anomalos, tubulatos, in inferiori parte occlusos, à parte superiore apertos, & quasi linguam habentes deorsum spectantem, post florem pistillum sit fructus membranaceus ovalis, viridis, sed post maturitatem fuscus, hic fructus est divisus in sex loculos, qui multa semina compressa, exigua, nigra, & sibi invicem incumbentia recondunt; radix est tuberosa, rotunda, satis crassa, fibrosa, extùs grisea, intùs flavescent, odoris ingrati, saporis valdè amari; hæc planta crescit in pratis, dantur variæ species: huic nomen inditum, quòd puerperis, vel potiùs parturientibus profit: quòd ἀρίστη sit ταῖς λοχίαις lochiis nempè expellendis. Alii deducunt ab inventore quodam Aristolocho. B. *Hol-wortel* / *Baar-wortel* / *Osterlucie.* G. *Osterlucei*, *Hol-wurtz.* Gall. *Aristoloehe.* A. *Birthwort.*

ARMENIACA MALUS, Persicæ satis similis, sed truncus crassior, cortice obductus magis nigro, folia habet populi nigra, vel Pyri, dentata, acuta, saporis acidiusculi; calix est monophyllus, quinquifidus, vel & in
sex

sex segmenta profundè sectus, cavus; flos rosaceus, peritapelatus, petalis natis ex margine calicis coronante cavitatem, petala aliquando sex continet, stamina triginta; ovarium in imo fundo calicis instructum tubâ longâ sit fructus ferè globosus, carnosus, Persicæ minoris magnitudinis, ad latera paululùm compressus, juxta longitudinem sulcatus, continet nucleum ossèum compressum, in quo amygdalus unus plerùmque reperitur, saporis aliquantulùm amari, grati; fructus caro ab una parte rubescit, ab altera flavescit, est dulcis, tenera, saporis grati fortè sic à natali solo Armenia dicta. Gall. *Abricotier*.

ARISTA, Gr. Ἀρίστα, Ἀρίστη, Ἀρίστηξ, ab areo. Estque ut acus tenuis longa, & eminent à gluma. In summa aristæ quasi apices & cornua sunt spicarum. B. *De haard der koojn-aare*. G. Das Haar von Korn, oder Spitzen an den ähren. Gall. *La barbe de l'epy du bled*. A. The ear of corn, the beard of the ear of corn.

ARMENUS seu ARMENIUS LAPIS, est lapis maculis viridis, cæruleis & subnigris relucens, sicut *Lapis Lazuli* punctis aureis; adeoque non differt inter se, nisi solâ maturitate. Uterque enim in unis iisdemque scaptenfulis reperitur. Lazuli tamen lapis ceu maturior, crebrius invenitur in fodinis aureis, Armenus in argenteis. Dicitur *Lapis Armenus* seu *Armenius*, Gr. Ἀρμένιος λίθος quod olim ex Armenia solum ad nos translata sit; hodiè tamen & in Germania effoditur, verbî gratia, in Comitatu Tyrolensi sub nomine Melochites. Præfertur colorato cæruleus. Inter purgantia recensetur ad drachmam & scrupulos quatuor. B. *Armeni-steen*. G. Armenier-Stein, Bergblaw. Gall. *La Pierre d'Armenie ou Armenienne*. A. Armenian-stone. Arab. *Hagar & Hagor*.

ARMERIUS FLOS, Gallis *Armoires & Armoiries*; hunc *Ruellius* Armerios flores nuncupavit. B. *Reikens / Quizendschoon / Tuilkens / Hoepeelbloemen*. G. Heiden-Bluemlein, Blutz-Tropffe, Stein-Nagel, Carthuefer-Blumen. A. Sweet-williams.

ARMILLA MEMBRANOSA, est ligamentum circulare, tendines multiplices universæ manus circulo aliquo comprehendens in regione carpi; in varia alia facilè divisibile. Duplicitia constituunt; unum sinum carpi fucingens, reverà unicum, sed latum robustumque, simul omnes

omnes tendines flectentium muscutorum continens : alterum quod est in dorso carpi, ex sex inter se connexis, & singulis annuli instar obvolutis circa extendentium tendines. B. *d'Armband*. G. Arm-Band. Gall. *Ligament du bras*. A. Membranous ligament incompassing the muscles of the arm.

ARMONIACUM SAL NATIVUM, Cyrenaicum veterum à Majoribus descriptum, sub arenis Libycis conrescebat : Ex notis bonitatis, quas Plinius indicavit, nostro hodierno factitio simillimum apparet. Verum nostratibus non nisi *Artificiale* cognitum est. Quod nihil aliud est, quàm sal amarum factitium, compositum, volatile, coctum ex urina, fuligine & sale communi, vel sale gemmæ & similibus, tale & circa ignivomos montes eructatur variis terræ locis; vesuvi optimum censetur hodiè: & non sine ratione videtur ex fuligine originem solam ubique ducere. Eligatur candidum ac purum, vel nisi satis nitidum fuerit, purificari potest. Præstantius habetur Antverpianum, & Venetianum. Dicitur *Sal Solare*, *Aquila Cælestis*, *Alba Mercurialis Fuligo*, *Sal Mercurialis Philosophorum*, *Lapis Adir*, *Audix*, *Anacab*, *Alacab*, *Aliocab*, *Alocaph*, *Alcob*, *Alfol*, *Alfatide*, *Alinziadir*, *Alistiles*, *Alumonodig*, *Amizadir*, *Anoxadic*, *Azanec*, *Butrum*, *Hifazium*, *Lixandram*, *Misâtis*, *Mestudar*, *Nusiadal*, *Nysæ*, *Obac*, *Raal*, *Salmiax*, *Tursies*. Fortè ab ἄμμοῦ seu φάμμοῦ arena. Dicitur & *Sal Mirabile* & *Clavis Metallorum*, quæ fluere facit. Signum ejus. Chymicis est asterismus. B. *Salarmoniak*. G. Salmiac. Gall. *Sel Armoniac*. A. Salt Armoniak.

ARMORACIA, est Raphani genus : componitur à pontica voce Armon, & agria.

ARNALDIA, est nomen morbi maligni, lenti, & chronici, quondam in Anglia familiaris, in quo capillorum defluvium maximè notabatur, &c. unde species luis Gallicæ videri posset, prout in initio in his regionibus sæviit.

ARNOGLOSSUM, est *Plantago* seu *agnina lingua*, quia ejus folia linguæ agninæ simillima sunt. Ex ἄγρῃ agnus, & γλῶσσα lingua. Dicitur & Polyneurum à nervorum, quibus quasi costæ per longitudinem folia ejus distincta sunt, multitudine. B. *Weg-here*, G. Wegerig, Weeg-

Wee-grich, Schaff-Zunge. Gall. *Plantain*. A. Ribwort plantain, jvaybread, or Lambs-tongue.

AROMA, est corpus vegetabile, gratum fortemque spirans odorem, ut Caryophylli, Cinamomum, ex ἀρὸς vel ἀρῆ particula intensiva, & ὄζω oleo, ὀδμή odor. B. *Riechende Specerie*. G. Gewuertz, Specerey. Gall. *Dro-gue*, *Epice*, *Epicerie*. A. Sweet smelling spicer.

AROMATOPOLA, est is, qui aromata divendit, *Aromatarius* dictus. B. *Cruidenier* / *Wzaogist*. G. Ein Wuerz-Kraemer, Materialist. Gall. *Espicier*. A. A Groces.

ARONIA & ARIA, est *Mespilus*, an ab Arona Gal-liae fluvio.

ARQUATUS MORBUS, seu ARCUATUS, idem quod *Icterus*.

ARS, dicta est, ex ἀρῆς, virtus, quam Græci scientiam vocant.

ARSENICUM, est corpus venenatissimum, album crystallinum, ponderosum, triturable, arte factum, dum Cobalti cum alcali fixo & Silicibus in Smaltum fusio paratur, adscendens flos dat arsenicum album crudum, quod clauso vase, igne valido, fusum, exhibet Arsenicum album venale: Si verò flos Arsenicalis cobalti funditur cum decima sulphuris communis parte, *Arsenicum Citrinum* fit, venenatum, sollicitè distinguendum ab *Auripigmento*, cum lethale sit vi indomabili: sed quoties flos idem cobalti, quintæ sulphuris parti ad ignem fusus admiscetur, nascitur illicò *Arsenicum rubrum*, venenatum, quod distinguendum est ab arsenico veterum. B. *Mattekruid*: quia mures gliresque hoc comesto moriuntur. G. Ratten-Pulver, Huetten-Rauch. Gall. *De l'Arse-nic, ou poudre aux Rats*. A. Arsenick or Orpment. Rattenbread.

ARTEMISIA, Planta est, quæ habet caulem quatuor circiter pedes altum, ramosum, durum, lignosum, fractu difficilem, parum villosum, ut plurimum ad rubrum vergentem; folia in acutas lacinias divisa instar absinthii, sed latiora, supernè viridia, infernè alba, odorifera, saporis dulcis parum ad acredinem vergentis; flores erecti, minimi, villosi, albidii, vel purpurefcentes, odorati; radix longa & instar digiti crassa, lignosa, saporis subdulcis & aromatici: si Plinio credimus, ab Artemisia Mausoli Cariae Regis uxore, quæ hanc sibi adoptavit,

ptavit, nomen accepit. Antea *Parthenis* dicta, hoc est, *Virginalis*, quia virgo Dea nomen illi dederit. Sunt, qui ab Artemide (id est Diana *παρὰ τὸ τὸν ἀρεὰ τέμεναι*) *Ilithya* cognominatam putant, quoniam privatim medeatur foeminarum malis. Quid impedit, nomen impositum esse, *ἀπὸ τοῦ ἀρτίμης*, quod est incolumis, vel integer. Hinc *Artemisia*, quod multas incolumes reddat. B. *Ep-boet / St. Jans Gerdel / St. Jans Kruid* G. *Bey-fusz*, St. Johans Eurtel. Gall. *Armoise ou herbe de Saint Jean*. A. Mugwort.

ARTERIA, est vas conoideum, in corpore nostro vivente, se attollens, atque vicissim se submittens, è corde magno trunco oriundum, sensim in minores ramos divisum, constans plurimis tunicis; quodque extremitatibus suis vel extra corpus, vel intra cava corporis, vel in alia vasa definit, sanguinem è corde ducens versus extrema.

ARTERIA COELIACA, vide *Caliaea Arteria*.

ARTERIA MAGNA, idem quod *Arteria Aorta*.

ARTERIA TRACHEA, vide *Aspera arteria*.

ARTERIA VENOSA, Veteribus sic vocata, hodiernis est vena pulmonalis, sive illud vas, per quod sanguis ex pulmonibus in sinistram cordis ventriculum transit: duas habet valvulas mitrales, à figura dictas; non est una vena; sed à sinistra cordis auricula prodit; deinde primò in quatuor, postea in innumeros ramos, per pulmones distributos dividitur; sive potius formatur ab infinitis venis, ex finibus arteriæ pulmonalis ortis, quæ sanguinem ex his acceptum revehunt in quatuor magna vasa, unde in sinum venosum pulmonalem; hinc satis impropriè quasi una vena consideratur, cum ex singulo pulmone duo magna vasa oriantur, in sinum venosum desinentia. B. *Tong-ader d'Aderslpe Slag-ader*. Lung-Ader. Gall. *Artere veneuse, veine du poulmon*. A. The vein of the lungs.

ARTERIACA, Medicamenta sunt, quibus ad vocis læsionem & tracheæ vitia solemus uti, & ab arteria trachea nomen accepisse videntur. *τὸ τῆς ἀρτηρίας τραχείας φάρμακον*, Arteriæ asperæ medela.

ARTHANITA, vulgo *Cyclamen* & *Panis porcinus*, est herba quæ habet folia subrotunda, ampla, singularia in uno pedunculo, qui ex apice tuberosæ radice oritur; *Pe-*
G dur.

dunculi floriferi, simili ortu, ex ipso tuberis corpore, enati, finis abit in tuberculum, cui adnascuntur segmenta quinque, foliosa, magna, profundè secta, calicem formantia; flos parte inferiori tubulosus, monopetalus, supra divisus in quinque amplas, longas, ad ima usque sectas partes, quæ retroflexæ circa pedunculum se colligunt, donatur quinque staminibus testiculos gerentibus tubæ arctè appositos: Ovarium in fundo calicis sphaericum, instructum tubâ longâ, donatâ apice tenui, membranaceum, habens in medio placentam sustentem multa semina, rotunda, divisum in aliquot partes, per maturitatem dehiscentes; radix tuberosa, crassa, orbiculata, carnosâ, externè nigra, internè albicans, imâ parte fibrillas dimittens; saporis acris est, pungitivi, exurentis, ubi exsiccata, ingrati: crescit in Italia & Germania in sylvis; observatur, quòd semen aquæ commissum, non ut alia semina in plantam, sed in bulbum prius crescat, unde deinde planta demùm emergit: an ab ἀρτοῦ panis, quia à porcis videtur amari, an ab ἄρτω tollo, ἀρτί, sublatus, quia verno & autumnali tempore se elevat. B. **Berkens-brood** / **Zeugen-brood** / **Ward-brood** / **Ward-appel** / **Ward-noten**. G. Schwein-brodt, Erd-appfel, Seu-brodt, Erd-wurtz. Gall. *Pain de porceau*. A. Sowbread.

ARTERIOTOMIA, est arteriarum sectio artificialis, ad sanguinem in Cephalæa, Mania, Epilepsia, oculorum, auriumque dolore & inflammatione evacuandum. *Sectio* illa fit in fronte, temporibus vel ponè aures: *Modus* incidendi hic est, post ligaturas nempe brachiis aut collo injectas, arteria inciditur ut vena, factâ deinde sanguinis evacuatione, emplastrum potenter astringens cum lamina plumbea vulneri applicatur, & fasciis commodis firmatur. *Curatio* septem vel novem dierum spatio absolvitur. Ex ἀρτηρία arteria, & τέμνω seco. B. **Gen Slag-aders snijding** / **of opening**. G. Öffnung der Pulsz-ader. Gall. *Arteriotomie*, *Section d'Artère*. A. Arteriotomie, opening of an arterie.

ARTHETICA, idem quod *Arthritica*.

ARTHETICA, seu **ARTHERETICA**, est herba Chæmæpytis, vel Primula veris. Sic dicta quod articulos juvet, ab ἄρθρον membrum.

ARTII.

ARTHRITICA, vide *Arthritis*.

ARTHRITIS sive MORBUS ARTICULARIS, circa duos, tres, pluresve articulos sive ossium internodia, suas tragœdias exercet. Estque dolor circa articulos, tendens, dilacerans, coarctans, vere & autumnò maximè revertens, ortus ab obstructione in vasis minimis circa has partes, unde nervi, tendines, ligamenta, periostea corrugantur, & miserrimè cruciantur, unde tumor, rubedo, tophi, aliaque symptomata concomitantia. Estque quadruplex; *Chiragra* in manibus; *Ischias* in aut circa os Ilium: *Gonagra* in genibus; & *Podagra* in pedibus: habet & alia varia nomina pro parte affecta, ut *dentagra*, *omogra*, &c. Vox *Arthritis* derivatur ab ἄρθρον articulus. Unde *Arthritica Medicamenta*, quæ Arthriticis doloribus subveniunt. B. *Het stercken / den artyk / de pootjes / boet-eubel / leden-zugt / leden-krankheid / jigt / gigt*. G. Zipperlein, Zipperlin, Fluesz, Gicht, Gliederwehe, Gall. *La Goute*. A. The Gout. Barb. *Gutta*.

ARTHRITIS PLANETICA, Idem quod *Arthritis vaga*, à πλανῶ vagor.

ARTHRITIS VAGA, est morbus articularis, quo dolor vehemens cum tumore & rigore nunc in uno membro est, nunc in altero: *Vaga* dicitur *Arthritis*, ex eo quod constanter uno loco non contineatur ut *Arthritis*, sed nunc in hac nunc in illa parte sentiatur. B. *Fliegende Gigt / ongedurige Gigt*. G. Fliegende Gicht. Ab auri-gando & quidem, die lauffende, à motu & velocitate, ideoque dicitur, die fahrende, vel potiùs lauffende Schmerzen. Idem die springende Gicht, die reißende Gicht, die Scharbockische reißende Gicht, die lauffende Gicht, das Scharbockische Zipperlein, die Scharbockische Gliederkranckheit, die kadden, die gute-hoelden, die nacht-griffe, die Alp-flecke. Gall. *Goute volante*. A. Wandering gout.

ARTHRODIA, est ossium articulatio, cum nempe cavitas excipiens est in superficie, & capitulum quod excipitur, depressum est: Uti articulatur scapula cum humero: ab ἄρθρον articulus & δέχομαι recipio. B. *En t'samen wzigting der beenderen*. G. Zusammenfuegung der Beinen. Gall. *Articulation*. A. Coarticulation.

ARTHRON, Græcis etiam ἄρθρον, est articulus, seu ossium connexio, motibus obeundis, accommodata. B.

Æn lid / gewigt. *Articuli* etiam dicuntur digitorum internodia. *συντολίδες* Galeno, *φάλαγγες* Aristoph. B. **De litten / leden / ledematen.** G. Glieder, Gliedmassen. Gall. *membres.* A. A Member, Limm.

ARTHROSIS, idem quod *Articulatio*.

ARTICOCA & ARTICOCALUS, est *Cinara*, ex *ἄρκτι* fortè perfectum & *κόκκαλ* nucleus pineæ nucis: quod cinaræ fructus pineo fructui similis sit. B. **Artichokken / Pijn-distel.** G. Stobil Dorn, à Strobulo. Gall. *Artichauts.* A. Artichock. Dicitur etiam *Strobulus*, *Cinara*, *Articoca*, *Cocalus*, & *Scolymus*.

ARTICULARIS MORBUS, vide *Arthritis*.

ARTICULATIO, est conjunctio ossium cum invicem, ad motum peragendum: Estque duplex *Diarthrosis* sive *Articulatio laxior*: & *Synarthrosis* sive *Articulatio strictior*. Gr. *ἄρθρωσις*. B. **Wzigting / geleding.** G. Gliederung der Beinen. Gall. *Articulation.* A. Articulation or Jointing.

ARTICULI, sunt plantarum partes, quæ in nodos quosdam intumescunt, à quibus persæpe ramuli prodeunt. B. **Knoopen / leden.** G. Gliedren, Knoepffe an den Planten. Gall. *Nœus*, *Boutons*. A. Knuckles or joints.

ARTICULUS, vide *Arthron*.

ARTOMELI, est cataplasmatidis species, quod ex pane & melle paratur, ex *ἄρτι* panis, & *μέλι* mel. B. **Æn gehonigde Brood-pap.** G. Eine Pappe von Hoenig und Brodt. Gall. *Cataplasme composé de miel & de pain.* A. Cataplasme made of honey an bread.

ARTOPTICIUS PANIS, hoc est tostus, ex *ἄρτι*, panis, & *ὑπτάω*, id est torreo.

ARTUS, sunt membra, ventribus adnata & articulis distincta. Vide *Arthron*.

ARUM, Character hujus plantæ idem ferè, qui Colocasie; habet verò arum folia oblonga, ampla, triangularia, aurita & sagittata, splendentia, adnata pedunculo affixo in postremo foliorum; flos anomalous est monopetalus, auris asininae instar, in medio eminet pistillum, quod obscœnam figuram repræsentat; radix rotunda, tota alba, nucis avellanæ magnitudinis, saporis acris, adeo caustica est, ut masticata fauces magis, quàm piper adurat, sitimque vix delebilem excitet. De Ari Etymo hæc

Iobelius, quin si è græco non sit ἱερός ἱερός, quasi sacrum, ut in iride factum, plebecula quæ *Barbam Auronis* vocitat, videtur agnoscere, ex palæstino vernaculo, & ornamento Aaronis pontificis. G. Papen pint, id est, *penem sacerdotis*, vocant, quod pistillum promit exacti ferè genitalis effigie. B. *Kalfs-doet / Duitsehe Geniber* id. que ob acrimoniam. G. Pfaffen pint, Deutscher Ingver. Gall. *Pied de Veau, vis de Prêtre*. A. Cuckow pintle, Wake-Robbin.

ARUNDO, seu HARUNDO, Genus plantarum est quod tantum à gramine differt ratione caulis & foliorum; habet caulem altum, nodosum, & excavatum; folia longa, satis lata, rigida, aliquantulum aspera; flores exiguos, molles, in initio coloris purpurei, postea cineritii; semina papposa; radices multas, longas, nodosas, serpentes: hæc planta crescit in paludibus, dantur varix arundinis species; fortè denominatur, quod ad undas, seu aquas fluctuantes, crescat. B. *Riet / Wehricht*. Kohr, Schilff-Kohr. Gall. *Canne, Roseau*. A. A Reed, Cane a Bulinsch. Gr. *Κάλαμος*.

ARYTÆNOIDES, seu GUTTALES, & GUTTUR-NIFORMES, sunt cartilagine duæ, quæ laryngis caput, unà cum aliis cartilaginibus constituunt. Sumitur quoque pro musculis quibusdam laryngis, ab ἀρύω haurio, ἀνοίγω aperio, quia inspirando aperiuntur, & εἶδος forma. B. *Spleet-makende kraken-beenen / tuilige / oft tregters wijsige krakebeenen*. vel *Spieren*. G. Das Gieß-faszgleiche Knorpel, vel Maufz. Gall. *Cartilages Aritenoides*. A. The Ewer-like cartilage.

ARYTHMUS, seu CACORYTHMUS, est pulsus ad sensum abolitus, & sine modulo, ex α priv. & ῥυθμός modulus: propriè notat pulsus qui nullum rythmum, ordinem aut proportionem observat, non verò planè abolitum pulsus, cui opponitur eurythmus, rhythmum certum observans: Arythmi species observantur tres à Galeno: Pararhythmus, quando vicinæ ætatis rhythmum observat: Heterorhythmus, qui planè alterius ætatis ordinem servat: Ecrhythmus, qui nullius ætatis rhythmum servat. B. *Gen Dols zonder order / ongeregelde Dols*. G. Ein sehr schwacher Pulsz. Gall. *Le pouls irregulier*. A. A pulse lost to sense. Vide *Cacorythmus*.

As five ASSIS, ut ex *Varrone* & *Plinio* colligere est, ab ære dicta. *Balbus* ad *Celsum* de assë ejusque partibus, quicquid unum est, & quod ex integrorum divisione remanet, Assëm rationatorem vocare scribit. Apud nos idem denotat ac pondo, seu unciarum duodecim libra. Quidam pro duabus drachmis sumunt.

ASA DULCIS, idem quod *Benzoin*.

ASA FOETIDA, est gummi, ex cujus plantæ radice *Assa* five *Afa* exprimitur. Magnâ quantitate crescit in imperio Perlico, inter Laram & Gamaron civitates. Estque duorum generum, primâ sarmentosa est, fermè ut salix aquatica, ex cujus foliis & stolonibus incisus *Assa Foetida* exprimitur, quæ, ut reliqui succi, sole induratâ in consistentiam evadit, qualis est Sagapeni. Secundâ species longè sæcundior est, estque succus expressus ex radicibus hujus plantæ, quæ crassissimos raphanos referunt, folia autem Tithymalli foliis similia; Cujus radicis exsiccata odor totas ædes implet: putant quoque esse succum sive lachrymam Laferis sive Sylphii in Media, Lybia ac Syria crescentis. Gravem naribus spirat odorem, quem vulgus nominat foetidum, instar allii: ut hujus exacta cognitio habeatur, afferenda sunt, quæ de hac habet doctissimus Kæmpfferus: Hingisch asam fundens est planta umbellifera Levistico affinis, foliis instar Pœoniæ ramosis, caule pleno maximo, semine foliaceo, nudo, solitario, Brancæ ursinæ vel pastinacæ simili, radice asam foetidam fundente: Patria ejus sola est Pertica, non Media, Lybia, Syria, aut Cyrenaica regio, unde ex hoc capite facta succi apud authores distinctio est inanis. Illa planta potissimum, quæ circa Heraatum campestre desertum occupat, & quæ crescit in montibus vicinis, territorio & oppido Disgûm, succi ferax existit. Afa foetida nulla ex caulibus vel sponte fluit, vel arte exprimitur, sed ex radice manat sauciata: Hæc autem radix miræ est longævitas, magna, ponderosa, nuda, exteriori vultu nigra in solo limoso lævis, in sabuloso scabra ac quadantenus rugosa, ut plurimum pastinacæ instar simplex, sæpe paulò à capite duabus vel pluribus divaricationibus brachciata, aliis perpendiculariter demissis, aliis inconditè & in obliquum extensis prout ab objectis flectuntur. Radix hæc quadrien-

nig minor parùm lactescit , & nunquam secatur , quo autem vetustior & major est , eo majorem impertitur lacrymæ copiam. Exemptâ tellure, si vel postridie secatur, lacte tamen stillabit , adeo nimirùm succo diffluit , à quo insolens pondus obtinet. Succus ex utriculis suis recens emanans candidissimus , liquidus & pinguis est , flori lactis dulcis exactè simillimus , adeoque omnis exfors lentoris , ad aëris verò solisve contactum , colorem subfuscum induit , & coalescens lentorem quoque. Fætor , virtutis index , quo major est , eo meliorem asam testatur. At ille in recenti lacryma vehementissimus est , cum eo quem concreta & antiquior redolet , qualem Europa recipit, nullatenùs comparandus. Affirmare ausim , inquit Autor , unam drachmam recens effusam majorem spargere fœtorem , quàm centum libras vetustioris , quem siccum venundant aromatarii nostrates , succi. De virtute medica hujus plantæ , dicit , Persicos Medicos ob delicatum nationis genium ab usu ejus ferè abstinere , rusticis saltem in colicis torminibus & hydropè præsertim tympanitide curanda usus innotuit. Vulnèra ex imposito recenti succo coalescere dicuntur ad miraculum &c. Dicitur & Laser , stercus Diaboli. B. *Wuppelg-dreck*. G. *Teuffels-Dreck*. Gall. *Assa Fetida*. A. *Assa fetida*, vel pevellodung. Gr. ὀπὸς Μηδικῆς, Συριακῆς, olim, Κυπριανῆς. *Laser Medicum* quibusdam, seu *Fetidum*. Arab. *Alit*. Indis *Hin*.

ASAPHATUM, est *Impetigo*. Vide *Saphatum*.

ASAPHIA, est vocis obscuritas, ex laxa aut mala organorum constitutione aut contemperatione, ex α priv. & σαφὴς manifestus.

ASARUM, est planta officinalis, satis humilis, quæ habet folia instar hederæ, sed minora, magis orbicularia cum deliquio ab una parte, polita, tenera, coloris viridis splendentis, auris humanæ figuram referentia, caulibus satis longis adhærentia; finis pedunculi porrigitur in ovarium, cujus superior pars excurrit in calicem trifidum profundè sectum, ex centro apicis ovarii erigitur tuba crassa, cylindrica, desinens in sex recurvos bisectos apices; Ex ambitu imæ tubæ accreta circumponuntur eleganti ordine stamina duodecim, instructa testiculis, sæcundantibus tubam dictam, paten-

tem usque in cava ovarii, quod hexagonum dividitur in sex loculos distinctos, in quibus gigarti hærent; flos quinque staminibus donatus, purpureus; radix perennis, fibrosa, parva, repens, angulosa, nodosa, incurvata, filamentosa, ex fusco rubescens, odoris fortis & grati, saporis acris nauseosi, & aliquantulum amari cum aliqua adstrictione; crescit in montibus, ut & in hortis: vi vomitivâ donatur hæc planta, sic dictum volunt, quod in ornatum non veniat, quoniam in coronas & fæta non addatur; ex *a* priv. *σάπρω* mundare, ornare, vertere: dicitur & Nardus sylvestris quia radice odor ad Nardum accedit. B. *Häsel-wortel* / quia circa corylos succrescit, vel quasi diceret *Asar-wortel*. G. *Häsel-Wurz*, *Häsel-Minich*, *Häsel-päpel*. Gall. *Cabaret*, *Oreille d'Homme*, *Nard sauvage*, *Oreillette*, *Rondelle*, *Girard Rouffin*. A. *Asarabacca*.

ASCARIS, seu *Ascarides*, sunt exigui rotundi vermes, qui in intestino recto plerumque hosiuntur in suis nidulis, cui titillationem & molestiam inferunt, ab *ἀσκήω* moveo, exerceo, quia suo motu molestant. B. *Mars-mäpen* / *Mars-wormjes*. G. *Ars-Wuermlein*. Gall. *Ascarides*, *petits vers*. A. *Ascarides*, little Worms.

ASCIA, ad vinculi & deligationis species refertur, quæ parum à recto declinat, in obliquum tamen nondum vergit insigniter.

ASCITICUS, qui Hydrope ascite laborat.

ASCITES, est hydrops, sive collectio lymphæ effusæ in duplicatura peritonæi, in cavo abdominis inter peritonæum & viscera abdominis; vel in dilatatis glandularum abdominalium cavernis hærentis; unde oritur abdominis tumor; & Lympha hæc fluctuat ad diversam corporis inclinationem, quo distinguitur ab *Anasarca*, ab *ἀσκήω* uter, quia utris in modum venter distenditur. B. *De water zugt* / *'t water buik-water*. G. *Die Wasser-sucht*. Gall. *Ascite*, *Hydrope sie Ascite*. A. A species of dropsie so called.

ASCLEPIAS, est *Hirundinaria* seu *Vincetoxicum*, habet caules rotundos, flexiles, sæpe parte superiori plantas vicinas ambientes, folia conjugata, bina, caulium nodis adversa, oblonga, polita, ampla, acuta; flores monopetalos, ad superiora divisos, ita, ut frænulum pentapetalum referant, coloris albi, odoris grati; post florem suc-

succedit fructus, duabus siliquis membranaceis constans, oblongus, acutus, per maturitatem dehiscens juxta longitudinem, continens semina plura, papposa, lanugine cristata, & multiplici serie imbricatim sibi invicem incumbentia, coloris rubicundi vel rufi: radix tenuis, fibrosa, albicans, odoris graviusculi, penetrantis, saporis acris, amaricantis aliquantulum nauseosi; dat succum lacteo viridescentem; hæc planta crescit in montibus & sylvis Famigeratissimum antidotum. Ab Æsculapio antiquo Medicinæ Authore nominata est. B. *Swaluwe-wortel*. G. Schwalben wurtz. Gall. *l'Asclepias, vinq poison, dompte venin*. A. Swallow wort.

ASCYRUM, est Hyperici species, & hoc perfectissime refert, sed vasculum feminine quinque loculare habet; significat durum fœnum, unde G. & B. Harthew, *Herts-hop*: Gr. à contrario huic nomen imposuisse videntur, *σχύρ* enim illis asperitatem significat quasi planta non aspera sive glabra, quia vi emolliendi pollet. G. etiam Hartz-Hawe, Waldt-hopff. Gall. *Asciron*. A. St. Peters wort.

ASEF, Idem quod *Hydrea*.

ASELLUS PISCIS, dictus à colore asini.

ASEMA, est crisis (ut dicitur) seu morbi præter spem mutatio, sine signis indicantibus eveniens. Ex α priv. & *σημα* seu *σημειον* signum, à *σημειω* signo.

ASITIA, sive ANOREXIA & APOSITIA, est alimentorum abhorrens fastidium, ex α priv. & *σιτ* alimentum, frumentum. B. *Een walg van eten / onlust tot eten*. G. Der Eckel zum Essen. Gall. *Degout*. A. A Loathing, or nauseousness.

ASODES, vide *Affodes*.

ASPALATHUM LIGNUM, hujus plantæ est florum magna suavitas, suntque multi & parvi: Ipsa planta frutex est densis ramis, spinis albis, duris, horridis, cortice caudicis albo, ad trium cubitorum & majorem altitudinem in altum assurgens. Verum Medici qui ante nos fuerunt, Aspalathum nescientes, *Citrinum* substituerunt *Santalum*, vel *Meum*, & si ignorantibus concedere fas sit, non ineptum, dictum *παρὰ τὸ μὴ ῥαδίως ὑπὸ τοῦ πλεονέκτων ἀποσπᾶσθαι ἢ τοῖς ἀφαιρῆσθαι*, quod non facile evelli sive eximi queat è corpore eorum, qui in eam impegerunt,

est enim frutex multis spinis horrens. *Plantus* ait Tyrannos Aspalathi spinis apud inferos laniari. *Theocritus Schol.* esse spinæ genus ait venenatæ. ἐπισπᾶω enim est avello, abstraho. Gall. *Aspalat*.

ASPARAGUS & ASPARAGOS, est planta, quæ habet caules crassos, rotundos, firmos, rectos, folia non habentes, in initio virides, deinde albos, edules: folia, ubi crescit, habet tenuissima proxima sæniculi foliis; flores rosaceos, hexapetalos, nudos, sex staminibus præditos, campanulam oblongam referentes; ovarium natum ex placenta hærente in pedunculi apice intra florem, fit bacca rotunda, mollis, rubra, includens semina dura, orbicularia, corneæ duritie, saporis subacris, subdulcis, odoris nullius: radix numerosa, longa, parva, spongiosa, rotunda, ex uno capite inæquali in plures fibras sese diffundens, externè coloris grisei, internè albi, saporis subdulcis subacris, odoris nullius, urinas valdè inficiens. Ασπάργος Græcis est, quod primum in lucem prodit oleris germen, priusquam in folia explicetur, sive recentissimus turio, qui edendus est, ut lactucæ, lupuli, betæ, omnia etiam germina & recentes cauliculi τοῦ δάμνων Asparagi dicuntur, non improbable videtur nomen ipsi esse datum παρὰ τὸ ἀσπάζεσθαι καὶ βλάσσειν, quod contrectantes ac salutantes manus findat, spinisque suis lædat. Extrita prior litera *Sparagus* vocatur. B. *Aspergjes / Spargies / Moral-kruud*. G. Spargen. Gall. *Asperges*. A. Sperage, or Sparages, corrupter Sparrow-grass.

ASPERA ARTERIA, seu **TRACHEA**, est fistula oblonga ex cartilaginibus variis & membranis constans, quæ à gutture, sive faucium imo incipiens, gulæque antèriùs incumbens, inque pulmones descendens, per totas eorum compagines ramificatione multiplici dispergitur. Superior pars *Larynx*, inferior verò *Bronchus* appellatur: quibus & tertia sive infima à *Malpighio Vesicularis* dicta additur; inservit aërem transmittendo per os vel nares acceptum, voci & respirationi. B. *De Lange-ppp / De Boegel-ppp / lugt-ader*. G. Die Luft-Roehr. Gall. *l'Aspre ou Trachée artère*. A. The Windpipe.

ASPERELLA, idem quod *Asprella*.

ASPERGULA, vel **ASPERULA**, est species Aparine, & folia ferè eadem habens, sed parùm latoria, & mi-

minùs aspera, parùm villosa, ex caule stellatim numero sex vel septem prodeuntia; flores in summitate caulis crescunt, in quatuor partes incisi, coloris albi, huic succedit fructus, qui continet parva duo semina, agglutinata, quæ sunt ferè rotunda, in medio excavata: radix parva, fibrosa, in terra repens; habet hæc planta odorem valdè gratum; hinc dicitur culcitra virginis; *Asperula dicta*, quòd ob asperitatem prætereuntium vestibis adhæreat. B. *Ste-nenkruit* vel *Lieven Vrouwen Bedstroo*.

ASPHALATUS, vide *Rhodium*.

ASPHALTOS, ASPHALTIUM, & ASPHALTUM, est bitumen, sebum, aut resina Macrocosmi, picis instar durum &c. Supernatare primùm aquis conspicitur, seu lacubus, hinc ad littora propulsum solis ardore, ignis vi, vel & temporis morâ excoctum concrevit, densatur, tenacissimumque redditur & splendens, fusile iterum est ad ignem, miscibile ad pinguitudinem olei affusi, & inflammabile. Præfertur reliquis *Judaicum bitumen*, quod Mortui maris (Ασφαλτίτης propterea dicti,) genitura. Præstat ut purpuræ modo splendeat (sc. in nigrore) sitque ponderosum, & validum odorem vibret; nigrum autem & sordidum vitiosum est. παρὰ τὸ σφάλαισθαι, quamvis ab Asphaltitide lacu (mortuum mare vocant) ubi plurimùm colligitur, derivari possit. Illud quoque nomen imponitur Trifolio odorato seu bituminoso, eo quòd illud bitumen seu Asphaltum oleat. B. *Joden-hym*. G. Erd-hartz, Erd-Schwebel, Jueden-pech. Gall. *Bitume Judaique*. A. Jews. pitch.

ASPHARAGOS, idem quod *Asparagus*: sed loco π. Atticè scribitur cum φ.

ASPHENDAMNOS & SPHENDAMNOS, est Acer montanus, fortè à Σφειδώνη funda. Ex Acere fiunt Arcus, & quia una vox sæpe pro altera sumitur, Arcus fortassè pro funda sumptus.

ASPHODELUS, est planta officinalis, quæ habet caulem rotundum, politum, fortem, ramosum, folia porri, sed longiora, & angustiora; florem in basin uique ferè divisum, nudum, stellatum, ovarium complectens instar calicis, ovarii apex emittit sex stamina, & tubam longam ex centro, sit deinde fructus obrotundus, carnosus, triangularis, in tria loculamenta, in quibus se-mina

mina triquetra reconduntur, divisus : radix multis tuberibus ab uno corpore pendulis, constat : saporis est amari & penetrantis : diureli præcipuè pollet, dictam volunt, quasi *σπόδιον διὰ τὴν τοῦ καιομένων νεκρῶν σποδὸν*, à *mortuorum combustorum cinere*. Etenim in tumultis Veteres Asphodelum scirebant ne deesset cibis mortuis, uti Porphyrius in quodam Epigrammate scriptum reliquit, ubi tumultum his verbis introducit, *Νότῳ μὲν μαλάχην τέ καὶ ἀσφόδιον πολύριζον, κόλπῳ δὲ τὸν δεινὰ ἔχω*. *Foris quidem Malvam, Asphodelumque habeo, intus verò mortuum claudio*. B. & G. Affodill. Gall. *Asphodèle*. A. Asphodie.

ASPHYXIA, est pulsus sensibilibiter deficiens sive potius pulsus privatio, sive defectio, cum non percipitur nostro tactui motus, atque hoc in omni parte, ita ut quo ad nostros sensus, nulla usquam arteria moveri videtur. Sumitur etiam pro *Lipothymia* & *Syncope*, sed in summo gradu, ubi omnia signa vitæ deleta quoad sensum, mortis imaginem simulant, ex α priv. *σφύζω* salio, pulso. B. *En ongeboelige pols / een pols die allenkskens vermindert*. G. Ein tödliche ohnmacht, wender puls auffhoeret. Gall. *Le poulsx manquant*. A. A pulse that is sensibly decayed.

ASPIS, Serpentis summè venenati genus est : dicitur ab α privativo. & *σπίζω*, sibilo, quia non sibilat.

ASPIDION, est clypeus parvus, *ασπίς* enim est clypeus, sic vocatur *Alysson Dioscoridis*, quia filiquas habet rotundas & parvas instar clypei parvi.

ASPLENIUM, est Scolopendrium, est planta, quæ habet folia Polypodii, sed minora, satis rotunda, versùs latus incisa, lanuginosa, pulverem squamosum habentia, in quibus microscopii ope apparent capsulæ membranosæ sibi invicem incumbentes, singulæ instructæ funiculo rotundo, qui constrictione suâ hunc fructum in duas partes aperiens, semina quædam minima fundit; radix est fibrosa : crescit hæc planta in locis saxosis ut in muris, præsertim in locis calidis : ita dicitur, veluti *ad splenem*, vel ut alii malunt, quòd minuat lienem tumidum & obstructum, vocatur quoque *Ceterach officinarum*. B. *Miltkruid / steenvaren*. Gall. *Ceterac ou vraye scolopendre*. A. Spleenwort or miltwast, vide *Splenion*.

ASPRELLA, est Equisetum majus, sic ob asperitatem dicta; eâ enim cistæ & scrinia poliuntur. B. *Polyst-biczenn*.

ASSA

ASSA FOETIDA & DULCIS, vide *Asa*.

ASSA DULCIS, idem quod *Benzoin*.

ASSARIUS, est Veterum pondus, continens drachmas duas.

ASSATIO, ab ASSARE, est quædam coctio sicca per ignem, ut est rhabarbari tostio, scillæ in fornace coctio. B. *Brading*. G. Bratung rostung. Gall. *Affation*, *torrefaction*. A. A Roasting or Brying.

ASSIMILATIO, est nutrimentorum assumptorum coctio, attenuatio, cum liquoribus animalibus subactio in formam nutriendo corpori aptam.

ASSODES, est febris continua, in qua exteriora moderate calida sunt, intus verò ardor adest, sitis insatiabilis, perpetua corporis jactatio, vigiliæ, delirium, &c. ab *ἀσάδουμαι* sicco; exaresco, & *ἰδιό* forma. B. *Een walg; koofts; een heet-houde-koofts*. G. Ein Kaltes Fieber. Gall. *espece de Fievre froide*. A. A Loathing fever.

ASTAPHIS, Atticis, vel STAPHIS, est uva solem passa, *Σταφύλη* enim est uva.

ASTER, est planta, quæ habet caules rectos, tenues, rotundos, duros, parùm villosos, coloris rubri; folia oblonga, villosa, aspera, saporis parùm amari & aromatici, ex summitate caulium oriuntur ramusculi, ex quibus flores radiatim dispositi nascuntur, pulchri, visui grati, instar Bellidis dispositi, coloris cærulei, violacei, purpurei, aliquando albi; flori succedunt semina oblonga, cristata; radix est tenuis, fibrosa, acris, amara, aromatica parùm: Gr. *ἀστὴρ* stella, quia flores ejus stellæ in modum explicantur, vel ut alii scribunt, quoniam ejus capitula, in quibus flores chamæmeli instar emicant, per ambitum divisâ foliolis stellæ modo radiata spectantur. *Attici* nomen ei tributum, quòd in Atheniensi agro frequentior vel melior, quàm alibi proveniat, dicitur & *Asterion*, & *Asteriscus*: *Βαβώνιον* seu inguinalis, quia inguinum præsentaneum est remedium. B. *Sterre-kruud*. G. Meyer-kraut, Bruch-kraut, Scarten-kraut, & Stern-kraut. Gall. *Espargoute*, *Estoillée*. A. Star-wort.

ASTERION, & ASTERICUS, vide *Aster*.

ASTHMA, est respiratio difficilis, parva, & crebra cum stertore & sibilo. Atque hæc duo phænomena ab Asthmate abesse nequeunt, tussis tamen primo sicca, paulò

paulò post humida rarò non adest, si unquam absit: Præterea Anxietate laborant, & incedere, sæpe etiam stare, nunquam absque incommodo in lecto decumbere, præfertim molli, nequeunt, sed à loci angustia valdè etiam læduntur, unde fenestras apertas volunt & libero aère frui. Nonnullis adest Cachexia, vel Febris, Pleuritis, Hæmoptoë, ventris Distensiones, Colica, Calculus, Palpitatio cordis, Animi deliquium &c. Aliquando periodicum est, & sæpe ingruit suppressâ evacuatione, quâ durante non aderat, & hoc difficilius est, quo minus tussi phlegmata ejiciuntur, ab ἀσθμὴ ἀνέλω. B. *Mamborstig/ dampige bozst/ koxt-ademing/ koxt-bozstig/ de king.* G. Engbuerstigkeit, Schwer athem. Gall. *Asthme, Courte haleine, poulsif.* A. Shortness of breath.

ASTHMATICUS, est is qui *Asthmate* laborat. Vide quid sit *Asthma*. B. *Die engbozstig is.* G. Engbuerstig. Gall. *Asthmatique, pulmonique.* A. One that is shortwinded.

ASTRAGALOIDES, folia habet pinnata, in impar definentia; siliquam univalvem cymbæ instar, semina reniformia: sic dicitur, quia Astragalo similis est, ex Ἀστράγαλος talus, & ἰδίον forma.

ASTRAGALUS, est Herba leguminosa: habet caules exiguos, simplices, excavatos, rubicundos; folia multa parva, brevia, acuta, villosa, pinnata, aliquantulum amara, bina quasi conjugata, ad costam in folium impar definentem; flores leguminosos, in summitate nascentes, purpureos, aut aliquando albos, sibi invicem conjunctos; post florem sequitur siliqua oblonga, rotunda, parva, rubicunda, foeta seminibus reniformibus; radix est longa, dura, lignosa, digiti crassitie corticem crassum, & fuscum habens, intus alba est, saporis dulcis; hæc planta in superiori parte se in plura capitula dividit, tres vel quatuor digitos longa, quæ, nisi intimius examinarentur, viderentur aliarum plantarum radices; crescit circa vias, & dividitur in siliquas longiores & bulbatas, vel in inflatas. Nomen accepit à seminis forma Ἀστράγαλος ἰδίος, talum referente. Alii dictam hanc plantam volunt, quod radicem teretem in superna, infernaque parte planam ac compressam habeat. Vel Astragali nomen inditum ab adnatis appendicibus solidis, duris, seu,

feu cornua implicitis, ad similitudinem flagelli. Gall. *Astragale*.

ASTRAGALUS, sive **OS BALISTÆ**, est primum os, tarsum unà cum aliis 7 ossiculis in pede constituens, quodque basis instar ossibus tibiæ subjicitur, sex habens latera, quibus mediantibus connectitur ossibus vicinis, ab ἀστράγαλιζω talis ludo, unde ἀστρία talus à Græci nominis ἀστράγαλῶ terminatione ultima, γάλῶ recisa, talum ab ore Romano formatum existimo, quum inter σ & τ sæpius sint permutata pari valore & pronuntiationis sono, alii ab α priv. & στρίφω verto deducunt. B. *De enklaen / de enklaen / de koot*. G. Der Knod oder Knoch, Item, das ferffenbein, die knockel des Schenckels. Gall. *Talon, Astragale*. A. The Huckle bone, the ankle.

ASTRANTIA, Folia habet quinquifida, digitata instar saniculæ; florem rosaceum, umbellatum, plurimis scilicet petalis constantem, apice plerumque reflexo, in orbem positus & calci insidentibus, is autem abit in fructum ex duabus siliquis compositum, membranaceis, oblongis, plicatis, contortis, striatis, quarum singula continet semen oblongum, & angustum; radix est fibrosa, nigra, uni capiti adhærens; crescit in sylvis: dicitur & *Magistrantia* sunt corruptæ voces; dicitur & *Asterition*, unde *Osterutium* seu *Ostrutium* sive *Imperatoria* nigra, Helleborus niger saniculæ folio, sanicula fœmina.

ASTRICTA ALVUS, vide *Alvus Astrieta & Coprostasia*.

ASTRICTORIA, vide *Astringentia*.

ASTRINGENTIA, seu **ADSTRICTORIA**, sunt quæ particularum suarum crassitie & figuratione prædita, corporis partes inter se cogunt & contriungunt, qualem habent ex.gr. cunei, lamellæ complicatæ & dissilientes, nec non fides ex contortis intestinis factæ. Gr. Στυπτικὰ. B. *t'Samentrekende middelen*. G. Zusammenziehende artzney. Gall. *Remedes adstringens, Styptiques*. A. The binding, Astringent Medecines.

ASTRION, est Herba dicta *Stellaria* & *Stella*, seu *Cornu cervi*, quia ejus plantæ folia in modum stellæ humi decumbunt. ἀστὴρ enim est stella.

ASTROLOGIA, est doctrina de astris, eorumque influentiis, viribusque in corpus non tantum humanum, sed

sed in quævis terrestria, quæ veteres astronomi Ægyptii miræ efficaciæ finxerunt, à quibus ad medicinam postea ineptissimè horum cognitio translata est, dum ex influentiis astrorum, causas morborum, sanitatis, medelarum, Longævitatís, explicare cæperunt, ex ἀστὴρ stella, & λῆγω dico. B. *Kenais der sterren / sterre-kyk-kunde.* G. Sternkunst. Gall. *Astrologie.* A. Astrologie.

ATAXIA, in genere privationem vel defectum ordinis decentis significat, in specie est defectus in requisito ordine dierum criticarum, secundum Veterum hypothefin; pulsus quoque dicitur ἀτακτος, inordinatus, qui nullum magnitudinis, celeritatis, aut æqualitatis ordinem observat; cui opponitur ordinatus, contrario modo se habens: sic & febris erratica dicitur ἀτακτος, quæ nullum servat typum vel ordinem in periodis ex α priv. & τέσσαρς ordino.

ATAXMIR, dicitur cura oculi, quæ adhibetur, quando pili præternaturaliter in palpebris oculi sub pilis naturalibus excrescunt, ipsique oculo nocent: Vox est Arabica ab *Albucase* usurpata.

ATECNIA, ex α pr. & τέλει pario, idem quod *Agonia*.

ATHANASIA, est *Tanacetum*, sic dicta, quod ejus flores non faciliè marcescant: vel potius, quod homines à vermibus levet: hisce enim laborantes, videntur nec vivere posse, nec mori, ex α priv. & θάνατος mors.

ATHANATOS, est *Lychis*, *Coronaria*, sic appellata, quod ejus flores colorem vividum diu retineant. Ex α priv. & θάνατος mors. Vide *Athanasia*.

ATHANOR, est furnus Chymicus. Aliis habetur Fornax sublimatorius, lapidi Philosophorum elaborando inservit. Dicitur & *Fornax acida* & *Niger Henricus*, vel *Piger Henricus*, & uterus chymicus. B. *Heupe Hendzisk.* G. Ein Ofen genant Fauler Heintz. Gall. *Four à distiller pour la pierre Philosophale.* A. Slow Henry.

ATHENATORIUM, est coöpertorium spissum vitreum super cucurbitam, habens collum gracile & spissum, quod intrat cucurbitam, neutiquam illam ambiendo; inservitque præcipuè sublimationibus.

ATHEROMA, est tumor propria tunica materiam pultaceam continens, indolens, digitis non faciliè cedens, nec pressus, cavitatem relinquens, natus plerumque in
fol-

folliculo adiposo, vel in cavernis glandulosis, à materia tali collecta, vel stagnando sic facta: ab ἀθήρεα pultis genus; unde ἀθήρ Aritia, ex cujus granis puls solebat parari. B. *Een Pap-geswel / bry-puist*. G. Ein Brey-geschwulst. Gall. *Atherome*. A. A Kind of swelling so called.

Ἀθροισμὸς εἰσβολῇ, Decessio febris incomprehensibilis, ex α priv. & θλίω, quassio, & εἰσβολῇ, accessio.

Ἀθροισμα, Collectio, acervus, cumulus; ab ἀθρο, densus & confertus.

ἈTHYMIA, est animi defectio & anxietas, ex α priv. & θυμὸς animus. B. *Een qualikte*. G. Ohnmacht. Gall. *Pasmoison*. A. Fainting.

ATINIA ULMUS, sic dicta à civitate Campaniæ *Atina* appellata.

ATLAS, est vertebra prima colli, immediatè capiti subiecta; sic dicitur quia caput sustentare videtur, corpore & apophysi spinosâ caret; ejus substantia reliquis solidior; supra & infra recipit, & non recipitur: caput in ejus anteriori parte articulatur; quò in articulo caput flectitur & extenditur; foramen proprium est omnium maximum; processus transversales reliquis longiores; peculiare quoddam ligamentum habet semicirculare, quod processum dentiformem sequentis vertebrae amplectitur, ab ἀτλάω sustineo, perfero. B. *Het Hoofdstagende werbel-been / den wterlas*. G. Der Atlas-Wirbel. Gall. *Atlas, la premiere vertebre du col*. A. The Atlas whirle-bone.

ATLE, est vox Ægyptia, nobis *Tamariscus domestica*.

ATOCIA, seu ATECNIA, est ex α priv. & τίτω pario: Vide *Agonia*.

ATOCIMUM, est nomen spurium, alias *Lychnis sylvestris*: est, quod nondum peperit: quia species flore pleno semen non ferat, ex α priv. & τίτω pario.

ATOMON & ATOMOS, sic quibusdam vocatur *Hel-leborus albus*, ut & *Hyoscyamus*, nec non *Thus*; quam ob causam, nescio: fortè quia ob vires strenuas, fecari ab imperitis non debeat, ex α priv. & τίτω seco.

ATOMUS, est minima sive ultima corporis particula, ex quarum congregata in unum multitudine, corpus quodvis sui generis componitur; & in quam separando partes iterum ab invicem, ultimo dissolvitur: talis ergo parti-

cula est in divisione ultima, ergo ulterioris divisionis verâ actione incapax, unde constantissima, talisque semper permanens; qualem pro principio omnium corporum assumpsit Epicurus. Verum usurpatur hæc vox plerumque laxiori sensu, quâ denotantur particulæ corporum subtiles, quæ solæ spectatæ sensus humanos fugiunt, adeoque indivisibiles nostrâ potestate habentur, ex α priv. & τέμνω seco. B. *Ondertie*. G. Unser trenlich stuecklein. Gall. & A. An Atome, or Small particule.

ATONIA, est languor, infirmitas & remissio virium, ex α priv. & τείνω tendo. B. *Slaphcid / magteloosheid*. G. Ohnmacht. Gall. *Foiblesse*. A. Loss or Strength.

ATRA BILIS, vide *Melancholia*.

ATRAPHAXIS, Atticis δ litteram in τ mutare frequenter amantibus, dicta est, quod ἀδρῶως αὕξει, id est, statim in amplitudinem adolescat. *Chrysolachanon*, sive *Auretum Olus* dixerunt, à luteo, quem profert, colore, vel dicitur παρὰ τὸ ἀδρῶως αὕξειν, utpote quæ octavo à fatu die prodeat. Vide *Atraphaxis*.

ATRACTYLIS, est Cardui, seu Cnici sylvestris species, sic dicta est, quod ex ejus scapo longo, lævique, rusticæ mulieres fusos conficiant. Ἀτρακτῶν est fusus. B. *Bastaert Saffraan*. G. Feld-Saffran. Gall. *Saffran Sauvage*. A. The Thistle.

ATRAPHRAXIS, Latinis *Atriplex*. Attici δ litteram in τ mutare amant. Dicta est, quod ἀδρῶως αὕξει, id est statim in amplitudinem adolescat.

ATRETUS, est cui anus aut genitalia non sunt perforata, sive id ex natura fuerit, vel morbo; carne videlicet aut membrana supercrescente, & meatum obstruente. Ex α priv. & τινέω perforo. B. *En toegroeyinge van den Mars of andere deelen*. G. Dem der Aars ist zu gewachsen. Gall. *Qui a quelque partie sans ouverture*. A. No perforated in an party.

ATRIplex & ATRIPLEXUM, est oleris genus: Planta est, quæ habet folia ampla, acuta, Betam referentia, sed minora, molliora, pulverem farinaceum habentia, coloris pallidè virentis, saporis insulsi; calix est pentaphyllus; flores sunt parvi, flavi, monopetali, quinquefidi, aliàs staminibus quinque præditi; in centro semen orbiculatum, planum, vel quodammodo ovatum, sa-

saporis, dum recens est, nidorosi, est & capsula involutum, in iis, ubi flos fructui contiguus; vel ovarium subrotundum, tubis suis instructum, arcè comprehenditur à duobus foliis angulatis seu cordiformibus, planis, in iis, ubi flos mas à fructu remotus est; radix recta, longa, fibrosa; hæc planta colitur in hortis, videtur corrupta vox à voce *Atraphaxi*, vel ab atro colore, ut quidam ajunt, quod homines lividos, & decolores faciat. Gr. *Ἀτράφις*, & *χευσολάχαρον*. B. *Melde*. G. *Molten*, *Milten*. Gall. *Arroche*, *bonnes Dames*, *Prudes Femmes*, *Folletes*. A. *Orrage*.

ATROPHIA, sive **TABES**, φθὴν, φθίσις, φθινὰς νόσος. *Plut. τρεῖδων πόνη Arctæo*. Est cum totum corpus, vel aliqua pars alimentis non reficitur, sed sensim gracilescendo emacescit. *Tabes* sæpe tantum sumitur, pro ulcere pulmonum, quo corpus univsum sensim colliquescit, ex a priv. & τρεῖφω nutritio. B. *Gen teringe / voedens gebzek*. G. *Schwein-sucht*, das *Schwinden der glieder*, die *Darre*, dasz abnemen, *Schwind-sucht*. Gall. *Consumption*, *Chartre*. A. *A Consumption*.

ATTA, Felto, qui propter vitium pedum terram attingit potius quam calcit. B. *Die de aarde schroomt te raken*. G. Ein *Schlupffer*, *Schlarper*. Gall. *Trainepieds*. A. One that rather toucheth than treadeth on The ground.

ATTENUANTIA, seu **INCIDENTIA**, sunt Medicamenta, quæ acutis suis particulis, poros aperiendo, crassos & viscidos humores incidere & discindere possunt in particulas minores: vel sunt potius illa, quæ vim habent singulas liquidi moleculas in minutiores reducendi; nifum particularum ad cohærendum tollendo. Gr. *Ἀπιντικὰ* & *Τμητικὰ*. B. *Verdunnende middelen*. G. *Duennmachende mittelen*. Gall. *Remedes attenuants*. A. *Attenuating*.

ATTENUATIO, est particularum alicujus medicamenti subtilisatio, ut eo melius & promptius lactea vasa permeent. B. *Verdunning*. G. *Subtilizierung*. Gall. *Attenuation*. A. *Attenuating*.

ATTONITUS MORBUS, idem quod *Apoplexia*. *Celso*, propriè cui casus fulminis vicini, aut tonitru sonitus stuporem afflavit. Gr. *Ἀπώπληξις*, *Ἐμβρόνιξις*.

ATTRACTYLIS, idem quod *Atractylis*.

ATTRAHENTIA sunt, quæ tenuibus suis particulis, poros aperiendo, humoresque contentos alliciendo foras, ubi minor est resistentia, non tantum partes in tumorem attollunt & rubore suffundunt, sed sæpe etiam plures vapores & humores, quam per densam cuticulam erumpere possunt è cute & carne expellendo, sub cuticula colligunt, eamque in vesiculas attollunt: Imò non rarò etiam festucas & aculeos infixos educunt. Gr. Ἐλκλικά, Ἐπισπαστικά, Ἐξίπωτικά ab ἔλκω traho. B. uit-trekkende middelen. G. Austreibende artzney. Gall. Remedes attractifs. A. Attracting Medicines.

ATTRITIO, dicitur solutio continui superficialia cuticulæ & cutis à compressione & motu oriunda; uti in itinere plantæ pedum, vel in obesitas nates atteruntur. B. Af-schuuring. Gall. Frottement. Sic quoque vocatur *Cardialgie* species, quâ ventriculus ab assumpto cibo, antequam excernitur, intensè dolens, & æstuans atteri videtur cum angustia & compressione anhelitus, ut statim præfocari videatur.

AUCTIO CORPORIS, est conditio quædam, quâ solida & fluida corporis animalis non tantum restituuntur ab assumptis, verum majorem in extensionem & copiam crescunt, quam quotidie vi circulationis dissipantur. Gr. Αὐξησης. B. Vermeerdering. G. Vermehrung. Gall. Accroissement. A. Augmentation or Increase.

AUCUPALIS SORBUS & AUCUPARIA, sic vocatur *Sorbus* seu *Ornus*, quia ejus baccis volucres capiuntur.

AUDITORIUS MEATUS, vid. *Meatus auditorius*.

AUDITUS, est sensus, quo ex vario aëris corpori sonoro circumstantis motu tremulo, tympanum in meatu auditorio verberante, aërem in cavitate tympani movente, soni per nervum auditorium, sensorio communi communicantur, ibique percipiuntur. Gr. Ἀκοή, Ἀκρόασις. B. Het gehoer. G. Anhoerung, gehoer. Gall. l'Ouye. A. The Hearing.

AVELLANA NUX, est nux arboris coryli, involucri callosis, succosis, herbaceis, barbatis, hirsutis, adstringentibus & acidis obsepta, magnitudine, ut plurimum dimidio minor juglande, oblonga, vel globosa, pu-

putamine umbilicato, per maturitatem flavescente; aut rufo, lævi, lignoso, aut duro fatis, cui subest pellicula in domesticis quibusdam coccinea, in aliis subrufa, in aliis alba, nucleum obvestiens albidum, firmissimum, sicuti Amygdali nucleus, ejusdemque sapore dulci lacteum remittentem succum; fortè ab avellendo, quia fructus avelluntur. Quidam malunt vocari *Abellana*, forsitan ab urbe Abella, vel Abellinum, vel ab Avella, urbe Campaniæ abundante optimis nucibus, quæ dicuntur *Avellana*: vocantur etiam *Κάρνα πορτοκὰ*, quod in Asiam Græciamque è Ponto venerunt: & *Λιποκάρνα*, sive parvæ, quòd juglandibus minores sint. Vide *Corylus*. B. *Hasselnoten*. G. Haselnusz. Gall. *Noisettes*, *Avelines*. A. Haselnut.

AVENA, est planta, quæ habet caulem tenuem; flos est apetalus, per fasciculos pendulos dispositus, singuli nempe flores plurimis staminibus constant, ex calice surgentibus; pistillum autem deinde abit in semen oblongum, tenue, farinaceum, gluma, quæ floris calix fuit, obvolutum; singuli fasciculi ita disponuntur in spicam ut dependentes veluti parvulas locustas bipedes Avena gerere videatur, quidam deducunt ab avere, quia concupiscitur, Gr. *Βρώμη*, fortè à *βρώμα*, quod cibum significat. B. *Haver*. G. Habern. Gall. *Avoine*, *Aveine*. A. Oats, Haver.

AUGMENTUM FEBRIUM, seu **INCREMENTUM**, est computatio, à quo tempore, febris continuæ incendium totam sanguinis massam occupavit, usque dum pervenerit ad statum. Gr. *Ἀνάστασις*, ab *ἀναβαίνω* ascendo. Vocatur item *Ἐπίδοσις*, *Ἐπίτασις*, *Ἀύξησις*. B. **Opplimlinge der koofts**. G. Anwachsung des Fiebers. Gall. *Accroissement de la Fievre*. A. The increase of a Fever.

AVICULÆ CYPREÆ, sunt pastilli aromatici, Gallicis *Oiselets*, quia accensi sensim sensimque avicularum more avolant, locumque odore replent.

AURA VITALIS, notat quibusdam illud in corpore humano principium, à quo omnes functiones vitales pendunt, quoque sublato, vita perit.

AURANTIUM MALUM, est fructus arboris, quæ folia habet rigida, ad basin duabus utrinque appendicibus seu lobis in cordis formam incisiss; calix est instar co-

tylæ orbicularis, parùm cavus, brevis, quinquifidus, vel & scissus in sex segmenta; flos pentapelatus, rosaceus, multis staminibus infra concretis ornatus; ex imo centro calicis placenta orbicularis nata sustinet ovarium, ferè rotundum, tubâ longâ instructum, id sit fructus globosus instar pomi, cortice cinctus, qui in una specie tenuior est, & fragrantior, in altera crassior; si hic recens est ad oculum apparent folliculi rotundi, tenui lamellâ tecti, in quibus oleum aromaticum gratum, à quo odor & sapor aromaticus dependet; hoc adeo scatet, ut pressus oleum exsiliat, & ad candelam accendatur, divisus in varia loculamenta, succi & vesicularum plena, sæta seminibus callosis; crescit hæc arbor in regionibus calidis, præsertim in Hispania & Lusitania, vocatur & Arantium, Aurangium, Aureum malum, malum auratum, vel pomum Nerantium vel Anerantium, Narangion: dici volunt ab aureo colore, quem cortices habent: alii ab urbe Achaïæ Arantia dicta: alii à gente Persarum, quæ Aranii solebat vocari. B. *Oranje Appelen*. Gall. *Orange*. A. an Orange.

AUREA ALEXANDRINA, est species opiatum sive Antidoti: sic dicitur quod recipiat *aureum*, & à Medico Alexandro inventa sit.

AUREUM UNGUENTUM, ab aureo dicitur colore.

AUREUS ARABUM, seu DENARIUS ROMANUS, septima uncie pars est; Pendet enim drachmam unam & insuper septimam ejus partem. Tres denarii seu aurei tetradrachmam constituunt, quatuor scrupulos computatur pendere.

AURICHALCUM, vocatur æ factitium flavum, colorem auri præ se ferens, compositum ex lapide calaminari & Cupro, dum metalli libræ 64. & lapidis libræ 46. cum invicem fundantur, misceanturque, quæ exhibent Aurichalci libras 90. B. *Geel-koper*. Gall. *Cuivre jaune ou Leton*. A. Brass.

AURICOMUM, dicitur esse Ranunculi species, sed malè: ex *Aurum* derivatur, & *Coma*, fortè ab aureo florum colore.

AURICULARIS DIGITUS, minimus digitus est. Vide *Digitus*.

AURICULA, est illa pars Auris omnium oculis obvia, quæ in capite extra os temporum prominet; pendula,

dula, patula, exteriùs cava, certæ semper & determinatæ figuræ in hominibus, externo suo ambitu renis circiter, vel sphæcoli admodum compressi, ovalem figuram referens, in superiori corporis loco, tanquam ad sonum undique facillimè recipiendum, testibus ipsis animalibus in prato humi stratis, vel prono capite incedentibus, gramen mandentibus, ad minimum auditum sonum, quem acutiùs audire volunt, corpus & caput erigentibus, aptissimo, sensorio communi admodum vicino, adeoque commodissimo, capiti ad locum ossis temporum ita nexa est, ut ab eo naturaliter paululum utrinque remota, parùm antrorsum & deorsum infundibuli vel corniculæ instar incurvata, promineat & notabili eminentiâ supra os temporum elevata sit, ut in recens natis infantibus vel feris Asiaticis hominibus, nudo semper capite incedentibus observare licet. Mirabili autem hoc artificio efficitur, ut nunquam vel ab ullo non nimis remoto sonoro centro liberè propagati sonori radii, utramque aurem simul omnes præterlabi queant, sed semper vel ab aurium alterutra vel ab utrisque, necessariò satis copiosi recipiantur; liquet enim hoc clarissimè ex eo, quod nullum in sphæra, circa hominis caput tanquam centrum radio trium pedum vel ultra descripta, possit inveniri punctum ex quo non utraque, vel una auris, aut saltem auris particula conspici potest, adeoque radii recti in illam duci queunt. Hinc patet, quid mali contingat ex pessimo in hisce regionibus Europæis mos, quo nutrices jam à teneris teneras & flexiles infantum aureo galeris, ligaturis, cæterisque capitis fasciis, & adultiores dein suas, viri comis adscititiis, pileisque, mulieres suis singularibus quasi hunc in finem fabricatis instrumentis, (quæ **ooslappen** & **haarpsers** belgicâ linguâ vocant) cæterisque caput tegentibus & defendentibus integumentis, ligant, comprimunt, reprimunt, ad caput applicant, apprimunt, alligant, adstringunt, sic situm & formam naturalem auricularum haud parùm immutant, depravant, egregium usum tollunt, hoc modo nativam illam à natura relictam, ut putant, deformitatem corrigentes. Hinc plerumque non ampliùs in his regionibus in suo naturali situ, sed ad ossa temporum appressas videmus hominum aures: in quo casu multi radii, aliàs in auriculam illapsu-

ri, præterlabuntur, & illapsi non omnes ad meatum auditorium pertingunt, unde minor radiorum copia, ad reliqua organa appellit; fit debilior impressio & gravior auditus.

AURICULA JUDÆ, sunt Sambuci fungi, habentes substantiam fungosam, spongiosam, levem, coriaceam, membranaceam, auriculæ instar, subtus incanam & cineream, supra nigricantem, saporis terrei & aquei insipidi, odoris nullius; cum truncis sambucorum annosarum adnascatur, à Tournefortio ad Agaricum refertur. Sic dicta, quod auriculam referant, cui additur Judæ: quia vulgus in ea opinione est pseudapostolum Judam se ex sambuco suspendisse. B. **Judas-Ooren**. G. Holder-schwamm. Gall. *Oreille de Judas*. A. Jews Ear.

AURICULA MURIS, est Alfinæ species: sic dicta quia ejus folia muris auriculis similia sunt. Vel Pilosella Myosotis. Gr. *Μυδς ἄρα*. B. **Muisen-oir**. G. Mausz-oehrlein. Gall. *Oreille de Souris*. A. Mous-ear.

AURICULA URSI, species est verbasci, quæ habet folia ex radice erumpentia, repentia, Borraginem referentia, in margine aliquantulum incisa, crassa, lata, nervosa, villosa, aspera, laciniata instar auris Ursi; caulis nudus est, sine foliis, rotundus, solidus, habens succum rubicundum, saporis dulcis & adstringentis, calix est parvus, quinquifidus, flos monopetalus, infundibuliformis; pistillum floris fit testa rotunda, calici adhærens, per maturitatem diffiliens in plurimas partes, habens placentulam, cui semina adhærent minima, angulosa: radix fibrosa, rubicunda, lapidibus adhærens, saporis adstringentis; hæc planta crescit in montibus, aliquando in locis humidis: nomen sortitur ex eo, quod folia ursi auribus non sunt absimilia, præsertim hyemali tempore, aut quando folia primum prodeunt. B. **Beeren-oor**. G. Bæren-œhrlein. Gall. *Oreille d'Ours*. A. Bears-ear or Oricula, Krenck Gewslip.

AURICULA INFIMA, Idem quod *Lobus auris*.

AURICULA CORDIS, numero duæ sunt, dextra & sinistra: sunt duæ cordis appendices, cavæ, musculosæ, ingentes, duplici serie fibrarum, contrario decursu in tendines oppositos latarum, instructæ, arteriis venisque innumerabilibus donatæ, quarum dextra uno tendine ori-

ve-

venoso dextri cordis thalami innixus, altero duriore in circulum ferè formati venæ cavæ accrescit; hæcque ex vena cava cruorem accipit, qui in ventriculum dextrum portatur, & inde pulmonibus imprimitur: Sinistra verò est minor, cui sanguis benè præparatus & solutus, mistus, subactusque cum heterogeneis, quibuscunque liquidis à pulmonibus de novo traditur, ut per sinistram ventriculū in arteriam magnam exoneretur, & in universum corpus distribuatur. B. *De ooren van 't hert.* G. Oehrlein an das Hertz. Gall. *Oreillettes du cœur.* A. The Auricle or the ear of the heart.

AURIGA, est fasciæ species, quâ latera deligantur; atque in hunc modum injicitur, mediâ fasciâ collum comprehenditur, capitaque obliqua per pectus attrahuntur, ibique inter se implicata sub alis ad dorsum adducitur, ibi rursus implicatur, atque ita donec totus thorax deligatus sit, modo à posteriori, modo à priori parte implicatur, extremaque inter se devincimus, quo vinculo utuntur aurigæ ad latera continenda. B. *Doermans-band.* G. Die Fuhrmans Windel. Gall. *Bandelette de Charretier.* A. A. Charter or Waggoner.

AURIGO, Idem quod *Icterus.*

AURIPIGMENTUM, est sulphuri plurimis dotibus simile, friabile, fusile, faciliè inflammabile, tumque fœtore sulphureo infestum, non acido volatili; iners, innoxium, parum venenatum, fusione rubescens, tumque volatilem materiam emeticam præbens, *Arsenicum citrinum* malè appellatum. Auripigmentum hoc nativum, fusum igne in vase clauso, massam dat fragilem, faciliè conterendam, minii fulgore spectabilem, nec valde acrem aut venenatam, quæ vocatur *Realgar*, *Arsenicum rubrum*, vel *Sandaracha*.

AURIS, Est organum auditus, & notat omnia auditoria organa; dividitur in tres cavitates scilicet in exteriorem, mediam, & interiorem: Exterior auriculam meatumque auditorium; media tympanum; interior verò labyrinthum comprehendit, &c. Gr. ὅς. B. *De Oor.* G. Das Ohr. Gall. *L'Oreille.* A. The Eare.

AURUM, est metallum, omnium ponderosissimum, simplicissimum, molle, maximè expansile, in igne & aëre fixissimum, coloris flavi, rubens ante fusionem, quod in

Madagascar est, adeo molle est, ut leni igne instar plumbi liqueſcat, à fale marino ejusve productis tantum solvitur : hinc rubigine caret, quum aqua regia & spiritus salis marini nusquam in aëre volitent, vix sonorum, specificæ gravitatis ad aquam, ut 19636 ad 1000. ab *Heb.* Or, quod exponitur pro luce, vel Sole; unde *Aurora. B. Goud. G. Gold. Gall. Or. A. Gold.*

AUSTERUS, à Gr. αὐστέρης, ab αὖω, exsicco dicitur de eo, quod terrestris est naturæ, cum salinis tartareis permixtæ, vim habens linguam, dum gustatur, constringendi. *B. Wzang. Gall. Austere, Apre.*

AUTOGENES, sic vocatur Narcissus albo flore : quia ejus bulbus, necdum terræ commissus, folia emittit ; ex sese enim quasi generatur aut nascitur, ex αὐτός ipse & γίνομαι nascor.

AUTOMATOS, est id quod suâ sponte movetur, ut est cordis motus, coctiones & fermentationes (ut vocantur) in ventriculo & intestinis, ab αὐτοματίζω spontè facio. *B. Zelfs-beweging / zelfs-roersel. G. Sich selbst bewegende. Gall. Automate.*

AUTOPSIA, ocularis alicujus rei inspectio est, ex αὐτός ipse, & ὥψις visus : verum notat quoque observationes, & memoriam effectuum in morbis, quos unusquisque proprio intuitu observavit.

AUTOPYRUS, est panis, ex propria farina coctus, cui nil furfuris adjectum vel ablatum fuerit ; hujusmodi panis aliis præfertur, quia furfures habent vim, ob gravitatem, abstergerendi, ex αὐτός ipse, & πυρός triticum. *B. Brood van Meel zo als 't van de Molen komt / Brood dat ongebuult is.*

AUTUMNUS, dicitur anni tempus tertium, æstatem sequens, Arcturo oriente incipiens, & vergiliarum occasu desinens quod notabile ob morbos mali moris plerumque ejus comites : ab augendo opes, ex Festo. *B. De Herfst. Gall. l'Automne, l'arriere saison.*

AUXILIUM seu REMEDIUM, est, quicquid contraria agendi vi, morbum impugnare est aptum. Estque triplex, *Dieta, Pharmacia & Chirurgia.* Vide *Medicamentum.* *B. Geneesmiddel. G. Ein Artzney, huelffe. Gall. Aide, secours, assistance, Remede. A. Helpe, assistance, aid.*

AUXYSIS, corruptè, sed melius *Osyris* : fortè à σύγω traho :

traho : dicitur de iis qui rastris stipulas aut simile quid in unum acervum contrahunt, & qui scopis sordes è parietibus detrahunt, aut in pavementum contrahunt. Ex illa Herba olim fiebant scopæ, inde *Scoparia* dicta.

AXILLA, est cavitas illa subter Brachium, in adultis pilis conferta. Lat. *Ala*. Gr. *μασχαλή* & *μάλη*. B. *De Orel*. G. Die Achsel. Gall. *L'Aisselle*. A. The arm-hole, or arm-pit.

AXILLARES VENÆ & ARTERIÆ, sunt illa vasa sanguifera, quæ à trunci summitate venæ cavæ, & arteriæ magnæ supra cor ad axillas, & brachium excurrunt. B. *De orels bloed-baten*. G. Die achsel blut adern. Gall. *Vaisseaux Axillaires*. A. The Vessels of the arm-hole, or arm-pit..

AXIOMA, effatum evidentissimum, simplicissimis innixum ideis, quod cuncti mortales ob simplicitatem & claritatem uno ore absque demonstratione pro vero admittunt: nonnunquam autem est propositio ab *Hippocrate* vel *Gale-no* in observatis quamplurimis fundata, & pro inconcussa ab illis habita. B. *Een klare waarheid*. G. Ein vollkommener spruech. Gall. *Axiome ; verité incontestable*. A. An Axiom or proposition.

AXIS, est vertebra tertia colli, capiti subjecta. Gr. *ἄξων*. B. *De Are*. G. Die Achse. Gall. *Essieu*. A. The third Vertebra near the head.

AXUNGIA, *Στέαρ ὕειον Diosc.* ὀξύνιον *Agin*. pinguedo vel sebum porci, sebo mollior. Quia verò hujus unguinis præcipuus usus fuit in axibus curruum inungendis, hinc illi nomen creatum, & Grammatici omnes pro unguine vehiculari exponunt. B. *Heusel / Seutzel*. G. Schmeer, Schmaltz. Gall. *graisse*. A. Fat grease.

AXYRIS, idem quod *Auxyris*.

Ἀύησις, ab *αὐξάνω*, cresco, ab *αὐξω* augeo, corporis est in omnem modum ampliatio.

AZOTH, modo Mercurium cujuscunque corporis metallici denotat, modo Medicinam quorundam universalem putatam ex Mercurio, auro & argento paratam; ante aliquot annos per Magnates, imò & vulgum celeberrimum, varii coloris; sed pro diversitate præparationis, sæpe nimis sollicitæ, unde mox pretio & famâ vilescere incepit. B. *Quiksilver*. G. Quecksilber. Gall. *Mercur*. A. Mercury. A. Mercury, Quicksilver.

AZU-

AZUGOS, est vena ortum ducens ex Vena cava duplici origine in abdomine inter duos diaphragmatis appendices, dein Thoracem ingressa sub Aorta juxta dorsi vertebrae, accipit Venas Intercoastales, & Venæ cavæ superiori iterum inferitur, estque insignis capacitatis. *Sine Pari* aut *Jugò* dicta, ex *a* priv. & ζῦλον jugum. B. *Ader son-*
der paar of weerga. G. Die ader ohne paar. Gall. *Veine*
Azygos. A. The veine without a paire.

AZUR, à voce Arabica, & Persica, *Lazur*, quâ cæruleum pigmentum denotant.

AZYMUS, est panis non fermentatus, & insalubris, ex *a* priv. & ζυμω fermento, unde ζύμη fermentum. B. *On-*
gehevelt brood / ongezuurt brood. G. Ungehuffelt, ungefäurt brod. Gall. *Pain à chanter, sans levain, azyme*. A. Unleavened.

B.

BACCA BACCÆ. Gr. κόκκος, dicuntur foetus seu fructus sphaerici, minores herbarum, fruticum, arborumve, qui dispersius rariusque nascuntur: vel quicunque parvi sunt & rotundi, ut ribes. Fraga, baccæ lauri, juniperi, plerumque molles, tenui membranâ, tecti, & semina in substantia pulposa nidulantia continent: atque in hoc ab acinis differunt, quod iis densius proveniant. *Bacca*, fortè à Baccho, quia vitis, baccas producens, Baccho dicta. B. *Bezie*. G. Beeren. Gall. *Baye*. A. A Berry.

BACCAR, BACCARIS, est herba odorata. Sic dicitur quasi πάγκχαρις, *omnibus grata*, propter eximiam fragrantiae gratiam, in radice cinnamomum redolente, vel nomen accepit ἀπὸ τοῦ βακχίου, χάρις, quod ex eo coronæ bacchantium more, magna cum gratia, quam ex hedera gestatae sint.

BACCHICA, vide *Hedera*.

BACCINIA & BACCINIUM, est Vaccinia, sic dicta quod baccas producat.

BACILLI, nomen imponitur Medicamentis figurâ bacillorum oblongâ, seu tereti, ut bacilli, seu candelæ odoriferae. Item & bacilli ex glycyrrhiza, ab una extremitate contusi, qui linctui inserviunt: Ut vulgò in affectibus pulmonum & tussi, vel asthma, à Galenica & Ara-

Arabica Medicorum turba præscribuntur. B. *Stokjes / iik en sproopstokjes*. Item vocantur Candelæ illæ, quæ usui veniunt, si cadaver aliquod foetidum dissectionibus Anatomicis vacet. *Kuikende Staatsjes*. G. Wolriechender Kertzlein. Gall. *Chandelles odoriferantes*. A. A. Sweet-smelling candle, or a Small Sticks.

BADIAGA, Est planta aquatica, spongiosa, ex multis fibrillis herbaceis quasi contexta, fragilis & friabilis si sicca, femina sunt grana rotunda, coloris albidus, in altera parte instar lapidum cancri excavata: odor plantæ est teter & pisculentus. Est planta apud Moscovitas in frequenti usu, contra livores oculorum & aliarum partium à verberibus, quos pulvis impositus unâ nocte tollere dicitur. Vide de hac Comment. Petropol. vol. 2.

BALANÆUM, sive BALNEUM, est propriè remedium corpori potissimum curando, detergendo, emolliendo, alliciendo, fovendo, quin & sudando deputatum: nam est totius corporis lotio; non rarò tamen & pro lotionem partium solummodo inferiorum sumitur, quas *Inseffus & Semicupia* vulgò vocant. Estque vel *Siccum* vel *Humidum*; sicca parantur ex cineribus, sale vulgari, arena, chalybe limato &c. *Humida* sunt vel *vaporosa*, vel *aquosa*. *Vaporosa* fiunt ex coctione Radicum, Herbarum, Florum, Seminum, &c. cujus vapor tantum suscipitur. *Aquosa* sunt vel *artificialia*, quæ parantur ex decoctis Medicamentosis. Vel *Mineralia* quæ *Thermæ* vocantur, quarum aquæ sunt aluminosæ, ferreæ, cupreæ, nitrosæ, sulphureæ, bituminosæ, vitriolicæ, &c. quæ omnes *Acidularum* nomine veniunt. B. *Zuur-bronnen*. G. Saur-bronnen. Ex *βάλλω* pello, & *αἷμα* tristitia seu morbus. B. *Ein Bad-stube / water-bad / bad*. G. Ein Bad-stube. Gall. *Un Bain*. A. Bath.

BALANDA, aliis VALANIDA est Esculus, cujus fructus glandiformes sunt: ex *βάλλω* glans, & *ειδω* forma.

BALANOCASTANUM, est radix tuberosa, quæ etiam Bulbocastanum appellatur. Ex *βάλλω* glans, & *κάστανος* castanea.

BALANOS, est glans propriè quercus, sed latius sæpe sumitur pro quibusdam fructibus oblongis & duris. Fortè à *βάλλω* projicio.

BA.

BALANUS, seu **GLANS**, est penis suprema pars, præputio tecta. *Βάλανος*, *κύντιος* *Suida & Hesychio*. B. **Oet hoost der mannelycke roede**. G. Der Kopff, vel Kolb am Schwantz. Gall. *le gland*. A. the head of the yard. Item *Clitoris Muliebris*, vide *Clitoris*. Sic etiam bulbosi fructus & radices appellantur, ut Juglans quasi Jovis glans; item glans quercus, Bulbocastanum &c. B. **Eekels / bol-len**. G. Ein Eichel, esch-lauch. Gall. *Gland*, *eschalotte*. A. A kind of a corns, or Chef-nut. Item *Suppositorium*, & *glans*, vide suo loco.

BALANUS MYREPSICA, sive **NUX UNGUENTARIA**. Venit ex Ægypto, Arabia, Æthiopia, Syria & Barbaria. Fructus est arboris Tamarisco similis, magnitudine avellanæ nucis, intus nucleum continens pinguem & oleosum, veluti amygdalæ. Plinio dicitur *Myrobalanum*. Arab. *Habel Ben*, vel *Ban*, ab aliis *granum Ben*, in officinis *Ben*. Turcis *Hebelben*, ex *βάλανος* glans, & *μύρον* unguentum.

BALATRO sive **BAMBALIO**, est vitium linguæ in laxitate consistens musculorum aut vinculi, cui adest nimia oris saliva. B. **Brepen** / loquuntur enim, ac si bucca pulte esset repleta. Sic G. Breyen. Gall. *Parler comme si l'on avoit la bouche pleine de bouillie*. Quidam accipiunt pro hominibus nullius pretii. Fortè à balatu & vaniloquentia. B. **Sabbelaars / tateraars / kakelaars**. G. Ein Plauderer, Backer vel Lallender Tröpff. Gall. *Hableur*, *jaseur*. A. A Babbler or Pratler.

BALAUSTIUM, est flos mali punicæ sylvestris coloris punicei, saporis adstringentis. An à *βλαστειν* germinare. Gall. *les Balaustes ou fleurs du Grenadier*.

BALBUTIES, Gr. *τραυλότης*, *τραυλισμός*, *φειλλότης*, & *ψειλλισμός*. Huc pertinet *Blesitas & Blesâ lingua*; *Balatro*, & *Bambalio*. Est vitium in musculis & organis loquelæ. Estque vox tarda & interrupta, variè flexa, & in quibusdam literarum pronuntiationibus admodum difficilis, hinc cum eas efferre non possunt, alium sonum & inarticulatum sive sibilum; & aspirationem eo conatu, quo difficultati mederi volunt, adspargunt subinde silent, mox contentiore voce excutiant incondita quedam, incongruâ oris & linguæ contorsione: Porro tremulo sono certa vocabula loquuntur & os habere solent hu-

humore nimium madens, quem sæpe cohibere non possunt, quin effluat, aut in adstantes expuatur. Tandem hoc habet Balbuties, quod alio tempore major sit, alio minor: hinc sani & qui bene loquuntur, nimium si festinent, sæpe balbutiunt. B. *Stameling*. G. Das Stammeln. Gall. *Beguayement*. A. A stuttering, a stammering.

BALISTÆ OS, vide *Astralagus*.

BALLOTE, est Marrubii species: habetque caules fortes, quadratos, lanuginosos, rubicundos, folia sibi invicem opposita, majora, & oblongiora Marrubio albo, Melissam referentia, sed obtusiora, magis rugosa, in margine incisa, coloris viridis subfusci, odoris foetidi; flores verticillatos coloris rubri; semina oblonga, in capsula, quæ flori tanquam calix inservit, inclusa; radix fibrosa, perennis: sic dicitur *παρὰ τὸ βάλλειν, καὶ ὅτι*, quod ad inveteratos aurium dolores sit efficax. Vocatur *Marrubium nigrum*, à foliorum similitudine & *Nigrum* à caulis colore, qui niger est respectu Marrubii albi: habet odorem virosum ut Castoreum. Gall. *Marrube noir ou Marrube puant*.

BALNEUM, Chymicis dicitur vario modo, nempe arenosum, Cinereum, Martiale, Mariæ, Maris, Vaporosum &c. *Arenosum Balneum* est, cum retorta vel cucurbita in arena collocatur vel in cineribus vel chalybis limatura. *Balneum Mariæ* seu *Maris*, quod hoc signo notatur. B. M. & M. B. est cum eadem instrumenta aquæ calidæ imponuntur; & cum vaporosum dicitur, instrumenta tantum vaporem aqueum excipiunt, vel corpora sudationi exponuntur. B. *In 't Bad distilleren*. G. In Bad distillieren, vel Sinbrennhelm. Gall. *Bain, Bain Marie, Bain de vapeur*. A. Distillation in the Bath. De cæteris Balneis, vide *Balaneum*.

BALSAMELLA, idem quod *Balsamina*.

BALSAMINA, est planta, quæ habet caules crassos, rectos, ramosos, succulentos, aliquando in parte inferiori rubicundos: folia oblonga, acuta, aliquantulum in margine incisa, saporis amari: flores polypetalos, anomos; hi autem vel tetrapetali, vel hexapetali; floris tetrapetali petalum superius fornicatum est, inferius concavum, & caudatum, duobus lateralibus auritis & amplio-

prioribus; floribus hexapetali petalum inferius est caudæ expers: Pistillum duobus foliolis stipatum, floribus medullium occupat, abique deinde in fructum nunc ex utraque parte turbinatum, nunc siliquæ æmulum, valde contractilem, vi elasticâ hâc illa dissilientem, seminibusque foetum, axi seu placentæ affixis; radix fibrosa, alba est: Nomen, quod ex floribus insolationi balsamum fiat, ad vulnera sananda, fortitur, mirum unde ipsi illud nomen, nam minimè balsamum refert, neque est apta ad Balsamum conficiendum, sed penitus est venenata. Gall. *Balsamine*.

BALSAMITA, est planta, quæ habet caules canaliculatos, villosos, ramosos: folia oblonga, in margine incisa: flores in summitate caulium congesti sunt; his succedunt capsulæ membranosæ, compressæ, oblongæ, semina parva continentes: radix mentham refert, fibrosa est; dicitur & costus hortorum, mentha corymbifera; derivatur, ob odorem potentem, à voce Balsamum. B. *Bali-hruid*. Gall. *Coq. herbe du Coq. Pasté*.

BALSAMUM, ejus planta frutex est, seu arbuscula, tres cubitos ad summum alta, folia alens Rutæ foliis similia. *Syriacum* dicitur Rutæ folio. Nascitur spontè in Arabia Felici, unde olim in Judæam, & hodie in Ægyptum translata, loco quodam occluso, Cayro vicino, quem *Materiam* vocant, colitur. Ejus fructus dicitur *Carpobalsamus*; Ramusculi *Xylobalsamum*; Succus *Opobalsamum*. Fructus eligatur recens, plenus, ponderosus, gustu mordax. Ramusculi probantur recentes, tenues & odorati. Dicitur ἀπὸ τοῦ βαλῶ, καὶ σμῶσθαι, quod cœlestem ac divinam messem reddat. *Hesychius*, βαλὼν, ἔδωκε καὶ ἔρανον, καὶ βαλὼς, polum cœlum. Vel *Balsamum* dicitur, quasi *Balsamin*, quod in orientalibus linguis exercitati dicunt esse, Princeps aromatum. *Pausanias*, si rectè scribitur πάσσαμον vocatur. Alii βλάσαμον. Ægypti *Balassan* nominant. B. *Balseni*. G. *Balsam*. Gall. *Baume*. A. The Balsame Tree.

BALSAMUS vel BALSAMUM. Balsami vocabulum pluribus in officina usurpatur significationibus. 1. Denotat genus quoddam odoramenti crassiusculi instar unguenti, vel linimenti, & hæc significatio usitatissima est. e. g. Balsamus rosarum, apoplecticus & similes. 2. Solent quoque

que ex gummi resinisve cum spiritu vini liquores destillari, qui extrinsecus illinuntur, balsamique nomine veniunt; ut balsamus nervinus, sciaticus & similes. 3. *Inunctorium* liquorem significat, eumque oleo crassiore, linimento liquidiorum. 4. Balsami nomine sibi vindicarunt *salia fusa & liquata*, ut balsamus salis gemmæ. 5. Sunt *singulares* quædam *præparationes* quibus balsami nomen imponunt; ut balsamum sulphuris, &c. 6. Tandem etiam lachrymæ quædam arboreæ balsami vocantur, ut balsamus copayvæ. 7. Balsamus est, quo cadavera condiuntur. B. *Balsam*. G. Balsam. Gall. *Baume*. A. Balme or Balsame.

BAMBALIO, Idem quod *Balatro*.

BAMBAX, Idem quod *Bombax*.

BAMMA, est tinctura seu liquor, in quo aliquid tingitur, aut madefit, ut panis jusculeo immersus, à βαπτο immergo. B. *Gen indoopsel*. G. Da man was ein taucht, einweicht. Gall. *immersion*, *trempelement*. A. A liquor in which any thing is dipped.

BAPTISÉCULA, vide *Cyanus*.

BARAS, Arab. Idem quod *Alphus*.

BARBA, est Labiorum & menti pars pilosa. B. *De baard*. G. Der barth. Gall. *La barbe*. A. A beard.

BARBA CAPRINA, vel CAPRI: vocatur à florunz figura, quæ caprinam barbam referre videtur.

BARBA HIRCI, idem quod *Tragopogon*, & *Ulmaria*.

BARBA JOVIS, est *Semper-vivum*, seu *Sedum*. Est arbuscula quæ habet caulem durum, ferè lignosum, cortice lanuginoso albo tectum, plures ramos dimittentem; folia bina villosa, splendentia, coloris argenti: flores in summitate crescentes, sunt exigui, leguminosi; genistam referentes, quo ad figuram, non quo ad magnitudinem; post florem sequitur filiqua brevis, ferè ovata, foeta semine subrotundo; crescit in montibus & locis saxosis circa mare. Gr. *Αἰσιων*: sic dicta fortè, quod putent cum Jovis barba similitudinem habere. B. *Huis-look* / *Wunderbaard*. G. Haus-laub, Hausz-wurtz, Donner-bart. Gall. *Joubarbe*. A. Housleeke.

BARBAREA, est herba S. Barbaræ dicata. Appellatur aliàs *Nasturtium Hyemale*. Gall. *herbe aux Charpentiers*.

BARDANA, est *Lappa*. Fortè à Bardus, hoc est hebes, quia folia habet mollia & hebetia. Vide *Lappa*.

BARYOCOCCALON, est *Stramonia*, five pomum spinosum, ac si diceres, quod sit nux, gravem somnum producens, ex βαρὺς, gravis, & κόκκαλον nucleus.

BARYECOIA, est audiendi gravitas, ex βαρὺ grave, & ἀκούω audio. B. *Swarthorigheid*. G. Harthoerung, Taubheit. Gall. *Surdité*. A. Hardness of hearing.

BARYPHONIA, est loquendi gravitas, à βαρὺ grave & φωνή vox. B. *Een moepelijckheid van spreken*. G. Schwere zu sprechen. Gall. *Difficulté en parlant*. A. Difficulty of speaking.

BARYPICRON, est Absinthium latifolium : quasi diceret, supra modum amarum. Ex βαρὺ grave, & πικρὸν amarum.

BASILARE OS, vulgo denotat *os Sphenoides*, & palati os. Significat quoque occipitis os, quod & *Os proreæ*, *Os memoriae*, vel *Os pyxidis* dicitur. Gr. ἰσιον. B. *Het Wigge-breen*. Gall. *L'Os sphenode*.

BASILICA, est vena brachii interna, *Hepatica* dicta, à βασιλεύω rego. B. *Lever-ader*. G. Die Leber-ader. Gall. *La veine basilique*. A. The basillick veine.

BASILICUM, est Medicamentum viribus pretiosum, & cæteris excellens, à βασιλεύω rego : hoc nomine tamen plerumque officinale unguentum insignitur. B. *Een kostninkelijc Gences-middel*. G. Koenigliche Artzney. Gall. *Remede Royale*. A. A Noble Medicine.

BASILICUM, est Ocimum, herba odorifera. Sic dicta ob vires quas præstat regias. Βασιλικὸν est Regium : βασιλεύω Rex.

BASIOGLOSSUM, est pars musculorum linguam deprensens, ortum a basi ossis hyoidis, finitur prope linguæ cuspidem, fibris secundum longitudinem, & aliquatenus oblique ad latus excurrentibus : ex βάσις fulcimentum & γλῶσσα lingua. B. *Des tongs neerdrukkende Spieren*. G. Des zungs niederdruckende maulz. Gall. *Muscle qui abaisse la langue*. A. Muscles that depress the tongue.

BASIS, est cordis superior pars mucroni opposita. Item sustentaculum ossis Hyoidis pro lingua : & occipitis os pro sustentando cerebro &c. Item in formulis præscribendis præcipuum ingrediens : à βαίω incedo, unde os Basiliare. B. *Ondersteunsel / grond / voet*. G. Der Grund, boden eines dinges. Gall. *Base*. A. The base of any things.

BATH-

BATHMIS, est sinus in ossē Brachii seu Humeri, utrinque singuli; in quo cum extenditur flectiturque tota manus; ulnæ ipsius coronæ, sive processus ingrediuntur: à βάινω ingredior. B. *En inhoek van 't schouder-been.* G. Hohle von das Arm-bein. Gall. *sinus ou fosse de l'os du bras.* A. The in most process of the Shoulder bone that receives the Ulna.

BATHYPICRON, est *Absinthium latifolium*. Significat, profundè amarum, ex βαθύ profunde, & πικρὸν amarum.

BATINON MORON, est fructus Rubi idæi; βάτῳ enim est rubus.

BATIS & BATOS, est Rubus, ut docet Nicandri Scholiastes: dicitur, quod indomita sit planta, accessumque propter spinas, quibus valde pungit, non admittit. *Εἰς τας*, inquit, βάτῳ διὰ τὸ ἀβάτῳ εἶναι. A contrario igitur nomen impositum, βάτῳ à βαπτίζω, vado, aditus, accessus, βατὴ γῆ terra facilis accessus: hujus fructus βάτινον vocatur.

BATRACHIOIDES, est Geranii species Batracho similis: ex βάτραχῳ rana, & ἰδῳ forma. *Batrachion* enim est *Ranunculus*.

BATRACHIUM Græcis, *Ranunculus* Latinis. Apulejus nominat *Sceleratam*. Vulgus Medicorum perperam, *Pedem Corvi* vocat. Sunt etiam qui *Flammulam*, ab utendi facultate appellant. *Batrachion* autem sive *Ranunculus* dicta est haud dubiè, quòd limitibus humidis opacisque marginibus ranarum more lætetur, aut quòd aquis ubi ranæ degunt potissimum, gaudeat; aut quòd sub ejus umbra ranæ frequenter inveniantur. *Agreste* verò *Apium* seu *Apiastrum*, quòd foliis Apium æmuletur. *Scelerata*, eo quòd comesta noxia sit: Vel, quòd magis arridet; quia validi sceleratique mendicantes sibi crura & lacertos hanc ipsâ dilaniant, quo possint impudentius stipem extorquere, atque hanc imposturâ pecuniolam aucupari. Βάτραχῳ est Rana. Vide *Ranunculus*.

BATRACHUS, RANA & RANULA, seu HYPGLOSSIS, est tumor sub lingua scirrhusus, suppuratorius, vel inflammatorius, continens nonnunquam in folliculo materiam melliceridis similem, linguam summopere incrassans, loquelam difficilem reddens, unde coaxando vox producitur, à βελῆαχίζω ranas coaxando imi-

tor, comp. ex βοή vox, τραχὺᾶ aspera, & ἔχω habeo. B. *Teit*
kikborsch **geswel.** G. Eingeschwulst unter die zunge. Gall.
le Batracos, ou Ranuncule. A. A disease under the tongue.

BAUCIA, dicitur Pastinaca sylvestris. Fortè à jucunditate; βαυκός enim est jucundus. Alii *Branca Leoniam* aut *Ursinam* vocant.

BDELLIUM, est gummi, aut lachryma resinosa, Myrrhæ gustu & colore proxima, sed cujus arboris incertum est. Si bonum, gustu erit subamarum, translucidum cum frangitur, pingue cum fricatur, odorum, facile mollescens & flammam concipiens, eamque cum strepitu pertinaciter alens: Gummi quidam arboris esse spinosæ in Arabia, India, Media &c. esse putant; illud nomen denotat, quasi diceret foetens gummi: videtur olim fuisse ex iis, quæ propter ingratum & gravem odorem, ferè foetere videbantur, à βδέλλω foeteo, pedo.

BE CABUNGA, est Veronicæ aquaticæ species, cujus est vox ficta. Ex B. *Beeke-boom / Water-kers / Boekbunge / Waterbunge / Water-poelcypn.* G. Bach bungen, Wasser-bungen, Brunnen-kresz. Gall. *Creffon aquatique; Berle.* A. Brook lime, Becabung.

BE CION, est *Tussilago* seu *Farfara*. Sic dicitur quia pectoris morbis medela est, βήξ quippe tussis est, & βήττω tussio.

BE CHICA, sunt Medicamenta tussim inhibentia, ejusque causas corrigentia, Lat. *Pectoralia* à βήττω tussio; Unde βήξ tussis. B. *Bozst-middelen.* G. Brust-artzney. Gall. *Remedes pour la poitrine.* A. Expectorating Medicines.

BE DEGARIM, seu BE DEGUAU, vide *Spina alba*.

BEHEN, officinæ nostrates monstrant radices nomine *Behen*: Unam *Behen Rubram* appellant, alteram *albam*. De utraque controvertitur cujus sint speciei. Arabibus (ut Serapion) sunt *Behen*, pastinacæ radicibus similes. Hinc scribit Hali Abbas, *Behen & Pastinacæ sylvestris radices* nullum inter se discrimen habere. E modernis *Behen albam* aliqui *Polemonii*, sive *Lychnidis sylvestris* speciem esse autumant, quam Tabernamontanus vocat *Herbam articularem*: *Behen rubrum*, alii *Limonii maritimi*, alii *Valerianæ rubræ*, alii *Bistortæ* speciem esse putant: aliqui verò, Garziâ & monente & reprehendente, *Zerumbeth* esse statuunt. Hinc est, quod aliqui in descriptionibus

bus Arabum substituunt *Eryngium*, alii *Tormentillam*, alii *Angelicam*, alii denique *Caryophyllatam*. Auctuarius & Myrepsus *Beben Hermodactylos* esse volunt, forsitan avellanas purgatrices.

BELEMNITES, est lapis, ultra digiti longitudinem non assurgens, teres, in apicem obtusum desinens, aliquando plenus, aliquando concavus, terram vel arenam recondens, coloris albi, cinerei, aurei, pellucidus interdum, juxta longitudinem habens rimam: nomen τοῦ βέλνις, id est sagittæ effigiem repræsentat: dicitur & Lyncurius, quod ex urina Lyncis conflare falsò putent: vel Dactylus Idæus, quod in monte Ida reperitur. Gall. *Belemnite ou Pierre de Lynx*.

BELENOIDES, est processus styloides, cranii basi infixus, à βάλλω jacio, unde βέλνις sagitta, & εἶδος forma. B. **Wiem-mps uitsteeksel**. G. Der griffel gleiche aufzwasch. Gall. *Apophyse styloide*. A. The proceſſe styloides.

BELLADONA, est planta, quæ caules dimittit ad altitudinem quatuor pedum qui sunt crassi, rotundi, ramosi, villosi; coloris rubicundi, obscuri: folia solani, sed duplo vel triplo majora, & latiora, oblonga, mollia, non angulosa, aliquantùm villosa aut lanuginosa: flores ex alis foliorum erumpunt, monopetali, campaniformes, ut plurimum in quinque partes laciniati; coloris albi & purpurei: florì succedit fructus ferè rotundus mollis, cerasam æmulans, niger, splendens, in duo loculamenta divisus, continens semina placentæ affixa, rotunda vel ovata: radix est longa, crassa, albescens, in multos ramos divisa; hæc planta crescit in sylvis, nomen est corruptum, ex *Bellonaria*, quo modo Solanum somniferum vocari scribit *Apulejus*. Significat etiam pulchram matronam, quia hâc olim utebantur mulieres ad decorandam cutim.

BELLIS, BELLIIUS FLOS, & HERBA MARGARITA, est planta parva, humilis, quæ habet folia parva, oblonga, levigata, in extremitate sua circularia, repentia, quædam parùm crenata, alia integra; calicem monophyllum, profundè divisum, & multifariam ad basin ferè usque: florem habet vel nudum, vel planipetalum; capitulum feminale per maturitatem, delapso flore, assurgit; ubique in pratis nota, sic fortassè vocatur, quòd

in pratis ubique bellum & lætum aspectum præbeat, hinc belus quasi pulcher dicitur; vocatur & consolidago; quia succo suo glutinoso vulnera consolidat. B. *Madelieben / Maagdelieben / Margrieten / Kersouwen*. G. Matzlieben, Massufelen, Monatbluemlein. Gall. *Marguerites, Pasquettes*. A. Daïsie.

BENEDICTA HERBA, vide *Caryophyllata*.

BENIGNUS MORBUS, est qui nulla vehementia & sævitia, supra ordinarium cursum habet symptomata. B. *Een goedaardige ziekte*. G. Eine nicht allzu schwere Kranckheit. Gall. *Maladie Benigne*. A. Amild disease.

BENZOIN, Gummi resina est, ut dicunt arboris proceræ; Verùm *Bontius*, dicit reperiri in Java plantam ex pluribus sarmentis coalitam, qualis est Smilax aspera; seu Salsa parilla, nisi quod sarmenta ibi brachii crassitiem æquent, vel etiam superent, ita ut hæc in medio sæpe truncus arboris continuus satis crassius appareat, ex hujus cortice inciso colligitur gummi benzoin. *Doctiss. H. N. Grimm*, notat esse arborem egregiæ formæ, recti caudicis, & mediocris magnitudinis, habens viri plerumque crassitiem; Crescit ad occidentem Sumatræ. Fructus fert rotundos sed compressos, magnitudinis parvæ nucis avelanæ, & inclusus est tunicæ, instar nucum juglandium, quæ tamen aliquantulum, pilosa est. Folia profert tenera & mollia, inferius pallido-viridia superius verò saturatè viridia. Nucleus hujus fructus saporem habet ingratum & amarum. Arbor quinquennis vel sexennis usque ad lignum secundum longitudinem vulneratur, unde liquor albus, tenuis, viscosus, glutinosus & pellucidus exstillat, qui solari calore induratur, unde duplex gummi, album & citrinum, vel crassius & obscuri coloris: Estque valdè odoratum, & si bonum, pellucidum, globulis candidis refertum, thuris æmulum, citrinescens est, venit etiam ex Siam, Samaria, & Sion. Vocatur & *Asa dulcis*. B. *Benzoin*. G. Benzoin. Gall. *Benjoin*. A. Benjamin vel Benzoin.

BERBERIS, est magna arbuscula, ramosa, spinosa, corticem tenuem, & politum habens; folia oblonga parva, viridia, in margine incisa, aliquantulum aspera, saporis acidi; flores in parvos racemos congesti, & multis parvis foliis flavis instructi sunt; his succedit fructus tener,

ner, parvus, ovalis, succo plenus, post maturitatem coloris rubri, saporis acidi, adstringentis, grati; semina oblonga, dura, coloris fusci in se habens; radix non est compressa, lignosa, intus flava: hæc arbuscula crescit in locis incultis: dicitur & *Oxyacantha*, idque à spinarum acuminatis cuspidibus. *Berberis* verò est vox origine Barbarica, & ab ea voce videtur descendere *Barbar*, *Barbaris*, & *Berberis*: nonnulli derivant ab *Amyrberis Avicennæ*, unde mutatis quibusdam literis *Berberis* devolvi putant: vocatur etiam *Spina acida* & *Crespinus* vel *Crispinus*, ab Italica voce, *Crespino*. B. *Zauce-boom* / *Zuur-boom* / *Berberisse-boom*. G. *Paissel-beer*, *Saurick*, *Erbfeil*, *Berberos-stand*. Gall. *Epine-vinette*, vel *Aigrette*. A. *Barberty-tree*, or *Pipperidge bush*.

BERIBERI, *Bontio* aliisque vox familiaris apud Indos: Vox est Barbarica significans paralyfis speciem, cum quis nictitando genubus & elevando, ovium instar incedat. B. *Schaaps-lammigheid*.

BERYLLUS, *βήρυλλος*, quasi virillus à virore lapidis.

BES, alias *Bessis*, *Bissis*, *Bissa*, vel *Bise*, quasi bis triens, quia $\frac{2}{3}$ sive duo assis Trientes, seu quod dempto libræ Triente superest, hoc est, Unciæ vii. Priscian. p. 8. vulgò *Marca*, vox præterquam *Celfo*, *Galeno* usitata. Olim *Des*, veluti dempto triente. Aliàs *Libra numularia* & octonaria.

BETA, est planta culinaria, quæ habet folia ex radice erumpentia magna, polita, splendentia, satis carnosâ, tenera, viridia, vel albescentia, aliquando viridia subfusca, vel rubicunda, succo saporis nitri plena; flos est apetalus, stamineus, in globum collectus, calice quinquifido prehensus; cuilibet flosculo subnascitur ovarium, quod est vasculosum, uno fœtum semine, fructus tres, quatuorve in unum colliguntur: radix annua, in nonnullis valde carnosâ, crassa: dicitur *Cicla officinarum*. Gr. *σιύτλον*, vel *τιύτλον*. Nomen accepit, quod figuram Litteræ Græc. *βῆτα* dum semine turget, referat. Nam summitatem in acumine reflexam obtinet. B. *Beet*. G. *Mangolt*, *Runckel*, *Pießlen*. Gall. *Bette*, *Poirée blanche*. A. *Beet*.

BETONICA, est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia oblonga, satis ampla, viridia, in margine incisa,

cifa, parum aspera, saporis amari; caulem quadratum, parum rugosum, folia hinc inde bina opposita habentem; flores in verticillos, deinde ad superiora in spicas digeruntur, galeâ erectâ, imbricatâ, bifidâ; barbâ trifidâ, segmento medio bifido, majore; semina oblonga, in capsula, quæ florî tanquam calix infervivit, inclusa; radix crassa, fibrosa: dicitur & *Vetonica*, à varietate & copia remediorum; κέστρον à Græcis dicta est, hâc siquidem voce opus interpunctum, acuve pictum nominavere, nascitur in pratis, montosis, frigidis & opacis locis, ideoque Gr. ψυχότροπον, vocata est, quasi frigus alens, ab inventoribus Vetonibus Hispaniæ populis *Betonica* & *Vetonica* appellata est, quod in frigidis locis nascatur; dicitur etiam κέστρον ab αἰχίομαι medeor, quia hæc planta summi usus est in medicina. Porro Caryophylleus flos etiam vocatur *Betonica*, vel *Tunica* detractis à Betonica duabus literis prioribus. B. **Betoni.** G. Betonien. Gall. *Betoine*. A. Betony.

BETULA & BETULLA, Gr. Σημίδα: arbor est, mediocris altitudinis, cujus rami sunt tenues, flexiles, incurvati, cortex exterior trunci est crassius, asper, albus, fissus; interior verò est tenuis, politus instar pergameni, hunc etiam veteres papyri loco adhibebant; lignum est album; folia mediocriter lata, acuta, in margine dentata, populo nigrae satis similia, viridia, tenera, polita, saporis amari; flos mas amentaceus, foliosus axi affixus capillaceo longo; fructus loco à flore remoto squammosus, cylindraceus, sub squammis suis recondens semina alata; hæc arbor crescit in sylvis: quidam dici putant, quod bitumine scateat; apud Plinium enim legere est; *Bitumen ex ea Galli excoquunt*: Malunt alii à batuendo nomen accepisse: batuere enim cadere est. Sic Batula, levi mutatione, fit Betula. B. **Berken-boom.** G. Bircken-baum. Gall. *Bouleau*. A. The Birch-Tree.

BEZOAR, est vel Chymicum, vel animale. *Chymicum* est compositio ex *Butyro Antimonii* & *Spiritu nitri*, ex qua pulvis albus componitur, adversus venena, qui & sudorem prolicit. *Animale* duplex est *Oriente* vel *Occidentale*. *Oriente* reperitur in animali capri-cerva dicto. Estque animal Persiæ ac Indiæ Orientalis, partim cervo simile, partim caprae: hinc fit ut aliis capra audiat, aliis hircus, aliis capri-cerva, Persis *Pajon*, iste lapis in præ-

prædicto reperitur animali, nempe in proventriculo, hinc & in ventriculo aliisque cavitatibus internis. Figuram habet ovalem, rotundam, sessilem & intus cavam, in mediotulio paleam continet, pilos, vel similia, superficies est lævis & glabra cum splendore, substantia è laminis caprarum adinstar sibi incumbentibus compacta, variante colore, plerumque atro-virente, hinc dilutius virente, pallescente, cineritio, fulvescente melleo &c. odore nullo, nisi contrito, tum muscum aut griseum ambrem redolet: variante magnitudine & pondere, plerumque sc. intra juglandis magnitudinem constitutis, vel paulò majoribus aut minoribus, dantur quoque artificialia, sed vilipendenda. Inprimis reperitur hic lapis, notante Kœmpfero, in Persidis provincia *Laar*, aliisque: genitrix est fera quædam montana caprini generis, quam incolæ *Pasæn*, nostrates capri-cervam nominant, destituti voce, quæ utrumque sexum exprimat. Animal pilis brevibus ex cinereo rufis vestitur, magnitudinem capræ domesticæ, ejusdemque barbatum caput obtinens. Cornua fœminæ nulla sunt, vel exigua; hircus longiora & liberalius extensa gerit, annulisque distincta insignioribus, quorum numeri annos ætatis referunt; annum undecimum vel duodecimum raro exhibere dicuntur, adeoque illum ætatis annum haud excedere, reliquum corpus, à cervina forma, colore & agilitate nihil differt: timidissimum & maximè fugitivum est, inhospita asperrimorum montium tesqua incolens, & ex solitudine montana in campos rarissimè descendens, & quamvis plures regni regiones inhabitat, lapides tamen Bezoardicos non omnes gignit. Omnes enim regiones quas incolunt capri-cervæ non ferunt herbas, ex quibus depastis lapides creduntur generari, vel qui generantur non omnes æquè nobiles sunt, hinc in quibusdam locis nulla ex prædictis bestiis datur ætate provecta, quæ lapidem non contineat, cum in aliis extra Larensē Provinciam, ex centenis, vix una sit, quæ lapide dotetur, eoque ut plurimum exigui valoris: in hircis lapides majores & frequentius inveniuntur quàm in fœminis: lapidem ferre judicantur annosi, valdè macilentis, colla habentes longiora, qui gregem præire gestiunt, circumspectius incedunt, & insidias magis, atque sodes, metuunt, quod idem de fœminis affirmabant

Autori ductores ibidem loci. Omnes Bezoardici non æque æstimantur boni ; notam legitimi lapidis profitentur , si volæ manus cinere aspersæ , vel cretâ oblitâ affrictus , lineam inducat luteam , vel ex luteo viridantem : Hæc illis Lydius est , quo veritatem simul ac bonitatem explorant ; Acus candentis admissio , quæ Cl. *Schrodero* placet , fallax bonitatis testis est : quia si adulterini ex resinosa construuntur massa , acum utique admittent ; legitimi vero plerique ita indurati sunt , ut acum candentem respuant. Quos Cl. *Kämpferus* in natali monte comparavit , & genuinos esse novit , vix candentis acûs vestigium recipiunt , sed tactu ignis dissiliunt : Neque est nota , addit , factitii lapidis , si interiores laminæ deterioris substantiæ & coloris fuerint : ea enim ex diversitate alimenti disparitas provenit , dum genitrix bestia locum pastus mutat. Pro genuino habet eos , qui inter resinæ & lapidis substantiam ita ambigunt , ut contusi in acido nitri , vel salis spiritu dissolvantur , ac menstruum colore satis rubente simulac virtute suâ imbuant ; ex lapidis raritate & pretio facillè colligitur , bezoardicos quibus in pharmacopœis Europæi utuntur , non esse Persicos , vel ex eorum numero , qui à capris bezoardicis *Pasen* nomen fortiuntur , sed vel ex aliis animalibus , vel sub alio cœlo degentibus depromptos & suppositos. *Occidentale* venit etiam ex capri-cerva , nulla tamen cornua gerente ; nascitur in Peru , dicitur *Vicumiras* seu *Taraguas* , in iis locis animalis , ut de priori dictum , invenitur , circa rem heterogeneam in cavitate media contentam tunicatim concretus ; Orientalibus ut plurimum major ; superficie scabrâ , colore cinereo , albo , nigro , obscurè virente , qui optimus. Gall. *Bezoar*.

BEZOAR ANIMALE , est hepar & cor viperarum ficatorum & pulverisatarum.

BEZOAR MINERALE , est præparatio antimonii sudoriferi , cui attribuitur virtus , quæ bezoar orientali ascribitur , unde nomen.

BEZOARDICUM , est Medicamentum alexipharmacum venena & malignitates expellens. Derivatur nomen à Lapide bezoar. B. *Gen tegengift*. G. *Wider-gift*. Gall. *Contre-poison*. A. A. Antidote.

BIBENELLA , & BIPENULLA , Idem quod *Pimpinella*,
Bi.

BIBITORIUS MUSCULUS, five rectus, *Oculum adducens*, positus in majori angulo oculi, ortus ex foramine orbitæ irregulari, antèrùs bulbo implantatur, sic dictus, quod introrsum nasum versùs oculum ducat, bibentescque cantharum inspicere cogat. B. *De drinkspier*. G. Der Sauffer Mausz. Gall. *Muscle Adducteur*. A. The drinking muscle.

BIBLIOTHECA, quasi βιβλίονθήκη, librorum theca; βιβλίον autem significat plantam, quæ papyrus dicitur, quâ olim chartæ conficiebantur.

BICEPS MUSCULUS, hoc nomine gaudent duo musculi, quorum unus est Tibiam, alter Cubitum movendo dicatus: qui Tibiam movet oritur uno capite in tuberositate ossis Iſchii, altero in inferiori & exteriori parte femoris, & inferitur in Epiphyſi superiori Fibulæ. Qui autem Cubitum movet, oritur uno capite à processu coracoideo, altero à cavitate clinoidea scapulæ, inferitur Ulnæ parti anteriori. B. *De twee hoofdege spier*. G. Der zweyköepfige Mausz. Gall. *Muscle biceps; ou jumeaux; celui du bras peut être appelé Coraco-Radial, par rapport à ses attaches*. A. The Muscle with two heads.

BICONGIUS, est mensura duodecim sextarios continens, dicitur continere viginti quatuor libras vini.

BILIS, est duplex, vel quæ in hepate mediantibus glandulis exiguis segregatur, vel in vesicula fellea: utraque per ductum Cholidochum in intestinum duodenum exantlatur, ut ibi ciborum ulteriori perfectioni inserviat, & fæces à secretionē chyli relictas foras convehat. *Bilis* chemicè examinata constat ex sulphure, sale volatili & pauca aqua, Ordinario flava utraque est; tamen quæ in vesicula continetur est profundius flava, spissior, amarior, quàm quæ ex Hepate continuo destillat: Et prior tantum copia, compressu externo, contractione fibrarum irritatarum in musculosa vesicæ tunica, excernitur; è contra verò hepatica dilutior, pellucidior, blandior, jugi fluore stillat; & solis actionibus circumductorum humorum, & respiratione expellitur; utraque hæc bilis humor est saponaceus, abstergens, olea aquæ miscibilia redens, resinas, gummi, tenacia quæque resolvens, attenuans, homogenea faciens, si cum his conteritur; nec alcalica est, nec acida, sed oleo, sale, spiritibus inprimis

mis concrevit aqua dilutis, non combustilis, nisi siccata prius, hæc tamen bilis cystica plus, hepatica minus præstat; unde diversitas quædam videtur in his. *Præter ordinem* verò Vitellina, Porracea, Æruginosa, vel Glauca est, quæ colorum diversitates solummodo ex spissitudine varia, & mora in cavo communi contracta expullulant. Bilis igitur est liquidum ex sanguine secretum, neque Bilis dicitur, nisi quando à sanguine segregata fuerit; ideoque Veterum sententia de humore bilioso, inventa circulatione sanguinis, prorsus corrui, vide *Humores sanguinei*, *Celso* Fel. *χολή ξανθή*, aut *κροκοειδής, γλυκὺ*, quasi dulce à contrario sensu, cum sit amarissimum, testibus *Plinio & Aureliano*. B. *Gal.* G. Die Gall. Gall. *Fiel*, *Bile*. A. The Gall or Bile.

BILIOSUS, dicitur, præsertim Veteribus, qui multâ bile abundat, & hinc ob temperamentum illud in quosdam inclinat morbos; sed qui nostra inspiciat fundamenta, aliter videbit, bilem quidem deficere, sed bonam nunquam abundare. B. *Gal-agtig.* G. Gifftgallig, der viel Cholerische Feuchtigkeit hat. Gall. *Bilieux*, *cholere*. A. Bilious or Cholerick.

BILIS ATRA, Idem quod *Melancholia*.

BIOLYCHNION, est calor natus qui à parentibus factui communicatur, ipsumque deinceps comitatur; verum postea cum in lucem editus est, hic calor sensim perit, postquam pueri spiritus & sanguis ab alimentis & aëre nitroso, alterantur, rescinduntur, mutantur. Nugæ sunt eorum, qui affirmant calidum hoc perennare; Nam si calidum sit, in continuo partium attritu & motu erit, ergo ut cæteri ignes & calores, dispellitur, ex *βίῳ* vita, & *λύχνῳ* lumen. B. *De ingeboren warmte*. G. Eingeboren Warmte. Gall. *la chaleur naturelle*. A. Nativa heat.

BIPINELLA, sive **PIMPINELLA**, est herba, cujus folia binis ordinibus plumatim sive pennatim digesta sunt, unde nomen. Vide *Pimpinella*.

BISLINGUA est *Hypoglossum*, seu *Laurus Alexandrina*, sic dicitur, quia supra ejus folium insuper foliolum habet linguæ instar.

BISMALVA, sive **ALTHÆA**: est officinarum vox barbarica. Vult dici, quasi duplex malva, vel quæ alterum tantum viribus pollet. Vel dicitur quasi malva ibiscum, vel malva viscum. Vide *Althæa*. Bis-

BISMUTHUM, idem quod *Marcasita*.

BISTACIUM, mutato B in P. fit *Pistacium*.

BISTORTA, Est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, longa, satis ampla, & acuta, Patientiam referentia, magis viridia in superiori, quam in inferiori parte, ex his erumpunt caules rotundi, parva quædam folia habentes; calix monophyllus, membranaceus, geminus; unus alteri suppositus, instar vaginæ; ex fundo hujus pedunculus oritur, cujus deinde fini adnascitur flos monopetalus, in segmenta profundissime sectus, & staminibus octo præditus, in densas & longas spicas congestus; in fundo hujus floris invenitur ovarium triquetrum, instructum tubâ longâ, continens post maturitatem semina triangularia, & splendentia; radix est carnosa quasi tuberosa & geniculata seu nodosa, oblonga, pollicem crassa, in se contorta, capillitio donata, foris ex fusco nigricans, intus ex flavo rubescens, saporis austeriusculi, adstringentis, odoris nullius; crescit in locis humidis; voluerunt quidam illam esse Britannicam veterum, sed hujus radix est tenuis, cum illa Bistortæ sit satis crassa, folia tamen utriusque satis benè inter se conveniunt: dicitur *Bistorta*; ob radicem semel aut bis contortam: dicitur etiam *Serpentaria*, *Colubrina* & interdum *Dracunculus*, vel *Dracontium*. B. *Herts-tongé*. G. Nater-wurtz. Gall. *Bistorte*. A. Bistort, Snake-weed.

BITUMEN, dicitur omne corpus, quod igni admotum faciliè flammam concipit, naphthâ atque Petroleo spissius, lentum valdè, tenacitate tamen primò adhuc diffuente; ab ignis calore liquefit, in aqua non subsidet nec miscetur; sive tum minerale, vegetabile, vel factitium fuerit, unde nomen generale est.

BITUMEN JUDAICUM, vide *Asphaltos*.

BLÆSITAS, est depravata locutio, à vitio linguæ, in conformatione aut obstructione peccantis. B. *Lispen*. G. *Lispeln*. Gall. *Begayement*. A. *Lispe*. Vide *Balbuties*.

BLÆSUS, est vitium in verborum prolatione. Item is cui pedes sive crura extrorsum vertuntur: vel cui dorsi spina anteriùs vel posteriùs incurvata est. Paralyticum quoque significat, à *βλαίσω* distorqueo. B. *Lisper*. G. *Der dauluvelt*. Gall. *Begue* A. That stammreth in speaking, or *Lispeth*.

BLAP.

BLAPTISECULA, vide *Cyanus*.

BLAS, est nomen ab *Helmiontio* confictum, significans generaliter astrorum motum localem & alternativum; sed quid ipse per illud vocabulum significat fortè nescivit, saltem nos nescimus.

BLATERONES, ex *βλάττειν* derivatur. Est autem nomen piscis inutilis, ut sunt blaterones homines, multa, sed inutilia dicentes.

BLATTA, Vermiculus est, quasi blapta, ἀπὸ τοῦ βλάττειν, id est nocendo, quia libros, ac vestes erodit. Hinc blattaria herba, quæ blattis scatet.

BLATTA BIZANTIA, sive UNGUIS ODORATUS, est alicujus conchilii integumentum: Odore suavi, colore fusco, figurâ oblongâ instar unguis.

BLATTARIA, planta est verbascum referens, differt tantum ab eo, quod ejus fructus sit magis rotundus, caules habet rectos, fortes, in ramos divisos; folia ejus sunt longa, verbasco angustiora, acuta, in margine incisa, non lanuginosa, coloris viridis nigricantis, in parte superiori splendentia, odoris ingrati, saporis amari; floris in quinque partes divisi, odori parum, pedunculis villosis adhaerentes; his floribus succedit divisus in eorum locum fructus, qui includit semina minima; nigricantia; radix rapum refert, est alba, dura, aliquantulum fibrosa: hæc invenit nomen hoc Latinum, à colligendis in se blattis: nam si alibi reponitur, vel projicitur, dicunt plurimas blattas super ea colligi. Alii à *βλάττω* noceo, quia blattæ vestimenta rodunt, & perforant. B. *Motten-kruid*. G. Schaben-kraut, Motten kraut. Gall. *herbe aux mites Blattaire*. A. Mothmulleyn.

BLENNÆ, est mucus crassus per palati foramina & nares destillans, qui provenit ex glandulis membranæ Schneiderianæ, investientis internas nares, cavitates ossis maxillæ superioris, sinus frontales, ossisque cuneiformis. B. *Snot*. G. Putzen, Notz, der unflat durch die Nasen: Gall. *Morve*, *Morveu*. A. Snot.

BLEPHARIDES, idem quod *Cilia*.

BLEPHARON, vide *Palpebra*.

BLEPHAROXYSTUM, instrumentum est, quo palpebræ raduntur & concinnantur, in Trachomate, sive asperitudine callosa palpebrarum interiorum, ex *βλέφαρον*, & *ξύειν* tondeo;

Βλέφαρον

βλησπισμὸς, incontinens est corporis jactatio, ex βάλλω, jacio.

BLITUM, est planta, cujus duæ species dantur generales, una alba, altera rubra, harum singulæ adhuc dividuntur in duas alias, blitum album majus habet caulem album, ramosum, quatuor circiter pedes altum; folia Betæ instar sed minora; flores sunt parvi, tribus staminibus constantes; ex calice tripartito surgentibus; pistillum autem abit deinde in semen plerumque oblongum, in capsula vesicæ æmula, quæ calix floris fuit, reconditum: radix est longa, pollicem crassa, saporis insulsi, ut tota planta: blitum rubrum majus, sive blitum nigrum, cum præcedente omninò convenit, differt tantum à colore; & quod ejus folia plerumque sunt minora; datur & blitum album minus, & blitum rubrum minus, refrigerantis & humectantis virtutis, quæ ab insulso fatuoque sapore nomen habet: à Gr. βλάξ, quod bardum aut stupidum denotat. Gr. βλίτον stolidus, ignavus. B. *Majer*. G. *Majer*, Meyer. Gall. *Blette*. A. *Blite*.

BOA, papularum morbus est, cum maculis rubentibus corpus rubet. Idem quod *Papula*. B. *Roodehout* / *roodjong* / *roodbank*. G. *Hitz-blatterlein*. A. *Pimples*.

BOCHETUM, sive **DECOCTUM SECUNDARIUM**, est alicujus decocti secunda decoctio. B. *Reindcr-drank*.

BOCIA, est vas vitreum ventricosum cucurbitæ instar. B. *Gen buik-glas*. G. *Bauch-glasz*. Gall. *Verre ventru*. A. *Bellied glassé*.

BOCIUM, idem quod *Bronchocèle*.

BOLBOCASTANUM, vide *Bulbocastanum*.

BOLBONAC, vide *Bulbonac*.

BOLBOS, vide *Bulbus*.

BOLETUS CERVI, *Fungus cervinus*, *Tuber cervinum*. Crescit in sylvis ubi cervorum copia est. Sunt rotundi, magnitudine ferè pilæ palmaris, & aliquando minores, cortice obducuntur subnigro, intus continent materiam pulverulentam nigerrimam. Βολίται nomen habent teste Marcello, ἀπὸ τοῦ βῶλος, gleba & λίαν valde. B. *Herts-wannen* / *Herts-spongie*. G. *Hirsch-brunst*, *Hirsch-schwamm*. A. *A Mushroem spawn*, *slime of the Hart*.

BOLUS, est Medicamentum internum, habens consistentiam, melle paulò crassiorē; & quantitas quæ unicâ dosi præscripta buccâ commodè excipi potest. **B. Een bȳok.** G. Ein bisßen, mundvoll, brocken. Gall. *Bolus*, *Morceau*, *une bouchée*. A. A Bolus.

BOLUS, Terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus Martialibus imprimis imprægnatum. Estque Armena, Orientalis, Germanica, Bohemica, alba &c. in omnibus linguis *Bolus* appellatur. Gr. βῶλος gleba, ager, à βῶω pasco & λῖαν valdè, quod è glebis pabulum animantibus uberrimè efflorescat.

BOMBAX, **BAMBAX** & **PAMBAX**, synonymia sunt, hinc nobis (sed malè) **Boom-wol** / nam arboreus tantùm frutex est. Hinc porrò **Bombazhne Wambais** / &c. sic fortè appellatur, quia more vermis bombycis, fructus ejus intus cotè, in modum serici, est quasi nendo obductus. Vide *Xylon*. **B. Kattoen** / **Boom-wol**. G. Baum-wol. Gall. *Cotton* A. Cotton.

BOMBUS, idem quod *Borborygmus*.

BONA, vel **BOONA**, est *Faba*, seu *Phaseolus*. For-
tè nomen sortitur à Belgico idiomate *Boone* : vel à Latino Bonum, quòd legumen illud benè nutriat, hominique brutoque salutare & bonum.

BONIFACIA, idem quod *Laurus Alexandrinā*.

BONUS GENIUS, est *Peucedanum* : à Græcis Prophetis ἀγαθὸς δαίμων, fortassè ob eximias vires, vel ob prognostica boni ominis, quæ ex illo divinare putabant.

BONUS HENRICUS, est lapathi vel Chenopodii species : planta scilicet, quæ plures caules habet pedem circiter altos, crassos, multis foliis triangularibus cinctos, quorum quædam atriplici, alia aro similia sunt, sed alba & farinosa, longis pedunculis adhærentia ; flos est apetalus, constans plurimis staminibus ex calice multifido surgentibus : pistillum autem abit in semen orbiculatum, planum in capsula veluti stelliformi, quæ floris calix fuit, reconditum : radix est longa, crassa, in plures ramos divisa, coloris flavi instar patientiæ : sic ob vires laudabiles appellatur : fortè ejus vires primùm à quopiam Henrico detectæ fuerunt : ideoque *Tota bona* & *Aureum Olus*. Gr. χρυσοδάχτυλον. **B. Algoede** / **Goeden Wendzik** / **Lamme-licus** oir. G. Guter Heinrich, Schmerbel. Gall. *Toute bonne*, *Bon-Henri*. A. English Mercury. Bō

BORAGO est herba, quæ habet caulem rotundum, debilem, excavatum, tenerum, ramosum, setis quasi obductum, terram versùs inclinatis : folia ex radice erumpentia, ampla, oblonga, aut ferè rotunda, villosa, parum acuta, tactui aspera, plerùmque repentia : flores in summitate caulis nascuntur, cærulei, vel albi, pulchri, visui grati, monopetali, rotati, ex cujus calice multifido oritur pistillum, media floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina veluti viperini capitis æmula, nigra, quæ in calice ipso longè ampliato maturescunt : radix est crassa, digitum longa, succum viscosum & crassum continens, insipidum : *Borago* mutato B. in C. est *Corrago*, quia putatur cor ejus plantæ usu roborari, & lætificari. B. *Bernagie*. G. Boretich, burretich. Gall. *Bourrache*. A. *Borrage*.

BORAX, est sal factitium ex sale Armoniaco, Nitro, Tartaro calcinato, Sale communi, Alumine, quæ cum urina liquantur, filtrantur, & tandem evaporantur. Sunt qui putant originem habere ex stabulis in quibus Elephantæ aluntur, quæ urina eorum & stercoribus imprægnata sunt. *Dioscorides* dicit habere porri colorem, sed nostrum album est, instar nitri : fortè à Porro nomen mutuatum, mutato P. in C. Gr. *χρυσόκόλλα* sive auri gluten. B. *Borag* / *Goud-soudeersel*. G. *Borras*, burretz. Gall. & A. *Borax*, *Boras*.

BORBORYGMUS, est murmur in intestinis amplis cum sonitu, ortum à flatu incluso, à *βορβορύζω* strepitum edo. B. *Beslote winden*. G. Ein Gemummel, Getösz. im Leibe. Gall. *Brùt*. A. Murmuring of the guts.

BOROZAIL, aut *Zail* Æthiopum; in viris *Asab*, in sceminis verò *Affabatus* dicitur. In utraque ora fluvii *Senna* multa sunt regna, præsertim in ea quæ meridiem spectat, Regnum *Mely*, in ea quæ septentrionem regnunt *Tombotu*. Ibi grassatur morbus, partes genitales potissimum infestans, diversus ab eo quæ vulgò *Gallicus* dicitur, qui ex immodica venere, cui multum obnoxii sunt, ortum habet.

BOSCI SALVIA, herba est à Boscum, vel Boscus, *bois*, in quibus locis crescit.

BOSMOROS, seu **BOSPOROS**, est frumenti species,

fortè, à βοσχω pasco, & μέρος portio : quia frumentum dentibus vel molâ dividitur : vel quia à bobus calcando à paleis separatur, βῆς, & βῶς dorice est bos, vel etiam ex βῆς & πείρω transadigo, transeo.

BOTANICA, est ea scientiæ naturalis pars, quæ docet structuram, vires, & usum plantarum, easque certâ methodo in suas classes & genera distribuit; hinc *Botanicus*, dicitur, qui hanc scientiam tractat. Gr. à βοτάνη herba, gramen. B. *Kruid-kenning*. G. Kraut-kennung. Gall. *la Botanique*. A. Botany or simpling.

BOTHOR, sunt pustulæ oris non serpentes, sed tales quæ faciliè suppurantur & delentur, etsi nonnunquam leviter eas suppurare contingat. Estque *Bothor* generalis appellatio etiam pustularum faciei, pulmonis & aliarum partium. Variolæ ac morbilli etiam *Bothor* ab Arabibus nominantur & pro vesiculis pustulisque oculis adventantibus sumuntur.

BOTRYS, est racemus uvarum vitis; ut & Herbæ nomen, quæ sic à semine vocatur, quod racematim ramulis adnascitur; sive quod plura ejus semina caulibus sic conferta pendeant, ut racemi in uva referant imaginem, à Cappadocibus, ἀμφοροσίαν vocari author est *Dioscorides*. B. *Wuiven-kruid / Piment*. G. Trauben-kraut, Krottenkraut. Gall. *Pimen*. A. Oake of Jerusalem.

BOUNIAS Gr. βυνίας, species Napi, cujus radix in rotundum crescit, ac βένις, seu verrucosa loca amat.

BOVINA FAMES, idem quod *Bulimia*.

BRABYLA, prunorum species est; sic dicuntur quia alvum ducunt, quasi βόραν βάλλοντα, id est, cibos depellentia, & ἥλα quasi μέλα, id est mala.

BRACHERIUM, idem quod *Anima*.

BRACHIA, Gr. βραχίονες, sunt plantarum, præcipuè autem arborum rami, quod instar brachiorum hominis extendantur. B. *Boom-armen*. G. Der Ast. Gall. *Branches des Arbres*. A. Branches of trees.

BRACHIALE, idem quod *Carpus*.

BRACHIÆUS, vide *Brachium*.

BRACHIUM, sive **LACERTUS**, est membrum constans brachio propriè dicto, cubito & manu. Forte à βραχίον sive βραχύτερ τοῦ λοιπῆ τοῦ χειρῶν, brevissimus reliquæ partis manuum. Unde *Brachiaeus Musculus*. B. *Den Arm*.

Arm. G. Der Arm. Gall. *Le bras.* A. The arm.

BRACHYLOGIA, vide *Brachylogus*.

BRACHYLOGUS, est qui suas sententias breviter determinat. *Brachylogia* est brevis locutio. Ut sunt *Aphorismi Hippocratis*, βραχὺ breve, & λέγω dico. Vide *Aphorismus*.

BRACHYPNOEA significat frequentius brevem, & simul ex longis intervallis factam spirationem.

BRADYPEPSIA, est tarda in ventriculo Ciborum concoctio, orta ex defectu salivæ, liquoris gastrici, fibrarum ventriculi laxitate, pituitâ viscidâ abundante, motu corporis & respiratione imminutis: ex βραδὺ tardum, & πίνω coquo. B. *Æen langsame koking der mage.* G. *Langsame kochung des Magens.* A. Slow digestion.

βραχυπνῶται, ex βραχὺς, brevis, & πίνω, bibo, qui parum, & rarò bibunt. Plerumque sunt phrenitici, qui ad potûs necessitatem non attendunt.

βραχύπνοοι, ex βραχὺς, & πνέω, spiro, brevis spiritus, qui parum, & rarò spiritum ducit.

BRANCA, est vox Italica, & significat pedem: sic vocatur *Acanthus*, *Branca ursina*: ideoque à similitudine quam ejus folia cum anterioribus urforum pedibus habent.

BRANCHUS, est raucoedo faucium, & asperæ arteriæ. Raucitas *Plin.* Ravis *Plauto.* à βράχω forbeo. Vide *Raucoedo*.

BRASSICA, est planta, quæ habet caulem humilem, crassum, cortice duro obductum, substantia medullosa repleto, saporis acris subdulcis: folia in initio erumpentia sunt ampla, obrotunda, fragilia, rubicunda, succulenta, rugosa, incisa, sinuosa, caulibus longis & crassis adhaerentia, plerumque convoluta, nervosa, foliis in parte inferiori decisis, altera superioris partis sibi invicem accumbentia & comprimentia, formant magnum caput obrotundum: flores quadrifidi & cruciformes, tetrapetali, ex quorum calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum, seu siliquam teretem, longam, cylindraceam, septo intermedio, cui valvæ imbricatæ utrimque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque foetam subrotundis; radix est crassa, multas habens fibras. Gr. κρόμη; nomen accipit à præfeca, quod ex hujus scapo

minutim præsecatur, siquidem nunc tonsili, nunc cynoso caule spectatur: Non desunt, qui brassicam contendunt ἀπὸ τοῦ βράζειν, à vorando nomen accepisse, Estur enim à tota Plebecula tum cocta, tum cruda, vel muria condita. Non desunt qui Brassicam, quasi *Passicam* nominatam referunt, quòd ex caule minutatim præsecatur, ut passa fiat. Vide *Crambe*. Hæc planta dividitur in tres species, 1°. Est quæ folia clausa, & dicitur capitata, 2°. Quæ folia explicata habet, 3°. Brassica cauliflora dicitur. B. *Stool*. G. Kohl. Gall. *Choux*. A. Colewort.

BRASSICA MARINA, vide *Soldanella*.

BREGMA, est os sincipitis, figurâ quadrangularis antèrè interuentu futuræ coronalis conjunctum ossi frontali, posterius interuentu futuræ lambdoideæ connexum ossi occipitali, laterali unâ parte intercurrente futurâ sagittali connectitur cum suo pari cognomine, altero latere cum osse temporum, à βρεγμα madefacio, quia illa ossa infantibus, & sæpe adultis humida & tenera sunt. B. *Oet opper hoofds-been*. Gall. *Os Parietal*.

BREVE VAS, dicitur vas à ventriculo venosum in ramum venosum lienarem transiens. B. *Oet horte vat*. G. Das kurtze gefæß. Gall. *Vaisseau bref ou court*. A. The Short vessel.

BREVIS CUBITI MUSCULUS, est musculorum cubiti extensor secundus dictus & brevis. Oritur ab humeri cervice, posterius miscetur cum Longo & humeri os occupat, desinit verò in illam Olecrani partem, cui innitimur. B. *De horte elleboogse spier*. G. Den kurtze Ellenbogen Mausz. Gall. *Le muscle court extenseur de l'avant bras*. A. The Short muscle of the Elbow.

BRITANNICA, est Herba, quam dicunt in convallibus locis propè Arcem *Bretten* reperiri, unde nomen deducunt. Sed malè: neque, à britannica insula deduci debet ut nonnulli statuunt. Sed est vox origine Frisicâ: Medetur quippe gingivis sanguinolentis in scorbutico malo, quando dentes vacillant, consumuntur, atque decidunt. Venit itaque à vocibus *Britten* en *Brit*, quod sonat *firmiter claudere* vel *inherere*, ut dentes sanis in alveolis solent, deinde additur *Tan*, & unius litteræ adjectione *D* fit *tand*: & *Hica* significat dentium expulsionem: hinc nostris *Hik* sive singultus, quia illa convulsionis species cum flatu expellitur.

BRI-

BRIZA, est frumenti species, ex quo panes conficiuntur: dicta hæc planta ἀπὸ τοῦ βρίζειν, quod est onerare, aggravare, & quasi Vetro sopire; quod hujus panis esu evenire, scriptum reliquit *Galenus*.

BROCHI, sunt labiones, sive qui magna & inordinata labia habent: Item laquei Chirurgici genus.

BRODIUM, est liquor in quo Medicamenta vel aservantur vel diluuntur. Item expressus succus ex materia cocta. v.g. ex Capone.

BROMOS, est frumenti species: dicitur βρώμος & βρόμος non à fœtore, sed potius quia veterina eâ multum vescantur, vel à fragore, sonituque, quem seges matura, minime tacta flatu, edit. Alii βρόμος legunt à βρώμα, quod cibum significat. Vocatur aliquando *Avena*.

BRONCHIA, sunt asperæ arteriæ, seu fistulæ respiratoriæ ramificationes; quæ ex annulis cartilagineis & membranis contractilibus componuntur: quæque primò in ramos, dein in ramulos innumeros divisæ, desinunt in minimas illas vesiculas, præcipuam pulmonum substantiam conficientes, quæ ramulis racemorum instar adhærent. à βρόγχος, guttur. B. De longe pppjes. Gall. *les Bronches*.

BRONCHOCELE, est tumor in larynge aut Broncho vel glandula Thyroidea, apparens, ortus ab humoribus in folliculis adiposis stagnantibus, vel ab aëre emphysematis speciem referente, à βρόγχος media pars asperæ arteriæ, aut κόλη tumor. B. Gurgel-geswel / Uecl-schwur. G. Gurgel Geschwulst. Gall. *Broncocele*, ou Gœtre. A. A tumor in the throat.

BRONCHOTOMIA, est asperæ arteriæ, in membrano-fa ejus parte, quæ est intra duos annulos, sectio; usus est in angina caput laryngis occupante, ad suffocationem inhibendam, ex βρόγχος media pars asperæ arteriæ, τέμνω seco. B. Een openinge in de longe-pijp / stroot-snee. G. Eröffnung der Gurgel. Gall. *Broncotomie*; *Section du gosier*. A. Acutting of the wind pipe.

BRONCHUS, est asperæ arteriæ portio media, fistulosa, ex annulis incompletis, sive non perfectè rotundis anteriùs constructa; posterius per membranam musculosam connexis, ubi in rotunditate deficiunt; superior pars *Larynx*; inferior *Vesicularis* dicitur: infervit voci & respirationi, à βρέχω vel βρώχω sorbeo, jugiter enim ad sanguinis

nis accensionem aer absorbetur. B. *Het middelste deel der lucht-ader / lange-pijp.* G. Die Gurgel. Gall. *Gesier.* A. The wind-pipe.

BRUCHUS, à *βρύχω*, comedo, vermis est herbas, & arborum frondes rodens. Dicitur aliis *βρύχου*, à *βρύχω*, frendo, strideo.

BRUNELLA, est planta, quæ habet caulem minimum, repentem, lanuginosum parum, angulosum, coloris purpurei : folia oblonga, villosa, rubicunda, saporis viscosi aliquantulum amari : flores in spicam squammatam, densam, brevem congeruntur, habentque galeam erectam, integram, cavam, longam, in superiori parte in decem labiis dissectam : semina obrotunda in capsula, quæ flori tanquam calix inservit, inclusa : radix est parva, fibrosa; crescit hæc planta in sylvis & montibus. vid. Etymon in Prunella.

BRUSCANDULA, vide *Lupinus*.

BRUSCUS, vide *Ruscus*.

BRYGMUS, est dentium inter se collisorum stridor & strepitus ortus à motu convulsivo musculos maxillæ inferioris occupante, observandus in Epilepsia, similibusque morbis convulsivis. *βρυγμός*, B. *Het knerssen der tanden.*

BRYON, est muscus, à *βρύειν* pullulare, quia muscus ex arborum corticibus expullulat. Vide *Muscus*.

BRYONIA, dicitur à *βρύειν* pullulare, quod in adjacentes scandens latè pullulet : videtur derivari à *βρύον* uva : vel à *βρύειν* germinare : uvas enim profert, & plura & longa germina, Gr. *Ἀμπέλου λευκή, ψιλαθρον.* *Vitis alba* dicitur, non quod vitis sit, sed quod in vitis similitudinem, juxta parietes proserpat, claviculisque ubique adhæreat : *Viticella* idcirco quoque nomen est : ut & *Psilothrum*, quod ejus acinis coria depilari possint, planta est quæ habet caules exiguos, ramosos, teneros, villosos, intra parvum tempus in magnam altitudinem crescentes, scandentes, plantas vicinas amplectentes : folia vitim referunt, sed minora, aspera, albescencia : flores sunt monopetali, campaniformes, albi, exigui, patentes, quinquifidi, ora radiatim expansa, calice tenacissimè comprehensi, proprio calici adnati ita, ut unum corpus esse videantur, quinque staminibus præditi ; alii flores similes innas-

cun-

cuntur ovario supra apicem ejus calice instructum. Ovarium innatum fini pedunculi, est bacca rotunda, vel ovata in initio viridis, sed post maturitatem rubicunda, succum flavescensem saporis ingrati habens, in qua hærent semina plura ovata & acuta; hujus ovarii apex coronatur calice & flore hermaphrodito simili flori masculino, sed minore: radix longa, crassa, tuberosa, carnosâ, albida, flavescens, quasi fungosa, intus circulis donata, saporis acris mordacis, amaricantis; nauseabundi, odoris virosi, dum recens est, mitior fit, dum senescit: observatum est ad triginta annos vivere, & radicem ad hominis crassitiem excrevisse; crescit in aqua, & locis uliginosis, si radix est bifurcata, tunc illam sæpe pro Mandragora vendunt, cultro faciem fingunt, & in superna parte insigunt granum hordei, quod deinde crescens, emittit radices tenues quæ pilos capitis referunt. *B. Quartel-besien / wilde wyngaart. G. Stick-wurtz, Schisz-wurtz, Rasz-wurtzel, Hunds-Kuerbs, Rœmische Ruebe, wilder Zitwan, Teufels kirsz. Gall. Bryone, feu ardent, Colubrine, Couleuvrée, vigne blanche. A. Bryony.*

BRYOPTERIS, seu **DRYOPTERIS**, est filix querna alba, musco quercino innascens, à *ῥέον* muscus quercinus, & *πτέρις* filix, folia enim alarum in modum habet explicata, à *πτέρυξ* ala.

BRYTON, est cerevisia; à *ῥέω* germino, pullulo, quia hordeum, ex quo cerevisia coquitur, prius pullulare, & germen emittere debet.

BUBONIUM, seu **INGUINALIS**; sic dicitur quia bubones, seu tumores inguinales sanare dicitur, à *βούων* enim est inguen, & tumor in inguinum glandulis.

BUBO, est inguen, sive locus à flexu femoris ad pubem. Item tumor p.n. in inguinibus, à lue venerea, vel peste excitatus, hærens in glandulis inguinalibus vel inflammatis, vel suppuratis, vel scirrhis à *βουβωνιάω* bubone laboro. *B. Tasbuil / las-klier / pest-buil / venus-buil / klap-ooz. G. Drusen, Schlier, Wachs-drusen, Knüttel in collo si fuerit. Ein Schlier. Gall. Un bubon, Poulain. A. Boile.*

BUBONOCELE, est *Hernia* sive *Ramex inguinalis*, hoc est quando intestina per processum peritonæi dilatatum, juxta decursum vasorum spermaticorum, in inguina de-

labuntur & tumorem p.n. constituunt : Nonnunquam pro bubone sive tumore in inguine sumitur, ex *ἑσῶν* inguen, & *κῆλη* tumor. B. *En zwellling in de lies / bzeuk / Darm-scheursel / lies-bzeuk*. G. Ein Bruch in den Gemächen, vel untertheil des Leibes. Gall. *Hernie inguinale, ou descente dans l'Aine*. A. A rupture.

BUCCA, Gr. *Στόμα, Γνάθος, Κόρρη*. Dicitur oris pars laxior, quæ inflando tumet, uti apparet in Tubicinibus. B. *De mond / het hol der kaken*. G. Die backen. Gall. *Bouche*. A. Thecheeke.

BUCCINATOR, est musculus buccarum rotundus, circuli instar, tenuis & membranofus, variis fibris intertextis ori tunica inseparabiliter succinctus. In hujus centro observavit *Casseri*us robustum quoddam vinculum exterius enatum, & os genarum perreptans, ubi in musculum quendam parvum & gracilem buccæ directè oppositum terminetur. *Oritur* à superiori maxilla, *inferitur* in inferiorem ad gingivarum radices. *Ufus* est buccas cum labiis movere : Estque dentibus instar manus, dum huc illuc ad dentes cibos propellit, quo exactiùs comminuantur. B. *De Kaak-spiet*. G. Der Backen-mauß. Gall. *Muscle Buccinateur*. A. The Muscle of the cheek.

BUCCINUM, BUCINUS, & BUCINUM, est flos regius, sic dicitur à similitudine tubarum, quæ buccinæ dicuntur.

BUCCULA, est carnosâ sub mento pars. B. *De onder-hin*. G. Unter-backe. Gall. *Petite bouche*. A. The under-chin.

BUCEROS, est sœnum Græcum : sic dicitur quia ejus filiquæ Bovis cornu referant, ex *βῆς* bos, vacca, & *κίρας* cornu.

BUCRANION, est *Antirrhinon*, sic dictum, quod ejus florum anterior facies, bovis capiti similis sit. Ex *βῆς* bos, & *κεφαλή*, caput, cranium.

BUGLOSSUM, Est planta quæ habet folia longa, & mediocriter ampla, villosa, aspera, coloris viridis fusci, splendentis : caulis ad altitudinem unius vel duorum pedum assurgit, setis quasi cinctus, in parte superiori dividitur in plures ramusculos, ex quibus nascuntur flosculi rubri, cærulei, vel albi, qui sunt monopetali, infundibuliformes, & multifidi, ex quorum calice ad basin usque

que secto, surgit pistillum, infimæ floris parti ad instar clavi affixum, & quatuor veluti stipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem semina viperini capitis æmula, quæ in calice ipso longè ampliato maturescunt; & saporis sunt amygdalarum: radix est longa, obrotunda, digiti crassitie, intus alba, extus nigra; tota planta habet succum viscosum: dicitur & lingua bovina: est species Boraginis: ex *ἔξ*, bos, & *γλῶσσα* lingua, quia folia hujus plantæ figurâ & asperitate suâ linguam bovinam imitantur. **B. Osse-tong.** G. Ochsen-zunge. Gall. *Buglosse*. A. Bugloss.

BUGULA, BUGLUM, BUGLA, Est planta, quæ habet duos caules, unus flores habet & est quadratus, alter tenuis & repens est; bini aliquantulum lanuginosi: folia habet oblonga, satis ampla, majora origano, mollia, aliquantulum in margine incisa, saporis subdulcis, postea amari & adstringentis: flores in spica verticillatim oriuntur, labio brevi staminibus ornato, inferiori trifido, mediâ parte procumbente bifidâ & majore: semina obrotunda, in capsula, quæ flori tanquam calix inservivit, inclusa: radix fibrosa, saporis adstringentis: datur & altera species Bugulæ, quæ dicitur consolida media Genevensis: est herba vulneraria, ideoque consolida media dicta. Nonnulli vocem derivant à Buglossa. B. *Zegezoen / ingzoen.* G. Guntzel. Gall. *Bugle ou consoude moyenne*. A. Bugule.

BULAPATHUM, est *Lapathum bovinum*, sed potius *magnum*, quia particula *βυ* est intensiva. Vide *Lapathum*.

BULBI, Gr. *βολβοι*. Fortè à *βυ* & *λαβειν*, quod ob crassitiem facilè,prehenduntur: vel à *βάλλειν*, quia facilè, globuli in modum projiciuntur. Suntque radices rotundæ, tunicatæ, quales sunt cæparum, tuliparum, hyacinthorum &c. Etiam ad alias radices vox illa transfertur, nempè ad radices tuberosas, ut glandes terrestres, bulbocastana, solani tuberosi & Chrysanthemi tuberosi &c. radices: radix bulbosa vocatur, quando plurimis constat lamellis vel membranis carneis sibi invicem parallele impositis; quæ deinceps maximam partem in folia explicantur, ex quorum medio floriger caulis exsurgit, quæ omnia in autumnno pereunt, sed in medio gemmam relinquunt, quæ remanet, & in qua jam tunc nova futura existit planta, quæ sequenti vere radices suas emittit, caulem, folia, & flores explicat; ut in prædictis plantis

videre est ; imò in hujus nucleo medio jam hæret planta anni tertii : hoc cum tuberosis radicibus bulbosa commune habet, quòd citra gemmam mediam, unam, vel plures minores relinquat gemmulas (prout in magis vel minus fertili luxuriat solo,) quæ sequenti plerùmque anno novas fibrillas emittunt, & sui juris factæ matrem deserunt, & propriis præfunt muneribus. *B. Bollen / klisterg.* *G. Kolb-wurtzel kein runde Wurtzel.* Gall. *Racine ronde, Bulbes.* A. Bulbs or any root that is round.

BULBINA, & BULBINE, videtur diminutivum à *Bulbus.*

BULBOCASTANUM, Est planta, quæ habet folia tenuissimè divisa, ad seseli accedentia, sed saporis debilioris, cauli longo purpureo adhærentia; flos, semina, & umbella ad seseli quoque accedunt; radix est bulbosa, nigra cute obductâ, carnosa, edulis, extus nigra, alba intus; pro bulbo habet quasi nucem castaneam, hinc nomen dicitur Italis pancafeole, ex pane, & caseo, quia nutrit instar panis & casei. Ex βολβος bulbus & κασάνα, Castanea, glans castaneam enim sapit; vocatur etiam glans terræ. *B. Ward-noten / Muizen met staarten / Ward-akers.* *G. Erd-nusz, Erd-kesten, Schafernusz, Erd-eychlen, Grund-eychlen, Acker-eychlen, Erd feygen.* Gall. *Glands de terre, Terrenoix.* A. Kepper nut, Earth-nut, pignut.

BULBONAC vel **BOLBONAC**, est herba, *Lunaria* sive *viola Latifolia* dicta: sic dici putat *Lobelius* à radice tuberosa seu bulbosa. *B. Penning-kruid / Penning-bloemen.* *G. Mondt-viole, Mondt-kraut.* Gall. *Lunaire.* A. Sattin or glonesty.

BUBONIUM, vide *Aster.*

BULBASPODELUS, est *Asphodelus bulbosus.*

BULBUS, vide *Bulbi.*

BULIMIA, idem quod *Bulimus.*

BULIMIASIS, idem quod *Bulimus.*

BULIMUS Aurel. *Phagadana*, *Edacitas præter consuetudinem* Horationo. βέλιμος Plut. in Symp. Galeni, βελιμία, βέλροσις. Plut. Hom. φαγιδαινα. Estque fames aucta nimis; cui sæpè lipothymia comitantur, *Bovina* dicta: oritur aliquando à ventriculi fermento nimium acri, & quacunque acrimonia huc delata, vel vermibus, vel actionibus corporis validis, & fibrarum ventriculi & Intesti-

testinorum robore summo, unde tunicæ membranacæ & nervi irritati animal remedium, alimentum, sibi appetit, ex βῆς bos, five ut aliis placet ex particula βῆ, significationem augente & intendente, & λιμὸς fames. B. *Noe-honger / een onverzadelijkē honger / razende honger / eet-zucht.* G. Al zu großer Hunger, Kuehe-hunger. Gall. *Appetit devorant.* A. An unsatiable hunger.

BUMELIA, est *Fraxinus bubula*, vel ut aliis placet, *Fraxinus magna*: ex βῆς bos, aut ex βῆ particula augendi, & μελία vel μελία *Fraxinus*.

BUNIAS, five NAPUS, significat radicem tuberofam, crassam & magnam, à similitudine collum, terræque tumorum, quos Gr. βενιδὼν appellant.

BUPHTHALMUM, est planta, quæ habet caules ad altitudinem unius vel duorum pedum crescentes, tenues lanuginosos: folia alternatim incisa, lanuginosa, dentata, tanacetum minoris similia: flos est radiatus, ejusque discus ex plurimis flosculis folio imbricato inter se distinctis componitur, corona verò ex semina flosculis, embryonibus insidentibus, & calice squammoso comprehensis: embryones autem deinde abeunt in semina plerumque tenuia & angulosa: radix est dura & lignosa: dicitur etiam *oculus bovini* seu *Cotyla fatida*. Vocatur sic, quia ejus flores oculi imitentur formam & boum potissimum oculis similes sint. B. *Noedil / Noeog / stinkende kermille / Padde-bloem.* G. Krotten-dill, Hundsz-dill, Hundsbloom. Gall. *Oeil de bœuf, Espergoute.* A. Oxe-eye, May-weed.

BUPLEURON, est planta, quæ habet caulem nodosum, in ramos divisum: folia sunt oblonga, satis ampla, rigida, dura, nervosa, acuminata, auriculæ leporis satis similia, & alterno ordine cauli adnata: flos est rosaceus, umbellatus, quinque petalis constans in orbem positus, & calici insidentibus; is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum, oblongis, hinc gibbis & striatis, inde verò planis; crescit hæc planta in locis montosis ad sepes, & in dumetis. Videtur componi ex βῆς bos, & πλεῦρον costa, quasi diceret bovis costa: dicitur & auricula leporis. Gall. *Perce feuille, Oreille de Lievre.*

BUPRESTIS, Gr. βῆπρησις, insectum est de genere cantharidum, in arbore pinu degens. Dicitur ex βῆς, bos, & πρησῆς, qui incendit, ex πρηθω, quod si bos cum pascuis

pascuis illud animal devoraverit inflammatione perit, & tumore abdominis.

BURSA PASTORIS, est *Thlaspi* species, quæ habet folia oblonga, incisa instar erucæ, repentia: caules sunt exigui, ramosi, in alas divisi, folia habentes, quædam integra, alia profundè incisa: flores parvi, albi, juxta caules ordinati, quadrifidi, cruciformes sunt; post florem sequitur fructus triangularis, compressus, bursam referens, divisus in duo loculamenta, continentia semina exigua, ferè obrotunda, nigra: radix est longa, alba, fibrosa, saporis subdulcis & ingrati: crescit hæc planta in omnibus locis incultis: sic dicitur, quòd ejus folliculi seminales Bursam pastoriæ apprimè referant. Hinc etiam *Pera pastoris* vocatur. B. *Herders-tag / Teskens-kruid / Worskens-kruid*. G. Tasschen-kraut. Gall. *Tabouret ou Bourse à Berger*. A. Shepherds purse.

BURSALIS MUSCULUS, est *Obturator* femoris internus, sic dictus quia tendines quadruplices junctos intra carnosum veluti marsupium, à tertio & quarto quadrigemino, eleganter formatum abscondit. B. *De brugs-spier*. G. Beutel-mausz. Gall. *l'Obturateur interne*. A. The inward Obturator.

BUSELINUM, est *Daucus vulgaris*, quasi diceret *Selinum bovinum*, id est *magnum*.

BUTOMON, est graminis arundinacei species, quæ habet caules rectos, crassos, politos, æquales: folia graminea, triangularia, ex radice erumpentia: caulis est nudus, in hujus capite umbella sustinetur vel flos polypetalus, rosaceus: floris pistillum abit in fructum, qui constat conjunctis arctissimis vaginulis, quæ plurima semina plana, oblonga, exigua, recondunt: radix est crassa, alba, nodosa, fibrosa: hæc planta crescit in locis aquosis, præsertim in pratis vel circa mare: dicitur & *Platanaria*: sic dicitur, quia avidè à bobus expetitur; vel quia valdè scindit, ex βῆς bos; vel βς particula augens, & τίμων seco. B. *Witt / gras*. Gall. *Jonc fleuri*.

BUTYRUM, Gr. βῆτυρον, quasi βῆς, seu bovis, τυρός, caseus, vel coagulum: pars est lactis pinguior ab ipso multâ agitatione & conquassatione secretâ: A. Chemicis hoc vocabulum translatum est ad liquores oleosos ex mineralibus paratos, uti ex Antimonio & Mercurio sublimata.

limato simul destillatis fit *Butyrum Antimonii*. B. *Bo-
ter*.

BUXUS, Est arbuscula, cujus truncus sæpe instar fe-
moris crassus, lignum est durum, compactum, & flavum:
folia sunt oblonga, minima, dura, obrotunda, crassa, po-
lita, semper viridia, splendentia, odoris penetrantis satis
grati: flores minimi, herbacei, tribus vel quatuor stami-
nibus constantes, è fundo plerumque tetragono calicis fo-
liati surgentibus; embryones autem in aliis ejusdem plan-
tæ locis oriuntur, abeuntque in fructus ollæ inversæ quo-
dammodo æmulos, in tres partes apice dehiscentes, in
tria loculamenta divisos, seminibusque foetos in capsula,
cartilaginosa, vi elasticâ munita, reconditis, hæc semina
sunt fusca, longa, splendentia à Gr. *πύξω*, mutato nem-
pe P. in B. venit à *πυκνίζω* densò, nam densum habet lig-
num. Hinc quoque *Bruscus* & *Ruscus*. B. *Palm / Bog-
boom / Bux-boom*. G. Buchsz-baum, Buxbaum. Gall.
Buis, Bouis. A. Boxtree.

BYNE, est *Maltum*, sive hordeum madefactum, &
germinans, quod postea siccatur, an à *βύω* & *γῶω*, quia
humore impletur? B. *Mout*. G. Maltz. Gall. *Moulture*,
Brais. A. Malt.

BYSSUM, **BYSSUS**, est lini præstantissimi species.

C.

CACABUS seu **LEBES**, est vas terreum vel cupreum
majus, stanno intus obductum, quod climactere su-
pra ignem suspendi solet, in quo Medicamenta coquun-
tur. B. *Gen Ketel*. G. Eine Pfanne, Kessel. Gall. *Mar-
mite, Chaudron*. A. A Kettle, Caldron or Basin.

CACATORIA FEBRIS, est febris intermittens, (sic
dicta Clarissimo *Sylvio de le Boe*) cum alvi dejectione
multa vel frequenti, & quandoque simul torminosa, di-
verso accessus tempore ægros valdè affligens, ac debili-
tans: etiam *Catarctica* & *Dejectoria* vocari potest. B. *De
hak-hooze*. G. Scheis Fieber. Gall. *Pièvre avec devoie-
ment*. A. The purging fever.

CACHECTICUS, est qui cachexia laborat. B. *Zug-
tig / die in een quaat vel steekt / Wangedaantig*. G. Der
Col-

Coller tufer feuchtigheit Aerkel. Gall. *Cachectique*. A. one of an ill constitution, and habit of body.

CACHEXIA, est malus corporis habitus, ex humorum vitiosorum dispositione mala, nutritionem corporis proinde depravante, ortus, unde febres lentæ, tabes, hydrops &c. contrahuntur: in cachexia facies sæpe pallida & mali coloris est, corpus tumidum & inflatum: Cachexia latè sumpta cum εὐεξία opponitur, ac ut bonus habitus omnibus partibus sanis communis est, ita malus habitus ab omnibus malis propagatur. Strictè *Cachexia* tantum sumitur pro mala dispositione in habitu corporis; *Euexia* verò pro humorum sive sanguinis pariter & corporis dispositione bona accipitur. Cachexia pro causâ agnoscit, vel liquidi nutrientis depravatam indolem quamlibet, vel vitium vaporum recepturorum, vel defectum facultatis applicantis. Ex κακός malus & εἶς habitus. B. *Ongedaantheid / groeue ziekte / wanstal / wangedaante*. G. Ubele und böse leibs beschaffenheit. Gall. *Cachexie*. A. disposition, or an ill state of body, A distemper.

CACALIA, sive LEONTICE, est planta Tussilagini vel Petasitidi non abfimilis, quæ habet folia magna, ferè rotunda, crassa, in margine incisa, angulosa, lanuginosa, inferius alba, Petasitidem referentia. Ex his exurgit caulis villosus, medullosus, in suprema parte in ramos divisus: flos est flosculosus plurimis petalis constans, quadrifariam divisus, embryonibus insidentibus, & calice veluti cylindraceo comprehensus: Embryo autem abit deinde in semen oblongum pappi instructum: radix fibrosa, minimi digiti crassitie: crescit in montibus: an ex κακόν malum, & λίαν valde? Quia fortè agris & campis invisâ est.

CACOA, est fructus arboris, magnitudine amygdali, colore fuscus, tenui membranâ conclusus. Tota autem filiqua in qua concluduntur magnitudinem habet cucurbitæ oblongæ mediocris fortis, desinit in acumen, uti inter περιήλια mea videre est. Quatuor ejus species recensent, unde & quatuor species fructus recensentur; prima & secunda species vocantur, *gros & petit caraque*; tertia & quarta species vocantur *gros & petit cacaos des Isles*. Venit ex variis Americanis locis, & Guatimala &c. Adhibeturque loco monetæ, pauperibusque pro Eleëmofyna datur,

datur, parant ex hoc tum potum Indis vulgarem, tum massam hanc *Chocolatam* dictam, (& potius hoc nomine venit) quæ fit ex dictis granis tostis & tufis ac aromatibus mixtis. Vide *Chocolata*.

CACOCHYMIA, est humorum in sanguine vitiosorum, abundantia: ex degeneratio sanguinis, feri, vel lymphæ à salubri sua conditione: veteribus dicitur pro varia dispositione, *ulcerosa, biliosa, pituitosa, melancholica, acida, falsa, pontica* &c. Sed vocabula hæc ob inutilitatem à veris Neotericeis irridentur, ex κακός pravus, & χυμός succus, humor, à χύω vel χύνω fundo. B. *Itwaat sappigheit / quade voedzaamheit / quaadbogtigheit / quaadbloedigheit*. G. Boësz Schwartz Geblue. Gall. *Cacochymie*. A. Cacochymie or an abundance of ill humours in the body.

CACOCOLIA, est bilis malè disposita, ex κακή mala, & χολή bilis. B. *Quade gesteldheid der Gal*. G. Ubele beschaffenheit der Gallen. Gall. *Indisposition du fiel*. A. Indisposition of the gall.

CACOCHYLIA, est depravata Chylificatio. Ex κακός malus, & χυλός, Chylus, succus. B. *Quade gylmakinge*. G. Boëse Dæwung. Gall. *chilification vitiée*. A. Depraved Chyle.

CACOËTHES, CHIRONIUM ULCUS five **TELEPHIUM**, est morbus, vel ulcus curationem respuens, quod ulcus malignum vocatur, hoc fit cum ulcus fuerit callosum vel sinuosum, cui nonnunquam ossicula decedentia & cariosa subjacent, ex κακόν malum, & ἥθος mos, consuetudo, est enim ulcus vel morbus mali moris. B. *Een quaad-aardige swær*. G. Ein boësz geschwær. Gall. *ulcere malin*. A. An evil ulcer, A Boil, vel fore.

CACOPATHIA, est mala passio, ex κακός malus, & πάθος passio. B. *Quade dzift*.

CACOPHONIA, est mala vocis prolatio, ex organorum vitio proveniens, ex κακώς malè, & φωνήω voco. B. *Quade uitspraak der woorden*. G. Der Schwær zu sprechen hat. Gall. *Difficulté en parlant*. A. A bad pronunciation, or an ill sound.

CACOPRAGIA, Gr. κακοπραγία, à κακός malus, & πράττω, facio. Est sæpè depravatio viscerum nutritioni famulantium.

CA-

CACORYTHMUS, pulsus est arteriarum, nullum ordinem servans. Dicitur etiam *Arythmus*, ex κακός malus, & ῥυθμός, ordo. B. *En ongelijke pols*. G. Ungleich flagende pulsz. Gall. *Le Poulx inegal*. A. An unequall pulse. Vide *Arythmus*.

CACOSPHYXIA, est pulsus vitiosus, ex κακός malum & σφύζω pulsō, salio. B. *En quade pols*. G. Ubele pulsz. Gall. *Le poulx mauvais*. A. A bad pulse.

CACOTROPHIA, est nutritio depravata ex sanguinis vitio : Ut in Lepra, Impetigine &c. ex κακός malum & τροφήν seu τε'φω nutrio. B. *Quade vording*. G. Das Ungedeyen. Gall. *Mauvaise nutrition*. A. Bad nourishment.

CACTOS, est Cardui species : cur ita dicatur, haud facile dixerim. An κακός quasi κατακτών, παρὰ τὸ κατὰκτείναν interficere, occidere, quod pappi ejus noceant, nec periculo careant ? Certè Dioscorides inter plantas tales, & pappos Cactos recenset. Quidam à καίω uro, quia urit seu pungit.

CACUMINA, idem quod *Summitates*.

CADAVER, a cadendo, quod animā spoliatum corpus, in terram cadat ; ex ἱδ. Gall. *Cadavre*.

CADMIA, vide *Lapis calaminaris* : Tutia etiam idem fortitur nomen. Arab. *Climia* vel *Chlimia*, vide *Tutia*.

CADUS, sive *Ceranium*, est Veterum mensura, continens vini centum & viginti libras ; olei verò centum & quinque.

CADUCUS MORBUS, vide *Epilepsia*.

CÆLESTIS, est IRIS, sic dicitur, quia iridi cælesti similis sit. Gr. ἑρνια.

CÆLI DONUM, est Chelidonium majus, sic appellatur ob egregias virtutes.

CÆLI ROS, est gramen Mannæ ; videtur Milii Sylvestris esse species.

CÆLI ROSA, & **CÆLI FLOS**, est *Lychnis Coronaria*.

CÆPA, **CEPE**, & **CEPA**, Est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, longa, angusta, fistulosa, acria : ex his nascitur caulis nudus, rectus, rotundus, fistulosus, in ventrem assurgens turbinatum utrimque : flos hexapetalus, in corymbum collectus, sphaericum : pistillum floris sit fructus subrotundus, trilocularis, foetus semi-

feminibus subrotundis, & nigricantibus : radix bulbosa, tunicata, orbicularis, odoris penetrantis & ingrati, saporis acris : Gr. *Κρόμμυον*, sic dictum quod oculi pupillam comprimere cogat : Nam oculos vellendo expressis subinde lachrymis contrahi pupillas certum est : quidam derivant à *κάρρα* caput, quia capitata : sed rectius à *κάρρα* pupilla, & *μύειν* claudere, comprimere. *Cepa* verò sic à capitibus magnitudine dicitur : Hinc derivatur Frisica vox *Ci-pels*. B. *Ajuin / Eujen*. G. Zweybel. Gall. *Oignon*. A. Onion.

CÆSAREA SECTIO, idem quod *Hysterotomotecia*.

CÆSAREUS PARTUS, vide *Partus Cæsareus*.

CALAMINARIS LAPIS, reperitur sæpius in metallorum fodinis; est lapis fossilis, subflavus, non admodum durus, dum accenditur fumum eructans : cujus usus insignis, dum additus Cupro, suum regulum cum eo miscet, illudque colore eleganti flavo donat, quod orichalcum vulgare est : in medicina magni quoque est usus. Dicitur & *Cadmia*. B. *Kalamint-steen / Kalmyp-steen*. G. Galmey, Galmey-stein. Gall. *Pierre Calaminaire ou Calamine*. A. Calaminare-stone.

CALAMINTHA, CALAMINTHUM, est Menthæ species, quæ crescit ad altitudinem circiter unius pedis, in plures ramos divisâ angulosos : folia sunt obrotunda, parum acuta, villosa, aut aliquantulum lanuginosa, sibi invicem alternatim opposita : flores nascuntur in pedunculis ramosis ex foliorum alis, coloris purpurei, galea obrotunda, bifida : semina nigricantia, oblonga, in capsula, quæ flori, tanquam calix inservivit, inclusa : radix fibrosa; tota planta habet odorem aromaticum & gratum : crescit in montibus. Dicitur quasi utilis Mentha : namque nido serpentes fugat. Ex *καλή* utilis, pulchra, & *μένθα* seu *μενθα*, Mentha. Aliis placet ἀπὸ τοῦ κάλιν quod lignum significat, à *καίω* uro. B. *Water of reid Mente*. Gall. *Calament*.

CALAMITA, nempe *Styrax*, sic vocatur, quia in calamis excipitur & asservatur.

CALAMAGROSTIS, & CALAMOGROSTIS, est gramen arundinaceum; ex *κάλαμος* virga, calamus, & *ἄγροσις* graminis species.

CALAMUS, *Arundo* : dicitur *παρὰ τὸ καλῆς ἀμῶσθαι*, quod
L pul-

pulchrè demetiatur arundo. Gr. Δόναξ, ἀπὸ τοῦ ῥᾶον δεινίσθαι, quòd facile à vento moveatur. B. **Riet.** G. Rohr. Gall. *Canne*, *Roseau*. A. A reed.

CALAMUS AROMATICUS, quid sit, dubitatur. Alii *Acorum* volunt, alii *Galangam*. Garzias dicit esse Aromaticum quidem, non verò odoratum, imò & juncum esse duntaxat. Seritur per universam Indiam: Neque odoratus est nisi è terra evulsus: quantoque viridior, tanto tetriori odore tetrior, teste eodem Garzia. Dicitur & Calamus odoratus Indicus, Alexandrinus, &c.

CALAMUS SCRIPTORIUS, est dilatatio quædam circa cerebri ventriculum quartum, quæ deinde in mucronem exacuitur, & ab hac figura nomen obtinuisse videtur. B. **De schryf-pen.** G. Schreibfeder. Gall. *ventricule du Cerveau en forme de plume*. A. A Writing pen.

CALATHUS, est rectus turbo; hoc est, id quod ex angustis in latitudinem se diffundit. Calathi effigiem planè liliorum flores referunt.

CALCANEUM, idem quod *Calx*.

CALCARIS FLOS, est FLOS REGIUS, sic dicitur, quod ejus flores quodammodo calcaria referant.

CALCEOLUS D. Mariæ, SACERDOTIS, MARIANUS, est Alismatis species, cui in medio floris aliquid concavum, instar calceoli apparet.

CALCHOIDEA OSSICULA, idem quod *Cuneiformia ossicula*.

CALCINATIO, est misti per ignem, aut res corrodescentes, (per Mercurium, aquam regiam &c.) in calcem solutio. B. **Kalkmaking / kalkbænding.** G. Kalkmachung. Gall. & A. *Calcination*.

CALCINATIO PHILOSOPHICA seu SPAGYRICA, est, cum cornua, ossa, aut ungulæ, super aquam ferventem per aliquot horas suspenduntur, donec omnem mucilaginem amiserint & facile in pulverem tundi queant. B. **Philosoophse Calcinatië.** G. Philosophische brennung. Gall. *Calcination philosophique*. A. Philosophicale Calcination.

CALCULUS, est præter sanitatem in corpore humano lapidosa concretio, quæ sæpe in renibus, vesicis, aliisque in partibus, ex particulis salinis & terrestribus concretis generatur. B. **Steen.** G. Blasenstein. Gall. *Pierre de la vessie*. A. Stone in the bladder.

CAL-

CALDARIUM, Idem quod *Laconicum*.

CALENDULA, nomen accepit, quod singulis ferè calendis floreat : sed alii putant, quòd sit corruptum nomen à Caltha, seu Calthula. vide ibi. B. *Gouds-bloem*. G. Ringel blumen. Gall. *Souci*. A. Marigold.

CALENTURE, est nomen morbi cujusdam peregrini, quo navigantes versùs Indiam occidentalem infestantur, dum tropicum appropinquant, & consistit in depravata imaginatione, cum pulsu debili, æquali, lento, absque febre & calore excedente.

CALIDUM INNATUM, vide *Emphytum thèrmum*, aut *Biolychnium*.

CALLICREAS five PANCREAS, est Glandula conglomera, magna, plana, carnei coloris sub ventriculi parte posteriore collocata, transversim à duodeno, versùs lienem extensa : longitudinem habet trium aut quatuor digitorum in homine ; & juxta alios octo vel novem quasi digitorum transversorum, & latitudinem digitorum duorum, vel duorum cum dimidio ; crassitiem unius digiti ; figuram ad linguam caninam accedentem, latiore propè duodenum, angustiore versùs lienem, tenui membranâ à peritonæo investitur : habet ductum excretorium ex multis minoribus conflatum, qui terminatur in homine juxta ductum communem biliarium in intestinum duodenum, quatuor vel quinque digitis infra pylorum, & ut plurimum eodem orificio cum ductu Cholidochæ : ex cuius ductu lymphæ volatilis & insipida effunditur : Verum *Sylvius de le Boe* cum Discipulo suo *de Graaf* succum acidum & subacidum, quandoque austerum & dulcem invenisse se dicunt, inde quoque originem ferè omnium morborum deducunt : Sed sciendum hoc fortasse fuisse observatum ; cum vix unus ex centum hominibus exactè sanus reperiatur. De hac quæstione vide Anat. nostr. Ref. Usus est, succo suo volatili chylum subacidum & bilis amarorem temperare, saponaceâ suâ vi omnia miscere, subigere, & volatilizare, ut tandem dulci sapore venas lacteas subeat & ascendat. Componitur, ex καλόν pulchrum, & κρέας quasi diceres carnem formosam. B. *Albleis / groote klier / heel-bleis / Buik-klier-leecke*. G. Die große drüse. Gall. *Le Pancreas*. A. The sweet, taste, all flesh, sweet-bread, the pancreas, or the Birr.

CALLIGONUM, Idem quod Polygonon. Ex καλὸν pulcher, κάλλιον melius, & ὄνομα genu, quia geniculata est herba.

CALIX, **CALICES**, sunt oculi five gemmæ florum prodromi, ut oculi Populi arboris: Vel est pars floris posterior, crassitudine quâdam notabili à pediculo distincta, flores vel involvens, vel sustinens. Vide *Alabastrum* & *Perianthium*.

CALLIONYMUS, est lilium convallium, ex κάλλιον melius, & ὄνομα nomen.

CALLITRICHUM, seu **POLYTRICHUM**, est herba capillaris, dicta quod capillos pulchrè tingat. Ex καλὴ pulchra, & ῥιζ capillus, vide *Polytrichum*.

CALLUS est durities in cute, absque sensu, orta à vasis minimis nimio labore compressis, consolidatis in formam solidi. Item est substantia circa ossium fracturas genita, ossea, sed mollior, effusa huc ex vasis materiam osseam naturaliter vehentibus, & fragmenta ossium fractorum connectens. Gr. πῶμα, πώσις, τὸλ. B. *Gen weere* / eelt. G. Dicke haut, schwiele an Füssen. Gall. *Callus*, *Durillon*. A. An hardness in the Skin.

CALOMELAS, est Mercurius cum Sulphure diu tritus, & in corpus nigrum redactus, cujus nomen derivatur à καλὸς pulcher & μέλας niger, ob colorem, & virtutem eximiam in purgando, aliisve casibus, ubi Mercurii usus requiritur.

CALOR NATIVUS, vide *Biolychnium*.

CALTHA, Est planta, quæ habet caules tenues, parum angulosos, villosos, ramosos, fungosos, viscosos parum: folia oblonga, integra, cauli adhærentia, carnosa, mollia, villosa, albescentia, satis ampla: flores discoidei, radiati, rotundi, magni nascuntur, coloris aurei, saporis fortis & grati, corona verò ex semi flosculis componitur embryonibus insidentibus, & calice comprehensis: Embryones autem abeunt in capsulas plerumque incurvas & marginatas, semine foetas ut plurimum oblongo: radix lignosa, fibrosa: dicitur & *Calthula*, quam vocem deinde corrumpentes officinæ in *Calendulam* immutarunt. Quamquam verisimile etiam sit, sic nominatam esse, quod omnium mensium Calendis, fruticare comperiat. Atque hinc fit quod nonnulli florem omnium men-

menſium appellent. B. *Gouds-bloem*. G. Ringel-blum. Gall. *Souci*.

CALVA, *Plin.* Calvaria. *Celfo*, Cranium, κρένιον, quòd cerebrum integat quaſi κρένιν id eſt Galea, πόλιν, κήγιν *Lycocr.* σκάρφιν *Ariſtoph.* κῦτιν, eſt integumentum capitis oſſeum. Vide *Cranium*. B. *Het hoofſcheel / pan van 't hooft / bekkeneel / hooftſchotel / herzen-bekken*. G. Hauptschedel, die Hirnſchale. Gall. *Crane*. A. The Scul. Item pars capitis capillata ſuperior, quæ à morbo vel ſenectute primo calveſcit. B. *De krume / bleſ*. G. Das oberſte des haupts. Gall. *Le Sommet de la tête*. A. The top of the head.

CALVARIA, Idem quod *Calva*.

CALVITIUM & CALVITIES, apud Græcos vocatum eſt φαλάκρωσις, & μαδάρωσις, quòd quidem vitium nihil aliud eſt, niſi depilatio capitis, potiſſimum ſyncipitis, ætate hominibus adveniens. B. *Kaal-voofdighheid*. G. Eine kahle, glatze. Gall. *Chauveté ou Calvitie*. A. Baldneſſ.

CALYPTRA, eſt involucrum tenue quorundam ſemini, illa incluſa tenens à καλύπτω occulto. B. *Het zaadſhuyſje*. Gall. *Coiffe ou enveloppe*.

CALX, *Plauto*. CALCANEUM, *Virg.* Item πτέρια, Σκέλις, eſt ſecundum os tarſi in pede, reliquis magnitudine & robore præſtantius, oblongum & verſus poſteriora protenſum, ut ei firmius homo inſiſtat, nec lapſu ſacili retrorſum concidat. B. *De verſenen / de hiel*. G. Die verſen, unter theil des ſchenckels. Gall. *Le Talon, le Calcaneon*. A. The Heel bone.

CALX, Chymicis quoque dicitur quilibet pulvis, per humiditatis ablationem, in partes tenuiſſimas ac velut impalpabiles redactus, idque intelligendum eſt de *Metallis*, *Mineralibusque* corroſis, iterumque calcinatis, ut de calce ſalis, antimonii, &c. ſicque nonnulli lapides in calcem comburuntur, ſicuti noſtrum cuique notum. Nec non *Vegetabilium* cineres; qui ſunt ſubſtantix terreoſalinx, & *Animalium* cornua, oſſa, &c. per ignis torturam partibus humidis, & volatilibus ſpoliata, à nonnullis nominantur *Calces*. B. *Kalk*. G. Kalck. Gall. *de la Chaux*. A. Chalce, Lime.

CAMARIUM, vide *Fornix*, ex καμάρα fornix, teſtudo.

CAMAROSIS, est cranii ictus, in quo ossis portio aliqua, in testudinis formam, suspensa relinquitur, estque quintuplex: 1. Cum frangendo os unum deprimitur, & alterum elevatur. 2. Quando os absque fissura deprimitur, quod infantibus proprium. 3. Est contusio, in qua margines sunt depressi & ossis medium in fornix speciem elevatum, remanente inferius spatio vacuo. 4. Depressio semet sponte elevat eo tempore cum os adhuc sit membranaceum, atque plectri speciem conservat donec ossificari incipit. 5. Quando tabula secunda est depressa, & prima semet in priorem statum reducit, à καμάρα testudo. B. *Derwerffel-bruch*. G. Hirnschal-bruch, Gewelbruch. Gall. *fracture du crane*. A. The Skull broken and become like a vault.

CAMBIUM, est humor secundarius secundum *Avicennam*, cujus usus erat, partes nutrire: primus dicebatur humor *Ros* sive *Innominatus*: Secundus, *Gluten*: & tertius, qui proximè in alimentum convertebatur, *Cambii* nomine veniebat: Sed ea figmenta, inventa à nobis circulatione sanguinis per tubulos, planè concidunt. Nisi per *Rorem* intelligas Chylum, per *Gluten* particularum quietem, & per *Cambium* Chyli assimilationem.

CAMELINE, quibusdam *Myagrion*, fortè sic dicitur, quod à Camelis valde appetatur. κάμηλον enim est Camelus.

CAMELOPODIUM, est *Marrubium*, quasi diceret pedem cameli: ex κάμηλον camelus, & πῆς pes.

CAMERA OCULI, oculi cavitas à quibusdam distinguitur in duas cameras, in anteriorem, & posteriorem; Antica, Lentis & Processuum Ciliatum superficie à postica; cornæ autem concavitate ab antica parte terminatur, & per septum medium uveam puta, in duas alias minores dividitur, quæ per pupillam inter se communicant; harum anterior major est posteriore; postica verò cavitas, duobus, ut vocant, humoribus crystallino scilicet & vitreo, repletur. Gall. *Chambres de l'Oeil*.

CAMERATIO, Idem quod *Camarosis*.

CAMOMILLA, corruptè sed melius *Chamamelum*, vidè suo loco.

CAMPANULA, sic dicuntur plurimi flores, qui Campanulam referunt, vidè *Cervicaria*.

CAM-

CAMPORA & CAPHORA, Veteribus incognita : gummi est alicujus arboris in Sumatra propè Baros. Pro-cera arbor est & densa, ædificiis struendis perutilis; Cau-dex rectè ascendit : Ramos ordinatè explicat : folia sunt magna, carnosâ, antè acuta, camphoramque spiran-tia. Fructus formosi sunt avellanæ nucis magnitudine, oblongè rotundi, tenui tunicâ cincti, quæ rursum, instar nucum avellanarum, alteri tunicæ eleganti forma inclu-ditur, colore rubro, purpureo, flavo & viridi, integrum fructum contegit, & tulipæ instar superius sese aperit. Postquam arbor ista fuerit caphorâ dives, à foliis, cor-tice, & externo ligno spoliatur, usque ad medullam, quæ finditur, in qua caphora eleganti formâ, coagulata & crystallina reperitur. In China & Borneo etiam nasci-tur, sed in *Japonia* alia colitur arbor, quæ camphoram præbet, folio tenuiori, molliori, diutissimèque odorem camphoræ spirante; quæ est *Laurus camphorifera*, ar-bor sylvestris; in *Japonia* occidentali & adjacentibus insulis in lætam vastamque tiliæ magnitudinem adoles-cens, cujus descriptionem vid. apud *Kæmpferum* in ca-talogo plantarum Japonicarum. Ex radicibus quoque cinamomi caphora elicitur, quod habeo ex Viris fide dignis. Non nego tamen aliam hujus gummi esse ar-borem, fruticem aut plantam, nam ex ipsâ salvia prole-ctam vidi. Est gummi ex albo pellucidum, graveolens ex China, Japan, aliisque locis ad nos delatum : Om-nium optimum dicitur, quod ex Borneo venit, sed ob pretium nimium fortè huc non adfertur. Facile accen-ditur, & si conservetur in thecis apertis disparet. Cam-phora non est gummi, sed potius resina, alba, pel-lucida, odoratissima, volatilis, & tritu difficilis; de arbore propria, regionibus fervidissimis, intra lignum, maximè ad corticem habetur, uti dictum est, in propria sua naturali gleba crystallina. In Borneo & Ceylon om-nium præstantissima & pretiosissima. In Alcohole perfe-ctissimè solvitur, pellucidissimâ specie, & odoratissimâ. Destillans tunc tota ferè, unâ cum Alcohole, vel paulò post, volatilis est, in liquorem homogeneous adscendens. Simulac guttula hujus liquoris limpidissimi aquæ immit-titur, uno momento albescens tota Camphora iterum apparet in aqua, integrum suum corpus reddens; ita-

que heteroclitum hoc corpus resinam refert, sed volatilem; differt tamen ab aliis resinis in eo, quod solvitur in spiritu nitri, vitrioli, aqua forti, ut in Alcohole, unde affusu aquæ revertitur immutata Camphoræ materies. B. *Campher*. G. *Kampffer*, Gall. *Campbre*. A. *Camphire*.

CAMPHORATA, seu *Camphoratum*, est Abrotanum, sic dictum quod Camphoram oleat.

CANALES, sunt ductus rotundi, intus cavi, utrinque aperti, longi, per quos liquores transeunt: ut sunt ductus Salivales, Biliarius, Hepaticus, Pancreaticus, &c. Gr. *πῶγος*, ductus. B. *Kiolen/ buizen*. G. *Kanäle*, Rœhre. Gall. *Canaux*, *Conduits*, *Tuyaux*. A. Channels, or ditches.

CANALES SEMICIRCULARES, sunt tres canales ossei, semicirculares à forma dicti, quia nempe singuli in semicirculi modum curvantur; durissimi, cavitate ferè ellipticâ donati, aliquando cylindricâ; in medio autem curvaturæ angustissimi, hinc versùs orificia sensim dilatati, circa eadem latissimi, inæquales longitudines adeoque & magnitudines habentes, medio existente minimo, eandem ferè magnitudinem, figuram, substantiam, duritiem, fortiti in infante & in adulto; vestibulo à parte postica, exteriori, auriculam respiciente, appositi & continuati; membranulâ tenerrimâ nerveâ vestibuli hic continuatâ vestiuntur; sex horum canalium extremitates, non nisi quinque ostia conficiunt in vestibulo, cum unum ex illis commune sit duobus canalibus, majori scilicet & minori; minimus canalis duo habet orificia; quinque hæc orificia unita, una cum fenestra ovali, orificio scalæ superioris cochleæ, & quinque aliis minoribus foraminulis, nerveos ramulos transmittentibus, atque adeo per istos occlusis, vestibulum formant. Unde patet hos canales in vestibulum hiantes ejus cavum augere, quemadmodum cellulæ apophysios mastoideæ augment cavum tympani. Insuper fluidum elasticum in illis contentum, etiam per motum stapedis æqualiter cum fluido vestibuli comprimitur, relaxatur; & tremores sonori etiam possunt quam optimè per horum cava propagari, in eorum latera incurrere, reflecti; & sic sonus quam optimè colligi, conservari, roborari, & intendi, ut phænomena canalium oticorum

incurvorum quam optimè docent. Interim simul etiam per membranas nerveas molles, hæc omnia investientes, impeditur clangor. B. *Half ronde ringsgewijse gaten in 't ooz.* Gall. *les Canaux demi circulaires.*

CANALICULUS ARTERIOSUS, est vas inter arteriam pulmonalem & arteriam magnam in fœtibus, quod in adultis obliteratur: medius est inter has duas magnas arterias, & utrique continuatus: oritur ab anteriore parte pulmonalis, paulò antequàm illa subit aortam, seseque bipartitur; & priori pariter aortæ jam descendenti parti se inserit, paulò ultra eum locum, à quo subclavia sinistra abscedit: Nisi potius dicendum sit, arteriam pulmonalem in duos se dividere ramos, quorum anterior est canalis arteriosus, posterior pulmonalis ad pulmones tendens; canalemque illum cum aorta confluere in unum, indeque effici aortam descendente, tantæ magnitudinis ille canalis arteriosus est, ut propè æqualis sit tum pulmonali, quàm illa ultra eum pulmones petit; tum ipsi aortæ; quàm cum ea se conjungit. Usus in fœtibus est ut ex arteria pulmonali per canaliculum hunc sanguis in arteriam magnam exoneretur, ex eo quod sanguis, (quia fœtus in utero aërem non respirat) per pulmones collapsos, vasa nimis comprimentes, sive quæ vesiculas cingunt, vel in spatiis intermediis hærent, fluere non possit. *De slag-ader-lykke buis.* G. Der puls-ader kanal. Gall. *le Canal arterieux.* A. Arterious vessel.

CANCAMUM, Quidam Laccam esse putant, alii Animæ gummi. Dioscoridi est Arabicæ arboris lachryma, Myrrhæ quodammodo similis, virosi gustûs: quod ad suffimenta usurpant.

CANCER, vide *Carcinoma*.

CANCER, est species fasciarum, quæ capiti tegendo, inservit. B. *Treeft-band.* G. Krebs-windel. A. Crabswate.

CANCORUM OCULI, sunt lapides parvi, albi, duri, crustacei, rotundi, compressi, unâ parte convexi, alterâ planiores, cum sinu in medio excavati, concreti in ventriculis cancorum, saporis cretacei. B. *Treeft-oo-gen.* Gall. *yeux d'Ecrevisses.* A. Crabs Eyes.

CANDELA, est Instrumentum Chirurgicum, rotundum, oblongum, tenue, ex flexili materia constructum, cuius

cujus apex materiam corrodentem continet, quod meatu urinario penis immissum, carunculas consumit, vel absque corrosivo explorandis ulceribus vulneribusque infervit. B. *Ēen stoning-haarsje*.

CANDELARIA, seu CANDELA REGIA, est Verbascum, quod etiam φλῆξ, Flamma & Cereus appellatur, quod cerei in modum flosculis suis se erigat. Vide *Verbascum* & *Phlomos*.

CANDISATIO, foli competit saccharo, quod in aqua solutum, purificatum, atque quadantenus inipissatum, in crystallos concrefcit, idque candisari vocant. Imponunt autem solutioni nonnunquam res medicamentales solidas, ut crystallis illis saccharatis obducantur, easque confessionibus adnumerant. B. *Candelisering*. G. Kandelizirung. Gall. *Candisation*. A. Candying.

CANDUM, melius *Canthum*, saccharum dicitur in crystallos redactum, vulgo *Saccharum candi* sive *candum*, *canthum*, id est *angulosum*, *candidum*, *crystallinum*, *lucidum*. Estque saccharum depuratum, candisando in crystallinam formam sec. art. redactum, ad modum quo salia crystallifantur: Est pro viliori vel depuratori saccharo vel rubrum, vel album, à *κάνθος* angulus. B. *kanth-suiker* / *Stok-suiker* / quia bacillos ollis imponunt, ut nempe crystalli ex syrupo spissiori iis adhæreant. G. Zucker-Kandey. Gall. *Sucre Candi*. A. Sugar-candy.

CANELLA, vide *Cinamomum*. Videtur nobis derivari à Canna, hinc *Canula* & *Canella*; sunt enim cortices Cannam referentes.

CANICÆ, sunt furfures, vel potius farina secundaria, quæ ex furfuribus, & pane constat, hoc est cui flores cribro adempti sunt. Sic dicitur, quia canes iis pascerentur: hinc *Panis Canicaceus*.

CANICIDA, est Aconiti venenosi species: sic dicitur, quod canes exinde moriantur. Ex canis, & cædo: vel cedo.

CANINA BRASSICA, est *Mercurialis*. Græc. *Κοινα* *πράσιον*.

CANINA LINGUA, idem quod *Cynoglossum*.

CANINA MALUS, idem quod *Mandragora*.

CANINA SENTIS, idem quod *Cynosbaton*.

CANINA APPETENTIA, vide *Cynodes Orexis*.

CA.

CANINA RABIES, idem quod *Hydrophobia*.

CANINI DENTES, vide *Dentes* & *Cynodontes*.

CANIRUBUS, quasi *Rubus Caninus*, idem quod *Cynosbatus*.

CANIS CEREBRUM, est *Antirrhinum*, quia folliculi seminales canis capiti mortuo & osseo similes sint.

CANITIES, est mutatio capillorum in colorem album ante legitimam ætatem. Canities verò duplex adhuc est : altera quæ secundum ætatis cursum obvenit : altera verò quæ vitiosa, & morbosâ ab *Aristotele* nuncupata est. B. *Griseoid*. G. Grawe, oder weisse Haar. Gall. *Blanchifure de cheveux*. A. Grayhair.

CANNA & CANA, apud Hebræos *Kanech*, calamum significat, unde hoc nomen originem habere videtur.

CANNA MAJOR, idem quod *Tibia*.

CANNA MINOR, idem quod *Fibula os*.

CANNABINA, Habitus ejus est Cannabis, flos masculinus & staminibus constans in una planta : ovarium est capsula longa, trigona, fæta feminibus multis, ita vocatur, quia Cannabim refert : est Eupatorium Cannabi simile : Tournefortius ad Bidentem refert.

CANNABIS, Est planta, quæ habet caulem rectum, quadratum, unicum, villosum, asperum, excavatum, cortice filamentoso tectum : folia digitata instar manus apertæ, in quatuor vel quinque partes divisa, dentata, viridia, subfusca, aspera, odoris ingrati : flos apetalus est, comprehensus calice quinquifido, expanso, & stamina quinque habens, in una planta ; ovaria bicornia, conferta in caulibus, rotunda, testa dura, tenui, fragili, includentia semina globosa, parva, quæ sub tenui cortice ex cinereo spadiceo glabro includunt medullam albam, saporis subdulcis : radix est annua, simplex, lignosa, alba, fibris instructa : colitur hæc planta in pratis circa loca humida ; distinguitur in duas species, una est Cannabis mas, altera femina sive sterilis : quasi *Κάναβος* dicitur, quod circa fonticulos, sparsasque scaturigines, spontè & fata luxuriet ; *κάναβοι* enim fontes sunt, multiplici rivo sparsi, alii deducunt à canna, quia cannæ instar ejus truncus cavus sit, *Barbaris* & *Vulgo Canapus Sativa* Gr. *Σχοινοςρόπον*, quod magni in vita usûs sit ad robustissimos funes texendos. *Sylvestris*, Latini *Ter-*
mi-

minalem vocant. B. *Stennip*. Gall. *Chanvre*.

CANNULA, est instrumentum Chirurgicum, cylindricum cavum, utrimque apertum, cum manubrio, per cuius cavum cauteria actualia protruduntur & diriguntur, ne vicinas partes lædant exurendo; inservitque itidem acubus quibusdam, ubi foramen apertum relinquendum, veluti cum in ascitide aquam educere tentamus. B. *Canholpÿp*. Gall. *cannule*.

CANON, est instrumentum Chirurgicum, quo, mediante acu, vulnera hiantia consarciuntur: Est rectum vel curvum, pro varia vulnerum φάρει. B. *Can Stanon* / ob similitudinem. Item, *Can gevenstert naepÿÿpjen*. G. *Röhrlein*.

CANTABRICA PLINII, eam putant esse Scorsone-ram, in Hispania primum inventa est, per Divi Augusti tempora, idque à Cantabris, unde nomen retinuit.

CANTHARIDES, est insectum pedatum, alatum, vaginipinne, oblongum, muscæ majoris magnitudine, colore viridi, & aureo, lucente, reperiendum in frumentis, rosas, fraxinis, oleastris, in Italia & Hispania, saporis acris & corrodentis, cuius vis vesicatoria, quando cuti applicatur, est insignis, diuresin utcumque movens. B. *Spaansche Vliegen*. Gall. *Mouches Cantarides*. A. *Spanisch-flies*.

CANTHUS sive **HIRCUS**, est angulus oculi, qui vel major sive internus, vel minor sive externus. Gr. *κανθοι*. Quorum qui ad nasum sunt, *κρυτῆρες* & *πηλαι* appellantur, quod inde lachrymæ effluunt: & qui ad tempora, *παραπτεαι* Poll. *Nicandro*. B. *De oog-hoek / oogwink*. G. *Die Augen-winckel*. Gall. *angle ou coin de l'œil*. A. *The corner of the eye*.

CANTUM SACCHARUM, vide *Candum*.

CANUM CERASA, vide *Xylosteum*, est *Periclymeni* species.

CAPELLA, idem quod *Cupella*.

CAPHORA, idem quod *Camphora*.

CAPILLAMENTA, sunt filamenta illa tenuia, in solorum medietate surgentia: seu particulæ teretes & oblongæ, in capilli modum extenuatæ: vocantur & caudæ quæ nectendis sustinendisque capitulis inserviunt, interdum tam tenuia sunt; & ita petalis innata, ut vel non appareant,

reant, vel ex ipsis quasi petalis oriri videantur : cæterum diversius plerumque in quibuslibet florum speciebus affignatur locus, unde masculina organa suam sortiuntur originem : hæc autem filamenta, vel simplici, ut in Gramineis, umbelliferis & similibus plantis, vel duplici, ut in Ricino, Lauro &c. vel multiplici vasorum spermaticarum serie constant, ut in Malvaceis & leguminosis obtinet. Vide stamina. B. *De Waadjes in de Blom.* G. Die Fäselein mitten in der Blumen. Gall. *Filets.* A. Threads.

CAPILLARIA VASA, sunt vascula minima, capilli speciem ob tenuitatem referentia. B. *Hairige vaatjes.* G. Haarkleine Gefäßlein. Gall. *Les vaisseaux capillaires.* A. Capillary Fessels.

CAPILLARIS HERBA, sic vocatur Capillus Veneris, Capillus terræ, Capillus aureus, Muscus capillaris, Trichomanes &c. idque ob capillorum ferè similitudinem.

CAPILLATIO, est ossis cranii fracturæ species, sensum plerumque fallens; ferè latens, quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert: sic vocatur, quia fractura capillum refert. B. *Ein Hair-scheur.* G. Ein Splitter der Hirn-schale.

CAPILLORUM DEFLUVIUM, idem quod *Alopecia*.

CAPILLUS, ac si diceres capitis pilus. *Hoofd-hair.* G. Haupt-haar. Gall. *Cheveux.* A. The Hair of the Head.

CAPILLUS AUREUS, est *Polytrichum*: idque à similitudine capillorum, & aureo colore.

CAPILLUS VENERIS, est planta officinalis, quæ habet caulem durum & nigrum, fortem: folia filicem referentia, sed ampliora, longiora, minutim incisa, crenata, dura, subrotunda, conjugata, & cauli accrescentia; floribus caret & fructus nascuntur in sinubus seu complicatione foliorum, in quibus occurrunt capsulæ sphæricæ annulo vi elasticâ donato munitæ, cujus contractione rumpuntur & semina fundunt minutissima: radix fibrosa, nigra: appellatur ita fortè, quia illa planta pendendi muliebris pilos quodammodo referat; vel à speciosis reddendis capillis: nec alio nomine Veneris vox adjecta est, quam quod hæc pulcherrima pingatur. B. *De-*
mus.

nus-hair / **Drouwen-hair**. G. Frawen-haar. Gall. *Capillaire ou Adianthe*. A. Venus-hair, Maiden-hair.

CAPISTRUM, est fascia quædam Chirurgica, quæ capiti, in prolapsu, aut vulnere maxillæ inferioris, accommodatur. B. **Een Hoofd-zwagtel** / **Hoofd-kap** / **Halster-band**. G. Haupt-windel. Gall. *Capeline, Chevestre, Bandelette de tête*. A. Head swadling-band.

CAPITA, circa herbas denotant rotunda illa seminum, aut florum receptacula. Vide *Codia*.

CAPITILUVIUM, est liquor quo caput lavatur. Comp. ex *Caput & Lavare*. B. **Een Hoofd-wassing**. G. Haupt-Waschung. Gall. *Lavement de tête*. A. Washing of the head.

CAPITIS DOLOR, idem quod *Cephalalgia*.

CAPITIS GRANUM, est *Staphysagria*: sic appellatum, quod capitis pediculos enecet.

CAPITULA, vid. *Apices*.

CAPITULUM MARTIS, est Eryngium, procul dubio, quia capitula habet armata, spinosa, & martialia.

CAPNITES, CAPNIUM, & CAPNOS, est *Fumus Terræ*, seu *Fumaria*. Ita dicunt vocari, quod ejus succo, si oculi irrigentur, lachrymæ, ut à fumo acri, exundantur, deducitur *ἐκ τοῦ καίω καὶ πνέω*, ut propriè sic dicatur *ἢ ἐκ τῆς καύσεως πνέω*: aut *παρὰ τὸ κάπτω* seu *κάπω τὸ πνέω*. Vide *Fumaria*.

CAPPARIS, est arbuscula spinis uncinatis armata, rami parum sunt recurvi: folia sunt rotunda, saporis aliquantulum amari: furculos agit, in quorum summitate habet parvos calices virides, qui ad condiendos carpuntur, si hi calices, postquam ad magnitudinem requisitam devenerunt, in planta relinquuntur, tum dehiscunt & fiunt flores albi, rosacei, tetrapetali, expansi, multis staminibus donati: flori succedit fructus pyriformis vel filiquosus, carnosus, in quo nidulantur semina plurima, plerumque subrotunda, vel reniformia: radix est longa, crassa, ejus cortex est tubulosus, rugosus, crassus, cinereus, saporis acris & austeri; cujus cortices ex radicibus extracti sunt in usu, qui saporis amari, subadstringentis, acris sunt, nullius odoris; & annumerantur quinque radicibus aperientibus minoribus à *καππαύειν*, quod idem est ac *κατὰπνέειν*, sedare, quia furoribus medeatur. Nam est

est vox apud Aristophanem antiquissima; itaque non à campis, ut quibusdam placuit, neque ab infimi sæculi vocibus barbaricis derivatur. B. *Kapper-boom*. G. *Kapern-baum*. Gall. *Caprier*. A. The Caper-tree.

CAPREOLARIA VASA, dicuntur ea, quæ in modum Capreoli mirè intorta incedunt, ut sunt vasa sanguinea testiculis & ovariis dicata. B. *Wijnranksvaatjes*. G. *Gäbelein-gleiche gefaszlein*. Gall. *Vaisseaux en forme de Tendons de vigne*. A. Wreathed vessels.

CAPREOLI, sunt filamenta tenuia, ex caulibus enata, contorta, quibus plantæ nonnullæ dotatae sunt, ut aliis sese annectant, uti est in vite, clematitum, similacum &c. speciebus. B. *Kladderien*. G. Die Gäbelein. Gall. *Les tendons*. A. Clasp, or Tendrolls.

CAPREOLUS AURIS. Vide *Helix*.

CAPRIFICUS, quasi diceret *Ficus capri*, fortè quia à Capris expetitur: vel à carpendo, quòd parietes & mæceries, atque adeo faxa ipsa sibi obstantia discerpat. Mart. *Marmora Messala scindit Caprificus*. Gr. *Εἰς ἑὸς*, seu *Εἰς ἑὸς*, an ab *ἑὸς*, quod cum ex arbore velut contendendum sit & luctandum, ut maturet fructus suos. B. *Wilde Dje-ge-boom*. G. Wilde Feigen-baum. Gall. *Figuier sauvage*. A. The Wild Fig-tree.

CAPRIFOLIUM, est Periclymeni species: cujus folia ramorum nodis adhærent, bina, per intervalla sibi invicem opposita, oblonga, acuta, mediocriter ampla, mollia, in parte superiori viridia, in inferiori albescencia; finis pedunculi abit in foliolum, quod à pedunculo perforatur, in hoc foliolo, circa pedunculum perforato foliolo emergunt sex ovaria plerumque longa, urceolata, quorum apex coronatur corona quinquifida; intra hanc, ut calicem apici ovarii innascitur flos monopetalus, inferius tubulosus, superius bilabiatus, superiori labio multifido, simplici, & linguæ simili: stamina quinque ex pariete interno tubulatae partis floris: ovarium tubâ longâ apice globofo donata instructum, fit bacca mollis, per maturitatem rubicunda, sætâ semine compresso, ferè obrotundo, satis duro: radix longa, repens, lignosa: sic appellatur, vel, quòd ejus folia à Capris avidè comedantur; vel quòd extremi flexus sint capreolati. Belgæ tamen *Seitenblad* vocant, quasi hircum oleret, vel

vel hirco quid simile haberet, vel, à capiendo, quòd circumvolvendo ad se vicinas arbores aut frutices capiat, aut vocet. B. *Hamperfoelie* / *Memmekens-kruud* G. Geiszblatt, Speck-gilgen, Zeuling, Wald-gilgen. Gall. *Chevre Fueille*. A. Wood-bind, hony suckle.

CAPSICUM, ejus variæ sunt species, sed vulgarissima est filiquis longis propendentibus; habet caulem angulosum, durum, villosum, ramosum: folia longa & acuta, instar Persicariæ, sed latiora, satis carnosæ, coloris viridis fusci, pediculis adhærentia: calix est parvus, brevis, rigidus, expansus: flores monopetali, rotati, multifidi, fructui infidentes: flori succedit fructus mollis, membranaceus, in duo vel plura loculamenta divisus, politus, splendens, in initio viridis, deinde flavus, post maturitatem ruber aut purpureus, fætus seminibus planis, ferè reniformibus, coloris slavefcantis subrubicundi: radix brevis, tenuis, multas fibras dans: crescit hæc planta in regionibus calidis, ut in Hispania plerumque pro pipere habetur Brasiliensi: & nomen hoc Actuarius accepisse credit à *καπτω*, quod semen hujus non tantum mordet, sed urat. Vel *ἀπὸ τῆς κάψης*, quod in capsula seu folliculo, ac quasi cista semen ferat. Gall. *Poivre d'Inde*, *Poivre de Guinée*, *Poivre du Bresil*, *Corail de Jardin*, *Piment*.

CAPSULÆ ATRABILARIÆ, sive *Renes Succenturiati*, aut *Glandulæ suprarenales*, sunt duæ glandulæ flavescences, compressæ, utrinque superiori renum parti incumbentes, in quibus angusta cavitas, liquore fusco subdulci illita: figura harum valde irregularis, quadrata, triangularis, ovata &c. magnitudo varia, in adultis sæpe instar nucis vomicæ majoris; in fætu verò major, & æqualis renibus, imò subinde major. *Usus* eorum est ut lympham in suas cavitates suscipiant, quâ sanguis crassius à renibus refluus, & sero maxima ex parte destitutus, diluatur, & ad cursum circularem fluidior reddatur: cum nullus ductus excretorius hætenus detectus sit; ideo usus harum incertior videtur, quàm ut aliquid certi de his dici possit, videtur tamen major in fætu quàm in adulto, esse. B. *De nier-doozjes* / *nier-klieren*, malè *zwarte gal-doozjes*. G. Die Schlieren an den Nieren, oder Nieren Sacke. Gall. *les Glandes sur-renales communément dites*

dites capsules atrabilaires. A. The Reins glandules.

CAPSULA CORDIS, idem quod *Pericardium*.

CAPSULA COMMUNIS *Glissonii* in Hepate, nihil aliud est quàm membrana à peritonæo producta, cui porus biliaris & vena portæ in hepate simul includuntur. B. *De gemeine doos van Glissonius.* G. Das Leber-fäszlein von Glisson. Gall. *Capsule de la Veine Porte, ou capsule de Glisson.* A. The common cover of Glisson.

CAPSULÆ SEMINALES, sunt extremæ, vasorum semen deferentium, capsularum instar, dilatatae cavitates, quæ per duo foramina, semen à testibus receptum, in vesiculas feminales emittunt, ut in iis ad coitus tempus asservetur, vel per vasa lymphatica in massam sanguineam reducatur. B. *Zaat-doosjes.* G. Das saamen fäszlein. Gall. *Capsules ou vesicules seminales.* A. The Seed-boxes.

CAPULUM, est palpebrarum, aliarumque partium contorsio, à *καμπτεω* contorqueo.

CAPUT, est pars corporis humani suprema, collo superposita, in se concludens tertium sive supremum ventrem, cerebri & cerebelli, in qua anima habitare videtur, domicilium præcipuum. Quod in summo positum est, oculorum gratiâ. Extus ossibus tegitur & cute cum musculis. Laterales partes sinciput; posterior occiput, & anterior frons dicitur. Infra frontem sequuntur oculi, nasus, os, mala, mentum &c. B. *t Hoofst.* G. Das Haupt, der Kopff. Gall. *La Tête.* A. The head.

CAPUT, in vegetabilibus est id, quod fursùm deorsùmve in globum extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magnitudine cesserit, *capitulum* nominatur. Extremitatem tamen vitis partem *caput* etiam vocant, id est, ultimum & productissimum flagellum.

CAPUT GALLINAGINIS, est quædam in urethra caruncula, seu eminentia, juxta quam ex vesiculis seminalibus, tanquam per duos oculos semen in urethram excernitur, facta ne semen ex uno latere erumpens, in osculum alterius lateris impingat. Atque sic à similitudine dictum vocatur quoque *caput galli gallinacei.* B. *Het Hen-nen-hoofd.* Gall. *la Caroncule, Tête de Poule, & Vermontanum.*

CAPUT MORTUUM, est residua illa materia, crassa
M &

& sicca, quæ in destillationibus omnium corporum, præcipuè mineralium remanet : communissimè autem remanentiam vitrioli notat, vulgò *Colcothar*, & *Terra Damната*. B. *De doode kop / doode overschot*. G. Der Dodten-kopff. Gall. *la Tête morte*. A. Dead head.

CAPUT-PURGIUM, idem quod *Errhinum*.

CARANNA, est resina duriuscula, tenax, non admodum glutinosa, Tacamahacæ similis, nisi quòd sit paulò odorator, splendidior, liquidior & densior. Adfertur ex Carthagine Indiæ Occidentalis seu novæ Hispaniæ provincia, ubi ex vulnerata arbore elicitur, atque illinc foliis latis ac nervosis instar arundinaceorum foliorum involuta ad nos pervenit. Sæpe illud gummi in cucurbitis excavatis quoque colligitur.

CARBO, vide *Anthrax*.

CARBUNCULUS, idem quod *Anthrax*.

CARCHESIUS, est laquei species, ex duabus constans habenis, vim habens æqualiter extendendi. Sic dicitur à fune qui in summo navis malo habetur, quem Gr. *καρχήσιον* appellant. B. *De marg-strik*. G. Der sægelloch-strick. Gall. *Lacq d'hune*.

CARCINODES, est tumor cancro similis, ex *καρκίνος* cancer, & *ἰδὼς* forma. B. *Een hanker-gezwel / de wolf / de vjet*. G. Ein umb sich fressend geschwær, wie der krebs. Gall. *Chancre*. A. A species of a cancer, crab.

CARCINOMA, CARCINUS sive CANCER, est tumor semper in glandulis productus, ab acribus & obstruentibus humoribus ortum ducens, rotundus, durus, lividus, dolens, in principio pisi magnitudine, sed postea gaudet venis circum se turgidis, pedesque cancri referentibus, quamvis non semper. Ex *καρκίνος* caicer, & *νέμεο* depasco. B. *Kreeft-gezwel*. G. Der Krebs, das gefræsz, der Wolff. Gall. *Ulcere Chancreux, Cancer, Chancre*. A. A Canker.

CARCINUS, idem quod *Carcinoma*.

CARDAMANTICE, dicitur & *Iberis*, & *CARDAMINA*.

CARDAMINE, & CARDAMON, Nasturtii species, est planta, quæ folia ex radice erumpentia habet oblonga, obrotunda, caulibus longis adhærentia : flores in summitate caulium, crescentes, albi, aut aliquantulum purpurei,

purei, quadrifidi, cruciformes : flori succedit filiqua oblonga, bivalvis, cujus valvæ per maturitatem helicis instar retroflectunt, & semina exigua subrotunda magno impetu ejiciunt : radix parva & fibrosa : hæc planta crescit in pratis & locis humidis : ex *καρδαμῶν* quod caput tentat, acrimonia sua dici volunt : quia sinapi simile sit. Malunt Alii *παρὰ τὸ κόρας μένιν* dictum, quod oculorum pupillas coëuntibus una palpebris, abscondat. Iterum alii *ἀπὸ τῆς καρδίας*, quod foveat cor, & in syncope illa, quæ cardiaca dicitur, plurimum valeat. Vel *ἀπὸ τοῦ καρδάμυς* : imò verum Etymon *ἀπὸ τῆς καρδίας* censeo : quod cordatos & sapientes efficiat. Gall. *Cardamine*, ou *cresson des Prez*, ou *Passerage sauvage*.

CARDAMOMUM, habetur & *majus*, *medium* & *minus*. De majori duas species vidi, *vulgare* nempe quod oblongis folliculis includebatur, magnitudine seminis, quod in minori concluditur : Nigrum erat uti aloë succotrina; sapore cubebem ferè æmulans. Vulgò *Grana Paradisi*. B. *Paradys grein*. G. Paradeisz-koerner. Gall. *Grains de Paradis*. A. Grains of Paradise, Greater Cardamom. Altera species concludebat semen in duobus folliculis, colore & magnitudine cannabis semini non cedens, sed sapore eodem. Primo intuitu videbantur mihi esse nuces avellanæ, suis calicibus externis viridibus & exsiccatis, inclusæ. Sed unicus calix duos folliculos comprehendebat. *Medium* necdum vidi. Sed *Cardamomum minus vulgare*, minoribus includitur folliculis, albis & tripartitis, non piperem sapore æmulans, sed magis Aromaticum veluti ex caryophyllis & caphura, à *καρδαμον* & *αμωμον*, habens ob saporem, cum cardamomo, & amomo similitudinem, vel dictum putant quasi nasturtium suave. Sed verisimilius nomen accepisse ab exotico vel Arabico verbo Cordumeni. B. *Kleine Kardamom* / *Paradys-koozn*. G. Cardamœmlein. Gall. *Maniguette*, *petit Cardamom*. A. Cardamom, grains of paradise.

CARDAMON, Græcè *Nasturtium sativum* Latinè sonat. Barbari nostræ ætatis Herbarii *Cressionem Hortensem* vocant. *Cardamon* verò Græcis nonnulli dictum esse arbitrantur à *καρδίᾳ* corde, quod ejus morbis medeatur : vide *Cardamina*. Alii diversâ ratione usi, sic dictum credunt, quod caput suo calore & acrimonia tentet, quasi

καρδιακον putant. Nam arcem mentis obsidens sua ferit acrimonia, & igneâ vi præditum caput tentat. Et alii à καρ cor, & δομάω domo, quasi planta cordis deficientes vires restaurans. Vide *Nasturtium*.

CARDIA, seu καρ, est cor, sive musculus principalissimus, sanguini duntaxat circumferendo destinatus: vide cor, à κραδαίνω palpo, vibro, ideò etiam pro καρδια dicitur καρδια. B. *Het Hart*. G. Das Hertz. Gall. *le Cœur*. A. The heart. Vocatur interdum *Stomachus*, sive sinistrum ventriculi orificium. B. *De krop van de Maag*. G. Der Mund von dem Magen. Gall. *l'orifice de l'Estomac*. A. Mouth of the stomach.

CARDIACA, est planta, Marrubio fatis similis, plures habet caules ad altitudinem duorum vel trium pedum, crassos, angulosos, fungosos, intus medullosos: folia Marrubio majora, subrotunda, urticam referentia, profundè incisa, virido fusca: flos monopetalus, labiatus, cujus labium superius imbricatum & multò longius est inferiore tripartito: ex calice surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina, angulata, totam capsulam, quæ floris calix fuit, occupantia: semina triangularia, nigra: radix fibrosa: tota planta fortem habet odorem, & saporem amarum, crescit in locis incultis, lapidosis: sic dicta quòd morbis cordis, vel potius stomachi medeatur, καρδια enim cor est. B. *Hertgespan*. G. Hertz-ge-span. Gall. *Agripaume*. A. Motherwort.

CARDIACA PASSIO, *Cardiacus morbus*, *Cardiaca & Stomachica exolutio*. Idem quod *Cardialgia*. Item est suffocatio cordis ex polypo, vel sanguine coagulato &c. à καρδια cor. B. *Gen Hartstikking*. G. Hertz-erstickung. Gall. *Suffocation de cœur*. A. Pain of the heart, or mouth of the stomach.

CARDIACUM seu CORDIALE, est Medicamentum, cor (ut olim putabant) roborans: Sed potius blandum motum sanguini inducens, quo vires corporis augentur, & spiritus exhausti reficiuntur, unde circulatio per consequens benignior & facilius redditur, ex καρδια cor, & αἰω uro. B. *Gen Hartsterking* / sed malim, *bloed-sterking*. G. Ein Hertzsterckend Træncklein. Gall. *potion cordiale*, *cordial*. A. Cordial Medicines. CAR-

CARDIALE, idem quod *Cardiacum*.

CARDIALGIA & CARDIOGMOS, Plinio *Rosio Stomachi*, est dolor ingens, morsus, rosio, aut contractio nervi paris vagi & intercostalis stomacho inserti, à materia vellicante in ventriculo contenta, vel inflammatione in illo oborta. Ita ut ejus dolore cor, ob consensum, angustatum, & contractum, Lipothymiam pati videatur. Vide *Cardiaca passio*, à καρδία cor, & ὀδύω doleo. B. *Maag-pijn/ Herte-pijn/ Herte-wee* G. Das Magendrucken, Hertz-wehe. Gall. *Douleur d'Estomac*. A. Pain of the heart, or mouth of the stomach.

CARDINALIS FLOS, sive Trachelium Americ-
anum, sic appellatur quòd istius floris color summè rubi-
cundus Cardinalium vestimenta æmuletur, præsertim sole
meridiano.

CARDIOGMOS, Idem quod *Cardialgia*, ex καρδία cor,
& ὀδύω doleo.

CARDOPATIUM, vide *Chamæleon*.

CARDUUS, an à *Cactos*? Est herba spinosa.

CARDUUS FULLONIUS, vide *Dipsacus*.

CARDUUS SUARIUS, vide *Chamæleon*.

CARDUUS VARIUS, vide *Chamæleon*.

CARDUUS SUARIUS & VARIUS: officinis & Bar-
baris Cardopatium appellatur, quod nomen haud dubiè
corruptum est, deductumque à dictione *Pancration*, nam
sic olim esse nominatum Chamæleonem Apulejus testatur:
aut à carduo vario, à qua dictione, *u* sc. littera in *p* & *r*
in *t* mutata, in *Cardopatium* facilis est lapsus. *Suarinus* por-
rò carduus dictus est, quòd fues, si in polenta exhibeatur,
perimat.

CAREBARIA, est Cephalalgiae species, seu gravitas
capitis, ex καρή caput, βαρὺ grave. B. *Hoofstg-waar-
heid*. G. Haupt-wehe. Gall. *Douleur de tête*. A. Heavi-
ness of the head.

CAREUM, Est planta, quæ habet plures caules ad al-
titudinem circiter sesquipedis, quadratos, nodosos, va-
cuos, ramosos: folia tenuiter laciniata costæ per conju-
gationes innascentia: flos est rosaceus & umbellatus,
plurimis scilicet petalis constans, cordiformibus, inæqua-
libus, in orbem positis, & calici insidentibus: Is autem
abit in fructum ex duobus seminibus compositum exiguis,

longiusculis invicem junctis, griseis, hinc gibbis, & striatis, inde verò planis, saporis acris & aromatici : radix longa crassa, carnosa, alba, aliquando flava : nomen habere refert Dioscorides ex regione Caria, nunc Lango : ubi abundè crescit. Dicitur etiam *Caros* & *Carui*. Gall. *Carvi*.

CAREX, est Junci acuti species, in arenosis tumulis circa mare succrescens, deducunt à caro : fortè ob solida folia. B. *Helm*. G. Reit-grasz. Gall. *Glayment de Marais*. A. Sedge, Sheer-grasz, Burr-reed.

CARICA, sic ficus vocatur à caria natali solo.

CARIES, **TEREDO**, **TEREDUM** & **PÆDARTHROCE**, est ossis cancer, seu corruptio & exesio, à medulla in ejus cavernulis putrefacta, vel aliis humoribus acribus, ibidem subsistentibus, ossis laminas corrodentibus, separantibus ab invicem, orta. B. *Beenvreter / opeten der beenen*. G. Beinfeule, Beinfraesser. Gall. *Carie*, *pourriture & vermoulissure des os*. A. Rottenesse of the bones.

CARINA, est illud rudimentum feminine primum, quod à mare communicatum ovo foemino, post varias mutationes fit ipsum animal; quodque propriè sic dicitur, cum constare observatur ex cerebro, cerebello, medulla spinali, ex quibus, explicatis, auctis, mutatis, cum aliis accretis junctis, animale corpus nascitur.

CARLINA seu **CAROLINA**, planta officinalis, quæ habet folia ex radice erumpentia, longa, ampla, profundè incisa, repentia, in orbem disposita, aspera, aculeata instar carduorum, coloris viridis pallidi : calix multis expansis aculeatis foliis cardui constat : floris discus sat patulus, constans flosculis fistulosis, radiatus ita ut petala plana sint, & secundò sterilia : semina post singulum florem sunt in apice vel papposa, vel emissis radiis penicilli modo coronata foliolis exiguis à se mutuo dissectis : radix sat crassa, cauliformis, fibrosa, ut plurimum in superficie cariosa, foraminulenta, coloris foris rufi; intus albidus, odoris gravis & fragrantis, saporis penetrantissimi aromatici : sic dicta à Carolo Magno, primo ejus nominis Romanorum Imperatore, cujus exercitus usu hujus radice liberatus, & præservatus à peste olim fuisse fertur : dicitur etiam *Leucanthe* à λευκή alba & ἀκάνθα, quasi spinæ

spina alba. Gall. *Carline ou Cameleon blanc ou Chardonne-rette*. A. Carline-Thistle.

CARMINANTIA seu CARMINATIVA, dicuntur flatûs discutientia, simul cum intestinorum dolore sublati, uti Anisum, &c. Carminare enim significat demulcere carminibus: veteres enim existimabant, Poëtas ope suorum carminum demulcere posse dolores atque motus nimis vehementes; unde Poësius æquè ac Medicinæ inventor habitus est Apollo. B. *Wind-dryvende middelen*. G. *Wind-treibende mittel*. Gall. *Remedes Carminatifs*. A. Carminative Medicines.

CARNEOLUS, vide *Sardius Lapis*.

CARNOSA MEMBRANA, sive caro quadrata, vel palmaris brevis, hæret in aponeurosi palmaris longi, dicitur contractam volam explicare. B. *Bleefig/ bliesg*. G. *Fleisch Häutlein*. Gall. *le Palmaire cutané ou le court palmaire*. A. Carnous membrane.

CARO, est substantia muscularis, constans ex fistulis, sanguinem ex arteriis accipientibus, inque venas revellentibus. Veteribus dicitur quintuplex *Musculosa*, *Fistulosa* sive *Fibrosa*, ut in musculis & corde. *Parenchymatica*, ut pulmo, hepar, lien. *Viscerosa*, ut intetina. *Glandulosa*, ut pancreas, glandulæ mammariae, salivares &c. *Spuria* ut Gingivæ, labia, penis glans, &c. Gr. *σαρξ & κέρας*, sed illa distinctio nullius est momenti, cum nulla caro sit, nisi musculosa. B. *Bleesg*. G. *Fleisch*. Gall. *Chair*. A. Flesh.

CARO, etiam significat substantiam istam molliorem fructuum succulentorum, quæ cortici subest, quam aliàs pulpam vocamus, ut *Pulpa*, vel *caro cassia*, *cydoniorum*. B. *Bleesg*. G. *Fleisch*. Gall. *Chair*. A. Pulp.

CARO QUADRATA, sive CARNOSA MEMBRANA.

CAROTA & CARYOTA, credunt à Germanica voce derivari *Gar root*, hoc est totum rubens, quia radix intus & extus obscurè rubet: sed errant, nam à Græcis vocem hanc mutuati sunt Romani: derivatur enim à *ce-ras*, sed Dores *caras* dixerunt.

CAROTIDES Arteriæ, sunt duæ arteriæ ortæ ex aorta paulum supra cor, ubi incurvari incipit, sursum exportectæ versùs caput; una est *dextra*, altera *sinistra*, u-

traque dividitur in *externam*, & *internam*, postquam carotis ad cranium ferè appulit, oritur *externa*, quæ paulum reflexa, ad fauces, faciem, capitis verticem, & retrò aures variè distribuitur. *Internus* alter verò ramus apparatu quodam velut mechanico, os cuneiforme pertransit, in eo enim peculiaris in utroque latere canalis insculpitur, in quo arteria illa in majorem cautelam tunica insuper ascititia crassiore investitur, sic igitur ductu instar S. duplicis canali osseo elapsa, tunicam ascititiam deponit, & τῷ ἰγκειφάλω suo sanguine prospicit, circa nervum igitur ophthalmicum ascendens, ad latera porrigitur, deinde ad anteriorem cerebri regionem intra ductum nervorum olfactoriorum: Ultimò ad posteriora protenditur & juxta medullam oblongatam & spinalem medullam cranio exiens, eam suo liquore ad os sacrum usque irrigat. Olim arteriam illam vertebralem seu internam vocabant, eo quod putarint eam ascendere & cranio immisso cum carotide conjungi, quod tamen juxta accuratiss. *Willisum*, secus exprimitur. *Soporales* seu *Carotides* vocantur, quia si vinculo constringantur, illicò affectus soporosi excitantur: Veteres enim malè soporem ordinarium inde produci existimabant. *Carpo* & *Celsa* Σφαγίτις appellantur, id est jugulares, à καρόω soporem induco. B. *De krop-slag-ader / de slaap-slag-ader.* G. Die schlaff-puls-ader. Gall. *Arteres carotides.* A. The carotik Arteries.

CARPENTARIA, in Gallia vocatur, propriè *Herba Judaica*, sic dicitur quod fabri lignarii eâ vulneribus medeantur: *un charpentier* enim est faber lignarius, eo quoque nomine *Nasturtium hyemale* appellatur.

CARPESIUM, qualis sit planta inter Eruditos disquiritur; alii cubebem volunt, alii Ruscum, alii aliud quid. Gr. Καρπῆσιον, à κάρφη festuca tenuis vel palea, quæ in frugibus aruit: vel è κάρφη cùm verius de caulium quàm radicum sarmentis dici videtur.

CARPIA, à Gallica voce *charpie* originem ducit, vulgò *carpie*. Latinis *lintheamentum carptum*, vulsumve è linteis concertptis: *Linamentum rasile*. Gr. τιλτὸς μοτὸς, διάσνεθ *Aegineta*, τιλμα *Apfyro*. *Delinamentum sanarium*; est concertptum linamentum, quo vulnere ulcerive immisso sanies inanitur. ἐμπνι μοτὸς *Hippocrati Linamentum*.

raſſe, è lanugine linteorum erafa conficitur. *ἑρπιδίου* Erotiano, *ἄχνη ὀθονίς* Hippocrati. B. *Geschlabde wieken*. *Linamentum tortile* à materia contorta fit *ερεπιδίου* μοτὸς. B. *Gedzaidie wieken* / vulgò *plukſel*. G. Pluckſel. Gall. *Charpie*. A. Plucking of Linne.

CARPINUS, est Aceris species, cortex hujus arboris est scaber & asper, coloris albescentis: rami valdè extenſi; lignum durum, albescentis: folia ſatis ampla, dentata, ulmi ſatis ſimilia: flos amèntaceus est, petalodes, axi longo communi adnatus; ſtaminibus multis ſub foliolis natis, in uno loco plantæ hærens: Ovarium ovatum apice piloſo, membranaceo involucro tectum, & tubis binis inſtructum; ſit fructus in eadem planta loco à flore remoto, in ſpicis foliaceis reconditus, oſſeus, umbilicatus, comprefſus, ſtriatus, fætus nucleo rotundo acuminato: putatur dici à carpo, vel à *κάρφω* ficco, quia lignum habet ſiccum. Vel quod facilè ſinditur. B. *Tok-hout* / *Tok-boom* / *Wiel-boom* / *Hane-beuk*. G. Hanen-buchen, Steinbuchen. Gall. *Carpene*, *Haſtre*, *Hefſtre*, *Charme*. A. The Horn-beam, or hard beam tree.

CARPOBALSAMUM, est Balsami fructus. Ex *καρπίος* fructus, & *βάλσαμον*. Vide *Balsamum*.

CARPUS, vulgò BRACHIALE, prima palmæ pars *κερφό* καρπὸς, *κλείς* *Hefſich*. est pars brachii inter partem inferiorem cubiti & manûs: Conſtat ex oſſiculis octo, quibus cubitus manui connectitur. B. *Dooz-hant*. G. Das Gelenck nach der hand. Gall. *Le poignet*, *l'avant bras*, *Le carpe*. A. The wrift.

CARTHAMUS, five CNICUS, Est planta, quæ caulem unicum ad altitudinem duorum circiter pedum dimittit, rectum, longum, rotundum, lignoſum, durum, in parte ſuperiore in plures ramos diviſum: folia ſunt oblonga, mediocriter lata, acuta, venoſa, ad ambitum multis ſpinis inſtructa: ſummitates ejus habent multa capita deſquamata, avellanæ craſſitie, alba, foliorum capitulo inſtructa: hiſce floribus delapſis apparent ſemina oblonga, nuda, hordei grano paulò craſſiora, polita, alba, ſplendentia, cortice duro tecta, & plena medullâ albâ, dulci, oleoſâ, poſtea acri, & naſeoſâ: radix est tenuis. Flores Tinctoriſus inſerviunt ad colorem rubrum conſiciendum: An à *καθαίρω* purgo, & alvus? Vide *Cnicus*.

CARTILAGO, est pars alba, ligamento ficior, duriorque; ossè verò mollior, admodum elastica, & lubrica: obducit ossium capita & cava, inunctaque pingui linimento, ex glandulis ligamentorum secreto, articulationem faciliorem reddit, partesque varias ab injuriis externis defendit. Gr. *χόνδρος* & B. *Knorpel-been* / *knor-been*. G. Krœpfel-bein, Knorpel. Gall. *Cartilage*. A. A Cartilage, or gristle.

CARUM, & CARUUM, vide *Careum*.

CARUNCULA, vid. caput gallinaginis.

CARUNCULA OCULI, est corpusculum in angulo majori oculi situm, spongiolæ formam habens, multis protuberantiis hirtum, veluti acinus botryos, colore rubro; operculi instar incumbens sacculo lacrymali, transfudans ex glandulis suis continuò humorem tenuissimum, ne arescat vel cum vicinis concreascit partibus; cujus usus est, ne palpebræ contra bulbum oculi perfectè claudantur, sed per hanc eminentiam cavum maneat, in quo liquidum lacrymarum collectum, per puncta deinceps lacrymalia absorbere commodè possit. Non reperitur hæc caruncula in animalibus, quibus cortina adest; non pertunditur ullis foraminibus hætenùs notis, ex quibus liquidum quaecunque exire possit, neque videtur esse operculum sacci lacrymalis lacrymas imbibens, nam simulac duo puncta lacrymalia læsa sunt, integra licet caruncula, sit lacrymarum stillicidium; verus ergò ejus usus videtur, ut non solum liquidum lacrymarum determinetur in puncta lacrymalia, sed illud sebaceum ibi appulsum, affigatur & colligatur ad scabritiem dictæ carunculæ, unde postea in lemas siccatum avertitur. B. *Het Oogklierkje*. Der augen schlieren. Gall. *Caruncule lacrymale*. A. Caruncule of the eyes.

CARUNCULÆ LACHRYMALES, idem quod *Caruncula oculi*.

CARUNCULÆ MYRTIFORMES, sunt orificii vaginae muliebris corrugationes, seu membranosa inæqualitates nullo certo numero comprehendendæ, quæ in parturientibus, & post partum ita oblitterantur, ut earum vestigium vel minimum non remaneat. Ut plurimum conspiciuntur quatuor; ex hymenis laceratione creduntur oriri, & nunc duæ, tres, nunc quatuor: observantur, eo præ-

præcisè loco, ubi olim hymen erat; defuntque in infantibus. B. *Wleifige heubeltjes*. G. Myrten-gleiche bislein Fleisch. Gall. & A. *Caruncules myrtiformes*.

CARUNCULÆ PAPILLARES, sunt corpuscula exigua in renibus, numero duodecim; propriè sunt fasciculi à concentratione canaliculorum, ex quibus renum substantia maximè constat, orti, qui serum à canaliculis recipiunt & in pelvim deducunt. B. *Teipelwijze kliertjes*. G. Tuttlein gleiche schlieren. Gall. *Caruncules papillaires ou les Mammelons*. A. Caruncules in the reins.

CARUS, est sopor in quo ægri vellicati, compuncti aut vocati, vix sensationis notas ostendunt, est tamen aliqua perceptio, sed subitanea, absque febre, vel ut multi volunt cum febre, circa morbos enim soporosos maximè dissentiunt Medici, Lethargo major, & Apoplexia minor est. Causa est obstructio vel compressio Pororum & Meatum versùs cerebri medullium euntium & in corporis callosi, limbo saltem extimo, sedem habentium ipso cerebro illæso manente, à καρόω soporem induco. B. *Slaap-sugt / slaap-zichte*. G. Schlaf-sucht. Gall. *ésspece de lethargie*. A. A Profound sleep.

CARYOCOSTINUM, est Electuarium, sic vocatum quòd caryophyllos & costum recipiat.

CARYON, nux est cujusvis generis, sed præsertim juglandis: à κάρη caput, quia est fructus rotundus, instar capitis humani: vel quia capiti gravedinem adferat.

CARYOPHYLLATA: Est planta, quæ habet folia lobata id est quibus ad latera excreſcunt alia folia prioribus majora, & ad Pentaphylloides accedunt, hinc Rajus alii-que posuerunt ad agrimonoides ob habitûs similitudinem, villosa instar agrimoniae, sed magis dura & aspera, coloris viridis magis fusci, in margine incisa; flos est rosaceus, constans plurimis petalis in orbem positis, è divisuris calicis monophylli & pelvisformis prodeuntibus; pistillum abit in fructum ferè & globosum, in quo semina plurima colliguntur oblonga caudata: radix crassior, oblonga, obrotunda ferè & fibrosa, coloris obscuri, odoris caryophylli: sic dicitur, quia ejus radix caryophyllos quodammodo sapit & olet; appellatur etiam *Herba benedicta* & *Sanamunda* à divina sua efficacia. B. *Engel-wortel*. G. *Benedikten-wurtz*. Gall. *Benoite, Galiot, herbe benite*. A. *Ayens, Herb-bennet*,
CA:

CARYOPHYLLEUS FLOS, est planta florifera, monoangeia, polysperma, cujus flores caryophyllos olent, unde nomen. B. *Nagelbloemen / Gyonoffels / Angelieren / Teste-bloemen*. G. *Nagel-blumen, Gras-blumen, Nägelein-blumen*. Gall. *Girofflée, Oeillets*. A. *Gilli flower, or Clove July flower*.

CARYOPHYLLI GARYOPHYLLI, ac si diceret *Nucifolium*, nomen, quod ipsi rei neutiquam respondet. *Caryophyllorum* arbores propagantur maturo ipforum fructu, qui non est vulgare illud *Caryophyllum*, in tabernis notum, illud enim rudimentum saltem est fructuum. Ipse fructus Aromaticus immaturus, non aliud videtur esse, quam quod verbi gratia, in rosa calicem, & quidem speciatim ejus capitulum, tandem fructum cynosbati constituit: hujus pars superior in quatuor cuspidulas divisa cum rosarum illo cortice lacinioso, Alabastrum nomine noto, convenire videtur: ipse flos summitati huic innascens exterius quatuor crassioribus pelliculis involvitur; quæ invicem complicatæ globulum illum efformant, hisque se pendentibus flos demum in conspectum venit, itidem quatuor foliolis primò candidis, deinde virescentibus, ex umbilico sive quadrato alveolo enatis constans, & multis staminulis albis, antheræ in modum, quasi totidem flosculis, prominulum ex umbilici medio apicem vel clavum ubique cingentibus, consitus. Baccæ quando è viridi aut pallido rubescere incipiunt, capitulum aperiant, floremque ostendunt, & earum vindemia instat, quæ cratibus imponuntur, & latis Ari foliis tectæ per aliquot dies fumo macerantur, deinde in sole exsiccantur, donec fulvum illum colorem acquisiverint, quali vulgò cernuntur. Arbores sunt quibusvis Lauris celsiores, non frutices. Folia Lauro quoque simillima sed angustiora. B. *Nagelen / kruid-nagelen*. G. *Nelcken, nagelein*. Gall. *Clou de Girofles*. A. *Cloves*. Fructus porrò maturi, quadruplo ferè majores sunt & crassiores, vulgò *Antophylli* dicti: Nucleum continent durum majores; sunt & magis ventricosi. B. *Moeder nagelen*. G. *Mutter nelcken*. Gall. *Antophyll*. A. *Great cloves*; Est & alia species admodum rara, minori forma, sed magis denticulata, & vocatur nostratibus *Kroon-nagelen & Honinx-nagelen*. Omnes illæ species apud me prostant. Est & cor-

cortex quædam ex America, & insula Cuba, allata, quæ & odore & sapore caryophyllis neutiquam cedit, vocaturque cortex caryophyllorum; arboris Xocoxochitl, seu Piper Tavalci dictæ ab Hernande. B. *Paigel-hout*. G. Nelcken-holtz. Gall. *Bois de giroffle*. A. The wood of the clove tree. Sunt & alii *Caryophylli Plinii* dicti, rotundi, magnitudine ribium, colore fusco, facili friabiles, racematim Botri instar succrescentes. Folia habent magna. Sapor feminis intus conclusi, imbecillem caryophyllorum saporem refert. Dicuntur & *Caryophylli*.

CARYOPHYLLI PLINII, vide *Caryophylli*.

CARYOPHYLLUS, si verbum verbo reddas *Nucis folium* sonat, quo cum tamen similitudinem nullam habet: sed est potius fructus rudimentum, cui in fronte flos necdum apertus insidet.

CARYOTA, vide *Carota*. Credunt à Germanica voce gar-root nomen accepisse, fortè à caro, ob radicem rubedinem, quam cum carne habent. B. *Karoten*. G. Rothe Ruben, rothe Pastenach. Gall. *Carottes*. A. Caroth.

CASSIA FISTULA, *Nigra, Solutiva, Laxativa*. Istius fructus arbor est procera, instar juglandis, quæ crescit in Indiis Orientalibus, Ægypto, & Alexandria, habet corticem griseum, saporis adstringentis; folia pinnata, & ferè cum juglande conveniunt, sed acutiora sunt, instar Persici foliorum. Flores pentapetali rosacei, in orbem positi, subflavi odoris gratissimi; pistillum abit in siliquam oblongam, rotundam, cylindricam, teretem, lignosam, aliquando compressam, in varia loculamenta divisam à dissepimentis transversim positis, obductis medulla nigra, liquida, dulci, in singulis loculamentis hærent femina depressa, dura, obrotunda, nitida, coloris flavi: floribus hujus arboris deciduis, siliquæ adeo indurescunt, ut à ventis agitatae tantum strepitum edant, ut à duorum miliarium distantia audiantur: Gr. *κασία μέλαινα*. Unde dicatur, non satis constat. An *ἀπὸ κοσμήματος*, quod derma sive corium significat Myrepso, quo calcei solent *κοσμήσθαι*? Certè siliqua, sive arboris hujus fructus crasso satis operimento corticofo, coriaceo & satis duro constat. Alii cassiam ab Acacia derivant sed malè. B. *Pjip-kassie*. G. Cassien, Cassiefistel. Gall. *La Cassie en baton, Cassie laxative*. A. The cassia or pudding pipe tree.

CAS-

CASSIA LIGNEA, Est Cassiæ lignæ Malabaricæ seu sumatrensis cortex, cinamomi in modum convolutus, cinamomo crassior, odore & sapore debilior, colore magis fusco, masticata, deliquescit in ore, & lentum quoddam glutinis quasi speciem relinquit, id quod cinamomo non accidit, cujus reliquiæ perpetuò supersunt: atque inde apparet hallucinatos fuisse illos, qui cortices cinamomi & Cassiæ lignæ sibi incumbentes, ab una eademque arbore detrahi, crediderunt. *παρὰ τὸ κάσαι* dictam volunt, quasi *κοσμέσαν* διὰ τῆς εὐσμίας τὰς αἰσθήσεις: *κάσαι* est enim ornare, vel quod sensibus fragrantiam largiatur. Vocatur & *Xylocassia*, & cinamomum spurium, canella ignobilior, Cassia Syrinx vide *Cinamomum*.

CASSUTHA, recentioribus Græcis *Cassythas*, *γ* in *u* transeunte, ut ferè fieri solet, Latinis appellatur. Officinis & Herbariis nostræ ætatis hinc deflexa pristini nominis umbra, *Cuscuta* dicitur, cum primùm *Cassutha*, dein conversâ *Cuscutha*, postremo *Cuscuta* cœperit appellari. Sunt qui *Podagram lini* vocant, quod quasi compedibus id, cui infederit, illiget, nec vinctum eo facillè possit extricari. Plinius ejus videtur meminisse iis verbis; est in Syria herba quæ vocatur *Cassythas*, non tantùm arboribus, sed ipsis etiam spinis circumvolvens sese: *Cassytas* enim legendum non *Caditas*. Jam igitur memoria *Plinii* Cassytas herba suo nomine syriaco venerat in latium, quod multis postea seculis usurpantes tam Poeni quàm Arabes, suis scriptis protriverunt, vide *Cuscuta*.

CASTANEA, Est magna & crassa arbor, cortice tecta polito, fusco, maculato, lignum est durum, in igne crepitans: rami valdè extensiles, & magnam umbram producentes: folia magna, ampla, longa, lata, tenuia, parùm aspera, in margine incisa, nervosa: flos mas, in hac arbore primo deprehenditur alio loco quàm ovarium, solitarius, ex calice pentaphyllo, valdè staminosus, per capillamentum tenue axi communi longo affixus, ut fiat amentaceus: alii flores hermaphroditi, constant calice & staminibus atque ovarii apice multifido & tubis sex distinctis, uno illo communi calice contentis: ovarium hoc deinde, ubi se expedit, fit fructus echinatus alio à flore primo loco in eadem arbore, subrotundus, quadrifariam dehiscens, ut plurimum, factus
casta-

castanea sub coriaceo putamine rubicundo, nucleum continente : hæc arbor crescit in regionibus calidis. à Castano Magnesiæ oppido ; vel à Castanide terra nomen habet. Non dicitur à castitate, quod quidam opinantur. Quæ terra Castaneas nutrit, Castalis Thessaliæ urbs, unde Castanea à terra Castanide urbe pontica, ubi copiosè provenit castanea. Malunt alii κάστανον à Castana Magnesiæ urbe dici. Alii Castanam urbem Apuliæ scribunt, non procul à Tarento, de quo non laboro. Sufficit ab urbe vel ab agro quodam nomen hoc accepisse, vocatur à Virgilio *Nux*. Nuces generaliter dicuntur omnia, testæ corio duriore, vocatur item Λιές βάλανος, Σάρδιανα βάλανος, Λοπιμόν. *Sardiana* quippe *Glandes* dicuntur, quoniam in Sardinia optimæ nascantur. B. *Castagne-booni*. Gall. *Marronier*, *Chateigner*.

CASTOREUM, quid sit extraneis nationibus vix sciri potest, quia Mercatores nostri illud emunt à nationibus, quæ illud iterum ab aliis habent. Alii testiculos, glandulas alii suspicantur. Anatomia detexit non esse testiculos, qui gallorum testes vix superant, sed vesiculas esse duas sive folliculos, qui tam in maribus quàm in fœminis, utrinque in inguinibus, statim sub cute, ovorum gallinaceorum magnitudine, & sæpe majores conspiciuntur, ex quibus liquor oleosus & gravi odore emanat, quem animal lingua lambit. Vesiculæ exsiccatae verum sunt *Castoreum*. Illud utraque India præbet. Gr. κάστορειον. B. *Beberz* / *Bebergeil*. G. *Bibergeil*. Gall. *du Castor*. A. *Castor*.

CASTRATIO, est Testium excisio, seu privatio, ne quis coitui aliquid contribuere posset. Vel quando id ex necessitate corrupti testis fieri debet. Is qui castratus est dicitur *Castratus* seu *Eunuchus*. B. *Tubbinge*. G. *Aufzschneidung des heimlichen Glieds*. Gall. *Castration*. A. *Gelding*, or cutting away the stones.

CASUS UVULÆ, vide in *Cion*.

CATACLEIS, est costa prima, subclavicula dicta, ex κάτω infra, & κλεις clavis. B. *De Opperr-rib*. G. *Die oberste Rippe*.

CATAGMA, est ossium fractura, sive separatio continui in duris corporis partibus, quæ externè duro quodam instrumento, vi partem affligente efficitur ; cujus disse-

differentiæ à forma, à parte & accidentibus desumuntur.
B. Been-breek. G. Ein Bein-bruch. Gall. *Fracture d'Os.*
A. The breaking of bones.

CATAGMATICA, sunt Remedia ad fracturæ curationem necessaria, à κατάργω deduco.

CATALEPSIS, *Catochus*, *Prehensio*, aut *Congelatio* est, quando is qui corripitur, subito corripitur, & in quo situ positus erat, immobilis manet, sive steterit, sive sederit, sive aliter flexus fuerit, respiratione salvâ, salvo pulsu, apertis oculis, sine motu, loquela, aut sensu, nam rarum est si sermones aliorum intelligant, aut cibum vel potum, quem præbemus deglutiant; Verum inter externas causas sunt fulminis ictus, & acere frigus: proxima causa videtur esse immobilitas sensorii communis, pro ut primo momento insultus se habebat, à καταλαμβάνω prehendō, corripio. **B. Zin-bang / leden-streking.** G. Sinnen-benehmung, oder Unempfindlichkeit. Gall. & **A. Catoche.**

CATALOTICA, idem quod *Cicatrizantia*, à καταλίσω cicatricem induco, vel deleo.

CATAMENIA, sunt menstrua muliebria, quæ plerumque singulis mensibus, ab aucta copia, & hinc intumescencia massæ sanguineæ inducta, turgescunt & foras ex vasculis uteri, vel vaginæ dilatatis ex muliebribus prorumpunt; Quidam menstruorum causam lunæ motibus adscribunt, hoc autem concessio necessum foret, ut uno eodemque tempore, omnes simul menstruum fluxum paterentur. Menstrua incipiunt anno duodecimo, decimo tertio, vel decimo quarto: Desinunt verò, circa annum quinquagesimum, verum hoc exactè determinari vix potest. Supprimuntur in prægnantibus, & lactantibus: Regula tamen non est, ex κάτω infra, & μὲν mensis. **B. De Stonden / Maant-stonde / Maandinaals-mutg / het Goed / Onpasselijkheid.** G. Monatliche Reinigung, Monat-zeit, Frauen-zeit. Gall. *Les menstrues, sang menstrual.*

A. Womans course, or monthly termes.

CATAPASMA, est pulvis fragrans, qui odoris sui causa vestibis inspargitur. Item pulvis fragrans qui post illinitionem, stomacho aut cordi applicatur, à καταπασάω inspergo. Vide *Diapasma*.

CATAPHORA, idem est quod *Coma*, verum in eo disse-

differunt, quod *Cataphora* tanquam genus omnium stuporū sine febris fumatur, videtur Cari levioris species. à κατὰ φέρον deorsum fero, quia ægrorum membra deorsum concidunt. B. *Slaap-zichte / slaap-zugt*. G. Die Schlaaffucht. Gall. *Grand Sommeil*. A. A deep or dead sleep.

CATAPHRACTICA, est nomen alicujus fasciæ seu ligaturæ, quæ thoraci accommodatur. B. *Een middelijfsband*. G. Brust-windel. Gall. *Bandelette de poitrine*. A. Breast swaddle.

CATAPLASMA, est Medicamentum externum topicum pultis consistentia. Præscribitur ferè duobus modis, nempe vel per coctionem vel sine ea. Illud fit frequentius; hoc sæpe majorum est virium. In illo jubentur asumere vegetabilia, scopo convenientia, ut radices, herbas, semina, flores, fructus &c. additis farinis appropriatis, aut illis omisissis, quæ omnia in s. q. liquoris, v. g. aquæ, cærevisiæ, lactis, vini, &c. coquuntur ad pultis consistentiam. Hoc paratur ferè ex vegetabilibus minutim concisis, affuso tantum liquore sufficienti, eâ solum quantitate, ut respondeat consistentiæ pultis. Possunt hic quoque addi farinæ, mica panis, olea, unguenta, sicuti quoque in prioris generis cataplasmatibus, à καταπλασσω fingo, formo, illino. B. *Een pap / brijje / cataplasme*. G. Ein Papp. Gall. *Cataplasme*. A. A Cataplasme, or pulstess.

CATAPOTIUM, vulgò *Pilula*, est Medicamentum internum; quod deglutiendo ad alvum subducendam & purgandam, in forma pilularum assumitur, ex κατὰ deorsum, & πίνω bibo. B. *Buik-zuiverende pillen*. G. Pillulen. Gall. *Pillules*. A. A Pill.

CATAPTOSIS, est Epilepsiæ symptoma cum homines erepente in terram concidunt, à καταπίπτω deorsum cado, idem quod *Decidentia*.

CATAPUTIA, Tres dantur hujus species, quarum semina in officinis servantur, nempe *Maxima*, quæ est Ricinus Americanus major semine nigro. *Media* quæ est Ricinus vulgaris, & *Minima*, quæ est, Tithymalus latifolius cataputia dictus. Omnium vis est urens, & vehementissime purgans fursum & deorsum.

CATARACTA, est duplex, *Incipiens*, seu *Suffusio*, vel *Confirmata* seu *Cataracta*, propriè dicta; *Incipiens* est

oculi suffusio, cum nempè nubeculæ, festucæ aut muscæ, ante oculos volare videntur. *Confirmata* verò est, quando à pellicula tenui, pupilla in totum vel ex parte occluditur, ita ut radiis solaribus debitus ingressus præcludatur; vel quando ipsa lens Crystallina opaca fuit facta. Cataractæ confirmatæ curantur acu per membranam albugineam & corneam ad Cataractam usque adacta, quæ acu deprimenda, & si resiliat, comminuenda, deinde oculus aquâ rosarum & alumine conquassato obligandus; à καταράκτω confundo vel impetuosè deturbo, quia sæpe subito hic morbus oritur; alii à similitudine Cataractarum, quæ sunt valvæ mobiles, quibus aquarum temperatur impetus, quia considerârunt hunc morbum tanquam valvam in humore aqueo, quæ visum interciperet; antiqui cataractas oculos Veneticos appellârunt, veneticus vel venetus denotat colorem glaucum, vel dilute cæruleum. Gr. ὑπόχυμα. B. *De staar / een bal-blies*. G. *Staar*, *Staar-fell*. Gall. *Cataracte*, *Suffusion*. A. A Cataract.

CATARIA, vel *Nepeta*: est planta, cujus caulis ad altitudinem circiter trium pedum adscendit, quadratus, villosus, ramosus: folia urticæ vel Melissæ, in margine incisa acuta, lanuginosa, albescentia, odoris penetrantis, saporis acris: flores in summitate ramorum nati, flavi, aut albescentes, in spicam congesti, galea erecta, bifida, subrotunda, barba tripartita, segmento medio excavato, eleganter crenato, amplo; cæterum binis segmentis, ut alis orificium patulum labiorum cingentibus: semina quatuor, ovalia: Radix in multos ramos divisa, lignosa: crescit juxta vias: videtur vox ficta à Belgico idiomate *een Nat* / *Cattus*: quia catti seu feles hanc plantam delectantur & vescuntur. B. *Natte-kruid* / *Nipte*. G. *Keyten*, *Katzen-kraut*, *Katzen-muntz*. Gall. *Herbe au Chat*, *Pouliot*, *Menthe de Chat*. A. *Nip*, *Nep*, *Cat mint*.

CATARRHOPUS, seu CATARRHUS, dicitur vulgò, quando humores, vapores aut flatus deorsum, ex capiteruunt. Vide *Catarrhus*, ex κάτω deorsum, & ῥεω fluo.

CATARRHUS, Veteribus dicitur humorum ex capite ad subjectas partes, ut nares, os, pulmones &c. defluxus; velut in Coryza, & Brancho contingit. Catarhi tamen non dantur, nam à capite nihil fluit ad illas par-

partes : Sed glandulæ narium , & quæ circa oris partes sunt, sæpe obstruuntur, inflammantur , & hinc illæ lachrymæ. Convenit sic dicere

*Si fluat ad pectus, dicatur Rheuma Catarrhus.
Ad Fauces Branchus, ad Nares esto Coryza.*

Destillationes , has Græci *καταρρῆς* & *καταρρυμῆς* vocant, alique fluores; sunt ut plurimum effectus frigoris, & præter naturam eveniunt ad glandulas , passimque per omnes corporis partes , ubi retrusa jacent vasa secernentia subter loca frigore tacta : ut si frigore excipiat facies, sequatur destillatio in nares ; si cervix & collum , quæque juxta sunt partes , tum fluor ad fauces ; sin inferiora , fiat inde fluxio ad intestina ; & sic porro ; sic pro diversitate arteriarum, venarum , aliarum partium frigore constrictarum, varii oriuntur effectus; destillationes ad varias partes : ex *κατω* deorsum, & *εγω* fluo. B. *En zinkinge / katern.* G. Ein Flusz des haupts. Gall. *Catharre, Rheume, Fluxion.* A. A Rheum.

CATARRHUS SUFFOCATORIUS, est quando (ut Veteribus placet) humores excrementitii à capite ad organa respiratoria decidunt , & suffocationem minantur. Sed potius dicerem esse glandularum, circa laryngem, intumescentiam , vel inflammationem , aut convulsionem muscutorum glottidis rimam claudentium , quâ respirandi difficultas, & suffocatio inducitur : causæ frequentiores observantur, materiæ eliquatæ in fauces, & pulmones subita destillatio; nervorum summa vitia ut in hystericis, polyphus cordis major subito in pulmones trusus ; hinc videtur esse tantum hic morbus subito occidens *ἀπνοιᾶ*. B. *En smorende zinkinge.* G. Stæck-flusz , erstickende flusz. Gall. *Catharre Suffocatif.* A. A. Suffocating, rheum.

CATARRHUS SPINALIS MEDULLÆ, est , cum quædam vasa lymphatica , medullam spinalem ambientia , fuerint rupta, ex quibus latex si decidat, Catarrhus inducitur. B. *En sinkinge des ruggen graats merg.* G. Ein Flusz des Marcks im Ruck-grad. Gall. *Catharre de la Moëlle de l'Epine.* A. A Rheum of the Marrow of the Chinbone.

CATASARCA, idem quod *Anasarca*, ex *κατὰ* per & *σάρξ* caro. N 2 CA

CATASCHESIS, est dispositio bona, hecticæ opposita. ex κατὰ per, & σχῆσις habitus, dispositio.

CATASTASIS, est corporis humani, vel temporis dispositio. à καθίστημι constituo.

CATATASIS, est extensio corporis versùs inferiora, ex κάτω infra, & τένω tendo.

CATECHU, & inconvenienter *Terra Japonica*, succus est ex variis astringentibus fructibus expressus, durus, gummosus & resinosus, ex purpureo nigricans, punctis albis intertextis quasi sitim contraxisset. Venit ex Pegu, Suratta, Magno Mogolis imperio, Malabaria, Bengala & Zeilon. Inter Pinang cum foliis Betel ut plurimum usurpatur. Verus fructus & basis est Acacia orientalis, planta Tamarindo non absimilis. Si tantillum ori indatur, astringit primò, deinde saporem dulcem & gratum relinquit, eodem modo ac folia Thee masticata. Horti malabarici Author, dicit esse succum inspissatum alicujus palmæ areciferæ nucleo versicolori nuci moschatae simili, cujus fructus sessilis *Fausel* dictus vel *Areca* & *Pynang*. Gall. *Cathou*.

CATEGORIA, ex κατὰ, & ἀγορά, forum Judiciale: quòd ea sicut in ipso cuncta sint ordinata. Unde est ordo, sive rerum series quædam.

CATHÆRETICA, sunt *Caustica* seu *Escharotica*, sive Medicamenta, superfluam carnem auferentia & perforantia: distinguenda tamen videntur à causticis, quia carnem vivam alterare non debent, sed tenax adhærens, & semi corrupta vasorum ramenta ad vivam usque carnem resolvere & detergere; hinc detergentia fortissima sive exedentia. Ex καθαρῆσι dejicio, subverto, detraho. B. *Brennende middelen*. G. Brennende mittel. Gall. *Remedes catharetiques*. vel *Caustiques*.

CATHARMA, idem quod *Catharticum*.

CATHARSIS, idem quod *Catharticum*.

CATHARTICUM seu CATHARMA, est Medicamentum purgans, quod ventriculum, intestina & quicquid in sanguine heterogeneum & vitiosum fuerit, expurgat, & in communem cloacam, seu intestina præcipitat. Vide *Purgatio* & *Vomitorium*. Cathartica dicuntur vulgò Cholagoga, ut *Rhabarbarum*, *Scammonium*, *Cassia fistula*, *Diaprunum solutivum*, &c. vel Plegmagoga & Hydra-

dragoga, ut *Colocynthis*, *Jalappa*, *Meeboacanna*, *Diaphænicum*, *Diacarthamum* &c. vel *Melanagoga*, ut *Helleborus niger*, *Folia Sennæ*, *Confectio Hamech*, *Trochisci Albandali*. Sed illa divisio à Neotericis jure rejicitur, cum purgantia ita specificè non operantur, ut creditum. Vocatur item *Purgans Med. Purgatio*, *Medicamentum ventrisfluum* Aurel. quod alvum dejicit. Κάθαρσις, Καταρτηριον ἢ Καθαρτικὸν φάρμακον, Ὑπὶ λᾶτον Hippocrat. Ἐλκτήριον Eustath. & Poll. Κενόσιμον φάρμακον Moschopulo. ἀκαθάρω purgo, mundo. B. Een buikzuiveringe / purgatie. G. Aufzuehrende Artzney, Purgation. Gall. une purgation ou un remede Purgatif. A. A purgative, or purging Medicine.

CATHEMERINA, idem quod *Quotidiana Febris*. Ex κατὰ & ἡμέρα ac si diceret κατ' ἡμέραν.

CATHETER, *immissor* vel *demissor*, est instrumentum recurvum & fistulosum, quod per urethram vesicæ immittitur, ad urinam suppressam evacuandam, vel calculum in vesica hærentem explorandum; estque vel *Flexilis* in priorem usum, vel *Immobilis* in posteriorem simul; vel *solidus* cum crena, qui in incisione adhibetur, accipiendo cultellum dicatus in sua crena. *Ænea Fistula Celsi*, Σίφων *Æginetæ*, ἀκαθίημι immitto. B. Een Catheter / Blaaspeilder / een pyp. G. Eine Harn aufzuehrende Pfeiffe, Catheter. Gall. Catheter, sonde, Tuyau pour tirer l'Urine. A. An instrument to draw out urine.

CATHETERISMUS, est administratio, quâ per catheterem, injectio in vesicam, mediante siphone, & cathetere, fiat, ἀκαθίημι immitto. B. Een inspeutinge in de blaas. G. Einspruetzung in die Blase. Gall. Injection dans la Veste. A. An Injection in to the bladder.

CATHOLICUM, seu PANACEA, dicitur Medicamentum universale seu commune, omnes vitiosos humores corrigens vel educens. Ex κατὰ per, & ὅλον totum. B. Een algemeen genees-middel. G. Ein Artzney wider alle Kranckheiten. Gall. Medicine Universelle, Panacée. A. A general medicine or panacea.

CATHYPNIA, est gravi & alto somno esse oppressum, ex κατὰ per, ad, & ὕπνῳ somnus. B. Een zware sla-perigheid. G. Eine sehr schwere Schlassucht. Gall. Grand Sommeil, ou profond assoupissement. A. Deep-sleep.

CATILLUS CINEREUS, seu OBRUSÆ CATILLUS,

LUS, Gallis *une Coupelle*, est species Catini, ex cineribus lotis facti; cujus usus est ad auri argentique depurationem. Vide *Cupella*.

CATINUS, idem quod *Cupella*.

ΚΑΤΩ PURGARE, hoc est per inferiora purgare, cui opponitur Ἀνω purgare, per superiora purgare.

CATOCATHARCTICA, sunt purgantia per inferiora, ex κάτω infra & καθάρτικον purgatio.

CATOCHE, idem quod *Catalepsis*, à κατέχω detineo, retineo.

CATOCHUS, idem quod *Catalepsis*, à κατέχω detineo.

CATOPSIS, est perspicacitas, à κατόπτομαι perspicio. B. *Woor-zigtigheid*. G. Scharpffsinnigkeit, klarheit. Gall. *Claire connoissance, penetration d'esprit*. A. Quickness, acuteness.

CATORETICA, CATOTERICA, idem quod *Purgantia*, à κάτω infra, deorsum.

CAUCALIS, Est planta, quæ habet caulem ramosum, villosum, ad altitudinem unius circiter pedis: folia aliquantulum Pastinacæ similia, sed tenuius dissecta, villosa: flos est rosaceus & umbellatus, plurimis scilicet petalis constans, inæqualibus, cordiformibus, in orbem positus, & calici insidentibus: Is autem abit in fructum compositum ex duobus feminibus oblongis, quæ parte, quæ se contingunt, plana sunt, ab altera gibba, striata, echinata, aculeata: nomen accepit, vel à feminum effigie, quæ vascula semisphærica imitantur: vel quod præarida strepitum edunt: παρὰ τὸ κεαύσθαι quod præter modum retorrida & exoleta sit. Gaza pedem gallinaceum interpretatur, idque quia Auctuarii Author, οἱ δὲ καῦκον, οἱ δὲ μύτις, δημόκριτος βεῖον, Ρωμαῖον πῆδον γαλλινάκεον, οἱ δὲ πῆδον πέλλι, Ἀἰγύπτιοι σῆτελις, alii *Caucum*, alii *Mutin*, *Democritus Brion*, *Romani pedem Gallinaceum, seu pulli pedem*, *Ægyptii Seselin vocant*. Μύτιν five pedem gallinaceum vocarunt, quod extremum folium Gallinæ pedi conforme est. Καυκὸν dictum testatur Oribasius. Hesychius καυκὸν καῦλων fortè καῦλιον, καὶ ἄγχιον λάχανον, *Cauliculus & olus sylvestre*. Sic fortè dictum, quod semen similitudinem quandam cum calceamento muliebri habet, quod καυκίδα vocat Athenæus: vocatur quibusdam *Daucus Sylvestris*, hinc fortè ex *Daucus, Daucalis & Gaucalis*.

CAVA VENA, vide *Vena Cava*.

CAUDA, vide *Capillamenta*, & *Coccyx*.

CAUDEX, Στέλεχος, Στέλεχος, Κόρμη; dicitur in arboribus & Fruticibus, id quod à radice supra terram simplex assurgit usque dum in ramos explicatur, & in quod à radice fertur alimonia; producitur à concursu plurium radicularum in unum truncum collectarum. B. *Stam*. G. Der Stamm eines Baums. Gall. *Tronc*. A. The stem, or trunk, or body, of a tree.

CAVITATES, sunt ventres majores, in quibus princeps aliquod viscus continetur; ut in capite, cerebrum; in thorace, pulmo, cor &c. in abdomine, hepar, lien, renes, ventriculus, intestina, vesica, &c. suntque tres, caput, thorax, & venter. B. *Holligheden*. G. *Hœlen*. Gall. *Cavités*. A. Cavities.

CAVITATES, minores sunt cerebri & cordis ventriculi, de quibus suo loco. Vide *Ventriculi*.

CAULEDON, est fractura ossis transversim facta, fracti ossis partes ita separans, ut è directo non jaceant, à καυλός caulis, virga. B. *En dwers-breek*. G. Ein Zwerbruch. Gall. *Fracture en travers ou transversale*. A. A breaking crosswise.

CAULIS, vocatur *Brassica*, quod præ cæteris oleribus insigni caule vigeat. Vide *Brassica*.

CAULIS, idem quod supra solum simplex profilit in herbis nominatur: sic utique caudex ad frutices & arbores; *caulis* ad herbas duntaxat pertinet. Gr. Καυλός. B. *Steel / struik*. G. Der Stengel. Gall. *Tige des Herbes*. A. The Stalk of any herb.

CAUSODES, idem quod *Causus*, à καίω uro, & ἴδιον forma.

CAUSTICA, five ESCHAROTICA, vel CATHÆRETICA, sunt quæ cutim & carnem in duram crustam, five escharam exurunt, & si fortiora sunt, vel diutius applicata maneant, consumunt; sunt propriè illa, quæ omnia, quibus applicantur, consumunt. Ut sunt æs ustum, Mercurius sublimatus corros: ferrum candens &c. à καίω uro. B. *Brandende middelen*. G. Durch brennende mittlen. Gall. *Remedes Caustiques, catheteriques*.

CAUSUS, seu FEBRIS ARDENS, ea est, quæ cum majori æstu, quàm in aliis continuis, cum hic sit urens

ferè ad tactum, & inæqualis diversis locis; respiratione anhelosâ & citâ: cutis siccitate magnâ; exacerbatione die impari, anxietate & inquietudine summâ, siti ferè intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis phlogosin arguentibus, cursum suum peragit, à καίω uro. B.

Brandende Koofts. G. Ein hitziges Fieber. Gall. *Fièvre chaude, ardente.* A. A Burning fever.

CAUTERISATIO, est artificialis quædam ustio mediante cauterio, à καυτηρίαζω cauterio inuro. B. **Brandinge.** G. Dasz brennen. Gall. *Cauterisation.* A. Cauterising.

CAUTERIUM, est instrumentum Chirurgicum ex ferro, auro, vel argento confectum, quod postquam incanduerit, actualem inurendi vim obtinet, cujus magnitudo & forma variat. Quandoque etiam pro cauterio potentiali sumitur ex lixiviis vel calce viva cum sapone paratum, à καίω uro. *Cauterium actuale* vocatur. B. **Wadelyk brand-pser**: potentiale verò **vermogelyk.** G. Fick-eisen, Cauterie, Brenneisen. Gall. *Cautéré, Feu Actuel.* A. Searing iron or actual Cautery. Sed potentiale cauterium. B. **Mogelyke branding / inetend-middel.** G. Nicht durch brennende cauterie. Gall. *Feu Potentiel.* A. A potential Cautery.

CEDMATA, dicuntur defluxiones ad articulos, & præcipuè ad coxendicem, à σκιδάζω dissipo, dispergo. B. **Blöepingen.** G. Ein Flusz. Gall. & A. *Fluxion, Rheume.*

CEDRUS, est arbor valdè procera, crassâ, erecta, pyramidalis, cariei non obnoxia: cortex politus: lignum durissimum, rubicundum, habens odorem Cypressi: Rami tortuosi & nodosi: folia angusta, viridîa, parva, squammosa, Cypressi æmula: flos est amentaceus, constans foliolis multis donatis apicibus multis: fructus in eadem planta loco à flore remoto natus, est bacca turgens ossiculis augulatis, foetis semine oblongo: Hæc arbor crescit in regionibus calidis: in monte Libani elegantissima reperitur, hinc ob altitudinem & pulchritudinem, dicitur Arborum Regina: æstate, vigente calore, Resina alba, pellucida, transparens, sponte absque incisione defluit, quæ instar mastichis granorum indurescit. Dicitur quasi à νέω uro: nam uritur ex ea Resina celebris, quæ *Cedria* dicitur: vel παρὰ τὸ νέεσθαι, ab aculeo, planta enim

enim est spinosa. Gall. *Cedre du Liban*.

CELASTRUS, arbor, ex iis quæ tardissimè suos fructus perficiunt, an à κηλῶς quatenus *dies Hiberna*, κηλῶσαι, arbores quædam agrestes; item vasa pastoralia.

CELE, est tumor Herniosus in quacunque corporis parte excitatus, à κηλέω intumesco. Vide *Hernia*.

CELLULÆ INTESTINI COLI, sunt cavitates, vel vesiculæ, factæ à tribus ligamentis partem illam fistulæ intestinalis contrahentibus; ut fæces ibi diutiùs remorentur, & major fiat liquidi exhaustio. In quibus stercora aliquamdiu morantur, ut adjacentes partes suo calore foveant, & quæcunque cruda sunt, diutiùs in iis coquantur & fermententur. Ita in vesiculis seminalibus habentur cellulæ, ad seminis subitum effluxum retinendum. B. *Celletjes*. G. Lœchlein. Gall. *Cellules des entrailles*. A. Cavities in the guts.

CEMENTATIO, est modus aurum purificandi per modum cementi regii. Vide in *Cementum*.

CEMENTUM, est pulvis, cujus ope calcinatio cementatoria peragitur. Vel ut alii, est mineralis acuta materia & penetrans, cum qua metalla strata, ad cemetandum reverberantur atque ita corroduntur, vel calcinantur: estque vel simplex vel mista: Item in forma pulveris vel pastæ. Hinc *Cementare* & *Cementatio*. B. *Verkalkinge met stof*. G. Kalkmachen mit staub, Cement. Gall. *du Ciment*. A. Cement.

CENCHRIAS, est Herpetis species, à similitudine seminis milii, *Herpes miliaris* dicta, à κένχρεσ milium. Vide *Herpes*.

CENCHROS, est milium, fortè enim à κένεργω aspero. Milium album seu luteum est caule aspero & hirsuto, vel à κέγχρον siccum, nam milium est siccissimum. Vide *Milium*.

CENEANGIA, est vasorum sanguineorum evacuatio per venæ sectionem, à κενόω evacuo, & ἀγγεον vas.

CENOSIS, à κενόω evacuo, Idem quod *Evacuatio*.

CENTAURIUM, vocantur duæ plantæ valde à se invicem diversæ, quarum una dicitur Centaurium majus, altera minus; majus dicitur & Rhaponticum Pharmaceuticum: Minus est planta; quæ habet unum vel plures caules parvos, angulosos, politos: folia sunt con-

jugata, fat crassa, oblonga, hyperici fatis similia : hæc ex radice, illa ex caule erumpentia : flos monopetalus, quinquifidus, in umbellam congestus; coloris rubicundi vel purpurei, aliquando albi : post florem succedit fructus ovatus, oblongus, in duo loculamenta divisus, semina exigua continentia : radix est exigua, insipida, lignosa : crescit hæc planta in locis siccis & arenosis. Sic appellatur, quod eo curatus dicitur Chiron centaurus, cum Herculis excepti hospitio pertractanti arma, sagitta excidisset in pedem; hinc à quibusdam etiam *Chironium* *Κενταύριον λιμνήσιον* & *λιμναϊον* Græcis: *Febrifuga* & *Fel Terræ* Latinis. *Limnesion* & *Limneum* dicitur, quod secundum aquarum scatebras ac paludes, quas Græci *λιμνας* dicunt, nascatur. *Febrifuga*, eo quod febres fugat & procul è corpore pellat. *Fel Terræ*, ob summam quam habet amaritudinem. B. *Wuizend Gulden-kruid* / & tum vox composita videtur ex centum, & aurum. B. *Centaurie* / *Wuizent gulden-kruid* / *Santorie* / *Ward-gal*. G. *Taufent-gulden kraut*, *Erdt-gall*, *Fieber-kraut*, *Biber-kraut*. Gall. *Centauree*, *fiel de Terre*, *Centoire*. A. *Centory*, *Centaurie*.

CENTI MORBIA, vid. *Centum morbia*.

CENTRUM, est medium corporis non Mathematicè sed Physicè sumptum, idque cor esse affirmant, à quo tanquam centro, sanguis in ambitum corporis propellitur & circulariter relegatur, à *κεντρίω* pingo; punctum enim est medium cujusque circuli. B. *Het middel-punt*. G. *Der Mittel-punct*. Gall. *Centre du corps*. A. *The middle of a body*.

CENTUM CAPITA, vide *Eryngium*.

CENTUM MORBIA, Est planta, quæ plures habet caules tenues, longos, ramosos, repentes : folia circinnatæ ferè rotunditatis, ex adverso caulis repentia, viridia, saporis adstringentis. Flos monopetalus, multifidus, arctè cauli adnatus : huic flori succedit capsula vel testa rotunda per maturitatem diffiliens, habetque semina minima : radix parva : crescit hæc planta in locis humidis: est *Nummularia*, quia creditur à mirifica sua, quam in pluribus ulceribus medendis obtinet, facultate sic appellari, sunt qui à foliorum similitudine, quæ nummi speciem referunt *Nummulariam* vocant. A nonnullis

Hirudinaria, quod passim terræ Hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec desunt, qui Serpentariam appellent, quòd compertum sit serpentes hâc herbâ, si vulnerentur, sibi mederi. B. *Penning-kruit* / *Wupzend-kruit*. G. *Egelkraut*, Pfennig-kraut. Gall. *Nummulaire*. A. Two penny-grass or Money wort.

CENTUM NODIA, est *Polygonum*, constans ex plurimis nodis.

CENTUNCULUS, & CENTUNCULARIS HERBA, vide *Gnaphalium*.

CEPA, CEPE, Idem quod *Cepa*.

CEPÆA, fortè sic dicitur per ἀντίφρασιν, quòd in hortis non nascatur, ut plura alia, quæ in littoribus reperiuntur, vel nomen accepit, quòd hortensi solo gaudeat, ac in hortis tanquam luxuriat: κήπη enim est hortus nisi fortè κηπαίως nomen accepit παρὰ τὸ κάπω τετίσι πίνω spiro, quòd flatus discutiat.

CEPHALÆA, est dolor capitis pertinax, inveteratus, & difficulter cedens, à κεφαλή caput, & ἄγω laboro, ago. B. *Ingevoztelde hooft-sweer*. G. Haupt wehe von langer zeither, staetz wehrende haupt-wehe. Gall. *Continuelle douleur de tête*. A. A Continual paine of the head.

CEPHALALGIA, sive *Capitis dolor*, sed recens, hinc à *Cephalæa*, quæ inveteratus dolor est, differt, is appellatur, qui aut totum caput, aut aliquam calvariae partem affligit, atque adeo frequens est iste dolor, ut rarò invenias eum, cui per totam vitam nunquam caput doluerit, & certè capitis dolor, ex æquo omnes aggredi solet, atque nemini fermè parcere, sive fuerit obesus, macer, torosus, jejunos, ventre plenus, sobrius, intemperans, æger, aut quoad cætera sanus; denique juvenis, senex, vir, foemina aut quivis. Imò levis adlit ægritudo oportet, aut rarò felicitas, quando non adest *Capitis dolor*. Partes quæ in dolore capitis affici solent sunt vel *externæ*, ut cutis, musculi, pericranium. Vel *internæ*, uti meninges, nervi, cerebrum, periossteum &c. Distinguitur quoque in *externum* & *internum*; *Particularem*, partem hanc vel illam affligens, unde variæ denominationes. In *Accidentalem* à sole, æstu, ira, potu, feбри &c. In *Habitualem*, *Levem*, *Vehementem*, *Acutum*, *Hebetem*, *Brevem*, *Diuturnum*, *Perpetuum*, *Intermittentem*, *fixum*, *vagum*,

vagum, molestissimum, frontis, à gravedine &c. ex κεφαλή caput, & ἀλγέω doleo. B. *Hoofst-weer / Hoofst-pijn.* G. Haupt-pein, Haupt-wehe. Gall. *Douleur de Tête, mal de tête.* A. Headach or paine of the Head.

CEPHALARTICA, sunt Medicamenta quæ caput purgant : quæ dicuntur *Caputpurgia*, ex κεφαλή caput, & ἀγρίζω perfectum reddo. B. *Hoofst-middelen.* G. Haupt-reinigende mittelen. Gall. *Remedes pour la tête.* A. Medicines which purge the head.

CEPHALICA, sunt Medicamenta, quæ stomacho recepta, & ad caput delata, in idem operantur, vel sanguinem, aliàs ineptum ita disponunt & præparant, ut capiti profit ac medeatur : Cephalica autem duplicia sunt, 1º. quæ tenui oleo, sale, spirituque abundant, omnia igitur attenuantia talia dici possunt, ut sunt omnes herbæ Cephalicæ dictæ, insecta quædam ut Aselli; nec non spir. salis armoniaci, spir. cornu cervi, Tinct. Castorei, nec non sal volatile oleosum, olea aromatica; & reliqua quæ odore & sapore inprimis grata sunt, vel 2º. frigida, nimirum illa, quæ odore grato nares afficiunt absque calore, qualia sunt lilium vulgare, lilium convallium, rosa &c. B. *Hoofst-middelen.* G. Haupt-artzneyen. Gall. *Remedes pour la tête ou Cephaliques.* A. Medecines in the distempers of the head, or Cephalicks.

Item vena externa in brachio *Cephalica* dicitur, quia in capitis morbis secari solebat, à κεφαλή caput. B. *Hoofst-ader.* G. Haupt-ader. Gall. *Veine Cephalique.* A. The Cephalick veine.

CEPHALOPHARYNGÆI, est primum musculorum gulæ par, à capitis cervicisque confinio demissum, & in tunicam oesophagi latius expansum, ex κεφαλή caput, & φάρυγξ fauces. B. *De slok-darms hoofst-spieren.* G. Des speisz-roehrs-haupt-maufz. Gall. *les Muscles Cephalopharyngiens.* A. The first pair of muscles of the gullet.

CEPHALOPONIA, est gravitas aut dolor capitis, ex κεφαλή, caput, & πόνος dolor, labor. B. *Zwaarhoofdigheit.* G. Haupt-wehe. Gall. *Pesanteur de tête.* A. Heaviness of the head.

CERA, sunt Apum favi, ex quibus mel expressum est, & constituunt corpus durum, ad calorem ductile, inflammabile, flavum, lentescens, in summo frigore du-

duritiem ferè friabilem acquirens, saporis & odoris mellei, inservitque omnibus ferè emplastris pro basi. Videatur Terebinthinæ quædam species, quam succi pingues plantarum sole calefactarum exsudent in superficiem, aut intra capsulas apiculorum floralium gerunt, quæ ab apibus colligitur, in globulos cogitur, posterioribus pedibus applicatur, in alvearibus deponitur, ibi in cellulas favorum fingitur, unde dein, uti dictum, melle separato, fœcibusque repurgatis, comparatur in usus humanos: hæc materies ceracea apparet quidem copia minutissima in superficie foliorum quibusdam in plantis, ut in Rosmarino, notante Cl. *Boerhaavio*, manifestè videtur apparere; aliter & sunt plerùmque globuli exilissimi, qui salient de apiculis seminalibus plantarum apertis, in parte floris masculina. Hæc vix ullâ arte colligi queunt ab hominibus; attamen deprehendit idem Cl. *Vir*, quòd aliquando cupiens folia Rosmarini sæpe cohobare cum alcohole, præter expectationem invenerit saporem ingratum, & odorem ceræ deturpassè spiritus hos primo bonos. Inde folia hæc lustrans microscopiis tubercula ceracea in superficie deprehendere videbatur, manibusque tractans multum, ceram digitis sensim accrescere experiebatur satis evidenter. B. *Was.* G. Wachs. Gall. *Cire* A. Wax.

CERÆA, sunt uteri cornua in brutis, in quibus generatio fit, à *κίρας* cornu. B. *Hoozen des Baarmoes* *derg.*

CERASUS, Est arbor, quæ habet folia majora, lucida: Calix est valdè cavus, monophyllus, coronatus, coronâ quinquifidâ, expansus, per maturitatem retroflexus: flos est rosaceus, pentapetalus, petalis natis ex interstitiis segmentorum calicis; staminibus triginta fœcundus: ovarium, tubâ longâ instructum in imo fundo Calicis fit fructus pulposus, subrotundus, vel cordatus, fœtus testa ossea rotunda, nucleum ejusdem figuræ recondente: pediculus fructus valdè longus: hæc arbor colitur in hortis, & ingens hujus datur diversitas, ejus flores ceram olent, hinc fortè à *κηρός* cera. Vel à Cerafunte Pontica urbe τὰ κεράσια fructus cerasi. Fortè à *κῆρ κῆρ*, quod cerasi fructus, cordis specie & colore in pomariis nostris visantur. B. *Kerse-boom / Kerse-booni.* G.

G. Ein Kirsch-baum. Gall. *Griottier Cerifier*. A. Cherry-tree.

CERANIUM, vide *Cadus*.

CERATIUM, est arboris filiqua, à κέρως, quia est corniculata.

CERATOGLOSSUM, est proprium musculorum linguæ par à cornibus ossis hyoidis prognatum, & linguæ lateribus junctum; usus est linguam recta deorsum anteriora versùs movere, quando ambo agunt: si verò alteruter contrahitur, in latus movet dextrum vel sinistrum, ex κέρως cornu, & γλῶσσα lingua. B. **Des tongss-beengs-hoorn-spiereu**. G. Des Zung-beins horn-mauß. Gall. *les Muscles Cerato-Glosses*. A. A pair of muscles of the tongue.

CERATODES, idem quod *Cornea tunica*, à κέρως cornu, & εἶδος forma.

CERATOMALAGMA, est compositio emolliens ex cera aliisque parata, à κηρὸς cera, & μαλάσσω emollio. B. **En zachte was-salf**. G. Eine weich machende salbe von wachs. Gall. *un onguent emollient de Cire*. A. A Composition made of Wax.

CERATONIA, est arbor ceratia, seu filiquas produ-cens, ex κέρως cornu, quia filiquæ cornubus non sunt ab-similes. B. **Sint Jans Brood**. G. Sanct Johans Brodt. Gall. *Carougier*. A. The carob-tree.

CERATUM, CEROTUM, vel CERATOMALAG-MA, à cera sic dictum, Medicamentum est externum, ex cera, oleis, & nonnunquam pulveribus compositum, un-guento crassius, & emplastro mollius. B. **En Zalf uit wasch/ was-pleister**. G. Ein Pflaster von wachs. Gall. *Carat*. A. Seare cloth.

CERAUNIA TUBERA, dicuntur, quia olim credi-derunt ea post fulminis ictus nasci: Κεραυνὸς enim ful-men est.

CERAUNOCHRYSOS, idem quod *Chryso-ceraunius* pulvis, ex κεραυνὸς fulmen, & χρυσὸς aurum.

CERCHNOS, est Laryngis quædam asperitas, quæ in-star granorum Juniperi sentitur, unde tussicula sicca ex-citatur, à κίρχω raucedine laboro. B. **De Hink-horst**. G. Ein Schaff-husten. Gall. *Toux Seiche, ou Coqueluche*. A. A Dry cough.

CER-

CERCIS, est os cubiti secundum, quod *Radius* appellatur, ob radii rotarum æmulationem, à *κερκίζω* radio. Vide *Radius*.

CERCIS, nomén accepit quod folium ejus in cacumen instar radii textoris, vel cunei exeat. *Κερκίς* enim est radius, pecten, & dicitur quasi *κερκίς*, quod folia ejus etiam cælo tranquillo crepent, sonitumque edant : (dicitur de populo arbore) est enim *κρίκειν*, *κρύειν* pulsare.

CERCOPITHECUS, *κερκοπίθηκος*, à *κίρς*, cauda, & *πίθηκος*, simia : est simia caudata.

CERCOSIS, dicitur carnosâ quædam excreſcentia ab uteri osculo prodiens, & pudendum muliebri replens, quod aliquando exterius progressum caudæ figuram refert, à *κίρς* cauda. B. *Gen uitwas des Moeders*. G. *Aufz wachs der Bärmutter*. Gall. *Excreſcence de la matrice*. A. An Excreſcence hanging out of the womb.

CEREA, Idem quod *Achor*.

CEREBELLUM, five *παρεγκεφαλής Heroph.* *ἑγκερνον Galeno* *ἐπικρανίς Poll.* *ἐπισθις* *εγκεφαλός*, quasi parvum cerebrum, sub posterioribus lobis cerebri, inferiori cranii parte situm; figuram habet ad globosam accedentem, superficiem minus gyrosam quàm cerebrum, sed quasi sulcatam, cujus sulci in medio maximi, at per gradus sensim minores, desinunt in Processum vermiformem; dividitur in partem dextram & sinistram, substantiam ferè eandem habet ac cerebrum, sed corticalis hic longè copiosior quàm medullaris, quæ arbusculas pulchrè repræsentat, quarum trunci ita dictos pedunculos cerebelli constituunt; nullæ hic adsunt cavitates ut in cerebro. In hac cerebelli substantia spiritus animales, actionibus involuntariis & merè spontaneis obeundis generantur. In homine, non item in brutis, exterius ex plurimis lamellis, sibi invicem incumbentibus constare videtur. B. *De Achter-hersenen / of kleine hersens / agter-bzein / by-hersenen / minder-bzein*. G. *Hirn-lein*, das hintertheil des hirns. Gall. *le Cervelet*, ou *Petit cerveau*. A. Little braine, or the hinder part of the head.

CEREBRUM, vitalia capitis, *Plin.* *εγκεφαλός*, *λευκός μύελός* *Sophocli* strictè sumitur pro parte anteriore τοῦ *εγκεφαλός*; estque substantia sui generis, exterius tegitur pia matre, plurimis gyris anfractibusque dotatur, exterior sub-

substantia cinerea est, in qua spiritus animales generantur : Interior alba est, sive medullaris quæ spiritus animales ex corticali recipit, eosque per corpus callosum & medullam oblongatam in nervos exonerat à quibus actiones voluntariæ maximè dependent. Item, cerebrum est imaginationis, iudicii, memoriæ & reminiscentiæ subiectum ; Ideæ enim seu species rerum ab organis sensuum externorum receptis, deferuntur ad sensorium commune sive initium medullæ oblongatæ, deinde per corpora striata ac corpus callosum, ubi imaginatio & iudicium fit, verum in corticali substantia memoriæ sedes dicitur ; si ideæ post aliquot tempus ex memoriæ loco revocantur reminiscentiæ nomine veniunt. Somnus item fit in cerebro, de quo vide suo loco. B. *De Dooz-hersenen / de groote-hersenen / bzein*. G. Das Hirn, oder gehirn. Gall. *le Cerveau ou la Cerveille*. A. The Brain.

CERELÆUM, est linimentum ex cera & oleo compositum, à κηρός cera, & ἔλαιον oleum. B. *Gen Wasch-smeer-sel*. G. Eine Salbe von Wachs. Gall. *Un Cerat*. A. A Sear cloth, Wax-ointment.

CEREVISIA MEDICATA, est cerevisia cui Medicamenta, cuilibet morborum scopo, convenientia, infusa fuerunt. B. *Genees-bier*. G. Artzney-bier. Gall. *Biere medecinale*. A. Physick Beere.

CEREVISIA, CERVISIA, CERERISIA, CELIA, est potus ex frumento compositus, qui ob egregias vires quasi *Cereris Vinum* appellatur. B. *Bier*. G. Bier. Gall. *de la Biere*. A. Beer.

CEREUS, est sedi species, in modum cerei, ex cera confecti, erecta. B. *Tooz-kruud / Fakkel-kruud*. G. Torschen-kraut, Fackel-kraut. Gall. *espece de trique madame*. A. Torch thistle.

CERIA, idem quod *Favus & Achor*.

CERINTHE, est planta, quæ ex radice quatuor vel quinque ramos germinat, qui rami rotundi sunt, succo pleni ; folia habent oblonga, acuta, lanuginosa, coloris viridis cærulei, punctis albis notata : flos est tubulosus, in medio ventrem habens, infra & supra quasi connivens : ex floris calice surgit pistillum, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, tetragonum, quod deinde abit in fructum, ex duabus testis subrotundis constantem, in duo loca.

loculamenta divisis, femine fætis ut plurimum oblongis, acutis; cujus floribus apes pascuntur, unde cera, κηρός enim est cera; vel à Cerintho urbe Bœotiae, ubi copiosè nascitur. B. **Wasch-kruid.** Wachs-kraut, Fleck-kraut. Gall. *Herbe de cire, melinet.* A. Honey-suckle, Honey-wort.

CERIO, Idem quod *Favus & Achor.*

CEROMA, Idem quod *Ceratum.*

CERONEUM, à cera dictum, idem quod *Ceratum.* B.

Den Ceroen / Wasch-pleister. G. Ein Pflaster da Wachs bey ist. Gall. *Cerat.* A. Sear-cloth.

CEROTUM, Idem quod *Ceratum.*

CERRUS & CERRIS, est arbor glandifera; sic fortè dicitur, quòd ejus glandes in acervum coagmententur; alii derivant à κέρας cornu, ob lignum durum. B. **Eike met bittere Eekelen.** G. Cerraichel, Cerr-eichel. Gall. *Cere.* A. Matthearing.

CERVARIA, est Sefeli Æthiopicum: an quòd cervi illam plantam ament? G. Hirsch-wurtz, Sessel-kraut, sed B. **Harst-wortel** / propter odorem resinofum.

CERVICARIA, five TRACHELIUM, est Campanulæ species: sic dicitur, quia morbis cervicis internis & externis, medeatur. B. **Hals-kruid.** G. Nacken-kraut. Gall. *Gantelet.* A. Throat wort, Canterbury bell.

CERVINUM CORNU, vide *Coronopus.*

CERVIX, Gr. αὐχὴ & ἐπρωμῖς, est posterior pars intra caput & dorsum, uti anterior *Collum* vocatur. Sic appellatur *Cervix uteri* ea pars, quæ est intra fundum & os uteri. Ita ossa dicuntur habere cervices, uti videre est in superiori parte ossis femoris, intra illam partem quæ in acetabulo reconditur, & trochanterem majorem, à quibusdam *Nucha* dicitur: in plantis, pars est illa à capitatis radicibus prodiens, praelonga, teresque: sic dicta, quòd in colli speciem figuretur. B. **De Nek / den Hals.** G. Der Nacke, das Genick. Gall. *Chignon du cou.* A. The Neck.

CERUMINA, Gr. κηρίδις, sunt aurium fordes, quæ in meatu auditorio ex glandulis auri adjacentibus proveniunt: Constant ex plurimo sale & sulphure adusto, unde amaritudo dependet: Utilia sunt ne pulvis, festucae, animalcula, &c. aurem internam subeant, dum quoque

membranam internam ab exsiccatione præservant. Vide *Marmorata aurium*. B. *Φορ-ſinner* / *Φορ-ſeep*. G. Ohrenschmaltz. Gall. *la Cire, ou eſpece de glu, qui ſe trouve dans l'oreille*. A. Ear-wax.

CERUSSA vel CERUSA, eſt plumbum mediante aceti vapore in calcem albam redactum. Gr. *ψιμύδιον*, à *ψιμύδιον* ceruſſa obliſo. B. *Ceruſſ* / *Tlood-wit*. G. Bley-weiß. Gall. *Ceruſe*. A. White lead. Arab. *Aſſedegi* ſeu *Aſſidagi*.

CESTRUM, appellatur *Betonica*, à varietate, ut vocant, & copia remediorum, quoniam variis & plurimis accommodatur morbis. Sed aliis *κίτρον* vocatur, à floribus ſpicata & mucronata acutis, verruculum, vel viriculum præferente. Vide *Betonica*.

CETE, *κίτη διὰ τὸ κύττω*, ob ſinuofam cavitatem, ſeu cavum ventrem. Intelligitur de majorum piſcium genere. B. *Walbiſch*.

CETERACH, quam vocem à *Pteryga* manafſe volunt, atque *p*. in *c*. ſæpe mutari ſcribunt. Sic ex *Pteryga*, *Cetergya* & corruptè *Ceterach*: eſtque Aſplenii ſpecies officinalis. vid. *ibid*.

CHÆREFOLIUM, CHEREFOLIUM, CHEREPHYLLUM, CEREFOLIUM; ſunt ſynonyma: eſt planta, quæ ex radice plures caules dimittit, tenues, ramoſos, teneros, à parte ſuperiore convexos, inferiore verò concavos inſtar ſtillicidii, politos: folia habet petroſelini, ſed minora, plus incifa, & molliora, villoſa in parte ſuperiore, ſucco plena: flos eſt roſaceus & umbellatus, plurimis ſcilicet petalis conſtans, inæqualibus, & calici inſidentibus: calix autem abit in fructum ex duobus ſeminibus compoſitum, roſtri avium æmulis, non ſtriatis, nunc lævibus, nunc aſperis, hinc gibbis, inde verò planis; atque ſic planta nominari putatur, quòd luxurioſâ foliorum fœcunditate & largiore comâ gaudeat, vel quòd gaudium, hilaritatemque folia excitent, ex *χαίρω* gaudeo & *φύλλον* folium. *Chærefolium* autem, Græcâ voce & Latinâ coaleſcentibus in unum nomen, ob id dictum eſt, quòd foliis luxuriat. B. *Kerbel*. G. *Kœrſſel-kraut*, *Kerbel-kraut*, *Kœrbel*, *Kurbel*, *Kœrbel-kraut*. Gall. *Cerfeuil*. A. Chervil.

CHALASTICA, ſunt Medicamenta quæ humectando & emolliendo, partes conſtrictas relaxant, à *χαλάω* relaxo, remitto,

CHA-

CHALAZIA, item χαλάζωις, Grando, est tuberculum in palpebris grandinem referens. B. *Ein weg-scheetjen / een strontjen*. G. Ein Hagel-geschwulst. Gall. *la grêle des paupieres*. A. A swelling Hailstone.

CHALAZÆ, binæ singulis ovis obtigerunt, altera in obtuso, altera in acuto angulo, plus earum in albumine reperitur; vitello tamen validius adhærent, ejusque membranæ appenduntur. Corpora sunt longiuscula, quasi duo canales cavi, varios emittentes surculos per albumen & vitellum, quibus intra amnium communicant, & hinc oculo apparent, concreta magis quam albumen, & albidiora, nodosa, luciditatis cujusdam non expertia, ut grando, unde illis nomen: Constat enim quælibet Chalaza pluribus quasi grandinibus seu canaliculis ex trunco majori derivatis, albumine ab invicem sejunctis; earum altera major est, & longius à vitello versus obtusum ovi cacumen protenditur: altera minor, à vitello inferius versus acutam ovi partem porrigitur. Major ex duobus vel tribus nodis, quasi grandinis granis, globulifve conflatur, qui modico intervallo à se invicem distant; minor ordine majori succedit, à χαλάζω grando. B. *Dr Hahn*. G. Der Hahn, das weisse im Ey. Gall. *Les Grêles ou Germes des œufs*. A. The tread of an Egg. Est etiam suum morbus, quando caro apparet, ac si alicam hinc inde conspersam contineret. Ideòque vocantur grandinosi. B. *Goztig*. G. Greisfig, pfinnig. Sive porcorum lepra. Gall. *Ladrerie de porc, sursemure*. A. The kernels of a swine.

CHALBANUM, vide *Galbanum*.

Chalcitis, est minerale simile æri, friabile nec lapidosum, sory tenuius, Myfi verò crassius, tractu temporis ex sory factum, à χαλκός æs. Arab. *Colcothar* vel *Cholcho-tar*. Pro Chalcitide Pharmacopæi hodierni Vitriolum album sive crudum, sive ustum substituunt.

CHALCUS, vide *Æreolus*.

CHALYBS, est ferrum purificatum, à vulgari differens, quod durius sit, & ignitum in aqua extinctum in summam duritiem abeat, à populis in Ponto ferrum preparantibus. Gall. *Acier*, quod ex eo fiant acies cultrorum. B. *Staal*. G. Stahl. A. Steel. Vide *Ferrum*.

CHALINOS, *Aureliano*, est ultimus angulus oris ac compago, vel buccarum pars circa labiorum confinia,

à χαλινὸς quòd sit veluti frænum & retinaculum oris.

CHAMÆACTE, est *Ebulus*, five sambucus humilis, ex χαμαὶ humi, in terra, & ἀκτὴ sambucus.

CHAMÆBALANUS, est terræ glans, vel simile quid, ut bulbocastanum, terræ tubera &c. ex χαμαὶ humi & βάλανος glans : sic dicitur quòd cortice terræ crescat. Vide *Apion*.

CHAMÆBATOS, est rubus humilis, à χαμαὶ humi, & βάτος rubus, sentis. Vide *Rubus*.

CHAMÆCEDRYS, est Abrotanum foemina, & dicitur, quasi humilis cedrus, ex χαμαὶ humi & cedrus.

CHAMÆCERASUS, Est arbuscula, quæ crescit ad altitudinem duorum circiter pedum ; habetque ramos lignosos, fragiles, cortice albescente obductos, medullâ albâ plenos : folia instar periclymeni, sed majora, latiora, duriora, minus viridia, acuta, villosa inprimis in parte inferiore, ex adverso opposita : flos monopetalus, parte inferiore tubulosus, bilabiatus superius, labio superiore multifido simplici, linguæ simili inferiore, ovario insidens, quandoque geminus in uno ovario, quinque staminibus præditus : calix tenuis, longus, angustus, bifolius, cui insidet ovarium, sæpe uno pedunculo geminum, emittens intra quemlibet flosculum tubam longam ; abit deinde in baccas molles rubras, similes ceraso minori, succo amaro & ingrato plenas, & semine compresso, subrotundo fætas ; est cerasus humilis, ex χαμαὶ humi & cerasus.

CHAMÆCISSUS, vide *Hedera Terrestris*.

CHAMÆCISTUS, in genere hic dictum volo, quòd ne cramben centies millesiesve coctam apponamus, χαμαὶ nihil aliud significat, quàm illud quòd humile & humi crescat : est enim Græcum præpositum, additæ voces sunt tantum investigandæ.

CHAMÆCYPARISSUS, est arbuscula pumila, ex χαμαὶ humi, & cypressus, ab odore & forma foliorum cum cypresso arbore.

CHAMÆDAPHNE, vide *Clematis Daphnoides*, ex χαμαὶ humi & δάφνη Laurus.

CHAMÆDRYS, Est planta parva, humilis, quæ plures caules habet ad altitudinem semipedis, tenues, rubicundos, lanuginosos : folia minima, per intervalla sibi invi-

invicem opposita, oblonga, firma, villosa, dentata instar quercûs, saporis amari, acris, aromatici : flores in foliorum alis nascentes, coloris purpurei, saporis grati : semina quatuor obrotunda in capsula, quæ flori, tanquam calix inservivit, inclusa ; radix minima, fibrosa, lignosa : crescit hæc planta in locis incultis, saxosis. Dicitur quasi humilis quercus, quod sc. folia quercûs habeat, & hujus respectu, quasi humi repat : ex χαμαι humi, & δένς quercus, dicitur ob parvitatem *Quercula* minor & à serratis foliis *Serratula* appellatur. Sunt qui *Serratam* idèò dici putent, quòd ab ea ferra inventa sit. B. *Maage Eike*. G. *Garmanderlein*, vergifz mich nicht, Batyengel. Gall. *Germandrée*, *Chefnette*, ou *petit Chesne*. A. *Germander*.

CHAMÆLEON, est Cardui species, à foliorum varietate sic dici solet ; mutat enim cum terra colores ; quod & in animali chamæleonte etiam fieri solet.

CHAMÆLEUCE, dicitur Tussilago, à χαμαι humi, nam Tussilaginis folia humi crescunt, & λευκή alba, ob foliorum nempè albedinem.

CHAMÆMELUM, Est planta, quæ plures caules habet tenues, semi pedem circiter altos : folia laciniata, vel minutim divisa : flos plerumque radiatus, cujus discus ex plurimis flosculis, corona verò ex semi flosculis componitur, embryonibus insidentibus, & calice squammoso comprehensus ; embryones autem deinde abeunt in semina oblonga, thalamo affixa : radix est tenuis & filamentosa : icta planta habet odorem penetrantem non ingratum : est *Camomilla* corruptè, quasi esset humilis malus, quoniam odorem habet mali, ex χαμαι humi, & μέλον malum. B. *Wermillen*. G. *Chamill*, *Kamillen*, *Kamomil*, *Kamamil*. len. Gall. *Camomille*. A. *Camomil*.

CHAMÆPITYS, Est planta, quæ habet plures caules parvos, longos instar manûs transversæ, lignosos, villosos, repentes, instar arbusculæ dispositos : folia oblonga, angusta, villosa, dentata, albescentia : flos est monopetalus, unilabiatus, in tres partes divisus, quarum media bifida, labii superioris locum occupantibus denticulis : Ex floris fundo surgit pistillum quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina oblonga in capsula, quæ floris calix fuit, recondita : flores sparsim in foliorum alis nascuntur, non verò

rò verticillatim ; radix crassa , fibrosa , longa , lignosa : tota planta habet odorem penetrantem , resinofum & ingratum , fapor est amarus : crescit in montibus & locis sabulosis : dicta est , quasi humilis & brevis , humique depressa picea , ex χαμαι humi , & πικρα picea , pinus ; ejus enim folia piceam olent. Vocatur etiam *Abiga* & *Ajuga* , ut & *Ibige*. Hinc abjectis duabus literis *i* & *g* , *Iba* & ab *Ajuga* abjectione literarum *a* & *g* , *Iva* manavit in vulgi nomenclationem. Officinæ *Ivam* cognomento *Muschatam* , appellant , vide *Abiga* & *Iva*. B. *Weld-cypres*. G. Vergis mich nicht , je lenger , je lieber , Schloff kraut , Erdpumedrig. Gall. *yvette* , *Moschate* , *Pinive arterique*. A. Ground pine.

CHAMÆSYCE , χαμαισύκη , ex χαμαι , humi , & συκή , ficus , quasi humilis ficus.

CHAOS , ex antiquo χάω , quod ex χαίω , hio , dehisco. Est vastus hiatus : vel dicitur rudis indigestaque moles , qualis initio mundi fuit.

CHARACIAS , dicuntur plantæ quæ circa valla crescant , hinc tithymalus characias , &c. Nam χάραξ val- lum est.

CHARACTER , est signum figuratum & Mysticum , quo apud Chymicos aliquid designatur , à χαράσσω sculpo. Apud Botanicos sic audit notâ illâ propriâ , quâ genera plantarum ab invicem distinguuntur. B. *Ein teyken*. G. Ein Zeichen. Gall. *Charactère* , *marque*. A. A Marke or sing.

CHARISTOLOCHIA , vocatur Artemisia ; fortè à χάρις gaudium & λόχος puerpera : quia lochia puerperarum cum gaudio pellit.

CHARLATAN , Gal. dicitur circulator : vel ab Hisp. *charlar* , boufon.

CHARTA EMPORETICA , seu BIBULA , est papyrus sine glutine facta , admodum porosa , filtrationi interviens. B. *Flad-papier*. G. Fließend Papier. Gall. *Papier brouillard* , *Papier à filtrer*. A. Blotting , vel sinking Paper , capper , brown paper.

CHARTA VIRGINEA , Idem quod *Ammios*.

CHEILOCACE , seu LABROSULCIUM , est infantum morbus , adultos enim rarò adoritur. Labra in eo admodum tument , tumore duro & nonnihil rubicundo ,
sed

sed nequaquam fervido, aut inflammatorio, & qui nunquam suppuretur aut caput fœdet; aliquanto magis introrsum quam extrorsum vergit: unde labia à gingivis & dentibus abscedunt longius, & foras aliquatenus replicantur. Adfunt sulci semper sanie madentes, aut crasso pure obfiti: ulcuscula, ut plurimum, concomitantur in ore, palato, lingua, buccis, labiis, gingivis. B. **Water-kanker.** G. Wasser-krebs. Gall. *tumeur Chancreuse*. A. Water-kanker, Kanker of the mouth. Derivatur χεῖλον labrum seu labium, & κακόν malum.

CHEIMETLON, Idem quod *Pernio*, à χεῖμαλιών per-nionibus laboro.

CHOEIRONIUM, idem quod *Cacoëthes*.

CHELÆ, à χήλαι, sunt denticulati cancrorum forcipes.

CHELIDONIA, seu CHELIDONIUM, est planta, quæ distinguitur in minus & majus; minus est species Ranunculi habetque folia instar cochlearis rotunda, viridia, polita, splendentia, nervosa, longis pediculis adnata, aliquatenus hederacea, sed molliora, minora: calicem habet triphyllum, admodum fugacem, & ante petala caducum: florem polypetalum, rosaceum: semina in capitellum congesta: radicem plurimis adnatis nodulis nodosam; hinc scrophularia minor dicitur. Crescit ad ripas, fossasve. Gall. *petite Chelidoine*, ou *petite scrophulaire*. A. Small. Celandine or Pilewort. *Chelidonium majus*, habet plures caules sesquipedem altos, tenues, rotundos, nodosos, ramosos, parum villosos: folia profundè incisa, dentata, similitudinem aliquam cum foliis Aquilegiæ habentia, utcunque tamen majora, longiora, numeroque plura: flos tetrapetalus est, cruciformis, luteus: siliqua est bivalvis, semina obrotunda & flavescencia habens: radix crassa, fibrosa: Tota planta scatet succo luteo escharotico odoris penetrantis, saporis acris, & amari: dicta à χελιδών hirundo: eo quod Hirundines eâ suis oculis medeantur, quamvis, ut tradunt, erutis. Sed *Chelidonium minus*, sic vocatum quod floreat hirundinum adventu, hinc & ille ventus *Chelidonia* quoque appellatur. Alii putant dici quasi *Cheli domum*, idque ob vires præstantissimas, tam in oculorum morbis quam vulneribus. B. **Stinkende gouwe / Gouw-wortel / Schelkens-hruid.**

kruid. G. Schel-wurtz, Schel-kraut, Schwalben-kraut, Goldt-wurtz. Gall. *Chelidoine*, *Eſclaire*. A. Great Celandon, celondine, celandine, ſwalow-wort.

CHEMA, eſt Veterum menſura, continens duo cochlearia parva.

CHEMIA, idem quod *Chymia*. Olim ſignificabat artem *χρυσοποιητικὴν* & *Μεταλλουργικὴν*. Vide *Chymia*.

CHEMOSIS, ſeu *Chymofis*, eſt tunicæ albæ tumor, ita ut oculi nigrum concavum videatur, à *χαίρω* hio, hiſco.

CHENILLE, à canicula, ex ſimilitudine hujus animalis.

CHENOCOPRUS, eſt ſtercus anferis, ex *χῆν* anſer, & *κόπρω* ſtercus.

CHENOPUS, vocatur *Pes anſerinus*, ejus etymon derivatur à *χῆν* anſer, & *πῆς* pes. Vide *pes Anſerinus*.

CHEREFOLIUM, & **CEREFOLIUM**, ſive **CHERIFOLIUM**, vide *Chærefolium*.

CHERMES GRANA, vide *Kermes*.

CHERMES & **KERMES**, eſt vox Arabica, Pharmacopæis familiaris: eſtque *Coccus Baphica*, ſeu *inſectoribus*, vulgò *Scarlatum*, hinc *Chermozinum*, id eſt color ex cocco extractus. Vide ulterius in *Coccus*.

CHERONIA, ſive **CENTAURIUM MAJUS**, ſic appellatur, quòd plurimis malis, curamque reſpuentibus medela ſit: *χείρων*, enim eſt pejor, ut & *χείρονα*; Medicamen illud, olim à Chirone, Medico quondam inventum. Vide *Centaurium*.

CHERVILLUM, videtur fictitia vox aſifarum, hinc *Servillum* & ſic deinceps.

CHILIOPHYLLON, eſt Millefolium, propter millena foliola ſic nuncupatum, ex *χίλια* mille, & *φύλλον* folium.

CHIMETLON, idem quod *Pernio*.

CHIMIA, idem quod *Chymia*.

CHYMIATRI, ſunt illi Medici qui medicamenta chymica præſcribunt, ex *χυμία* chymia & *ιατρὴς* Medicus.

CHINA CHINÆ, vide *Cina Cine*.

CHINA RADIX, ſatis eſt craſſa, manum longa, contorta, nodofa, inſipida, & ſine odore. Eſt *Orientalis* è China allata, & *Occidentalis* quæ ex Hiſpania nova & Peru nobis

nobis adfertur. Præfertur tamen orientalis, quæ exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente : & hæc, quo nigrior eo melior. Occidentalis est colore interius magis ruflo : simlacis in modum crescit, folia ferè plantaginis magnitudine, cordiformia : caules habet spinosos, repentes, & arboribus vicinis adhærentes. In morbis podagricis, in lue venerea, aliisque curatu difficilibus maximi usûs existit, sed an effectibus, promissis respondeat, meritò dubitatur. Chinenfis dicitur *Lompatan*, *Lampacos* & *Bonti*, nobis à regione China appellatur *Radix Chinæ*. Persis *Chop China*. B. *China-wortel*. G. Bocken-wurtz. Gall. *Chine*, *esquine*. A. China root.

CHIRAGRA, est arthritidis species, sive articularis manuum dolor, vide *Arthritis*, ex χεῖρ manus, & ἀρτερία venor, quasi manibus captus. B. *Hand-bang* / *hand-eubel* / *hand-sleccijn* / *hand-jigt*. G. Das zipperlein der hænden. Gall. *Douleur* & *goute aux mains*. A. The gout in the hand.

CHIROMANTIA, est divinatio ex inspectione manuum, quâ ex lineamentis futura prædicunt, Medicis scitu non necessaria, cum potius sit ars fallax, ex χεῖρ manus, & μάντις vates. B. *Hand-hjking*. G. Wahrsägung auf den Hænden. Gall. *Chiromantie*. A. Chiromancie.

CHIRONES, idem quod *Sirones*.

CHIRONIUM, est ulcus malignum, & curatu difficillimum. B. *Quaadaardig-zeer*. G. Ein böses geschwær. Gall. *Ulcere malin*. A. Ulcer difficul to ture. Vide *Ca-coëthes*.

CHIRONIA & CHIRONIUM, nomen invenit à Chirone Centauro, vide *Centaurium* : ab eodem inventore putant quoque Brioniam vocari *Chironium*.

CHIRURGIA, est ars, quâ ope manuum vel instrumentorum, morbos auferre nitimur. Vel est pars Therapeutices, quâ morbi incidendo, urendo, & membra dearticulata restituendo, curantur. Vel Chirurgia est scientia docens modum & qualitatem operandi in corpore humano vivente. Vel ut *Vigo* habet, Chirurgia est scientia docens modum & qualitatem in carne, nervo & ossè hominis laborantis propriis Chirurgorum manibus, omne morbosum curandi. Estque quintuplex : quamvis

alii quadripartitâ divisione gaudent. 1. *Synthesis* seu separata conjungens. 2. *Diaresis*, continua solvens. 3. *Diorthosis*, compressa & contorta corrigens. 4. *Exaresis*, superflua extirpans. 5. *Anaplerosis*, deficientia restituens, ex $\chi\alpha\iota\epsilon$ manus, & $\epsilon\gamma\omega\upsilon$ opus. B. *De heel-konst / Chirurgie*. G. Wundartzney. Gall. *Chirurgie*. A. Chirurgie.

CHIRURGUS, est vir artis Chirurgicæ peritus, ex $\chi\alpha\iota\epsilon$ manus, $\epsilon\gamma\omega\upsilon$ opus, qui instrumentis & manibus suis in corpore humano operatur. B. *Een Heel-meester / Mond-meester / Chirurgijn*. G. Ein Wund-artz. Gall. *Chirurgien*, A. Surgeon, a Chirurgion. Habentur, qui in genere omnia, quæ sunt in arte Chirurgica, aggrediuntur, ut vulgares Chirurghi. Sed & sunt, qui circa unicum solummodo accidens versantur, ut *Lithotomi*, qui calculum fecant. Alii qui oculos curant; alii lvi venereæ medentur. Nonnulli dentes evellunt; quidam membra luxata, vel contracta restituunt &c.

CHLOROSIS, five MORBUS VIRGINEUS, vulgò *Icterus albus*, quia ex albo virent. Videtur esse species Leucophlegmatix, ex sanguine viscido, five potius ex inertia solidorum, quâ sanguinis periodus & spirituum animalium confectio præpeditur, cum mensium obstructione, & diaphoresi denegata, unde fibris muscularibus obstructis, & spiritibus deficientibus, ad quodvis opus peragendum tardæ & segnes evadunt, à $\chi\lambda\omega\rho\iota\varsigma$ viridis sum. B. *Maagde-ziekte / Byster-ziekte*. G. Hertz-gesperr, Farb-sucht, Jungfer siechte. Gall. *les Pâles couleurs, Chlorose, Maladie de filles*. A. Greene sickness.

CHOANA, est infundibulum in medullæ oblongatæ basi propè coalitum nervorum opticorum repositum, rimam in concursu ventriculorum amplectitur, unde per hoc liquida serosa ex cerebri ventriculis, ad glandulam pituitariam deducuntur. Item pelvis renum, de qua suo loco; est item instrumentum ex quovis metallo factum, vel vitro, per quod liquores in aliud vas funduntur. Gr. item $\pi\acute{\upsilon}\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, $\lambda\eta\kappa\omicron\varsigma$ *Herophilo*, à $\chi\acute{\iota}\omega$ fundo. B. *Een trechter / tremelle*. G. Ein Trechter. Gall. *Un entonnoir*. A. Funnel, Tunnel.

CHOCOLATA, est compositio quædam ex fructibus *Cocoa* dictis, vainigliâ, Cinamomo, Saccharo &c. quæ omnia in massam vel placentulas rediguntur. Dicitur &

Succholata, & *Chucalata* ; præparatur cum lacte vel aqua cocta & fervida, atque agitando Chocolata liquefcit, & forbendo calidè bibitur. Vide *Cocoa*. Gall. *du Chocolat*.

CHOENIX, est mensura Veterum, continens cotylas tres, five sextarium unum & dimidium, five duas libras mensurales cum quadrante. Notatur signo X. & desuper imponitur V. secundum aliorum calculum continet vini quadraginta & quatuor uncias, & olei circiter quadraginta.

CHOERAS, idem quod *Scrophula*, à χοῖρε porcus : fortè quia porcis familiaris est.

CHOLAGOGA, sunt Medicamenta quæ dicuntur ordinatam in Hepate & vesicula fellis secretionem bilis augere, illam vel in Intestina ducendo, vel receptam per Intestina statim & recta expellendo, reducuntur ad duas classes, quarum prior continet quæcunque sanguinem hepaticum attenuando, secretionem bilis uberiores promovet ut sunt saponacea &c. posterior autem includit omnia illa, quæ diaphragma & abdomen violenter concutiendo, bilem ex hepate & vesica fellea in intestina derivant, inter cholagaga recensentur quædam ut *Rhabarbarum*, *Senna*, *el. diapruni* &c. à χολή bilis, & ἄγω duco. Vide porro *Catharticum*.

CHOLEDOCHUS, est ductus biliaris, communis ductus, recipiens ortu suo ductus Hepaticos, & vesiculæ fellis, quæ cum poro biliario ad angulum acutum jungitur suo ductu, & duo hi ductus uniti faciant ductum communem majorem prioribus, oblique descendente, qui ad angulos acutos appositus duodeno, penetrat exteriorem ejus tunicam, dein inter hanc & alteram descendens, mox perforata & hæc, inter secundam & tertiam longo itinere progressus, foramine rotundo in cavum intestini liberè exit; & per hunc ex vesicula fellis & ductu hepatico, bilis ad intestinum duodenum propellitur ex χολή bilis & διχομαι recipio. B. *De Gal-leider*. G. *Der Gallen gang*. Gall. *Le conduit commun du fiel*. A. *The Common passage of the gall*.

CHOLERA, five *Passio Felli-flua*, est convulsivus motus ventriculi & intestinorum, in quo omne quod in ventriculo & intestinis continetur, sed præcipuè bilis, copio-

piosè per os & anum ejicitur, imò aliquando omnis quæ in corpore existit: Adfunt Anxietates magnæ, gravis cardialgia, sitis ardens, inquietudo & virium subita prostratio, Diarrhœa quoque seu bilis, & aliorum humorum per inferiora effluxus magnus: Hinc pulsus in principio celer & frequens, debilis fit, tardus & intermittens; animus deficit, exteriora frigent, & mors accedere incipit, quæ aliquando intra paucas horas ingruit. Huc referunt *Choleram siccam*, quæ est eructatio magna multorum flatuum cum dolore & crepitu, ex χολή bilis & ῥέω fluo. B. *Galbzaken / boort / bozt / buikwee / krebeling*. G. Der Gallen kranckheit, cholerische feuchtigkeit. Gall. *Debord, Trouffe galant*. A. The gall flixe or choler.

CHOLERA SICCA, vide *Cholera*.

CHOLERICA PASSIO, idem quod *Cholera*.

CHOLERICUS, dicitur de eo qui plurima bile abundat. B. *Galagtig*. G. Gallfuechtig. Gall. *Bilioux*. A. *Cholerrick*.

CHONDRILLA, est planta, quæ folia ex radice erumpentia habet magna cichorei sylvestris similia, profundè incisa, per terram in orbem sparsa, ex his caulis enascitur, inferius spinosus & in plures ramos divisus flexiles, nudos, vel foliola tantum quædam gerentes angusta instar graminis: flos est semiflosculosus, constans plurimis semi flosculis, embryoni insidentibus, & calice veluti tubulato ac cylindriciformi comprehensus: Embryo autem abit deinde in semen pappis instructum: radix est longa, pollice crassâ, succo lacteo valde viscoso plena, saporis dulcis non ingrati: hæc planta nomen invenisse videtur ab eventu, quod in ramulis imis gummi reperiri solet, magnitudine fabæ, mastichi simile, aut nucleo thuris, quem χόνδρον Græci nominant. B. *Dratten-kruid*. G. Wurtzen-kraut, warzlein wegwart. Gall. *Condrielle*. A. Gum succory.

CHONDROS, vide *Cartilago*.

CHONDROS, est granum grumus concretus, ut mastichis, Thuris &c. Hinc *Condrilla*.

CHONDROSYNDESMUS, est ligamentum cartilagineosum, sive unio ossium, interveniente cartilagine, ex χόνδρος cartilago & συνδέω colligo. B. *En kraak-beenige band*. G. Knorre-lichte zusammen-fuegung der beinen. Gall.

Gall. *Ligament Cartilagineux*. A. A Cartilaginous ligament.

CHORDA, idem quod tendo, nervus, vel intestinum, de quibus suo loco.

CHORDA, dicitur tensio quædam penis versùs perinæum, cum dolore, ex Venere maligna sæpe contracta. B. *ἰσος*. G. Seiten. Gall. *Cordée*. A. An extension of the yard.

CHORDA MEMBRANÆ TYMPANI, est nervus quidam formatus à concursu duorum nervorum, filamenti sc. tertii rami quinti paris, & filamenti septimi paris, tympani membranam non tangens. Hoc ipsum est parvum illud nervi filamentum, quod olim Anatomici velut *Chordam membranæ* tympani arbitrati sunt, quod crediderunt sonum aliquem excitare posse, communicando motum suum tremulum membranæ sicut fit in chorda, quæ super pellem tympani militaris tenditur; sed ejus usus patet ex natura sua nervea, & distributione. B. *De Trommel-blics ἰσος*. G. Die Seiten gleiche Senn-ader im Ohr. Gall. *Corde de la membrane du Tympan*. A. The nerve that runs along the membrane of the tympanum.

CHORDAPSUS, sic *Celfo* dicitur, à *Barbaris Misere-re mei*; alii *Iliacam passionem*. Tormentum *Aurelianus* dixit. *Volvulus* etiam non inscitè appellatur, vulgò *Ileus*. Estque facum alvinarum per solum os ejectio, ab obstructione excrementorum, à flatibus, inflammatione, aut involutione & convulsione intestinorum, causata; cùm nempe superior pars intestinorum in inferiorem, vel è contrà sese insinuaverit, quâ involutione velut nodi inde exoriuntur, unde quoque motus peristalticus inversus. Dicitur quoque chorda intestini coli, seu ligamentum, quod cellularum dissolutionem impedit. Vide *Iliaca passio*, ex *χορδῆ* intestinum, & *ἄπτω* nodum facio, necto. B. *King / Darm-king / ontfermt u mijner / lang eubel / darm-singer / drek-braken*. G. Darm-gicht. Gall. *passion Iliacque ou misere-re*. A. Griping of the guts.

CHORDATA GONORRHÆA, vide *Gonorrhæa Chordata & Chorda*.

CHOREA SANCTI VITI, est insanie species, quæ aliquando diu grassata est, hominibus non decumbentibus, sed *ἰεθοσαδην*, ut *Hippocrates* appellat, discurrentibus

bus & saltantibus, ac choreas ad extremum usque spiritum, nisi per vim inde abstracti fuerint, ducentibus. *Horstius* inquit se cum mulieribus quibusdam locutum, quæ quotannis Sacellum S. *Viti*, quod est in finibus *Ulmensis*, visitantes, ibidem saltu cum perturbatione mentis, eousque sese nocte dieque exercent, donec ecstaticarum instar corruunt: quâ ratione sibi restitutæ videntur, ut parùm vel nihil sentiant per annum integrum, usque ad Maji tempus subsequens, ubi membrorum inquietudine eousque sese torqueri referunt, ut vicissim circa Festum S. *Viti* ad prædictum locum, saltationis gratiâ, sese conferre cogantur. G. St. Vits Tantz.

CHORION, est membrana secundinarum externa, una cum cæteris membranis & humoribus factum in utero comprehendens. Figura ejus in variis animalibus diversa; in mulieribus orbicularis, membranacea ipsius substantia, prioribus mensibus exilissima, tractu temporis crassescit; constat tenuibus, squammosis membraneis pelli- culis. Ea, quæ respicit uterum maternum parte lustrata; apparet hæc membrana rugosa, pinguitudinis nonnullius propaginibus, ac quasi venosis & arteriosis, sine ordine obvenientibus, sparsim superficiem occupantibus, filamentis tenerrimis comitata: interior ejus pars non videtur alia esse, utcunque examinata, nisi aliquo modo continuata, sed tenuis, fibrosa, retiformis textura, magis minusve, à rubentibus memoratis filamentis occupata: Hinc vasa, quibus insignitur, sunt venæ & arteriæ, quarum insignes ramificationes in glanduliferis cunctas ejus partes perreptant, quæ multis in locis concurrentes, rubicundas maculas efformant, harumque beneficio utero annectitur. In placentiferis verò per ejus partem mediam, ubi nimirum placentæ cohæret, vasorum sanguineorum myriadibus superbit, at extra placentæ circumferentiam nullis dari, certum est: hæc membrana in hominibus, uno solum in loco, utero adnascitur, in aliis animalibus hic connexionis modus, pro animalis diversitate plurimum variat: usus ejus videtur esse, liquorem alendo fœtui idoneum imbibere, vasa umbilicalia fulcire, atque carunculas in glanduliferis, & placentam in placentiferis sustinere: dicitur fortè sic à *χωρίω* secedo, quod post fœtum enixum secedit: vel à *χωρίον* parvus locus,

eo quod in ipsa membrana, tanquam in loco parvo, fæ-tus novem menses habitat, ut volunt *V. Fort. Plempius* cum *R. de Graaf*, vel ἀπὸ τοῦ χορῶς à choro, quia in eo va-sa, ut in choro ordinata sunt; à Galeno secundinæ nomi-ne donatur. **B. Het buitenste vliez der Dageboorte / ader-vlieg.** *G. Das Ader-häutlein.* *Gall. Chorion, Mem-brane des Eaux.* *A. The outward membrane that contains the child.*

CHOROIDES, est plexus arteriæ carotidis & venarum plurimarum, sub specie membranarum tenuissimarum cum invicem cohærentium, in ventriculis cerebri anterioribus reperiendus, in quibus, ut cavi maneant, arteriæ liqui-dum continuò deponunt, quod Venæ ex illis iterum ab-sorbent. Item *Uvea tunica* pupillam constituens, ex χορο-chorus, eo quod vasa velut in choro disposita sint, & ὠ-ῖ-δος forma. **B. Een geblogten net / net-gelyk.** *G. Netz-gleiche Gefäßlein.* *Gall. la membrane Choroide.* *A. The folding of the carotid arterie.*

CHRISTI MANUS, vide *Manus Christi*.

CHRISTOPHORIANA, est planta, quæ caules ha-bet exiguos, teneros, ramosos, ad altitudinem circiter duorum pedum crescentes: folia sunt magna, ampla, in plurimas partes oblongas divisa, acuta, dentata, coloris viridis albescentis: flores pentapetali, stellati, rosacei; flos non aperitur, quin diffletur calix, sic & petala cito diffantur, ita ut de numero petalorum non conveniant in-ter se auctores: post florem sequitur bacca mollis, ferè ovata, aliquantulum carnosa, quæ per maturitatem sit ni-gra, continens semina gemina ordine ut plurimum super invicem posita: radix satis crassa, fibrosa, externè nigra, internè flava: crescit hæc planta in montibus, quæ fortè à quodam Christophoro nomen habet. *Gall. herbe de Saint Christophle.*

CHROMATISMUS, est coloratio seu tinctura in sano & morbofo statu urinarum, salivæ, cruoris, vel sterco-ris, à χρωματίζω coloro.

CHRONICUS, est morbus diuturnus, ultra quadrage-simum diem extensus, ut Febris quartana, Phthisis, Asthma, Hydrops &c. à χρόνος tempus. **B. Een langdurige ziekte.** *G. Eine stete, langwirrige Kranckheit.* *Gall. Ma-ladie Chronique.* *A. An inveterate distemper, or a Chro-nicall disease.*

CHRO-

CHRONIUS, idem quod *Chronicus*.

CHRYSANTHEMUM, Est planta, quæ habet caulem altum, squammosum, cineritium, in multos ramos divisum, multa folia incisa millefolium referentia habentem; singulus ramus florem radiatum aurei coloris in summitate habet; hujus discus ex plurimis flosculis, corona verò ex semisflosculis componitur embryonibus insidentibus, & calice semisphærico ac squammoso comprehensis: embryones autem deinde abeunt in semina plerumque angulata aut striata, vel tenuia & acuta: radix annua est, fibrosa, non longa, minima, alba; crescit in montibus ac pratis; floret per totam æstatem: ejus appellatione plures herbæ, flores luteos eximio splendore micantes habentes, veniunt, ex χρυσός aurum, & ἄνθος flos, vel ἀντίζω floridum reddo.

CHRYSISCEPTRON, est *Chamaeleon* album, sed unde illud nomen ei competit, nescio, derivatur ex χρυσός aurum, & σκήπτρον Sceptrum, Baculus, Scipio: fortè quòd ejus caulis cum floribus, in modum sceptri se erigat: vel quod accensus, tonitru in modum sonum edat.

CHRYSOCERAUNIUS PULVIS, est *Aurum Fulminans*, quod præparatur ex auro soluto, in menstruo sale armoniaco imprægnato; infuso oleo tartari, calx ad fundum præcipitatur, quæ edulcoratur & ad usum exsiccat, ex χρυσός aurum, & κεραυνός fulmen. B. *Blixenient-gout* / *Wunder-gout*. G. *Donner-gold*. Gall. *Or fulminant*. A. *Fulminating gold*.

CHRYSOCOLLA, Est sal fossilis, figuræ variæ, magnam aquæ vigecuplo majorem, copiam ad solutionem requirens, & calorem magnum; sapore subamarescente, sed dulcescente in exitu; ad ignem facilè fluens; simul in spumas tum assurgentes se effundens; aquam plurimam ita dimittens; residuo in vitri pulchri speciem subsidente; corporum sibi commistorum fluxum in igne valde promovens; sic metallorum, auri præprimis, consolidationem efficiens. vide & *Borrax*.

CHRYSOCOME, est herba flores aureos & comosos proferens, ex χρυσός aurum, & κόμη coma.

CHRYSOLACHANON, est *Atriplicis* species, foliis subluteis, ex χρυσός aurum, & λάχανον olus. Vide *Atriplex*.

CHRY.

CHRY SOLITHOS (Veterum) vel *Topasius* (gemmariorum modernorum) est gemma aurei coloris. Duo habentur genera, *Oriente & Europæum*, ut illud colore, ita duritie Europæum superat : hoc enim instar cryſtalli molle est, & cum aureo colore, vel multum vel parum nigricat. Invenitur in Bohemia passim. Gr. χρυσόλιθος, ex χρυσός aurum & λίθος Lapis. B. *Chrysolit*. G. Ein Chryſolith. Gall. *Topaze*. A. Chryſolite.

CHRY SOMELA, sunt mala citrei vel aurei coloris, ex χρυσός aurum & μήλον malum.

CHUS, Gr. χῆς, dicitur & *congius*, *congiarium*, & *cboa*. Liquidorum mensura Atticis fuit, sex sextarios continens, vel cotulas atticas duodecim. Libras quoque olei continet novem, vini verò decem, mellis tredecim cum dimidia. *Lindenius* vini saltem tribuit libras octo cum unciiis quatuor. *Rhodius* Congium denas libras pendere affirmat, aliis continet vini octo libras, & olei septem cum quarta parte.

CHYLIFICATIO, est actio in ventriculo & intestinis, quâ cibi & potus, & digerendo & movendo in chylum mutantur. Vide *Chylus*.

CHYLOSIS, idem quod *Chylificatio*.

CHYLUS, est succus albus, ex levi dissolutione & motione alimentorum, præcipuè sulphuris & salis, quibus esculenta abundè scatent, in ventriculo & intestinis, qui interveniente ventriculi succo acido, albus redditur : si enim liquori cuilibet, sulphure, aut sale volatili imprægnato, humorem acetosum confundas, illicò lactescit; uti cernitur in præparandis lacte sulphuris, aut extractis vegetabilium resinosis. Quin & spiritus cornu cervi, aut fuliginis, sale volatili plurimum refertus, si liquori acido vel aquæ simplici confundatur, colorem lacteum acquirit : vera chyli albitudinis causa debetur inprimis miscelæ partium oleosarum ingestorum cum aqua, quod satis evidenter apparet in emulctis, quæ eo magis albescunt, quo olei plus continent. Tandem Chylus post commixtionem bilis pariter & succi pancreatici volatilis intestinorum papillas & lacteas venas subiens, sanguini suffunditur, à χολάω in succum redigo. Latinis etiam *Chymus*. B. *Chyl* / *Chyl* / *voedend sap* / *maag sap*. G. Erst verdawte Speiße im Magen, oder Chyl. Gall. *Le Chyle*. A. Chyle.

CHYMETLON, idem quod *Pernio*.

CHYMIA vel CHYMIA, est ars, docens regulas, quarum exercitatione fiunt operationes, quarum effectu corpora sensibilia, quæ vasis capi possunt, inter se componuntur, vel resolvuntur; horum mutationes per sensus examinat, idque inprimis ope ejus instrumenti, quod ignis dicitur: ejus partes sunt duæ igitur vel *solutio* corporum, vel *compositio*. Dicitur *Chymia*, vel *Chemia*, seu cum Arabico articulo *Alchymia* vel *Alkymia*: Unde hic deducta alii aliter sentiunt. Alii Chymiam à $\chi\acute{\omega}$ vel $\chi\acute{\omega}$ dictam existimant, quod scilicet metalla dura, visceribus terræ effossa, liquare & fundere primum docuerit. Alii $\chi\alpha\mu\acute{\alpha}\nu$ nominant, quasi ut quidam volunt, *Artem Ægyptiam*. Cum enim ut refert *Plutarchus* in libro de *Iside & Osiride*, Ægyptus à Sacerdotibus Sacrà Linguâ Chemia appellaretur; aut ut est apud *Herodotum*, in *Ægypto*, oppidum quoddam vetustum, *Chemis* nominaretur, hinc *Chemiam*, quasi *Artem Ægyptiam*, in *Ægypto* scilicet primo, seu inventam, seu excultam, dictam putant. Alii à quodam *Alchymo*, seu inventore seu cultore hujus artis, dictam existimant: sed sine fundamento: cum enim ab aliis ars hæc *Chemia* & *Chymia* appelletur, ex Arabica lingua articulum, AL, quæ intendit significationem accessisse facile patet. Alii *Halchemiam* quasi satis fusoriam dictam putant; sed etiam eadem de causa ineptè. *Celius Rhodiginus*, antiq. lect. lib. 7. cap. 2. *Archymiam*, quasi $\alpha\epsilon\rho\gamma\acute{\upsilon}\rho\alpha\ \chi\eta\mu\acute{\epsilon}\alpha\nu$ nominat; verum cum nondum satis constet, an vox hæc Græca vel Arabica aut Ægyptia sit, de ejus derivatione non multum laborandum. Differentiam hodie faciunt inter Chymiam & Alchymiam, nempe Chymiam referunt ad artem Medicam, verum Alchymiam ad artem $\chi\epsilon\rho\sigma\omicron\pi\omicron\iota\eta\tau\iota\kappa\acute{\eta}\nu$. *Ægyptiis* $\iota\alpha\upsilon\epsilon$ vocatur item *Spagiria*, *Hermetica ars*, *ars perfecti Magisterii*, *ars Segregatoria*, *Separatoria*, & *Destillatoria*. B. Chimie Alchymie / Schei-konst / Stof-scheiding Metaal-konst. G. Chymey, Schmelzt-kunst, Giesz kunst, Scheid-kunst. Gall. Chimie. A. Chymistry.

CHYMIATRIA, idem quod *Chymia*, est medicandi ars per Medicamenta Chymica, ex $\chi\eta\mu\acute{\epsilon}\alpha$ & $\iota\alpha\tau\epsilon\rho\sigma\iota\alpha$ Medicatio.

CHYMICA, seu CHYMICALIA, sunt Medicamen-
ta,

ta, quæ Chymici præparant, ut gratiori & minori quantitate ab ægris assumantur.

CHYMICALIA, idem quod *Chymica*.

CHYMICUS, est artis Chymicæ peritus, sive Chymicus est artis dissolvendi, & vicissim coagulandi peritus. B. *Gen stof-scheider / stof-ber-er-bzenger / Chymist / bzander / laborant / laborateur*. G. Ein Chymist, Distillirer. Gall. *Un Chimist*. A. A Chymist.

CHYMOSIS seu CHEMOSIS, est palpebrarum ex inflammatione distortio: Item tunicæ Corneæ in oculo inflammatio, à *χέλιω* hilco. B. *Entsteking in d'oogen*. Entzuendung der Augen. Gall. *Inflammation des yeux très violente*. A. A distortion of the Eye lids by an inflammation.

CHYMUS, idem est quod *Chylus*, à *χύω* succum ex primo, fundo. Nonnulli tamen eo designant partem Chyli optimam, à fecibus separatam, & lactea ingressam.

CICADA, quasi citò cadens: vel à *κίε*, ejusdem animalis sono, & *ᾄδον*, ex *ᾄδω*, canto. Gall. *Cigale*.

CICATRISANTIA, sunt medicamenta, quæ impedimentum tollunt, quo vetabatur vasorum ex unione dissolutorum concretio vel exsiccatio; sunt igitur, quæ liquida allata ad soluta vasa reddunt blanda, dein vasorum fines flexiles reddunt, extenduntque, denique vasa hæc exsiccant; inter quæ præcipua sunt, quæ ex plumbo conficiuntur, vel quæ ex illo constant. Gr. *καταλοιπὰ φάρμακα, ἐπιδερμικά*. B. *Wund-machende Medicamenten*. G. Wund-heilende, oder Haut-machende Artzney. Gall. *Remedes cicatrizants*. A. Cicatrising Medicines.

CICATRIX, Cicatrices sunt vestigia quædam & notæ, quæ relinquuntur post gravia vulnera & ulcera, quare cutis defædatur. Aliæ sunt simplices, aliæ cum cavitate & diminutione partis, aut superexcrementiæ. Gr. *ἔλκ*. B. *Gen Wund-teiken / een wond-teiken*. G. Ein Wund-mal, Narben, ein Schramm. Gall. *Cicatrice*. A. The scar of a wound.

CICER, est planta vel Leguminis species; quæ habet caules tenues, lignosos, duros, ramosos, aliquantulum villosos: folia exigua, villosa, dentata, bina costæ adhærentia: flores sunt parvi, leguminosi, albi, aut rubi.

bicundi : flori succedit filiqua brevis continens femina referentia caput arietinum, unde hæc planta cicer arietinum dicitur : cicer est vel rubrum vel album, rubrum officinale, album culinarium; cicera rubra sunt ciceris fativi femina rotunda, angulosa, pisso majora, unico angulo acuto prædita, coloris ex fusco rubentis, saporis viscosi & leguminosi : radix longa, exigua, alba : an sic vocetur à cienda urina ? An quia venerem cieat & stimulet ? An quod eminentem habeat cicatriculam ? An à κικὸς robur, quod ejus cibus corpus roborat ? An ab Hebræorum *Kikar*, massa, pars rotunda. B. *Cicere* / *Spaanse Erwtten*. G. *Kichren*, *Kicher*, *Zifer-erbsen*. Gall. *Pois ciches ou pois bécn*. A. *Chices*, *chicpease*, *vetches*. Gr. Εἰβιθ.

CICERA TARTARI, dicuntur pilulæ ex Terebinthina & cremore tartari.

CICERBITA, est Sonchi species, an à Cichoreo, quasi parvo dicta ? Cichoreum enim à quibusdam κίχρη & κίχρηα appellatur. Vide *Sonchus*.

CICHOREUM, Est planta, quæ habet caulem intortum, crassum, rotundum, villosum, excavatum, ramosum : folia longa, valde lactescentia, amara, plus minusve incisa, aliquantulum villosa : calix floris totus maturus redditus, valde est compressus, oblongus, squammosus, atque instar vasis cujusdam recondit femina angulosa instar cunei, in parte superiore excavata, alba : radix crassa, sat longa, & fusca extus, intus albicans, succum habet saponaceum, in orbiculos descissa dat lac amarum, hinc inter lactescentia refertur : distinguitur in sylvestre & fativum, sed prius usitatus est in Medicina ob amaritatem. Ægyptium nomen est, ac inde in Græciam, postea in cæteras nationes commigrasse docent. Cichoreum tamen dictum videtur à κίχρη *invenio*, *reperio*, quod frequens in pratis, campisve nascatur ac reperiatur. Vel à κίχρη & χωρίον, quod per agros serpat. B. *Cichorei* / *Duikeri* / *Duikeri* / *Wegewaart* / *Wegweisz* / *Hindleufft*. G. *Zamblaw-wee wart*, *Weg-weisz*, *Hindleufft*. Gall. *Cichorée sauvage*. A. *Cichory*, *Succhory*. Gr. Σίχρη, ἀπὸ τοῦ σάιζειν, *σάζειν* mundare purgare.

CICINDELA, quasi candela, noctiluca. Est enim genus scarabæi nocte lucentis. Gall. *ver luisant*.

CICONGIUS, est mensura duodecim sextarios continens.

CICONIA, quasi cicania Isid. à sono quem quatiente rostro faciunt illæ aves : vel à cicur, ob benignam naturam. B. *Spebaar*. Gall. *Cigogne*.

CICUTA, Est planta, quæ habet caulem fatis altum, crassum, politum, serpentis cutim referentem, excavatum : folia minutissimè divisa, & subdivisa, petroselino fimillima, inodora : flores sunt albi in umbellas crescentes, plurimis constantes petalis cordiformibus, inæqualibus, in orbem positis, & calici insidentibus : is autem abit in fructum ferè globosum ex duobus seminibus compositum, exiguis, hinc gibbis & striatis, inde verò planis : radix cauliformis, longa, alba, crassa, tota planta habet odorem ingratum, sapor ejus est acris : est herba lethifera, morte Socratis clara. An appelletur, quòd ejus assumptione caput Vertigine & Fatuitate, imò morte afficiatur ? Gr. *κάρσιον* : nam *καὶνῶν* est *εἰς ψαῖν* vertere. B. *Scheerling / dulle petercelp / winterling / pyphkruid / dulle herbel*. G. Schirlinck, wutscherling, wundt-scherling, wueterich. Gall. *Cigue*. A. Hemlock.

CICUTARIA, est planta, quæ habet caulem ingentem, nodosum & concavum : folia cicutæ majoris fimillima, semina profundè striata, angusta, oblonga, magna : radix fibrosa, cujus nomen à cicuta derivatur.

CILIA, propriè sunt extrema palpebrarum corpuscula duriora, & cartilaginosa, semilunata, quæ Græci *τάγρας* vocant, Latini *Cilia*, quibus pili insiguntur, quos alii *Cilia* appellant. Superioris palpebræ pili versùs superiora curvantur, sed inferioris versùs inferiora ; semper ferè eandem servantes magnitudinem, impedièntes ne leviora oculo incidant, nam duplici pilorum insignium serie constituti sunt. Horum etiam usus videtur, dare sensum acutissimum, unde simulac aliquid oculum, quod ipsum lædere possèt, appetit, hinc monitus statim clauditur ; & moderare lucem, & oculum quasi in umbram constitutere ; ne à radiis lucis fortioribus lædatur ; hinc fit, ut qui his carent, non nisi in crepusculo benè videant. Gr. *βλεφαρίς*, *ὀφθαλμός*. B. *d'Oog hairen* G. Hærlein an den Augenliederen, Augenbrawen. Gall. *Les cils ou Poils des paupieres*. A. The haire on the eye lids.

CIMOLIA TERRA, *κιμωλία*, à Cimolo Infula in mari Cretico, unde ortum habuit : est boli species.

CINA CINÆ, seu **CHINA CHINÆ**, est cortex peruvianus, non absimilis cortici junioris quercûs, saporis nonnihil astringentis penetrabilissimi & amari, paulum ingrati & quo amarior & ponderosior est iste cortex eo melior, adversus febres maximè laudatur. Dicitur & *Kin-kinna*, *Palo de Calenturas*, *Gannana peride &c.* Arborem repræsentat *T. Bartholinus*, sed descriptionem nullam dat. Hinc cujusnam arboris cortex sit, hodiè nondum benè constat.

CINAMOMUM, est arbor altitudine citri aut mali aurantii; magna habens folia, lauri foliis similia, glabra: Vidi nuperrimè ramulum cui adhuc sex folia insidebant, & integrum folium seruo, referens figuram, quam edidit *Abrab. Munting*; *A. Costa* repræsentat etiam cinamomi folium: sed non convenit cum meo, sed potius infum Malabattrum refert: Fructus habet nigros, glandes referentes, magnitudine avellanæ nucis. Cortex interior Cinamomum propriè est. Videtur differre à *Cassia lignea*, (cujus variæ dantur species) cum cinamomi cortex grandior sit & sapore penetrantior: Cassiæ verò tenerior & manducata mucilaginem præbet: optimum cognoscitur solum gustu, nam licet color & odor adsint, sæpe tamen non est bonum, nam mora & adulteratione sæpe vim amittit; cortex externâ parte liberatus, secatur in laminas quadrangulas, exsiccat, & spontè convolvitur, hinc cortex ramorum esse videtur, cum sit reverà trunci. Cortices fortè unius quoque arboris sunt, & rami majores fortassè præbent cinamomum, teneriores verò cassiam sed hæc conjectura minimè verosimilis apparet, ob rationes hic & in cassia lignea, allatas. Radix suppeditat *Caphoram*; lignum roseum spirat odorem; Folia juniperum olent; fructus verò expressi & cocti ceram velut adipem dant & Caryophyllos odore imitantur. Flores habet albidos ferè inodores. Colitur in Zeilon, maximum est Aroma, & in Medicina quoque maximi usus. Dicitur & *Canella*; *Cinamomum* dictum contendunt, quasi *Amomum Chinesè*, seu *Amomum* ex China delatum: alii nomen accepisse putant à verbo *Cau*, quod lignum, & *Nama*, quod dulce significat. Nonnulli *Κινναμόμον* dictum

etum credunt, quasi *κίναμον ἄμαμον*, Amomum à puritate cinamon, vel nomen fortè impositum ab Hebræorum *Kinamon*. B. *Kannel*. G. Canel, Zimmetrinde, Zimmet. Gall. *Canelle*. A. Cinamom.

CINARA, Est planta, quæ ex radice folia erumpentia habet longa, larga, ampla, profundè incisa, ex his emergit caulis satis magnus, striatus, lanuginosus, crassus, intùs medullosus, plures ramos dimittens, quorum singuli habent in summitate capitulum variæ magnitudinis, valde squamosum, rigidum, durum; squammæ, fructu factò grandiore dissolvuntur, ac superius virent, interius verò ac inferius carnosæ sunt & albidæ: comeduntur ex hoc capite partes duæ, nempe squamarum ungues, & medius discus, cui papposum semen infidet. florem habet flosculosum, plurimis scilicet flosculis constantem multifidis embryoni infidentibus. Dictam volunt à cinere quo stercoreari amat. Alii à *Cinara* potius puella, quæ in ejus speciei carduum mutata est, appellatam esse contendunt: vocatur etiam scolymus. Gr. *Σκόλυμος* vel *σκολιός* asper, quia hæc planta est aspera nonnullis *Cocalus*, *Alcocalus*, *Articoca*, & *Articocalus*. Vide *Articocalus*.

CINEFACTIO, est quando res per ignem comburuntur, & in cinerem reducuntur. B. *Aschmakinge*. G. *Aschmachung*, zu aschen verbrennen. Gall. *Reduction en cendres*. A. A making or burning into ashes.

CINERARIA, appellatur Jacobœa marina, cujus folia cinereum habent colorem.

CINERARIUM, idem quod *Conisterium*.

CINERATIO, idem quod *Cinesactio*.

CINIS, est pulvis ille griseus ex combustionem rerum combustibilium residuus, constatque ex sale (qui elixivari potest) atque terra, ut dicitur mortua. B. *Asche*. G. *Aschen*. Gall. *Cendre*. A. Ashes.

CINIS CLAVELLATUS, propriè cinis est ex claviculis vitis. Aliis est caput mortuum ex destillatione fœcum vini residuum, combustum & elixivatum. Nonnullis est sal ex cineribus lignorum quorundam extractum, optimèque reverberatum. B. *Pot-asch / weed-asch*. G. *Weid-asche*, *pot-asche*. Gall. *Cendre gravelée*. A. Ashes.

CINNABARIS, alia est *Factitia*, & alia *Nativa* five *Mineralis*. *Factitia* conficitur ex Sulphure & Mercurio, ex quibus mixtis fit sublimatio. *Nativa* est Terra mineralis lapidescens, rubicunda, constans etiam ex sulphure & mercurio vivo cum terrestri materia instar lapidis, compactis. In ipsis fodinis ex sulphure & argento vivo coagulasse per fusionem ab igne subterraneo factam, docet arte factâ cinnabaris; & ejus resolutio facilis in verum sulphur & Mercurium. Adfertur ex India orientali, Ungaria, Germaniæque locis variis; prope Alsheimium Palatinatus &c. Eligenda quæ gravida Mercurio & Sulphure præstantioribus, adeoque Ungarica, utpote quæ auro aliquantulum pollet; quo quidem respectu minus valet usui medico quàm civili. *Dioscoridi* dicitur *Minium*; quamvis diversum nobis à Cinnabari sit; datur etiam Cinnabaris antimonii, quæ est massa compacta, dura, opaca, ponderosa valde, quæ in collo retortæ, ubi præparatur butyrum antimonii, reperitur, à parte quâ superficiei vitri adhæret, splendet, ab altera scabra, trita in pulverem; dat veram cinnabarim ex Mercurio & sulphure antimonii unitis constantem. Videtur dici à *κινάβρα*, ob sædum odorem quem exhalat, dum foditur, à *κινίβραω* oleo, sæteo. B. *Vermilioen* / à verme quodam ex Illicis baccis proveniens, cujus succo panni serici & lanei rubro colore saturato inficiuntur. Item *Berg-rood* / *Cinaber*. G. Zinober. Gall. *Cinabre*. A. Cinnabar.

CINNABARIS, CINNABRION HERBA, appellatur Rubia tinctorum, quia ejus radicibus lintea &c. rubro tinguntur colore, cinnabari vix dissimili.

CINNUS. Gr. *Κυνών*. Potus genus apud veteres nominatissimum ex polenta, caseo aliisque vino incoctis, unde verbum *concinmare*.

CION, *Columella*, *Gargareon*, *γάργαρα*, *Gurgulio*, *uva*, *uvula*, *uvigena*, *uvigera*, *Epiglottis* Plin. *Sublinguium* Isidoro, pensilis de palato *Isthmus*, five *Gutturis Operculum* dicitur. Item *κίων*, *σφυλοφορον* ex palato in ore penitius, juxta narium meatus supra laryngis rimam inter *Amygdalas* dependet, estque processus ex substantia, ut videtur, glandulosa spongiosa & rubra, quam putat *Columbus* oriri ex palati tunica, eo loci reduplicata: sed *Riolanus* à musculis ibi desinentibus: glaberrima est, flexilissima,

lima, subpellucida, plena cryptis apertis, mucosis, & fibris longis musculosis, in unum punctum collectis, cæterum tota vasculis innumerabilibus contexta: vasa repertiuntur arteriosa, venosa, omnium ferè serierum, tam in usus communes, quàm potissimum ad officium cryptarum; musculi huic machinæ proprii, plurimi attribuuntur. Figura est rotundè oblonga, superius crassior, & in acutum obtusè desinens. *Usus* est moderari vocem & aëris frigiditatem, & impedire ne potus ad nares ruat. *De Mell.* G. Der Zapff das Athem Zuenglein. Gall. *la Lnette* A. The Roof of the Mouth. Interdum uvula nimis propendet ab humoribus obstruentibus, qui per vasa lymphatica redire nequeunt, unde casus uvulæ oritur. B. *Den huijg.* G. Das fallen, oder schieffen des Zæpf-leins. Gall. *la Lnette abatue.* A. The Falling of the uvula.

CIONIS, idem quod *Cion*.

CIRCÆA, Est planta, quæ habet caules tenues, rotundos, rectos, villosos, medullâ repletos: folia sibi invicem opposita nascuntur juxta longitudinem caulium; ad basim latiora, ad apicem acuta, dentata, pediculis adhærentia: flos ex duobus petalis calici etiam bifolio insidentibus constat: calix autem deinde abit in fructum pyriformem, in duo loculamenta plerumque divisum, semina facta ut plurimum oblonga: vocatur Mandragora, quia hæc herbâ quondam alios fascinare *Circe* magica inventrix folis filia putatur, vel quia hujus plantæ fructus se vestibis affigit, hocque modo homines ad se trahit, sicut Dea *Circe* suis incantamentis facere credebatur. Illud nomen etiam aliis plantis imponitur. Gall. *Circée*.

CIRCUITUS, idem quod *Periodus*.

CIRCULATIO, sanguinis, vide *Periodus*.

CIRCULATIO CHYMICA, est liquoris puri, per circularem destillationem in pelicano, vel alembico cæco, agente calore, exaltatio; dum enim liquor in recipiente contentus undique clauso exhalare nequit in auras, sed colligatur in superiori parte vasis, cadit inde iterum ad fundum vel directo lapsu, vel per laterales alas pelicani, idque aliquoties circuli in modum pro genio liquoris destillandi. B. *Weder-drybing.* G. Offt widerholtes distilliren. Gall. *Circulation chimicale.* A. Chymical circulation.

CIRCULATOR, idem quod *Circumforaneus* vide *Agyrta*.

CIRCULATORIUM, est vas vitreum, ubi infusus liquor, ascendendo ad summum vasis, & iterum in locum ex quo venerat descendendo per laterales alas cavas, colligentes omne quod in supremum vasis adscenderat, quasi in circulo rotatur. Varia sunt hujus generis vasa, sed duo præcipuè sunt majoris momenti & usûs duntaxat, *Pelicanus* nimirum, & *Diota*, B. *Omduyf-glas*, *Circuler-glas*. G. *Circulier-glasz*. Gall. *vaisseau Circulatoire*. A. *Circulatory glass*.

CIRCULATUM MINUS, nihil aliud est quàm *Spiritus Vini*.

CIRCULUS, est Instrumentum rotundum ad chemi-
corum vitra abscindenda ex ferro factum; perfringuntur hoc modo: circulus igne candefactus vitro circumponitur, illudque tamdiu stringitur, donec fervereat & incal-
lescat, cumque adhuc fervet frigida gutta immissa, aut frigidi halitus afflatu dissilit, atque disrumpitur. B. *Ein Ring*. G. *Ein Ring*. Gall. *Anneau*, *Cercle*. A. *Ring*.

CIRCUMFORANEUS, idem quod *Agyrta*.

CIRRI, plantarum & inprimis radicum tenuia sunt capillamenta, quæ contorta crispantur. B. *Strullende haptel*.

CIRSION CIRSIIUM, est Cardui species, quo cum convenit in omnibus, & ab eo tantum differt spinis mollioribus: quia putatur hæc planta Varicibus mederi, nomen accepit à *κίρσις* varix, cum vena multo sanguine dilatata est. *Fuchsius* nominat *Buglossam* vel *Linguam bovis*.

CIRSOCELE, est varicosa vasorum ad testes euntium dilatatio, ita ut tertium testiculum quandoque mentiatur, ex *κίρσις* varix, & *κῆλη* tumor. B. *Zwelling* / *of bzuuk der kloot-ader*. G. *Geschwollene*, *auff gelauffene saamen Aderen*. Gall. *Hernie des Vaisseaux spermaticques*; *Circofele*. A. *A Swelling of the seed-vessels*.

CIRSOS sive **VARIX**, est nimia venarum in exteriori corpore sitarum dilatatio in tumorem elata, flexuosa, in una aut pluribus corporis partibus hærens; oriunda ab impedito sanguinis valde moti per has venas transfluxu, unde ad sedes valvularum à sanguine collecto ita dilatantur sæpe, ut rupturam minentur. Invenitur apud Græcos duplex nomen: Alterum est frequentissimum *κίρσις* seu (ut est apud *Pollucem*) *κίρσις*, alterum verò non ita fre-

frequens *ἱζία*, quod quidem postremum usurpatum invenitur ab *Hippocrate*. Latinis *Varix*; *Ramex* tamen apud *Plautum* pro varice pectoris aliquando sumitur, in *Merc.* I. II. *Tuâ causâ rupi ramices, tamdudum sputo sanguinem* B. *Schozsten Ader / uitgerechte Ader / Ader spat.* G. Aderbruch, Krampffader, aufgeblasene, geschwollene Adern. Gall. *Varice, Veine dilatée.* A. A crooked swelling vein, or varix.

CISSAMPELOS, dicitur de convolvulo, vineas amante, quia juxta illas sæpe succrescit. Ex *κισσός* Hedera, à *κίω* quòd in pariete vel arboribus latè serpat; vel à *κίω* scindo, quia Hedera arborea alias arbores scindit & perdit, adde *ἀμπέλ* vitis, vinea: ab *ἀμα* una & *πῆλός* lion. pro *ἔιν* vinum. Vide *Helxine Cissampelos*.

CISSIMUM, seu *CISSOPHYLLUM*, sunt Vincetoxici Synonyma: quia habet folia Hederae similia. *Κισσός* est Hedera, cui adjicitur *φύλλον* folium.

CISSOS, est Helix seu Hedera, vide *Κισσός* in voce *Cissampelos*. Bacchus quoque olim *Κισσός* dictus.

CISTERNACHYLI, idem quod *Sacculus Chyliferus*.

CISTUS, *Κισθ* & *Κισσαρον*, est frutex, cujus folia obrotunda, villosa, aspera, conjugata: flores rosacei, quinquepetali, coloris rubicundi: calix triphyllus, pistillum abit in fructum qui est capsula obrotunda, villosa, aspera, quæ per maturitatem dehiscens semina exigua, & rufa fundit: radix lignosa, ramosa: crescit in regionibus calidis, præsertim in locis saxosis: ex hujus foliis Ladanum gummi exsudat. Dicitur fortassè quòd ejus species aliqua *κίσσω*, id est Hederae foliis rotundis sit similis: Sunt qui nomen à Bacchi saltatore derivant, cujus nomen erat *Cittus*, vel *Cissus*: Historiam vide apud *Cassianum Bassum*. Nonnulli *ἀπὸ τοῦ κί*, verme, seu curculione derivant: *κίς* enim omnia frumenta perterebrat: unde *κισσηγίς* pumex variis foraminulis perforatus lapis est. Sic frutex hic à porosa textura & innumeris spiraculis pervia, quâ vinum transmittit. Gall. *Ciste*.

CITRAGO, appellatur Melissa, ob citreum, quem spirat, odorem. Vide *Melissophyllum*.

CITREA MALUS, Est arbor semper virens, cujus rami sunt extensi, flexiles, cortice viridi & polito instructi: folia laurinis similia, longa, acuta, rigida, absque

que appendice, carnosâ, in margine dentata, coloris viridis splendentis, præsertim in parte superiori, odoris penetrantis: flos est rosaceus, plurimis scilicet petalis in orbem positis constans, ex cujus calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum oblongum, donatum cortice crasso, inæquali, carnosâ, in initio viridi, postea citreo splendente, intus albo, odoris grati, saporis aromatici & grati: fructus hic dividitur in loculamenta succo acido grato, & seminibus externè duris, oblongis, albis medullofis, saporis aliquantulum amari, facta: hæc arbor crevit in regionibus calidis: dicitur, quod ejus fructus citrinum habeant colorem; quorum succus gratissimè acidus nitrosus, & refrigerans, optimum in febre ardente sitientibus est solamen. B. *Citroen*. Gall. *Citronier*. A. The Citron tree.

CITRINUM succinum, arsenicum, sulphur, citrina stæchas, citrinæ myrobalani. pen. corr. vide *Amaracinus*, seq.

CITRULLUS, Anguria est, sic à citri luteo colore dictus.

CITTA, five PICA, est appetitus depravatus, quo ea appetuntur, quæ ab esu humano prorsus aliena sunt, ut Calx, fistulæ tabacæ, carbones, testæ, panni, coria, arena, &c. Causa latet in depravato ventriculi succo, qui non nisi per insueta assumpta mutari potest, vel à circulatione sanguinis mutata, ut in gravidis, vel ab imaginatione depravata. B. *Verdozven of onguere Honger*. G. Der Schwangern Weiber lust zu unnuetze Sachen. Gall. *Appetit depravé*. A. A strange depraved longing in breeding women.

CIVETTA, à voce Indica *zibeth*. Est animalculum ex cujus vesiculis circa Inguina succus pinguis fragrantissimus educitur. Vid. *Zibethum*.

CLARETUM, est vinum, aromatum infusione imprægnatum, ac saccharo edulcoratum, dicitur aliàs *Vinum Hippocraticum*: Item Vinum Medicatum, sic nominatur, quod per manicam Hippocratis colatur & purificetur. B. *Klarep / Klaretten-wijn / genees-wijn / kruid-wijn / kandeel-wijn / hypocras / bruids-tranen*. G. Hippocras, gewurtz-wein, claret. Gall. *Vin Clairét*, *vin d'Hippocrat*. A. An Aromatick wine, or claret wine.

CLARIFICATIO, est modus, quo succi vel decocta turbida, & crassa, clariora redduntur: quod fit filtratione,

tionē, subfidentia, fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis. B. *Een klaar-making*. G. Reinigung Clarificirung. Gall. *Clarification*. A. Clarifying or clearing.

CLASSIS, sic à Botanicis vocatur congeries Plantarum, quibus nota quaedam communis adeò propria adest, ut hæc ab omnibus aliis generibus prorsus differant: Solentque hodiè omnes plantæ in sua genera & classes redigi, ut scientia botanica ad methodum doctrinæ deducatur, & facilius nomina plantarum memoriæ mandari possint. Gall. *Classe*.

CLAUDUS, est qui altero pede minùs æquè incedit, altero breviorē, aut aliter distorto, vel contracto vel minùs robore valente ob musculos aliquos femoris relaxatos, vel paralyticos. B. *Mank*. G. Hinkend. Gall. *Boiteux*. A. A Cripple.

CLAUSIPORTA, pro clausiporca: nam porcæ sunt clusiles, Italis *porceletti*.

CLAVICULÆ, sunt ossicula duo thoracem claudentia, oblonga, dupliciter incurvata, scapulamque clavis instar, cum sterno firmantia: sic dicuntur à clavis ædium antiquis, *Pataxii* à *Spigelio*, & deinde à me visis. *Celsus* *Jugula* vocat à Jungendo, alii *Ligulas*, *Os furcale*, &c. Gr. appellant *κλεις*, *κλεις* *Hom.* *κλειδον* *Gal.* transversim sub imo collo sitæ sunt, in pectoris summo, utrinque una. *Figuram* habent oblongi S. Latini. B. *Het sleutelbeen / krop-been*. G. Das hals-bein, troßel-bein. Gall. *la Clavicule*. A. The Clavicular bones.

CLAVICULÆ, in plantis capillamenta intorta, vel *Capreoli* sunt, quibus quasi manibus proreptans vitis adminicula comprehendit. Vide *Capreolus*.

CLAVUS, vide *Helos*, est etiam doloris capitis species clavum referens. Item est verrucæ species, callosa, parum elevata, digitos vel plantas pedum occupans, ex calcei pressione inæquali, vel attritu oriunda. B. *Een ijk-doozn / exteroogen*. Vid. *Helos*.

CLAVUS, juxta *Tornamiram*, est passio in parva capitis parte: Communiter est supra oculum in supercilio, & videtur ægris ac si pars capitis clavo vel terebello perforaretur. Et à Celfo clavi vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est.

CLEI-

CLEIDION, idem quod *Clavicula*.

CLEMA & CLEMATIS, dicuntur plantæ sarmento-
sæ, ut vitis &c. à κλάω frango, quia fragiles.

CLEMATIS DAPHNOIDES, Est planta, quæ habet
caules exiguos, tenues, longos, rotundos, virides, no-
dosos, repentes, ubique adhærentes: folia sunt oblon-
ga, viridia, polita, bina, sibi invicem opposita, caulibus
brevibus adhærentia, saporis amari, stiptici: flos est
monopetalus Hypocrateriformis, multifidus, coloris ut
plurimum cærulæi aliquando albi, rarò rubri, sine odo-
re, ex hujus calice surgit pistillum intimæ floris parti ad
instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum oblon-
gum, duabus siliquis constantem, quæ continent sēmi-
na plurima oblonga, ferè cylindracea, sulcata ab una par-
te; radix fibrosa. *Pervinca* officinis, *Vinca pervinca* vul-
gò nominatur. *Clemaida* Græci, quoniam κλημαται, hoc
est sarmenta seu viticulas per terram spargat, dixerunt.
Daphnoida verò à foliorum Lauri, quam ejus folia ha-
bent, figura. Plinius Clematida *Ægyptiam* nominat
vincam pervincam, alioque nomine *Chamædaphnen* dici
tradit, quòd sc. humilis videatur Laurus, ut nomen fo-
nat vinca: dicta fuit, quia in thalamis nuptialibus inde
cingula conficiuntur. B. *Maagdepalm / vinkoonde*.
G. Ingruen, Singruen. Gall. *Lysseron, Pervenche*. A. Per-
winkle.

CLEMATIS PASSIFLORA, ita appellatur, quod va-
ria in flore habeat Christi passionis signa. B. *Bloem des
Lydens / Passi-bloem*. G. Passions-blume. Gall. *Fleur
de la Passion*. A. Flower of Passion.

CLIMACTERICUS ANNUS, tales anni dicuntur,
qui à nugivendulis, per certos gradus, vel certam distan-
tiam, aut numerum septenarium & nonarium distinguun-
tur, & inter hos quadragesimum nonum, & sexagesimum
tertium præ aliis notatu dignissimos habent: quòd in his
insignes mutationes, & pericula vitæ metuenda sint. Vi-
de *Annus Climactericus*. B. *r Moozd-jaar*. G. Mord-
jahr, das Wecksel-jahr. Gall. *Année Climacterique*.
A. The termes of important change sin the bodies of men.

CLINICUS, est Medicus vel Medicafter, qui diætā
curat, aut Medicamentis. Sed hoc munere sæpe à mu-
lierculis, quæ lecto affixis subministrant, fungitur, à κλί-
νῃ, Lectus, derivari debet. CLI-

CLINOIDES APOPHYSIS, Gr. κλινοειδής, à κλίνω, inclino; quòd hæc ossis protuberantia finum parvum habeat, qui lectum referat. Uti sic scapulæ apophysis humeri os recipiens, &c.

CLINOPODIUM, est planta, quæ habet caules tenues, quadratos, villosos, longos: folia majoranæ sylvestris similia, sed minus odora, sibi invicem opposita, villosa, saporis salviæ: flores in verticillos densos, cauli circumpositos aggesti sunt, galea erecta rotundula, bifida, barba tripartita: flori succedunt quatuor semina oblonga, tenuia, rubicunda, in capsula, quæ flori tanquam calix inservivit inclusa: radix fibrosa: crescit in sylvis: quibusdam *Marum* appellata, est propriè lecti pediculus, quòd folia habeat lecti pedibus simillima, à κλίνω inclino, reclino; unde κλινη lectus, & πῦρ pes. B. *Mastik-kraut*. G. *Mastick kraut*. Gall. *Herbe de mastik*. *Basilic sauvage*. A. Wild Basil.

CLISTUS, vide *Clyffus*.

CLITORIS, seu **AMORIS DULCEDO**, est velut penis muliebri, titillationi inserviens, genitalibus scæminis appensus parte superiori: Constat, ut penis virilis, ex duobus corporibus nervosis, quæ ab inferiore parte ossium pubis ortum ducunt, etiam in extremitate obtegatur glans præputio; ejus substantia spongiosa est, adeo ut à sanguinis majori vel minori copia effusa in cellulis cavernosis tempore voluptatis intendi & relaxari possit, non tamen ut in viris perforata est. Dicitur à κλειτορίζω lascivio. Gr. κληπωρίς dicitur & Nympha. B. *De Kistelaar*. G. *Scham-zuenglein*. Gall. *le Clitoris*. A. The yard of a woman, or the clitoris.

CLOACA, à colluendo, vel à cloacare, id est inquinare, vel à cluo, id est purgo. Corporis immunditiarum est receptaculum.

CLYDON, est fluctuatio assumptorum in ventriculo, ob laxitatem fibrarum ejus, & vim minorem muscutorum abdominalium quam ut viscera contenta sufficienter comprimant, à κλύζω abluo, lavo.

CLYMENUM, Est planta, simillima in omnibus *Lathyro*, nisi quòd folia plurima uni costæ adnascantur, non modò duo, sed aliquando quatuor, sex vel octo ad eundem exortum: dictum scribunt ab inventore *Clymeno*.
Re-

Rege : sed rectiùs à κλίνω reclino , quòd fructus sive folliculi ad se invicem reclinant ac quasi recumbant , veluti iridis floris folia postea Clymenum vocarunt , & Regium nomen ei imposuisse sinxerunt.

CLYPEALIS CARTILAGO, idem quod *Thyroides*.

CLYPEUS , sive clupeus à cluendo , hoc est purgando, vel quasi calypeum, à καλύπτειν, tegere, quòd tegat.

CLYSMA, idem quod *Clyster*.

CLYSTER, eris, pen.prod. quia Græcis κλυστήρ, ἥρθη. Ita apud *Galenum* legimus : πολὺ ἐν τῷ ποικίτῳ κλυσθήρεϊ κίται. Ακλῶζω abluo, eluo.

Πολλάκι δ' ἐν κλυσθήρεϊ νέον γλῶγγος οἶος ἀμέλξας. *Nicand. Alexipharm.*

CLYSSUS, est, quòd alicujus rei essentiam, apud Chymicos, contineat : vel quando ejusdem rei species variè seorsim elaboratæ iterum conjunguntur, ut cum sal commune, Sulphur, oleum, spiritus & Mercurius iterum in unum corpus coagulantur. Dicitur & *Aqua Stimmea* vel *Sulphurea*, estque spiritus quidam mineralis, cujus basis præcipuè Antimonium, nec non alia sulphura mineralia. Vide *Essentia quinta*.

CLYSTER & CLYSTERIUM seu ENEMA, est Medicamentum internum, fluidum, quod per anum in intestina ope siphonis injicitur. Clysteres alii sunt emollientes, & laxantes, alii detergentes, alii astringentes, alii anodynî, alii ad alias intentiones parati, à κλύζω abluo. Gr. κλυστήρ. B. *Clysterie / Clystec / Spuitsetting / Darm-spoeling / Gat-spoeling*. *Clyster* fumitur aliquando latiori nomine, pro *Metrenchyta*, *Otenchyta*, *Risenchyta* &c. quæ suis vocabulis suo loco reperiuntur. G. Einspruetzung, Clystier. Gall. *Lavement*, *Clystère*. A. Clister.

CLYSTERIUM, vide *Clyster*.

CNICUS & CNECUS, vocatur *Carthamus*, herba flores proferens croco similes. Hinc κνηκός est flavus color, fortè à καίειν accendo, quia ignei coloris est, ut crocus, vel ἀπὸ τοῦ κνίζειν, quod mordere & pungere significat : vel ἀπὸ τοῦ κνίσμας, quod pungendo, pruriginem excitet, quod de sylvestri rectiùs, quàm de sativo dici potest. B. *Wilde saffraan / basterd saffraan*. G. Wild-saffran. Gall. *Saffran Sauvage*, *Saffran batard*. A. Bastard Saffron.

CNIDE, est Urtica urens, quia nocenti lanugine pun-
git, à *κνάω* scindo, scalpo, pruritus excito.

CNISMUS & CNESMUS, à *κνάσμαι* scalpo, prurio.
Vide *Pruritus*.

CNISSOREGMIA, sive SODA, est ciborum ex reg-
no animali in ventriculo debili hærentium, nec subactò-
rum fatis, adeoque in initio putredinis positorum eructa-
tio, undè *ructus nidorofus* dicitur: si autem cibi ex regno
vegetabili fuerunt, adeoque suam sequentes naturam, est
in ventriculo, quasi exustio, & pruritus, cum eructatio-
nibus acidis, à *κνάσμαι* prurio, & *ῥήγνυμι* rumpo, quia
calor cum aciditate erumpere videtur. B. *De Zode /*
Spjjs-verbzandinge. G. Hitze des Magens, Sode. Gall.
Ardeur d'Estomac. A. The heart burning.

COAGULANS medicamentum dicitur, quod partes
fluidum constituentes in massam strictam & concrescen-
tem mutat, ita ut multæ sub una superficie moveantur
antea separatæ hocque facit vel exhalando diluens, vel
addendo glutinans, vel partes inter se compingendo. B.
Een verdikkend of zamenstrekkend middel.

COAGULATIO, dicitur humoris à re aliqua vel vera
privatio, vel saltem talis, quæ sensibus nostris non appa-
ret, vel particularum ante fluidarum in solidum cohærens
mutatio. B. *Strekkinge*. G. Ein Rinne, zusammen ge-
lossen. Gall. *Coagulation*. A. Coagulation or Curdling.

COALESCENTIA, est partium solidarum unio, quæ
antea erant divisæ. B. *Van-een-groejinge*. G. Zusammen-
wachfung. Gall. *Coalescence*. A. A Growing together.

COARTICULATIO, idem quod *Diarthrosis*.

COBALTUM, *Cadmia nativa*, *Fossilis*, *metallica*, est
minerale terreum, colore ferè nigrum, æris vel argenti
particeps. Foditur copiosè haud procul à Goslaria. Causti-
cum est & erodens, adeoque inter venena habendum. B.
Kobalt. G. Kobalt, Mucken-pulver, quia Muscæ ejus
gustu perimuntur. Gall. *Cobaltum*, *espece de Cadmie natu-*
relle. A. Braffe ore, or Cobalt.

COCCIGRIA, vel COGGYRIA, est arbuscula mon-
tana & sylvas amans, ejusque radicibus lanæ, &c. purpu-
reo inficiuntur colore, Etymon erit à *κόκκος* granum,
bacca, color ex cocco factus *punicens*, & *ἄγριος* sylvestris.

COCCUS, in genere sumitur pro omni bacca, sed pro-

ximè refertur ad Illicis minoris baccas, quæ *Grana Kermès* seu *Chermes* appellantur, nonnulli putant coccum significare vermiculum, qui singulis baccis innasci dicitur, hinc ejusmodi color vocatur *Vermeil* & *Vermillon* à verme nempe, hinc quoque Arabum *Chermes*, *Kermes*, *Color Chermesinus* &c. nostris *Karmosyn*. Hinc *Coccineus color*.

COCCUS CNIDIUS seu **GNIDIUS**, baccæ esse putantur chamæleæ: admodum urentes & acres, hinc à *κνίδα* uro, vel *κνίδη* urtica urens: urticæ enim instar urit, mordet, pruriginemque excitat. Pipere enim, quod calidum fatis, calidius est. Fortè *Gnidius* appellatur corruptè facilitatis gratiâ ut fieri solet.

COCCUS BAPHICA, idem quod *Kermes*.

COCCYMELEA & **COCCYMELEON**, videtur esse pruni species, & quibusdam videtur esse *cuculi malus*, *κόκκυξ* enim est cuculus, & *μῆλον* malus: hinc arborem illam dictam conjiciunt, quod grandescuntibus pomis, cuculus è suis latebris prodeat, & conspiciatur: vel, nomen hoc potius inditum, quod floreat, quando cuculus ad suas latebras redit, nec ampliùs videatur.

COCCYX, est ossæ compages quæ constituitur ex tribus ossiculis, rariùs quatuor, quæ ossi Sacro subsunt, horum supremum latius inferiori, ita ut caudam referant, quæ introrsum inclinata, faciliori sessioni inservit. Dicitur & *Orropygium*, *Uropygium*, *Sacra spina*, *Isidoro*, *κόκκυξ*, ἡ ῥήπυγιον, σπονδύλιον. B. *Stiet-been* / *stupt-been* / *steert-been*. G. Das Guck-gucks vel Schwantz-beinlein. Gall. *Le coccis*, *l'Os de la queue*. A. The Rump-bone.

COCHLEA, Tertia Labyrinthi pars est, structuræ valde mirabilis, quæ vestibulo in parte canalibus semicircularibus opposita, anteriori, interiori, faciem respiciente, positu tamen canalibus inferiore, apposita, & pro parte continuata est; à Vesalio Buccinæ comparatur, vulgò cochlea à similitudine quàm optimè dicitur, testam enim limacis spirali suâ fabricâ exactissimè refert. Est autem canalis ossæus, substantiâ ossæâ, tenerrimâ, friabili, in auribus saltem exsiccatis calcinatum os referente, constans latiori ferè circulari basi seu orificio, partim à vestibulo, partim à fenestra rotunda incipiens, Sensim in progressu extenuatus, arctatus, tandem angustissimus, tenuissimus, in apicem desinens, hinc conicus, quia circa alium conum,

hum, simili substantiâ osseâ, tenerriam, friabilissimâ, fragilissimâ constantem, basin versûs cranii cavitatem, apicem verò versûs tympanum habentem, à parietibus ejus sinuositatis, per quam nervi auditorii portio mollis ad cochleam pertingit, efformatum, quem nucleum, modiolum, conum sustentantem, firmantem, appellare licet, spiralem in modum circumpositus, à basi ejus fursûm à basi sua binis gyris perfectis, non liberè continuatis, sed sibi invicem impositis, coherentibus, cum uno dimidiato confectis, apice suo angustissimo ad Modioli seu conii firmantis apicem perfectè cochleæ instar terminatur, desinit. Interim canalis hicce conicus, spiralis, diaphragma habet, seu septum medium, spirali suo decursu canalis spiralem ductum sequens, hinc *Lamina spiralis* nomen non immeritò ferens, formam Moscelis trianguli, si explicetur, habens; quod iterum lineâ ferè perpendiculari ab apice ad basin demissa, in duo triangula ferè rectangula, & æqualia distinguitur. Horum triangulorum alterum, quod cono sustentanti proximum est, osseo-cartilagineum, sensim versûs apicem tenuescens, tenerum, tenue, politum, elasticum, ab ea sede, quâ canalis modiolo adhæret, proveniens, assurgens, ultra medium ejusdem cavi vix progreditur: alterum respectu conii firmantis, externum, ubi præcedens osseum desinit, incipiens, eique annexum, continuatum, membranaceum, tenuissimum, tenerrium, colorem obscuriorem habens, nervosum, ad oppositum canalis latus à nucleo aversum pertingens, ei annectitur, firmatur, reflectitur, evolvitur, & totum canalis hujus superficiem, internam investit, interim tensum, elasticum, tremulum, cum priori osseo non exactè idem planum formans, sed paulò inferiùs declinans. Ultima hæc pars membranacea ad minimum ex binis adhuc lamellis composita videtur, dum sc. singula binarum canalis cavitatum suâ membranâ investiatur, quæ binæ membranæ investientes etiam partem osseam septi, eam deferunt, sibi invicem applicantur, & sic formant unam membranam, ut etiam in membrana tympani, & in variis aliis corporis locis contingit. Inter has autem adhuc videtur intercipi tertia lamella nervea, seu expansio quædam nervosa. Ope hujus diaphragmatis cochleæ cavitas dividitur in duos cuniculos cavos ferè semiconicos, & æquales, æquè longos, sibi

invicem incumbentes, fortè non communicantes, membranarum tenerrimis, nervosis, vasculosis, intus investitos, *scalas* appellatos, quarum scalarum superficiem levissimam, cavitatem semiconico ellipticam propter deflexum partis membranosa ipsius septi, amplo & patulo orificio aperitur in vestibulum ad anteriora ovalis fenestrae, inferior verò cavitatem sortita magis irregulari figurâ donatam, nec non superficiem modiolò adhærentem asperam & inaequalem; à foramine rotundo in tympano excavata exoritur, & ab ipsa hujus foraminis membrana inhærente striâ, partim dimidiato margini foraminis, partim ipsi septo inculptæ, occluditur. *κόγχη* *Rusô.* ἀσπίς *Poll.* B. *Het* *stek-been.* G. Das Schnecken-gleiche Beinlein. Gall. *le Limaçon.* A. Snailbone.

COCHLEARE, maximum, pendet drachmas quatuor: Magnum sesqui drachmam: parvum drachmam unam: minimum drachmam semissem. B. *Ein Löffel.* G. Ein Löffel. Gall. *Cuillier, cuillerée.* A. A Spoon.

COCHLEARIA, est herba antiscorbutica, humilis, quæ habet folia ex radice erumpentia obrotunda, medio-criter ampla, carnosa, excavata aliquando instar cochlearis, viridia, splendentia, succo plena, caulibus mediocriter longis purpureis adhærentia: caules ex his nascuntur ad altitudinem unius circiter pedis, angulosi, rubicundi, ramosi, folia exigua oblonga sine caulibus habentia: flores quadrifidi, cruciformes, & albi juxta longitudinem summitatum caulium nascentes; flori succedit siliqua ferè sphaerica septo medio instructa, cui ad latera adhærescunt semina exigua, ferè rotunda, rubicunda: radix exigua recta, & fibris albis instructa: icta planta vel contrita habet odorem penetrantem, & saporem acrem; crescit plerumque in locis maritimis: sic vocatur à cochlearis forma, quam folia habent. Gall. *herbe aux cuilliers.*

COCLES, quasi unoculus, vel ocles, vel κύκλωψ, quòd à κύκλος, circulus, & ὀπταμαι, video.

COCTIO, est assumptorum crassiorum in minimas particulas redactio, cum liquidis oris & ventriculi &c. mistio, ita ut apta evadant transitui per lactea, sanguineaque vasa, & nutritioni corporis. *Prima* coctio fit in ventriculo, à fermento ibidem à reliquiis ciborum remanente, partim ab humore gastrico ex glandulis vasa sua accipientibus

bus ab arteriis coeliacis in ventriculum affluente, & à respirationis motu, & ipsius ventriculi contractione, & ambientium calore ac compressione. *Secunda* fit in intestinis à bile, & succo pancreatico, & prioribus adminiculis. *Tertia* in glandulis mesentericis, à lymp̃ha cum Chylo sese miscente. *Quarta* in pulmonibus, à nitro aëreo inspiratione, aërisve in vasa sanguinea actione, dum in inspiratione cunctis viribus in vesiculas pulmonales irrui, adeoque vasa sanguinea has cingentia & interposita mirè mutat & comprimit. *Quinta* in vasis & visceribus, puta liene, hepate, testibus virilibus &c. Malè coctionis nomine indigitatur, quia coquere igni proprium est: si enim calor esset fermentationis causa, quid tunc dicendum de piscibus, aliisque in quibus calor sensibilis nullus inest. Coctio est propriè assumptorum in nostram naturam mutatio per vim solidorum & fluidorum, sive per actiones naturales. B. *Itokinge* / *gestinge* / *verduwing*. G. Verdæwung. Gall. *Concoction*, *digestion*. A. Concoction, digesting. Pharmacopæi eodem coctionis vocabulo utuntur in coquendis Medicamentis, quæ nihil aliud est quàm particularum quarundam, ex Medicamentis mediante ebullitione, extractio. B. *Itokinge*. G. Die Kochung. Gall. *Cuiffon*. A. A Boyling.

COCCTIO, autem Practicis significat illum statum morbi, quo materia morbosâ prius cruda, per circulationem sanguinis, vel per propriam materiæ indolem, vel per medicamenta, sic mutatur quo ad molem, figuram, cohæsionem, mobilitatem, inertiam, ut non amplius adeo recedat à sano statu, minùs ægrotum reddat corpus, & impetum morbi minuat; status ille morbi, in quo hæc ita fiunt, appellatur coctio, maturatio, vel *παρασκευα*.

COCULUS INDI, fructûs magnitudine & figurâ instar lauri baccae, racematim pediculis hærentes, hederæ corymborum modo ex Alexandria adferuntur. Quidam Solani Maniaci, alii Clematis fructum censent. Dicuntur aliàs *Bacca Levantica*, *Bacca Orientales*, *Bacca Cotylæ*, *Elephantina*, *Cuculus indicus*. B. *nocle*. Contra pediculorum acies utitur vulgus. G. Doll-kœrner. Gall. *Coques du Levant*. A. Indian cockles, grain vel berry.

CODIA, sunt capita papaveris, ex quibus syrupus conficitur, sed strictè: latè verò sumitur pro omni plantarum

capitulo. Gr. κώδην & κώδ:α : κώδη fructus est papaveris. B. **Man-koppen / slaap-bollen.** G. Mohn Hæu-ter, wagsame köepff. Gall. *Pavot.* A. Tops of poppies.

COECUM INTESTINUM, est in ordine à ventriculo quartum, & crassorum intestinorum primum, situm est ad os Ileum dextrum, incipit, ubi intestinum Ileum desinit & in appendice sive processu vermiformi finitur; valde capax, longitudo hujus intestini non excedit latitudinem 3 vel 4 digitorum transversorum; sacculi instar pro-pendens, & ab una parte impervium est: Gr. τυφλός. B. **De blinden Darm.** G. Der blinde Darm. Gall. *Le Boyau cæcum.* A. The blind gut.

COELIA, est cavitas magna, ut venter infimus, medius & supremus, à κοῖλ cavus. B. **Een holligheid.** Høhle. Gall. *Cavité.* A. Any great cavity.

COELIACA AFFECTIO, idem quod *Cæliaca passio.*

COELIACA ARTERIA, est quæ à trunco arteriæ magnæ oritur, ventriculo, & hepatis suis ramificationibus prospicit. B. **De maags slag-ader.** G. Der magen puls-ader. Gall. *Artère Cæliaque.* A. The Cæliack artery.

COELIACA PASSIO, sive affectio, est alvi fluxus, in quo cibus vel in totum, vel ex parte mutatus, absque chylicatione, per anum ejicitur. Estque duplex *prima* in qua cibus in ventriculo solummodo coquitur: *altera*, quando in ventriculo, & intestinis coctio seu fermentatio simul peragitur, verum propter obliterationem aut obstructionem papillarum intestinalium, vel vasorum Lacteorum, ex longa nempe inedia, vel dysenteria purulenta &c. non intrat in corpus, à κοιλία venter, alvus. B. **Spys-loop / grauwe-loop / rauwe gylbloed.** G. Bauch-flusz. Gall. *Flux d'Aliment.* A. The Cæliack passion.

COELI DONUM, idem quod *Chelidonia.*

COELOMA, est ulcus cavum & rotundum, in cornea oculi tunica, à κοῖλ cavus. B. **Een rond hol in 't oog.**

COELUM, est cavitas oculi versus canthum. *Cæli τροπαι*, sunt aëris constitutiones. Cælum etiam dicitur *Palatum.*

COEMENTATIO & COEMENTUM, vide *Cementum.*

COFFE, Fabarum species est, in Arabia Felici nascens, ex quibus tostis & tritis, aquâ fervidâ tinctura extrahitur, quæ sorbillando à Turcis, Ægyptiis, Persis aliisque

que nationibus ex vasculis ebibitur. Arbor Euonomo similis est, sed folia crassiora, durioraque habet, imò viridiora, & perpetuò virentia. Singulæ vel plures sabæ folliculis castanei coloris includuntur. Vocatur *Coffèe*, *Coffi*, *Coava*, *Bon*, *Bunchum*, *Chaava*.

COGGYGRIA, vide *Coccigria*.

COHOB & COHOBIVM, idem quod *Cohobatio*.

COHOBATIO est, quando liquor destillatus, menstruo suo reaffunditur, & deinceps destillationi exponitur; ut destillata sic viribus, majoribus imprægnentur, & magis reddantur spirituosæ. B. *Vernieuwinge / herbattinze / weder-overhaling / weder-overtrekking*. G. *Offt Wiederholte Distillierung*. Gall. & A. *Cohobation*.

COINCIDENTIA, sive INTERCIDENTIA, est, cum aliundè in aliud vas humor fluit. Ex. gr. in oculo *coincidentia* est, ubi in meatum porumve opticum, qui à basi cerebri veniens, oculo videndi facultatem tribuit, humor adaperto vel rupto vase incidit, obturatque eum, unde cum dolore visus offenditur. Gr. *παρίστασις*.

COINDICANTIA, sunt signa quæ cum aliis signis simul, considerata idem auxilii genus in morbis adhibendum indicant.

COL. ADD. In formulis Medicorum brevitatis gratia scribitur, & significat Colaturæ adde, quando decoctioni percolatæ aliquid insuper admiscetur.

COLATORIUM, est cribrum, pannus, aut aliud quid, per quod aliquid colatur. B. *Cen 3pgdoeli / cen dooz-3pg-tuig*. G. *Ein feih-tuch, ein durchschlag*. Gall. *Colatoire*. A. Strainer, a straining cloth.

COLATIO & COLATURA, est quando liquor post coctionem aut infusionem, per cribrum, aut pannum percolatus est, & à crassioribus particulis liberatur. B. *dooz-zeigsel*. G. *Durchseihung*. Gall. *Colature*. A. Liquor when strained.

COLCHICUM, est bulbus florem ferens, folia habet lilii; florem liliaceum, monopetalum, ex ipsa radice ortum, tubi tenuissimi forma, in sex partes sensim ampliati; pistillum autem è fundo floris surgit, in capillamenta tenuia desinens, abutque in fructum oblongum, trigonum, trilocularem, sætum seminibus subrotundis: radix est gemina, tuberosa, rotunda, avellanæ magnitudine, compressa,

fa, albida, carnosa, quarum una exterior elapsi anni sterilis, marcescens; altera in fibras porrecta, intra priorem latens, eodem involucro membranaceo involuta: saporis dum recens est hæc planta, acerrimi, dum annosa, subdulcis farinacei paululum viscosi vel lenti, odoris nullius: crescit hæc planta in pratis & montibus, bulbus dicitur esse venenosus, à Colchide veneni ferace, in qua nascitur, nomen sumpsit. Gr. *ἑρμύρεον*, Hermodactylum vocant. B. *Tijdeloosen / Maakte-vrouwen*. G. Zeitlofen, wildt Saffran. Gall. *Colchique ou Mort au chien*. A. *Meadow-saffron, the dogsbone*. Vide *Ephemerum*.

COLCOTHAR, est illud corpus siccum & terrestre, quod post destillationes validas in vasis remanet, vulgò *Caput mortuum*, & propriè intelligitur de vitriolo. B. *Dood de kop*. G. Der todte Kopff. Gall. *Tête morte*. A. The caput mortuum of Vitriol.

COLES, idem quod *Penis*.

COLICA PASSIO, idem quod *Colicus dolor*.

COLICUS DOLOR, est dolor acutus in intestinis abdominalibus sedem habens, oriundus à quacunque causa, quæ fibras nervosas intestinorum valde distendit, erodit, comprimit, solvit: à colo intestino nomen habet, sed immeritò, quia in omni intestinorum loco reperiri solet: est verò major aut minor; continuus aut intermittens, & sæpe habens statas periodos, murmura ventris, & punctiones vel vagas vel fixas; alvus plerùmque suppressa est vel flatibus plena: interdum eructatio & vomitus urgent, & febris, vel inquietudines, & urinæ quoque suppressio; quòd si diuturnus, fixus & vehemens fuerit, ei solet denique remittenti paralyfis artuum supervenire. Nomen rectius fortitur à *κοιλία* alvus, qui non semper in colo, ut vulgò putant, verum maxima ex parte in media alvo seu Mesenterio contingit, unde *Cæliaca Passio* potius appellari possit, quidam ἀπὸ τοῦ κολλάζειν θάαι à torquendo, quòd in eo fiebant tormina colica. B. *Colijk / darm-scheetg pijn*. G. Das Bauch-grimmen, Bauch-wehe, Colick, Darm-gicht, Darm-winde, das grimmen. Gall. *Colique, trenchée de ventre*. A. The Colick.

COLLA, est GLUTEN, Gr. *κόλλα* B. *Lijm / Pleister*. G. Leim, Pleister. Gall. *Glu, Colle*. A. Glue.

COLLATITIUM, est caro cocta vel assata pulli aut ca-

caponis, quæ in mortario tunditur, tusa juri vervecini admiscetur, quæ ægris cum omphacio aut Limonum succo propinatur, fortè ex κόλλα gluten. B. *Holps*.

COLLECTIO, est quando varia Medicamina sicca, uti Radices, Herbæ, Semina, &c. præscribuntur, & in unum chaos mixta, ut vino infundantur, ægris porriguntur. B. *Verzameling / Collectie*. G. Eine Sammlung. Gall. *Collection*. A. Collection, Gathering together.

COLLECTICA, sunt Medicamenta conglutinantia, ut *Sarcotica*, à κολλάω glutino.

COLLICIÆ, sunt *Lachrymalium punctorum* in unum ductum in utroque latere concursus, humorem palpebrarum in narium cava derivantes; in homine ipsis ciliorum apicibus ad canthum majorem insculpta foramina, breves demittunt canaliculos, demonstratu difficiles, nisi cautè diffractis narium ossibus, tunicæ relinquantur integræ, mox enim ubi ossa penetraverint (quousque tenui separantur membranâ) in sinum ampliati narium continuantur tunicæ. In ove, lepore, vitulo, cuniculo, non in ipsis ciliis, sed interius paulò eadem reperiuntur ostia, quæ profundius in avibus quærenda, ubi quàm in ullo alio genere longè majora, receptum majorem stylum per palati rimam emittunt; brevis hic admodum, quæ foramina distinguit, membrana. B. *Water-gooten / of traan-gooten*. G. Thränen-löcher. Gall. *Conduits des Points lacrimaux*. A. The Gutters.

COLLIQUAMENTUM, est liquidum in ovo humano vel animali contentum, quod fotu vel incubatu fluidissimum, tenuissimum, pellucidissimum factum est, ita ut eo, rudimentum animale innatans, nutrirî possit: hinc in ovis animalium membranaceus sacculus rudimentum ambiens, in quo hæret hoc liquidum, vocatur sacculus colliquamenti.

COLLUM, est illa pars corporis, quæ intra caput & pectus media est, sustentat caput. Constat ex septem vertebis, musculis, arteriis carotidibus, venis jugularibus &c. Anterior pars tantum dicitur *Collum*, posterior verò *Cervix*. B. *Den Hals*. G. Der Halsz. Gall. *Le Col*. A. The Necke. Sic *Collum Uteri*, est media pars intra fundum uteri & ejus os. B. *De Hals des Ufsmorders*. G. Der Halsz, Mund der Bärmutter. Gall. *l'Orifice de la Mat-*

trice, le Col de Matrice. A. The Necke of the Womb.

COLLUTIO, est oris ablutio, quâ dentes vacillantes, vel quâ gingivas, & ulcera detergemus. B. *En af-was- schinge / spoelinge / spoel-water / zuiveringe.* G. Auf- spuelung. Gall. *Gargarisme.* A. A Washing.

COLLYRIUM, quondam erat Medicamentum oblongum, quod in oculorum affectibus sumebatur. In oblonga verò, nonnunquam orbiculari formâ paratur, & vehiculo convenienti pro oculis sanandis dissolvitur, à *κολοβή* mutila, & *ἔρα* cauda, quia habet velut mutilatam caudam; sed potius à *κάλυω* inhibeo, & *ῥῆς* fluxio, quia fluxiones oculorum inhibet. B. *Oog-water.* G. Augen-artzney, Augen-wasser. Gall. *Collyre, Remede pour le Mal des yeux.* A. A Remedie for the eyes.

COLOBOMA, est vitium labiorum, palpebrarum, aurium vel narium &c. quo partes partibus vel à nativitate, vel casu quodam accrescunt, quæ tamen antea vel solutæ fuerant, vel solutæ esse debuerant, à *κολάω*, amputo vel *κολλέω* agglutino, de oculis dicitur. B. *Verrotte en aan een gewasse oog-schelen / oogen verminktheid.*

COLOCASIA, Est planta aquatica, caulem habens quinque vel sex pedes altum, digiti crassitie: folia sunt ampla, rotunda, in parte inferiori nervosa, longis & crassiusculis caulibus adhærentia, succum aquosum & viscosum habentia, lævia, pedunculo in umbilicum folii inserto, finis pedunculi dat calicem monophyllum membranaceum, infra cavum, turgentem in ovalem figuram, supra in vaginam acutam, semi patulam, instar auris ovillæ explicatam, ex imo fundo calicis axis est, cui circumnascuntur multa ova sphaerica, baccata, singula instructa sunt tubâ longâ, tenui, filamenti instar, gerentia unum vel alterum semen subrotundum: eidem axi supra hæc ova circumcrescunt stamina masculina dense stipata, suis testiculis instructa: denique supra hæc iterum tertia series filamentis numerosis eandem axim ornat, qui tum format pedunculum graciliorem purpureum: ille denique eminens in clavam longam, nigram plerumque abit: radix est tuberosa, crassa, carnosa, farinosa, edulis, saporis castaneæ: crescit hæc planta in lacubus & paludibus, præsertim in Ægyptia & Alexandria: putatur esse Arum Ægyptium à *κόλα* venter & *κόζω* orno, quod ventrem ornet. Gall. *Fève d'Egypte.*

COLOCYNTHIS, est citrulli species, amarissima; quæ habet plures caules repentes, villosos, asperos, folia caulibus satis longis adhærentia, à se invicem satis distantia, ampla, profundè incisa, villosa, aspera, albescentia, imprimis in parte inferiori, punctis plurimis albis notata: flores flavi, pallescentes: flori succedit fructus levis, amarus, rotundus, non edulis, pugni magnitudine, ex flavo viridis, occludens sub cortice tenui, polito & splendente medullam candidam, fungosam, levem; & semina in cellulis parva, compressa, oblonga, cucumeracea, quasi sordida, albicantia, saporis acris amari, & nauseosi: crescit hæc planta in Indiis Orientalibus; advehitur nobis cortice denudato, & tunc albidus est coloris, ex Italia, Hispania, Gallia &c. Estque major & minor, rotunda, quæ in usu est, oblonga, pyriformis, pomiformis, semina quoque continet amarissima. Vehementer purgat. Gr. *Κολοκυνθίς* cucurbitam significans parvam, *παρὰ τὸ κόλον κινήσειν*, seu *κινᾶν*, quia colon seu ventrem commovet. Vide *Cucurbita*. Arab. *Albandal*, *Chandel*, *Händel*, & *Handhal*. B. *Hoioquint*. G. *Coloquinth*. Gall. *Coloquinte*. A. *Coloquintida*.

COLON, est crassorum intestinorum secundum; ejus situs sic se habet. In dextro Ilio à cæco intestino oritur, & reni dextro adhæret; deinde sursùm reflectitur sub hepate, ubi folliculo fellis nonnunquam annectitur, à quo luteo colore inficitur; ulterius pergit transversim sub fundo ventriculi, & à sinistris lieni jungitur, deinde reni sinistro alligatur, ubi gyros habet admodum obliquos, & inde in rectum recta definit. *Longum* est communiter palmas octo vel novem, latissimum verò & amplissimum omnium. *Cellulas* habet multas. Ligamentum quoddam, medii digiti latitudine per ejus medium parte supernâ intexitur, deinde ob amplitudinem duo ligamenta sortia habet, unum sursùm, alterum verò deorsùm, ut supernis & infernis partibus alligetur. Circa initium habet valvulam, sursùm spectantem, ne sc. ex crassioribus intestinis in tenuia aliquid remeet. Gr. *κῶλον*, ἢ *κατὰ κοιλίᾳ* *Ruso*, *Poll.* *νεταίρη* *Hom.* à *κολάζεσθαι* torquendo; quod in eo fiebant tormina colica, vel à *κοιλότης* cavitas apud *Athen.* vel à *κωλύειν* ab impediendo, quia in eo excrementa, ne statim decendant, morantur. B. *Kronkel Darm*, *Kartel Darm*. G. *Der Grosse Darm*. Gall. *L'Intestin Colon ou le grand Boyau*. A. *The great gut*. Co.

COLON, Gr. κῶλον. Vide *Membrum*.

COLOPHONIA, dicitur, quod ex Colophone urbe olim advehebatur, est substantia oleaginosa, flavescent, arida ac friabilis, residua ex resinis abietina, strobilinaque coctione dum purgantur, vel destillantur, inspissatis ac frigore induratis; si in pulverem redigatur, & pulvis per candelam accensam dispergatur, flammam concipit, & fulgur repræsentat. Vocatur & Pix Græca. B. *Spiegel-harz*. G. Spiegel-hartz. Gall. *Colophone*, *Poix-refine*. A. Colophony or Rosin.

COLOSTRUM, dicitur lac primum, quod post partum in mammis colligitur, tenuius & acidius, facillimè coagulatur. B. *Biest*.

COLPUS, idem quod *Sinus*.

COLUBRINA, est Ari species, *Serpentaria* dicta, idque ob serpentinum, sive colubrinum colorem, quem habet caulis. Vide *Dracontia*. Eodem quoque nomine insignitur *Bistorta*.

COLUBRINUM LIGNUM, sive SERPENTARIUM, propriè radix est, arboris Timorensis admodum amara, colore fusco. Utuntur adversus colubri morsus, medetur & febricantibus. Nascuntur in *Zeilon* tres species. B. *Slangenhout*. G. Greisz-holtz. Gall. *Bois couleuré ou de couleur*, *Bois de Serpents*. A. Snake wood. Indis *Comexi*.

COLUM, est omne illud, per quod, ad liquorum depurationem, aliquid colatur & transmittitur, ut cribrum, manica Hippocratis, linteum, papyrus bibula, &c. B. *Ein Strampn / Heins-dock*. G. Ein Durchschlag, ein Seih-tuch. Gall. *Un Couloir*. A. A colander or strainer.

COLUMELLA, idem quod *Cion*.

COLUMNÆ CORDIS, sunt carneæ & rubræ eminentiæ in auriculis & ventriculis Cordis conspicuæ, quæ sunt totidem quasi muscoli, cavitates inæquales reddentes, ut sanguis his quasi manibus dum cor contrahitur, confringatur, & separetur. B. *Hert pilaartjes*. G. Hertzsen æderlein, das Hertz geæder. Gall. *Colonnes charnuës du cœur*. A. The fibres or columns of the heart.

COLUMNA NASI, est nasi pars carnosâ in medio prominens: labio superiori vicina. B. *Het Neus-stuonfel*. G. Die Nasen Säule. Gall. *la Colonne du nez*. A. The end of the nose.

Co-

COLUMNA ORIS, idem quod *Cion*.

COLUMELLARES DENTES, vide *Dentes*.

COLUTEA, est arbuscula, cujus lignum intus cavum, ferè instar sambuci, sed durius, & non medullosum, duplici cortice obductum, superius cinereo, inferius viridi: folia novem aut undecim uni costæ adhærentia, fennam referentia, sed majora, molliora, & magis subrotunda, obtusa, in superiori parte polita, & magis viridia quàm fennæ, albescentia & villosa in parte inferiori, saporis amari: flores sunt leguminosi, coloris flavi, in spicam congesti: flori succedit siliqua membranosa instar vesicæ inflata, polita, plerùmque rubicunda, in duas partes dehiscens; continens semina reniformia, flava, post maturitatem ferè nigra, saporis pisi: quod, si quis eam mutilet, ipsa moritur; ergo à *κόλλω* mutilo: dicitur etiam fenna spuria vel fenna pauperum. B. *Lombartse Linse*. G. Welch fene-baum, Welsche Linsen. Gall. *Baguenaudier*. A. Bastard fenna.

COLYTEA, idem quod *Colutca*.

COMA, est in plantis, quidquid hilari venustate cernium modo, summa ramorum vel colliculorum exornat. Vide *Summitates*.

COMA SOMNOLENTUM, est sopor lethargo minor, sine febre, in quo æger excitans ad interrogata respondet: & statim in profundum somnum relabitur, ore hianti & maxillâ inferiori demissâ, mortuis similior quàm vivis decumbit: *Causa* est obstructio cerebri cum nempe viscida illuvies anfractuum sive gyrorum cortices, unâ cum minoribus medullæ inclusæ rivulis invaserit. Idem est quod *Cataphora*, ab inusitato, verbo *κῶ* id est cubo pro *καίρω* jacio. B. *Slaap-ziekte*. G. Schlaff-sucht. Gall. *Grand Sommeil*. A. A disease causing heavy & long sleep.

COMA VIGIL, sive AGRYPNIA, est morbus, in quo ægri continuò ad somnum proclives sunt, attamen vix dormire possunt, cum immani capitis gravedine, sensuum & omnium motuum torpore, quibus non rarò delirium accedit. Ob insomnia imagines & velut spectra, quæ imaginationi indefinenter objiciuntur, excitantur. Hinc si eos excitaveris, oculos attollunt, & torvè te aspiciunt, sæpe insomnia sua narrant, mox ad somnum se rursus reponunt, subinde sese jactant, erigunt, moxque relabuntur, adeo ut *Coma Vigil* sit status medius inter lethargum & phre-

phrenitidem, ideoque *Typhomania* dicitur. Gr. Ἀγρυπνίας νόσος. B. *Wakende slaap-zugt*. G. Wachende Schlafsucht. Gall. *Sommeil Veillant*. A. Watching or waking coma.

COMARUS, est Arbutus, & dicitur παρὰ τὴν κόρην ἐν τῷ χειμῶνι ἀρῆεν, quod comam sive cacumen hieme viridem obtineat.

COMBUSTIO, vide *Ignis actualis*.

COMITIALIS MORBUS, idem quod *Epilepsia*.

COMMANSUM, vide *Apophlegmatismus*.

COMPLEXI MORBI, sunt, qui ita invicem comitantur, ut unus absque altero esse non possit, ut Pleuritis & Febris. B. *Alen een verknogte ziekten*. G. Viele zusammen gefuegte kranckheiten. Gall. *Maladies unies*. A. Complex disease.

COMPLEXI MUSCULI, pertinent ad occiput. Ortum habent à septimæ colli & quinque thoracis vertebra-
rum superiorum transversis processibus; qui variis occipiti tendinum radiis atque carnis vinculis affliguntur. B. *De samen gebogde spieren*. G. Zusammen gebogener maulz des hinterheils des haupts. Gall. *Muscles complexes*. A. The third pair of Muscles belonging to the Occiput.

COMPLEXIO, vulgò pro temperamento habetur; aliàs dicitur de morbis complexis & complicatis, item de febribus diverso tempore invadentibus: sic & pulsuum differentia, varia coitio inter complexionones recensentur. B. *Complexie / getempertheid*. G. Complexion, gestaeltnusz. Gall. & A. Complexion.

COMPLICATI MORBI, sunt quando diversi morbi in uno subiecto concurrunt, exempli gr. si vulnere capitis adsint cranium fractum, meninx læsa, cerebrum vulneratum &c. B. *r Samen verknogte ziekten*. G. Verwirrete zu sammen gewickelte Kranckheiten. Gall. *maladies Complicquées*. A. A compound or complicate diseases.

COMPOSITA, sunt Medicamenta, quæ ex variis simplicibus Medicamentis parantur; ut sunt Aquæ quædam, Syrupi, Electuaria, Opiata, Trochisci, Unguenta, Emplastræ, &c. quæ in vulgaribus officinis prostant: sunt etiam quædam Chymica, ut varii Spiritus, Salia volatilia oleosa, Tincturæ, Ballama, Essentiæ, Pulveres &c. *Samen gestelde dingen*. G. Vermischte, Vermengte artzeney. Gall.

Re-

Remedez Composez. A. Compound Medecines.

COMPOSITIO, est, cum varia Medicamenta invicem miscentur, ut in Theriaca & Mithridatio. B. *Samenstellung / Compositie.* G. Zusammen vermengung, vermischung. Gall. & A. Composition.

COMPRESSIO. Vid. Catalepsis.

COMPRESSIVA MEDICINA, dicitur *Avicenna* sicca, causans in membro siccitatem & coadunationem ipsius ad se ipsam, unde obturatur transitus & meatus. Et ex fortitudine compressionis & coadunationis partium membri ad invicem coguntur, humiditates subtiles in ejus concavitatibus permanentes exprimi violenter ex motu ejus opposito.

CONARIUM, sive GLANDULA PINEALIS, in cerebri plexu choroidis pendet, à coni seu turbinis forma sic dicta. Collocatur intra thalamos nervorum opticorum & natum prominentias. Hanc animæ sedem esse, aut Principes facultates ab eadem oriri vix credimus, quoniam animalia quæ imaginatione, memoria, aliisque superioribus animæ potentiis ferè in totum destitui videntur, hanc glandulam satis amplam atque angustam habent. Sensorium itaque constitui debet, ubi & nervi oriundi sunt. *Ufus* est humores serosos, à sanguine arterioso depositos, excipere, & in se retinere; donec aut venæ depletiores factæ, eosdem resorbeant, aut lymphæductus (si qui adfuerint) eos extra convehant. Doctiss. *F. Bayle*, de usu tamen ejus dubitat: cum dicit, quis sit verus illius glandulæ usus, non est ita facile statutu. Cum in variis cerebris hominum, boum, ovium semperprehenderim glandulam illam manifestâ salsedine atque satis acri esse imbutam, suspicor in ea salem aliquem volatilem à sanguine separari, sali volatili armoniaco analogum, qui in caudicem medullæ spinalis diffusus, vigorem addit spiritibus animalibus & eorum coagulationem impedit, à *κρίν* meta, turbo. B. *’t Ppn-appeltjen / ppn-appel-klier.* G. *Zubel-appfel.* Gall. *Glande pineale.* A. Pine-apple gland, or pineal gland, pine-nut.

CONCAVATIO, idem quod *Arcuatio.*

CONCENTRATIO & CONCENTRANTIA MEDICAMENTA, sunt ea, quibus acidum ita moderatur, additione alcali, ut nullum eorum prædominetur: ut in
Tar.

Tartaro vitriolato : unde dicitur humores concentrare , quando acidum superfluum ab alcali subjugatur. B. **t Sa-**
men-punting van 't zuur en 't zout. Vide *Absorbentia*.

CONCEPTUS & CONCEPTIO, est quando post fecundum concubitum, ovum ex ovariis femininis abreptum, per tubas fallopianas delatum, à femine maris fecundatum, & in uterum maternum illapsum fuerit. B. **Ont-**
fanginge. G. *Empfängnusz.* Gall. & A. A Conception.

CONCHA, est auriculæ externæ cavitas maxima in ipsius medio sita, cartilaginea est, coarctata & portione Helicis, Anthelicis, Trago, & Antitrago terminata, figuræ ferè Elliptico-hemisphæricæ, dividitur iterum quasi in binas cavitates, nimirum superiorem minorem, *Cymbam* dictam, & inferiorem majorem *Innominatam* vocatam : distincta est ope eminentiæ cujusdam, quæ ad Helicis exortum incipiens, ad oppositum conchæ latus perveniens, terminatur & evanescit in sua cavitate majori & inferiori, foramen auris format, sive ostium meatûs auditorii. B. **De**
schulp des Oors. G. Die Kruemme oder dasz hol im Ohr, Muschel der Ohren. Gall. *la Conque ; le creux ou la Coquille de l'Oreille.* A. A schell of the eare.

CONCRETIO, est liquidæ alicujus substantiæ, aut succi in massam solidiorem condensatio, ut absinthii succus condensatus, succus glycyrrhizæ, Acaciæ, Hypocistidis &c. B. **Verdikking.** G. Dickmachung, dasz zuesammen rinnen. Gall. *Concretion, Condensation.* A. Idem.

CONDENSANTIA, sunt quæ moles solidiores cujusque particulæ fluidum constituentis, magis in contactus immediatos comprimunt, adeoque solidiores faciunt. B. **Verdikkende middelen.**

CONDITUM & CONDITURA, à *Condire*, est compositio, è Conservis, Pulveribus, Speciebus Aromaticis cum syrupo convenienti in Electuarii formam redactis. Sumitur etiam pro Medicamento simplici, saccharo vel melle condito : ut Zingiber, Helenium &c. conditum. B. **Conserf / suiker bewaarsel.** G. Eingemachte sachen. Gall. *Conserve.* A. An electuary.

CONDRILLA, idem quod *Chondrilla*.

CONDUCTOR, est instrumentum argenteum, vel orichalceum, cavum, quod vesicæ immittitur, & viam alii instrumento itinerario monstrat ad extrahendum calculum.

lum. B. *Weg-wpzer*. G. Weg-weiser. Gall. *Conducteur*.
A. The conductor, or guide.

CONDYLOMA & CONDYLU, est articulorum junctura, ut in maxilla, sive nodus, aut ossum internodia. Item processus maxillæ inferioris retusus, qui mediante membranoso ligamento interventu cartilaginis mediæ, mobilis, ossi petroso coarticulatur. Item tumor quidam callosus in digitis manuum aut pedum, præsertim verò circa anum & pudenda muliebria; tuberculum nimirum durum, & occallescent ex humoribus, ibidem restagnantibus sensim excrescens, & tædio potius plerumque, quàm dolore molestum. Interdum quoque inflammationem conjunctam habet, à *κόνδυλος* digiti articulus. B. *Knopf* *zwellen*. G. Felgwartzen. Gall. *Condylome*. A. A swelling especially in the fundament, proceeding of inflammation.

CONDYLI, sunt articuli seu nodi & digitorum tubercula, quæ circa articulationem crassiora sunt. Vide *Metacondyli*. B. *De Knokelen*. G. Die Knoden, die Knubel. Gall. *Jointures*. A. Knots, Knuckle or joints of the fingers.

CONFECTA, vocantur res (ut femina, amygdala, nuces pini, cinamomum, &c.) saccharo sicco obductæ, & incrustatæ. B. *Besuiherde Zaden*. G. Confeit, mit Zucker eingemacht. Gall. *Remedes Confits*. A. Confits.

CONFECTIO, est compositio ex pulveribus, gummis, saccharo, melle, syrupis &c. in unam massam conjuncta: estque duplex; arida, ut Trochisci, tabellæ: vel humida, ut Opiata, Condita, Conservæ, & omnis generis Antidota. B. *Een toemaaksel / doosuihering*. G. Mit Zucker vermischte Artzneyen, ein conserv. Gall. *Confection*. A. Composition.

CONFORMATIO, est illa conditio partium firmarum corporis animalis, quâ in statu sano & naturali gaudent his requisitis, *np. numero, magnitudine, figurâ, cavitâ, superficie, & situ*. vel quâ in statu morbofo & præternaturali his sex vel abundant vel privantur. B. *Een geschapenheid*. G. Gestalt. Gall. & A. *Conformation*.

CONFORTATIVUM & CONFORTANTIA, idem quod *Cardiacum*.

CONGELATIO, est quando liquores in massam, glaciei similem, rediguntur, ut sunt omnes salium *Cryalli*. B. *Kristal-makinge*. G. Krystall-machung. Gall. *Congelation*. A. Congelation.

Iation. A. A freezing or congealing together. Ita vocatur etiam *Catalepsis*, quia homines quasi congelati sunt.

CONGELATIO, vide *Catalepsis*.

CONGELATICUS, est *Ecstaticus*, qui aliquando ex se quasi rapitur, & diabolos aut angelos se vidisse affirmat. Vide *Ecstasis*.

CONGIUS & CONGIARIUS, est mensura Veterum continens decem vini libras, & novem olei.

CONGLOBATA GLANDULA, est glandula rotunda, per se subsistens, simplex, ut sunt glandulæ mesenterii & cæteræ omnes, quæ lympham accipiunt, & iterum eructant in alveos magnos, vel in sanguinem, vel extra corpus, à Cl. A. Nuk *Muscosa* appellata. B. *Ronde Hilier / mosachtige Hilier* G. Runde Trusen. Gall. *Glande conglobée*. A. A. Conglobate gland.

CONGLOMERATA GLANDULA, est, quæ ex variis conglobatis glandulis est coagmentata, seu conglomerata, & per vasa communia adunata, unaque omnibus communi membrana connexa; huic unum, plerumque commune emissarium est, quod excipit humorem ex cunctis emissariis partium immixtum, eum colligit, & in cavum aliquod majus effundit. Tales innominata oculi, Parotis, pancreas, glandulæ salivales &c. quæ ductum habent proprium excretorium, ut sunt ductus pancreaticus, salivales &c. in quem omnes glandulæ per canaliculos minimos suum humorem affundunt, à Cl. Nuk *Vasculosa* vocatur. B. *Op-reengetaste Hilier / vatagtige Hilier*. G. Faszachtige Trusen. Gall. *Glande conglomerée*. A. A conglomerate gland.

CONISTERIUM, est fornacis *cinerarium*, sive locus infimus in quo cineres colliguntur. Ex *κόινος* cinis, pulvis, & *τρίφυς* pono. B. *Het Asch-gat*. G. Das Aschen loch. Gall. *Cendrier*. A. Ash-hole.

CONIZA, vel CONYZA, est planta, quæ habet caules tres vel quatuor pedes altos, coloris obscuri, villosos, lanuginem albescentem habentes, ramosos: folia verbascum nigrum referunt, sed minora, odorata, acria, & parùm amara: flos ex meris flosculis compositus, multifidis, embryoni infidentibus, & calice squammoso plerumque cylindræo comprehensus: Embryo autem deinde abit in semina papposa: radix divisa, lignosa, odora, amara & acris: cres.

crefcit hæc planta in montibus & fylvis. Sic dici volunt, quod necet Culices, *Κάτωνψ* enim eft culex : fed rectius à *κονίφεον* quod pulvere fœdetur, quia ob exfudantem pinguedinem foliis facile adhæret. B. **W onder-kruid** G. Donner-wurtz, Durr-wurtz. Gall. *Conife*. A. Fleabane.

CONJUNCTIVA TUNICA, vide *Adnata*.

CONOIDES, vide *Conarium*.

CONQUASSATIO, eft quando vegetabilia succulenta, vel fructus recentes, qui ad fuccum exprimendum expetuntur, piftillo craffiusculè contunduntur.

CONSENSUS, fit in morbo, ab alio morbo dependens, ut in pleuritide læditur ob confenfum respiratio. Item, eft *Correspondentia* variarum partium per connexiones communes, nervorum fc. & tendinum. B. **Medelydentheid**. G. Mittleiden, Sympathie. Gall. *Sympathie*, *Convenance*, *Accord*. A. Consent or sympathy.

CONSERVA, eft compositio, quâ quodvis vegetabile recens minutiffimè concifum, aut contufum faccharoque permixtum, futuroque ufui medico affervatur. B. **Konferbe**. G. Ein Conferw. Gall. *Conserve*. A. A Conserve.

CONSILIGO, ejus plantæ nomen à rusticis creditur inditum, quod in arvis inter filiginem frequentiffimè inveniatur.

CONSOLIDA, eft Symphytum, quæ planta officinalis, & valdè mucilaginoſa, hinc conglutinans egregiè partes : à consolidandis vulneribus nomen habet. B. **Waal-wortel / Smeer-wortel**. G. Wall-wurtz, Beinwell. Gall. *Conſoude ou Confiere*. A. Confrey, comfrey.

CONSISTENTIA, dicitur, cùm res aliquatenùs ad certam craffitiem coquitur ; ut in ſyrupis coquendis aliifque evaporandis fieri ſolet. B. **Consistentie / dikte / hoogten** ; ad consistentiam coqui, **tot een ſekere dikte / of hoogte koken**. G. Dickmachen, dicke. Gall. *Consistence*, *ce qui a du corps*. A. Consistence.

CONSOLIDANTIA, ſunt, quæ moderatè in vulneribus acre quodcunque affluxum liquidum temperant ; fordeſque detergendo, efficiunt, ut alimentum in partem ſolutam commodè impellatur, & ſic ſolida concreſcant. B. **Berenigende middelen / of die de begroeping bevoorderen**.

CONSTIPANTIA, Medicamenta ſunt, quæ vaſorum

emissaria ita obstruere possunt, ut fluxus vitalis per illa interceptiatur; aguntque vel externè vasi inhærendo, adeoque id comprimendo, vel quatenus vasa intrant, sese eorum lateribus applicant, atque sic infarciunt. Hinc duplicia sunt sc. illinentia & emplastica. B. **Toestoppende Middelen.**

CONSTITUTIO, idem quod *Catastasis*.

CONSTRICTORES MUSCULI, sunt qui partem constringunt & coarctant. Vide *Sphincter*.

CONSUMMATUM, est quando alicujus gallinæ minutim conscissæ succus, in vase benè obturato, sine additione, per B.M. extrahitur: demptis solummodo capite, pedibus & pinguedine. Vocantur autem hodiè sic juscula quarumvis carnum diu in Aqua cocta, & in gelatinæ formam redacta, in scopum ut debiles citius & magis nutriant, quàm si darentur juscula tenuia; sed perversè sic ratiocinantur. B. **Consumaat / restauraat.** G. Consummat. Gall. *Consummé*. A. Consummate.

CONTAGIUM, est venenum quod ab uno subjecto propagatur in aliud: hoc dupliciter contingit, ad distantiam per aërem, vel simplici contactu. B. **Besmettelzheid.** G. Ansteckende Kranckheit, eine Seuche. Gall. *Maladie Contagieuse*. A. Contagion.

CONTEMPLABILES DIES, vide *Critici dies*.

CONTINENS CAUSA, est causa morbi interna, cum materia aliunde orta, quæ ita morbo proximè adhæret, ut eâ positâ morbus ponatur, sublatâ tollatur.

CONTINENS FEBRIS, est, quæ sine intermissionis, aut remissionis tempore, assiduè affligit. Estque duplex; primaria, aut secundaria, *primaria* oritur à sanguinis circulatione nimis evecta & exaltata, ut in Causo, Pleuritide, Angina &c. *Secundaria* verò seu *Symptomatica*, producit ex vulneribus, ulceribus, &c. ut in phthisi, vulneribus capitis, &c. B. **En geduurige koozts zonder verminderinge.** G. Ein stæt, unauff hoerendes Fieber. Gall. *Fievre sans intermission*. A. A continued Fever.

CONTINUA FEBRIS, est, quæ continuò quidem affligit, sed cum remissionis & exacerbationis tempore: estque *Quotidiana*, *Tertiana*, *Quartana*, & *Erratica*. B. **Geduurige koozts met vermindering.** G. Das tægliche Fieber. Gall. *Fievre continue*. A. Continual Fever.

CONTORSIO, est quando membrum aliquod separatur

tur à junctura sua, separatione non completâ, ita ut partes extra naturalem locum recesserint. Ita in specie *Contorsio* est luxatio vertebrarum dorſi in latus aliquod, & ita species gibboſitatis est.

CONTRACTURA, ſic vocatur alicujus partis, pedis, manus, cubiti, dorſi &c. contractio ſenſim facta, unde flexio impeditur, aut non niſi cum dolore, & vi quâdam peragitur. Habet ſæpe contorſionem in malam figuram, ut in Gibboſis, & Pumlionibus; atque ad illam figuram non niſi lentè pervenitur, ſæpe Atrophia antecedit, inflammatio etiam, & abſceſſus vel vulnus, vel ulcus, imò Paralyſis nonnunquam conjungitur, & dum in uno loco Contractura fit, cum eminenti tumore ac figura membri perversa, in alio fit depreſſio: demùm hæc Convulſio eſt, quæ oſſa non modo è ſedibus ſuis diſlocat, ſed aliquando mirum in modum reflectit, incurvatque, unde in vicinis carnibus plerùmque macies fit, ſeu Atrophia, uti hoc laborantes muſculi, cùm ad reſiſtendum validi non ſunt, efficiunt, quòd Antagoniſtæ fortiores contrahantur, & contractæ remaneant. Gr. ἀγκύλη ab ἀγκυλῆσθαι incurvare. **B. Trekking.** G. Das Spannen, zuſammen ziehen. Gall. & A. *Contraction*.

CONTRA FISSURA, eſt quando quis ceciderit in pavementum lævâ Cranii parte, inque oppoſitâ parte fiſſura reperiatur, triplex eſſe perhibetur: 1. in eodem oſſe, quando pars ſuperior eſt læſa, & inferior fracta. 2. in diverſo oſſe, cùm poſt caſum in occipit, coronale os frangitur. 3. in diverſâ tabula, quando ſuperior eſt læſa, & ſecunda frangitur. Sed num detur contrafiſſura, apud Principes Medicos liſ eſt, & me judice, meritò negatur. **B. Een tegen-ſcheur.** G. Ein gegen-bruch. Gall. *Contre-fiſſure*, *Contre-fente*, *Contre-coup*. A. Idem.

CONTRAHENTIA, Medicamenta ſunt, quæ puncta diſtancia ab invicem ſolidæ fibræ motricis in propiorem adigunt contactum & cohæſionem, ſic ut inde fibra ſolidior, durior, firmiorque evadat; atque proindè tota ſolidorum compago, ex fibris meris compoſita, cui hæc medicamenta applicantur. **B. Te ſamen-trekkende middelen.**

CONTRAINDICATIO, vide *Antendeixis*.

CONTRAYERVA, eſt radix, undique verrucoſa, & aſpera, oblonga, tenuis, foris colore rubro, intus albidio,
R 3 odo.

odoris aromatici; saporis nonnihil adstringentis, penetrantis, satis acris, aromatici, amari, inprimis si radix vegeta, tum habet acrimoniam aromaticam satis magnam Iridis vel Cyperi radicibus non absimilis; hæc annis abhinc aliquot ex provincia Peruviana Charcas apportari cœpit. Ex Latino contra & Hispanico vocabulo yerva, quasi diceret contra venenum: Drakena appellata fuit à Clusio in honorem F. Drake qui primus dicitur hanc radicem invenisse, & in Europam adportasse; nondum constat, cujus plantæ radícula sit; datur adversus venena, & sudorem movet. Dicitur & *Radix yerva, Bezoartica, Cyperus odoratus peruvianus, Dracena &c.* B. *Gift-Wurzel.* G. Gift-wurtzel. Gall. *Racine de contrayerva.* A. Yerva, Counter poysen.

CONTUSIO OSSIS, est, cum instrumento quodam duro & obtuso os ita læditur, ut externè integrum videatur, cum tamen versùs interiora à toto separatum sit. Gr. *θλάσις & θλάσμα.* B. *Gen Contusie / kneusung.* G. Zerstoßung, Zerknirschung. Gall. *Contusion, Meurtrissure.* A. Bruising, contusion.

CONVOLVULUS, idem quod *Volvulus.*

CONVOLVULUS & CONVULVULUM, seu SMILAX, Sic etiam propriè vocantur duæ plantarum species, quarum una convolvulus major, altera minor: prior est planta, quæ habet caules longos, tenues, sarmentosos, scandentes, & omnia apprehendentes: folia hederam terrestrem referunt, sed molliora & majora, viridia, acuta: flores monopetali, campaniformes, ad ora expansi, coloris albi; ex floris calice surgit pistillum, infimæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum subrotundum, membranaceum, ipso calice plerumque involutum, modo unicapfularem, modo tricapsularem, & feminibus factum angulosis, nigricantibus, vel aliquando rubicundis: Radix exigua, longa, intus alba: hæc planta est amara & acris: illud nomen imponitur omnibus plantis, quæ sese adstantibus arboribus, stipitibus &c. circumvolvunt, iisque adhærent. Vide *Helxine cissampelos.* Gall. *Grand Liseron ou lizet.*

CONUS, Græcis, vel *Pyramis*, est inversus turbo in plantis, hoc est, id quod ex latitudine in arctius protrahitur ac fastigiatur, cui calathus contrarius, ut diximus, existit.

CONUS FUSORIUS, seu PYRAMIS, est crucibuli spe-

species, ex lato in angustum abiens, ex ferro aliove metallo conflata, cujus ope reguli plerumque separantur à scoris: dum enim liquatum minerale huic infunditur, concutitur malleolo conus ut tremiscat, tum partes graviores cadunt ad fundum, & leviores, ut sunt scoris, supernant. B. *Gras-naald/ Giet-kroes*. G. Giespuckel. Gall. *Crenset en forme de Pyramide*. A. A crucible.

CONVULSIO, est contractio musculi, vel fibrarum versùs principium, violenta, nunc definens, nunc renata, aliquandiu perseverans, undè eam accipere oportet, tam in Musculis majoribus quàm minoribus, sive fibris. Dicitur quoque *Spasmus*; sed hic tamen aliquomodo differt, cùm sit perpetua tensio absquè remissione: neque opus est cùm scolis addere *Involuntariam* esse convulsionem, quia decet convulsionem ad fibras contractas referre, in quibus nunquam *motus voluntarius* existit, adeoque etiam nullus præter aut contra voluntatem. Estque *Universalis*, quæ ad plures & præcipuos musculos, qui corporis machinam sustinent & movent, unâ vice extenditur; vel *Particularis*, quæ in uno tantum vel pluribus unius membri musculis contingit, & sæpe comitem habet paralylin. Gr. *Σπασμός*. B. *Stuip-trekking/ Kramp-trekking*. G. Der Krampf, der einen Zeucht. Gall. *Spasme, Convulsion*. A. A cramp, or convulsion.

CONVULSIVUS MOTUS, vide *Motus Convulsivus*.

CONYZA, vide *Coniza*.

COPAL GUMMI, est resina duriuscula, admodum candida, vel ex albo flavescens, pellucida, benè odorata in massam redacta, adfertur ex India occidentali, sive Nova Hispania, ubi ex vulnerata arbore guttatim stillat. Aliquantulum odoris spirat. Sunt duæ species, altera *Xoloch copalli* dicitur, altera *Copal Cahuitl*.

COPAYVÆ BALSAMUM, seu COPAL YVÆ OLEUM, colligitur ex arbore balsamifera Brasiliensi fructu monospermo, cujus caudex terebra perforatur, ex quo foramine instar terebinthinæ destillat, & quidem tanta copia, ut ferunt, ut spatium trium horarum duodecim libræ colligi possint, vulnus obducitur postmodum cera aut argilla, & quando post quindecim dierum spatium rursus adaperitur, majori adhuc in copia defluit. Arbor nascitur in Brasilia. Lignum habet rubrum; folia obrotunda, qua-

tuor aut quinque digitos longa, duos vel tres cum semisse lata; florem fert mediocrem, quinque foliis obrotundis constantem. Fructus illi est siliqua obrotunda, vel ut Pizio, instar baccæ lauri, qui ab incolis comeditur.

COPELLA, vide *Cupella*.

COPHOSIS, est aurium surditas vel incipiens, vel perfecta, à quavis causa orta, qua impeditur vel tollitur sonorum delatio ad sensorium commune, fitque plerumque ab obstructione meatûs auris, relaxatione, ruptura, inflammatione & incrassatione membranae tympani; concretionem tubæ Eustachianæ, muscutorum ossiculis adhærentium paralyfi, nervi acustici compressione &c. à *κοφω* surdus sum. B. *Doofheid*. G. Taubheid. Gall. *Surdité*. A. Deafness.

COPOS, est corporis lassitudo, quando muscutorum vascula minima humoris viscidis aggravantur, & obstruuntur, & spiritus animales in Cerebro defunt, adeoque nec in musculos determinentur, ita ut motibus obeundis inepti, & pigri evadant, à *κόπω* lassus. B. *Dermoeidheid*. G. Muedigkeit. Gall. *Lassitude*. A. Weariness.

COPROCRITICA, sunt Medicamenta, quæ fæces alvinas subducunt & evacuant, ex *κopro* sterminus, & *κρίνω* cerno.

COPROPHORIA, idem quod *Purgatio*, ex *κopro* sterminus & *φωρίω* fero, gesto.

COPROSTASIA, est alvi constrictio, ex *κopro* sterminus, & *στάσις* statio. B. *Hardipbigheid*. G. Hartleibigkeit. Gall. *Constipation* vel *Durété de ventre*. A. Bounding in belly or coëtive.

COQ. AD MED. CONSUMPT. hoc est, Coque ad Medietatis consumptionem.

COQ. in S.Q. A.Q. hoc est, coque in sufficiente quantitate aquæ.

COQ. S.A. est, coque secundum artem. Sunt hi termini vel abbreviationes, quibus Medici in formulis suis brevitatis ergo utuntur.

COR, est substantia carnosa & fibrosa, ex variis muscutorum ordinibus & tendinibus conflata, demonstrante *Lowero*: habet duas auriculas totidemque ventriculos; dextræ auriculæ vena cava, sinistræ vena pulmonaris adhæret; dextro ventriculo arteria pulmonaris, sinistro vero

ro arteria magna connectitur. Investitur sacculo membranaceo *pericardium* dicto, quo mediastino & diaphragmati conjungitur; superius basin, inferius cuspidem habet, collocatur in medio thoracis intra pulmonis lobos, situ transverso, ita ut ferè horizonti parallelum jaceat, sanguini recipiendo, eumque validâ contractione musculorum circumvehenda tantùmmodo inservit: in corde glandulas dari invenit du Vernoï, tradiditque in Comm. Petropolit. vol. 2. Gr. καρδιά, & καρ. B. *Het Herte*. G. Das Hertz. Gall. *Cœur*. A. The heart.

COR, in vegetabilibus, est quod in medio ligni residet, & tertium à cortice continetur, velut in ossibus Medulla, à nonnullis *Matrix*, & ab aliis *Medulla* nominatur. B. *Merck* / 't *Pit*. G. Das Marck. Gall. *le Cœur*. A. The Pith.

CORACOBOTANE, est nomen quod imponitur Brusco, & Lauro alexandrinæ, & significat *Herbam corvi*, derivatur enim ex καρὰς corvus, & βοτάνη herba.

CORACOBRACHIÆUS, idem quod *Coracoideus*.

CORACOHYOIDES, sunt musculi à scapulæ processu coracoide orti, qui ad os hyoides procedunt ipsique inferuntur: *Usus* est oblique deorsum movere os hyoides, ex καρὰς corvus, & υοιδίς hyoides os. B. *Des tong-beens* *Raben-ber uitsteekzels-spieren*. G. Des Zungbeins Rabenschnabel gleiche maulz. Gall. *Muscles Coraco-Hyoïdiens*. A. Brawnes of the bil of the raven.

CORACOIDES PROCESSUS, est *Rostriformis* scapulæ processus, vide *Ancyroides*, à καρὰς corvus, & ἄνδρῳ forma. B. *Raben-ber uitsteekzel*. G. Das Rabenschnabel gleiche aufzwachs. Gall. *Apophyse Coracoide*. A. Ravenbees-proces.

CORACOIDEUS, five CORACOBRACHIÆUS, est unus ex musculis brachium moventibus. Oritur à coracoide processu scapulæ, unde ei nomen: & inseritur in internum humerum circa medium, juxta tendinem Deltoidis. Principium habet nerveum & breve, oblongum ventrem, satis corpulentum & robustum tendinem. Venter ejus perforatus est, unde etiam *Perforatus* dictus & transitum nervis largitur, qui ad cubiti musculos distribuuntur. Hunc muscolum alii saltem musculosam portionem Bicipitis vocârunt, utilem ad brachium scapulæ processui adducendum, five antrorsum supra pectus attrahendum, ex

κοραξ corvus, & ἰδοῖ forma. B. *Rabenbeß-spier*. G. Rabenschnabels maufz. Gall. *Muscle Coraco brachial*. A. A muscle arising from a process of the Scapulla called Coracoides.

CORALLINA, est muscus petrosus marinus, inhærens scopulis, & piscium testis corallisque, eo sanè modo, quo muscus arboribus innascitur, optimaque est, quæ à corallis detrahitur : Color griseus est; sapor subsalsus. B. *Korall-mosch*. G. Meer-moss, Corallen-moss. Gall. *Coralline*, ou *moussè marine*, ou *Brion*. A. Coralline. Lumbricos enecare dicitur.

CORALLOIDES, est planta maritima, ramosa, nulla folia habens, similis Coralliis ob figuram & duritiem à Corallo. vide *Dentaria*.

CORALLUM & CORALLIUM, Num ad vegetabilia, num ad mineralia pertinet adhuc lis est inter multos, videtur tamen ad vegetabile regnum deduci debere, hincque dici potest planta in fundo maris nata, foliis carens, cujus neque flos neque semen cognitum, rupibus & aliis corporibus affigens aliqualem radicem, cortice vestitam, & in ramos divisam : extremitates horum ramorum molles sunt, parvorum globulorum seu Ribium ad instar rotundæ, in sex cellulas divisæ, repletæque humore albicante, crasso, acri adstringente; hi globuli capsulæ seminales esse creduntur, & succum, quem fundunt, producere plantas corallorum in omni corpore, cui illabitur : variæ Corallorum in utraque India, imò & in Europa & Asia dantur species, colore quoque differenti. Est & rubrum, album, nigrum, cæruleum. Tunc differunt figura : aliæ instar arboris racematim se elevant; Aliæ glabris ramis, aliæ hispidis; nonnunquam fistulosæ species inveniuntur, vel figuram tuberosam, vel lactucæ folia, aut lichenis terrestres, aut cornu cervinum &c. referunt. Coralla sub aquis mollia esse, sed in aëre indurari unanimiter dicunt. Exinde eliciuntur tincturæ, magisteria &c. sed in pulvere ad scrupulum intus sumpta, acidum in corpore nostro potenter domant. Gr. *Κοράλιον*. B. *Korall*. G. Korall, Corallen. Gall. *Du Corail*. A. Corall.

CORCHORUS & CORCORUS, Est planta sesquipede circiter alta : folia sunt alterna in caulium nodis appolita, in margine incisa, parte ima barbulam utrinque
unam

unam seu apophyfin lingulae instar tenuem possident : flores rosacei quinquepetali ut plurimum , lutei : ex hujus calice surgit pistillum quod deinde abit in fructum , qui est longa siliqua cornuta , quæ quinque loculamentis constat , per quinque septa media dissecta , in quibus loculis quinque valvæ se expandunt , & dimittunt semina numerosissima , exigua , coloris cinerei , saporis viscosi : hæc planta crescit in hortis ; an Anagallis , an Ocimum sylvestre , vel alia planta ? Disputatur : ejus tamen Etymologiam deducunt ἀπὸ τῆς κόρης καὶ κόρω , quod oculi pupillam ornet , five purget : est Melochia Alpin. Ægypt. quidam nomen à corde derivant , quia ejus fructus cor referre creditur.

CORDIALIA , CORROBORANTIA seu CARDIACA, Vide *Cardiacum*.

CORDIS PALPITATIO, vide *Palpitatio cordis*.

CORIANDRUM , & COLIANDRUM , Est planta , quæ caulem habet sesquipedem vel duos circiter altum , rotundum , tenuem , medulla repletum , ramosum : folia inferiora Petrosellini similia , superiora magis incisa , & Camomillæ fatis proxima : flores parvi rosacei , & umbellati , plurimis scilicet petalis inæqualibus & cordiformibus constantes , quandoque æqualibus , in orbem positis , & calici insidentibus , is autem abit in fructum ex duobus feminibus compositum , nunc semisphæricis , nunc sphæricis , striatis , ex cinereo fuscis , includentibus sub cortice tenui medullam subfuscam , duriusculam , in medio quasi dissepimentis distinctis , saporis subdulcis , subacris , saporis aromatici : volunt nomen derivari à κόρις cimex ; quia recentis folia & semina cimices olent. Sed alii derivant à κόριον seu parva puella , κόρη est puella , quia fructum gerit , ceu pupillas κόρας oculorum. Gr. Κόριον & Κόριαννον. B. *Koriander* / *Koliander*. G. Koriander , Schwindell. Gall. *Coriandre*. A. Coriander.

CORIS, est Hypericum , an à κείρω scindo : quod vulnera sanet ? Vel quod tota pulchella , & perquam hilari facie sit , κόρις enim & κόρη , *Virgo* , *Puella* dicitur.

CORNEA OCULI TUNICA , seu CERTAODES , quæ etiam *Scelerotes* & *Dura* vocatur , à dura meninge originem habet ; anteriùs pellucida est , & in eminentiorem figuram protuberat in uno homine plùs , in altero minùs ; à lateribus tunica albuginea obducitur ; interiùs humorem aqueum

aqueum continet; corneæ hujus structura mirifica est; si constringatur oculus à parte postica, ubi muscoli inferuntur, & solvitur tunc levissimâ manu acutissimâ lanceolâ, vulnere perpendiculari levissimo, mox dilatatur vulnusculum, contrahentibus sese fibris, secedit lamella; si novum iterum fit vulnusculum, idem fit; quod quidem usque ad 30 vices fieri potest, & singulâ dissectione erumpit liquidum tenuissimum, quo absterfo mox erumpit novum, nullum habens saporem, nisi leviter subsalsum; unde apparet, quod cornea constet ex membranaceis stratis per transversales fibras annexis; hinc quoque non ita absurdè videtur illorum sententia, qui corneam, tamquam membranam à sclerotide diversam distinguunt; tota pellucens in vivis, in morientibus sensim obscuratur; in extinctis penitus opaca, unde illa obscuritas inter certa instantis mortis signa adnumerat Hippocrates. B. *Het hooznachtig blies*. G. Das hornharte häutlein. Gall. *La Cornée*. A. horn-fleece or coat.

CORNICULARIS PROCESSUS, vide *Ancyroides*.

CORNUA, dicuntur additiones acuminatæ ungulares, nascentes super juncturas in extremitatibus propter operationis vehementiam.

CORNUA UTERI, seu CERÆA, sunt duæ uteri partes laterales in quibusdam brutis, ut vaccis, cervis, ovibus, capris, canibus, &c. in quibus fœtus in imprægnatis his matribus habitant. Cornua tamen ex horum imitatione tribuerunt, etiam humano utero Authores; quia ad fundi latera, aliqua utrinque est protuberantia, ubi vasa deferentia inferuntur; sed pessimè, & rarissimè muliebris uterus bipartitur, ut in brutis. B. *De Moeder-hoornen*. G. Die Kruemme der Bärmutter. Gall. *Les Cornes de la Matrice*. A. The corners of Horn of the womb.

CORNU CERVI, vide *Coronopus*.

CORNUS, est arbor, quæ habet lignum durum, compactum, album, satis magnum & extensum, corticem durum, rubicundum, vel cinereum habens, saporis adstringentis, folia sunt longa, ampla, venosa, mollia: flores in extremitate ramorum crescentes, pedunculis brevibus adhaerentes, quadrifidi, in crucem dispositi; calix abit in fructum carnosum, ovalem, olivam ferè referentem, sed minorem, in initio viridem & acerbum, postea per maturitatem rubrum & aliquando flavescens, saporis sub-

dulcis cum aliqua grata acredine, & adstriptione, in hoc fructu invenitur officulum oblongum, albescens, in duo loculamenta, quæ singula unicum semen oblongum includunt, divisum : hæc arbor crescit in hortis; dantur duæ species corni, sc. mas & fæmina : dicta est quod duritie & rigiditate cornibus similes ramos habeat. B. *Koornoeljeboom*. G. Welsche Kirschen, Kornel-baum, Kurker-baum. Gall. *Cornouillier, ou Cornier*. A. Cornell-tree or dog-tree.

CORNUTA, idem quod *Retorta*.

CORONA, est superior dentium molarium superficies.

CORONA REGIA, vide *Melilotus*.

CORONA TERRÆ, vide *Hedera Terrestris*.

CORONALIS SUTURA, Gr. *Στεφανίτης & Στεφανιά*.

Est Fissura, quæ pectinatim, dentatæ ferræ instar, coit; estque in superiore parte cranii ab uno tempore ad aliud, & circumscribitur ossibus frontis & bregmatis, in cujus medio sagittalis futura terminatur. B. *De Kroon-naad*. G. Eine Fuge der Hirnschalen. Gall. *La Suture coronale*. A. The coronal future. Crouw Suture.

CORONARIA VASA, sunt venæ & arteriæ cor, nutritionis & motûs gratiâ, cingentes : item vasa sanguinea sinistrum os stomachi cingentia : arteriæ coronariæ cordis duæ, oriuntur ex aorta mox supra valvulas semilunares cordis sinistri, & opposito itinere unum componunt canalem basi cordis innexum toto ambitu, unde demissæ arteriæ, variis inter se anastomosibus junctæ, in innumerabilia exilissima vascula distribuuntur, quæ ultimo roris effusi more humorem fundunt, & quæ omnia sensibilia cordis puncta pervadunt, omnemque ferè cordis substantiam cum venis, similiter positis, componunt, accretâ inter vasa pinguedine externâ. B. *De Kroon vaten*. G. Die Herts gefasse. Gall. *Vaisseaux coronaires*. A. The crown Vessels.

CORONE, est processus osseus, acutus, & anterior inferioris maxillæ, à similitudine rostri cornicis, *Rostriformis* dictus. Gr. *Κορών* cornix. B. *Het Kraepe-belis uitsteeksel*. G. Kraey-schnabels gleiche aufz wachs. Gall. *Apophyse Coronôide*. A. process of the crown's bil.

CORONOPUS hortensis, est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia multa, longa, angusta, nervosa, profundè incisa, longis, ad margines laciniis appositis lacinia-ta, parvum cornu cervi referentia, saporis aliquantulum ad-

adstringentis, sed grati : nascuntur ex foliis caules tenues, rotundi, rigidi, villosi, pedem unum vel sesquipedem alti : flores & semina plantagine : Radix plerumque exigua, sed aliquando digitum crassa, alba, saporis aliquantulum adstringentis : hæc planta colitur in hortis. *Pes cornicis* dicitur à pedis cornicis similitudine, quam ejus exprimunt folia. Alii quod ejus stylus, è mediis foliis exurgens, in cornicis pedem conformatus articuletur, reliquam exhibens crucis effigiem : vocatur & *Sanguinaria* & *Sanguinalis*, quod sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui *Herbam stellæ* nominant, alludentes haud dubiè ad Græcam appellationem *Astrion*. Nonnulli quod folium ejus multipartitò confectum in cervini cornu imaginem effigietur, *cervinum cornu* vocarunt. Ex κορώνη cornix, & πῆς pes. B. *Werts-hoozn* / *Gravinne-kruud* / *Itraapen-boet* / *Floop-kruud*. G. Krayen-fusz. Gall. *Corne de cerf*, *pied de corneille*. A. Buck-horne plantain.

CORPORA NERVEO-SPONGIOSA, idem quod *Corpora nervosa penis*.

CORPORA NERVOSA PENIS, F. Ruifchio *Corpora nerveo-spongiosa*, sunt duo corpora longa, orta à parte inferiore ossium Pubis seorsim, & cincta membranâ propriâ, junguntur sibi mutuo ope septi medii, quod sensim evanescit versùs anteriora, & ex cellulis plurimis membranosis contexta, quæ maximum penis corpus constituunt. Si illa corpora expandantur, per sanguinem in cavernulis majori copiâ influxum, erectio istius instrumenti fit. Ex similibus duobus corporibus etiam constat mulierum Clitoris. B. *De zenuwagtige Lighamen*. G. Die Sennadrige theile des Mænnliches glieds. Gall. *Les corps caverneux*. A. The nervous body's of the yard.

CORPUS CALLOSUM, est medullosa seu potius fibrosa cerebri pars, ex cujus complicatione ventriculi cerebri anteriores constituuntur. Estque tota medullosa, nulla membrana obtensa, medullæ oblongatæ apicibus utrobique affigitur : ab istis apicibus tanquam ortu suo, medullaris hæc substantia cerebrum obducens & concamerans versùs posteriora expanditur, ac sensim minuitur, demùm hujus expansi limbus exterior arctius contrahitur, ac inferiùs, medullæ oblongatæ caudici membranarum & vasorum nexu conjungitur. Porro firmioris connexionis

gra-

gratiâ, ab interiore ipsius parte, juxta ipsius apices, processus medullaris exoritur, qui cerebri fissuram subten- dens, ad limbos ejus pertingit; quibus velut brachiis utrin- que reflexis unitur: quæ quidem brachia medullæ oblon- gatæ caudicem amplectuntur, adeoque illum cerebri lim- bum sibi firmiter annectunt. B. *Het weeragtig lichaam.* G. Die Schwielharte theil des gehirns. Gall. *Le corps cal- leux.* A. The pith of the brain.

CORPUS GLANDULOSUM, seu GLANDOSUM, idem quod *Prostata*.

CORPUS PAMPINIFORME, vide *Varicosum corpus*.

CORPUS VARICOSUM, vide *Varicosum corpus*.

CORPUS PYRAMIDALE, idem quod *Varicosum cor- pus*.

CORRECTIO, est quando medicamini sal quoddam aut aliud quid additur, ad effecta acceleranda: vel quan- do vis violenta reprimatur. B. *Verbetering.* G. Verbesse- rung. Gall. *Correction.* A. Correction.

CORRECTORIUM, est, quo Medicamenta melioran- tur, ne cuiquam noceant, & facilius assumi queant, ut quando Sennis additur semen fœniculi, folia scrophulariæ &c. Ad hæc medici attendere solent, dum morbis profligandis accommodant remedia, quæ si sola non satis con- venirent in data ægri temperie, additione aliorum ad sco- pum medicum diriguntur, & sic corriguntur. B. *Gen Ver- beteringe.* G. Verbesserung. Gall. *Correctifs.* A. Idem.

CORROBORANTIA, idem quod *Cardiaca*.

CORROSIO Chymica, est corporis misti, per res cor- rosivas, calcinatio. B. *Opthinge.* G. Zernagung. Gall. & A. *Corrosion.*

CORROSIVUM, est Medicamentum solida corporis animalis corroderendi vim habens, ut Ruptorium, Calx, Aqua fortis, &c. Cujus ope superflua carnis excrescentia absumitur vel depascitur; vel ut fontanella fiat ad pus vel aquam effusam evacuandam. B. *Corrosief.* G. Zernagen- de mittlen. Gall. *Corrosif.* A. A Corrosive.

CORRODENTIA, sunt quæ acutis suis particulis car- nem excrescentem edunt, & consumunt & quidem om- nia, quibus applicantur. B. *Corrosief / knagend middel.* Zernagende mittel. Gall. *Corrosifs.*

CORRUDA, est Asparagus sylvestris, dictam volunt quod

quòd ubi adolevit facile corruat, decidatque. Ast cùm græca apud Theophrastum vox sit à κορίω verro, purgo, nam colligatis in fasciculum truncis, verrendo inservire possunt.

CORTEX, est exterius tegumentum, seu cutis vegetabilium, ut & nucum, malorum granatorum, aurantiorum &c. Item exterior substantia cerebri & cerebelli. Gr. λήπισμα, φλοιός. B. *De bast*. G. Rinden am baum. Gall. *Ecorce*. A. The bark of a tree.

CORTICALIS SUBSTANTIA CEREBRI, & CEREBELLI, est substantia ejus exterior plurimis Labyrinthis & mæandris exterius dotata; tenui meninge obducitur, cinericea, mollis, humidior, cingens ubique, accuratè, totam originem alterius substantiæ internæ, albissimæ, solidioris, exsuccæ magis, quæ medulla cerebri & cerebelli vocatur; ita ut hæc ab illa oriri primò manifestè videatur undequâque, tam in appendicibus, ventriculis, cruribus, medulla oblongata; in interiori verò parte medullæ spinalis similis est cortici recondita substantia, tota pariter ibi arteriosa, quam medullosa ambit, inversâ ratione quam in priori, & juxta *Malpighium* ex glandulis minimis ovalis figuræ composita, juxta alios & quidem verosimilius ex meris vasculis à vasis piæ matris oriundis. Corticalis hæc substantia ab interiori ergo cerebri parte medullarem seu fibrosam substantiam sibi vicinam habet, quæ ex cortice originem ducit, ut clare in cerebello patet. Usus est spiritus animales segregare & è massa sanguinea excipere, ex qua per medullarem substantiam & nervos distribuuntur, & per universum corpus deferuntur. Secundo, fortè memoriæ & sônni sedes ibi collocatur. B. *Bast-agtige substantie*. G. Die Rindengleiche theilen im gehirn. Gall. *Substance Corticale du cerveau*. A. the cortical substance of the brain.

CORTUSA, Est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, ampla, rotunda, incisa, aspera, saporis stipitici, caulibus longis adhærentia: ex his nascuntur caules parvi, nudi, in summitate habentes flores quinque petalis constantes, purpureis: radix valdè fibrosa; tota planta est valdè odorata; crescit in locis arenosis, & argillaceis, satis convenit cum auricula ursi; dicitur & fanicula alpina, vel montana latifolia, laciniata. Est Matthiolo
Caryo-

Caryophyllatæ species, sic dicta quod à *Cortuso* primum hæc planta reperta sit.

CORYLUS, Est arbuscula, quæ plures habet ramos longos, flexiles, sine nodis, cortice tenui obductos: ejus lignum est tenerum, album: folia sunt ampla, sparsa, in margine dentata, acuta, in parte superiori viridia, in inferiori albescentia: flos mas constat tribus squammosis foliolis, quorum exterius binis interioribus incumbit, ex infimo flore quatuor pedunculi emergunt, singuli habentes testiculum suum; omnes flores simul adnati axi longo referunt caudam cati: flos femina in eadem planta, loco diverso à mare nascitur, constans calice squammoso, foliolis multis se invicem succingentibus facto, intra quem ovarium latet instructum multis tubis incurvis, rubris, acutis: fit deinde fructus ossæus putamine nucleum condens carnosum, hærens arctè innatus calici foliaceo: radix longa, crassa, robusta: hæc arbor crescit in sylvis, cujus fructus nux Avellana & λεπτοκάρυος dicitur. Fortasse erit vox corrupta ex καρύα, cum κα sit mutatum in κο. εν manet, deinde a in us, hinc corylus, si fallar, non mihi vitio verite, est enim tantum divinatio. B. Hazelaar. hazenote-boom. G. Hasel-nusz, Hasel-strauch. Gall. Noisetier, Noisetier, ou Coudrier. A. Hasel-nut-tree, Hasle-tree, or a filberd-tree.

CORYMBI, sunt summitates Hederarum, velut uvæ dependentibus acinibus coactæ. Transfertur tamen vox ad multos herbarum fructus.

CORYMBIA, CORYMBOS, CORYMBE, est Hedera, arborea, sic dicta, quod supra arborum capita ascendat; derivatur à κεφα caput.

CORYPHE, est vertex capitis; item digitorum extremitas interior juxta ungues, à κορυφή in verticem attollo.

CORYZA, five GRAVEDO, est succorum nostri corporis, ab externo frigore, inspissatio, unde in minimis vasculis, ubi hi alluunt, fit obstructio; vel ab eadem causa vascula contrahuntur, hinc à liquido suo inflammantur, quod cum facillimè fit in locis ubi continuo alluit aër, tota membrana à *Schneidero* descripta, nares &c. investiens afficitur, unde ex glandulis ejus fit liquoris acris & salii defluxus; sic & glandulæ pulmonarem fistulam perreptantes ob acrem succum excitant tussim. Coryza est vel sine vel cum febre, à κορυζάω gravedine laboro. vide *Catar-
rhus.*

rhbus. B. *Derkhoutheid / de snuf / zwaarhoofdigheid / druppinge uit de hersenen* G. Schnappen, Flutz, oder beschwerung desz Haupts. Gall. *Enchiffrenement ; Rhûme.* A. Heaviness, or distiness.

COS VINUM, est Vinum, quod insigni colore, odore, & sapore pollet. Prior enim littera significat colorem; media odorem; & ultima saporem. Gall. *du Vin Theologal.*

COSMETICCA, sunt Medicamenta externa, illinendo applicata, cutim dealbantia, & emollientia, ad pulchritudinem illi conciliandam; ut oleum tartari, lac virginis, dissolutio ex mercurio sublimato, sulphure, camphora, &c. à κοσμέω orno. B. *Blanketzel.* G. Blancketfel, Farb anstreichende mittlen. Gall. *Remedes pour blanchir ou netoyer la peau, ou pour farder.* A. Cosmeticks.

COSTÆ, Gr. πλευραι, σπασσαι. B. **Ribben.** Sunt illa ossa, quæ arcuata, oblonga, unâ cum aliis partibus thoracem constituunt: Posteriorum connexionem cum vertebrais dorso, anterieus verò cum sterni cartilaginibus habent: numero in quolibet latere duodecim sunt: septem superiores veræ seu potius longæ, quinque inferiores spurix, seu breviores dicuntur. Item ῥόβοι πλευραι, μαλθακαὶ πλευραι, χονδροειδεις ἀκραιται. Costarum pars latior *Palmula* dicitur, πλάτη *Poll.* angustior, quæ spinæ vertebrais attingit, *Remulo κάπιον*: *Polluci* μεσοπλευρία costarum spatia intermedia dicuntur. B. **Korte ribben / bastert ribben.** G. Die kurtze rippen. Gall. *Fausses côtes.* A. The Spurious ribb's. Costæ etiam sunt margines ossis scapulæ, & ossis illi.

COSTUS, est herba odorem spirans, nomen accepit, ἀπὸ τοῦ κοσμεῖν ab ornando, quod odoris sui fragrantia sensus decorat; duplex in officinis prostat, *Albus* & *Niger*, vocatur etiam *Mentha Saracenica*, & *Græca*, Straboni *Costarium*. Vocatur aliàs *Mentha corymbifera*, à dispositione florum & odore, herba S. Mariæ. Balsamita, ubi vide: costus Arabicus, est radix exoticæ plantæ arbusculæ sambuci satis similis, oblonga, pollicis crassitie, gravis, compacta, coloris buxæ flavescentis extûs, intûs rubri, saporis acris, amari, aromatici, grati, subdulcis, odor ejus si in ignem conjicitur sat gratus: tres costi dantur species, Arabicus, dulcis, & amarus; sunt qui volunt has tres species inter se non differre, nisi ratione ætatis, sed quemadmodum de plurimis exoticis ita de costo nihil adhuc in-

dubitanter differi potest. B. *Kost* / *Balsam*. G. *Frauwenkraut*. Gall. *Costus Arabique*. A. Sweet smelling costus. Arab. *Kaft* & *Kost*.

COTINUS, Est arbuscula sex vel septem pedes alta, ejus lignum est flavum, ramos dimittens rotundos, cortice rubicundo & obicuro instructum : folia sunt ampla, venosa, ferè rotunda, in longo pedunculo : Caliculus exiguus, quinquefidus; flosculus rosaceus, pentapetalus, in ramulis capillaceis : Ovarium fit fructus orbicularis, duro putamine impartibili tegens semen triangulare, coloris rubicundi, fusci aut nigri : radix lignosa : hæc arbuscula crescit in montibus : dicitur etiam Coccigria, à κόκκος granum, & ἄγρια sylvestris, quasi grana sylvestria. Est Oleaster sylvestris, qui vocatur cotinus ad lineamenta modo conchilii colore insignis. Nomen fortè ab insula Hispaniæ Continusa post Gades; ubi Oleaster seu Cotinus in magna copia alitur, me latet. B. *Wilde Olyf-boom*. G. *Wald-Oel-baum*. Gall. *Fusset*; *Olivier Sauvage*. A. The Wild Olive-tree.

COTONEA, CITONIA & CYDONIA MALUS, Est arbor, quæ habet lignum tortuosum, durum, pallidum, albescens, habens corticem mediocriter crassum, fatis politum, externè coloris cinerei, internè rubicundi; folia mali, integra, albescentia, in parte inferiori lanuginosa; flos est rosaceus, quinque vel plurimis petalis in orbem positis constans, cujus calix abit in fructum turbinatum, carnosum, in loculamenta divisum, seminibus plurimis, glutinosis, oblongis, & callosis facta; radix magna, coloris obscuri : crescit hæc arbuscula in montibus & locis aridis : sic dicta est, à Cretæ oppido, unde primum advecta est. *Cotonea*, verò à Sidonte Corinthi vicio nominata est, primus Cato illud nomen dedit : quibusdam, quod mala ejus cotone, seu lana quâdam tegi videantur. B. *Querc-boom* / *Querc-appel-boom* / *Querc-per-boom*. G. *Quitten-baum*, *Kutten-baum*. Gall. *Coignassier*. A. The Quince-Tree.

COTONIUM, COTONUM, COTUM, vide *Xylon*.

COTULA, est Camomillæ species, quæ in duas dividitur, quarum una dicitur cotula fetida, sive Chamæmelum fetidum, quæ habet folia Chamomillæ vulgari similia, odore abominabili, gustu amaro. Gall. *Camomille puante*.

te. Altera species, dicitur cotula non fætida, & à foliis cotulæ fætidæ distinguitur solo narium judicio, sapore amaro, vocatur & Chamomilla inodora, Buphthalmum. Gall. *Oeil de bœuf.* Datur & tertia species cotulæ, quæ est flore luteo radiato, five Chrysanthemum tenuifolium boeticum, five Buphthalmum tenuifolium, folio mille folii: nomen quod ei Thufci indiderunt satis declarat: *Cautam* enim appellaverunt, unde diminutivum *Cautula* deductum est, & tandem corruptâ voce *Cotula*, à καλώ uro, quia, illi qui in campis alvum exonerant, & deinde hâc herbâ sedem abstergunt, paulò post intolerabili vexentur ardore. Alii à cote denominationem trahunt, quia fortè quibusdam in locis cotibus, seu rupibus innascatur. B. *Kroedille / Krocogen.* G. Krottendill, Knedtill, Kne-aug. A. Stinking May-weed, or camomil. Gr. Κυνανθεμῖς Κυνόβοταν.

COTYLA ATTICA, pendet uncias novem, ut Hemina Italica. *Cotyla Italica* verò est libra mensuralis unciarum XII. vel capit semifextarium.

COTYLE seu **COTYLA**, est *Acetabulum* seu cavitas ossis coxendicis, quæ caput femoris ossis excipit. Gr. κοτύλη γλῶσσαν *Theocr. interp.* B. *Het heupen-beens hol.* G. Die schuffel, oder hoele darin sich das Hufstbein fueget. Gall. *Le Creux d'un os, ou s'emboite un autre os.* A. The cavity in the Hip-bone.

COTYLEDON, idem quod *Cotyle*.

COTYLEDON, ACETABULUM, five **UMBILICUS VENERIS**, Est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, rotunda, pingua, succulenta, tenera, umbonem five umbilicum quali referentia, saporis viscidî, & insipidi, pediculis longis adhærentia, ex quibus producit caulis semi pedem altus, qui in plures ramusculos dividitur parvos flores gerentes: qui sunt monopetali, campaniformes, tubulati & multifidi, ex quorum calice surgit pistillum, quod infimam floris partem perfodit, abique deinde in fructum, ex plurimis vaginulis constantem, in capitulum collectis, à basi ad apicem dehiscentibus, ac semine fætis ut plurimum minutissimo: sic dicitur quòd folium habeat instar vasculi excavatum, quo solebant veteres haurire, vel quod sit instar coxendicis concavum: κοτύλη enim est cavitas dicta coxæ, in qua os femoris capite suo rotatur, à κείω jaceo, politus sum. Vocatur item γῆς ὀμφαλόν,

λον, quòd veluti oculum seu umbilicum densioribus cingeret foliis, adinstar majoris sedi. Gall. *Nombril de Venus*.

COTYLEDONES seu ACETABULA UTERINA, vel πλακταίαι κερταίαι. Sunt glandulae per externam fœtus membranam seu chorion dispersae, quae succum nutritium fœtui alendo ex utero segregant: sed hoc locum tantum habet in quibusdam animalibus: in mulieribus verò placenta uterina earum vicem gerit. Item venarum uteri hiantium oscula, quae acetabulorum & cotyledonum nomine veniunt. A foliorum Cotyledonis herbæ similitudine nomen fortiuntur.

COURAP, scacies quædam Indica est, Impetiginem aut Herpetem referens.

COXÆ Os, Celfo, aliis *Innominatum & Ilium. Coxendis*. Varroni ἰχθίον κόχωνω *Hesych.* dicitur, eo quod ileum intestinum contineat; lateribus ossis sacri annexum est; in infantibus ex ossibus tribus constat, ilio nempe, Ischio, & osse pubis, per cartilagineas invicem conjunguntur usque ad septimum annum, tum triplici lineâ distinctum apparet: quod adultis in unum coalescit. B. *Het heupen-been / ps-been / de joukhen*. G. Das Heufft-bein. Gall. *La Hanche*. A. The Hip vel Huckle bone, or the haunch.

COXENDIX, idem quod *Coxa & Ischium*.

CRAMA, CROMA, & CHRAMA, est mixtio cujusque rei, sive Medicamenti, sive Elementorum, à κειράγνυμι misceo. B. *Gen mengsel*. G. Ein Vermischung, Vermengung. Gall. *Mixtion, Meslange*. A. Mingling or Mixture.

CRAMBE, Est planta, quae habet folia Brassicae rubrae, sed magis crassa, magis carnosae, visui gratiora, circa margines undulata, & veluti crispa, saporis non ingrati, ex foliis nascuntur caules, qui in summitate habent flores cruciformes, quatuor scilicet petalis constantes; ex quorum calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu testam unicapularem, bifariam dehiscentem, semine fœtam ut plurimum oblongo: crescit hæc planta circa loca maritima: crambe est vox græca significans Brassicam, sed cum hac malè confunditur, nam Brassica est aliud genus plantæ, hinc à Tournefortio optimè ab invicem distinctæ, & nomen Brassicae sive crambe hic retentum est ob defectum vocabulorum: dicitur quasi Κοράμβω παρὰ τὸ κόρατι

κόρας ἀμβλύνει quod oculorum pupillas, quas Gr. κόρας vocant, hebetet obtundatque. Sed alii dici volunt à πάρα quia brassica capitata est. Et alii ita vocatam asserunt quia κόρα ἄμωγη vel ἀντίωγη, quod crapulæ adversetur. Vide *Brassica*. Gall. *Chou marin sauvage d'Angleterre*.

CRANIA, est cornus, arbor; à κράνον caput, quod capitatum fructum ferat, vel, quod instar Calvariae duri sunt rami. Vide *Cornus*.

CRANIUM, est compages octo ossium capitis, ad quod pertinent ossa frontis, sincipitis, occipitis, temporum, sphenoidis, & cibriforme: sese habet velut κράνιον Galea, quia cerebrum ab externis injuriis defendit, superior ejus pars ex diplomate, sive duplici tabula constat, ab aliis Calva & Calvaria appellatur. Vide *Calva*, forte à κείρω tondeo. B. *Het Bekke-neel / Hersen-bekken / Hoofspan / Hersen-pan / Hoofst-schootel*. G. Die Hirn-schale. Gall. *Le Crane*. A. The Skull.

CRAPULA, est capitis dolor, ex nimio vini usu contractus, ex κόρα caput & πάλλω vibro. B. *Brassen / zateheit verbuiftheit*. G. Hauptwehe von ubrigen trincken. Gall. *Crapule; Yvresse*. A. Gluttony or a surfeit.

CRASIS, sive TEMPERAMENTUM, est mixtio ex convenienti qualitatuum constitutione. Temperamentum dicitur simplex vel compositum: *Simplex* cum una tantum qualitas excedit, ut calidum, frigidum, humidum, siccum, salum, acre &c. *Compositum*, cum plures qualitates eminent, ut calidum & siccum, calidum & amarum, salum & acre, acidum & frigidum, acidum cum acrimonia &c. Item aliud est *Infitum*, quod partibus inhæret; aliud *Influens* quod à spiritibus, & sanguine in partes influit: estque *Moderata* vel *Immoderata*: *Totalis* vel *Partialis*: *Nativa* vel *Adscititia*: *Permanens* vel *Fugiens*: ad *Pondus* vel ad *Iustitiam* & sic finguntur plurimæ differentiae, quæ vix ullius momenti sunt, à κράγνυμι misceo. B. *Getempertheid / temperament / gematigheid*. G. Die Mässigkeit. Gall. *Constitution, Temperament*. A. Temperament, or Constitution.

CRASSULA, est Telephii species, sic dicta, ob folia solito crassiora: ut & vermicularis, eandem ob similitudinem *Crassula* vocatur *minor*.

CRATÆGONON, herba Cercalis videtur & affinis Melam-

lampyro, cujus usus & efus est semen vividum & genitale reddere, id enim τὴν γόνον καλῶν significat, semen robore acuere & quasi viribus imbuere.

CRESSIO, vide *Cardamom*.

CRATICULA, est instrumentum Chymicum ex bacillis ferreis quadratis digitalis crassitudinis, juxta se in acutum ita positis, ut semidigitale spatium inter illos intersit, factum focis conficiendis, carbonibus sustendendis inferiens. B. *Gen Rooster*. G. Ein Rost. Gall. *Un Gril*. A. A Gridiron.

CREA, est tibiae anterior pars. Dicitur & *Ocrea*. Vide *Tibia*.

CREMASTER, Musculus, carneus oritur à magna parte inferiore, anteriore spinæ ossis Ilium, obliquo descensu adnascens carneis fibris ad marginem anteriorem, descendenter, ossis Ilium, versus os pubis, unde antrorsum, deorsum, oblique se expandit, lateralia, & anteriora, tunicae vaginalis amplectitur, dum à parte anteriore ossium pubis, post vaginalem tunicam fibræ carnea ortæ, recta dimissæ, deorsum, se applicant parti posticæ tunicae vaginalis, & ita simul formant musculum cavum, undique accuratè clausum, quo tunicam vaginalem, testemque, elevat, sustinet, comprimit, exprimit, à καράω suspendo. B. *De opschoztende spieren*. G. Der hoden hangmaufz. Gall. *Muscle cremaster*. A. The cremaster muscles.

CRENÆ, sunt quædam in extremis oris incisuræ, à quibus crenata herbarum folia vocantur, hoc est ferrata, & per ambitum secta.

CREPATURA, à *Crepare*, est quando hordeum aut aliud quid coquitur, donec crepat.

CREPITUS LUPI, vide *Orbicularis*.

CRIBRATIO, est pulveris tusi per cribrum dimissio, seu materiae tenuioris à crassiore beneficio cribri separatio. B. *Zistinger teemfinge*. G. Siebung, das Sichten. Gall. *Criblement*. A. Sifting, or Searcing.

CRIBROSUM OS, vide *Ethmoides*.

CRIBRUM, Gr. ἡθμός. κόσκινον, est instrumentum, ex lana, linteo, cannabe, serico, seta &c. quo olea, liquores &c. percolantur, vel pulveres trajiciuntur: atque est vel rarum vel densum, apertum vel clausum, B. *Ziste/teemg*. G. Ein Sieb. Gall. *Crible*, *Tamis*, *Etamine*. A. A. Sieve, or Searce.

CRIBRUM BENEDICTUM ANTIQUORUM, Veteres in renibus duas cavitates finxerunt secundum longitudinem fitas : unam supremam, in quam sanguis ferosus ex vasis renalibus effundebatur : alteram infimam, transversâ quâdam membranâ distinguere putabatur instar cribrî angustissimis foraminibus pervia : unde *Colatorium* vocârunt, & *Benedictum cribrum*, per quod voluere percolari serum in ureteres, sanguinem verò probum remanere pro nutritione renum.

CRICOARYTÆNOIDES, sunt musculi à cartilagine cricoide sive annuliformi profecti, qui arytænoidi inferuntur. quàm, dum retrorsum atque exterius abducit, rimam quoque laryngis dilatat, ex *κρίκος* annulus, *ἀρυτῆς* vel *ἀρύτης* apud Hesych. haustrum vasis genus apud Lucret. lib. 5. ab *ἀνοίγω* aperio, & *ἰδ* forma. B. *Des rings spleet-spiereu*. G. Der ring mausz. Gall. *Muscles Cricoarytenoidiens*. A. The cricoarytenodes muscles.

CRICOIDES, est capitis laryngis cartilago annuliformis, ex *κρίκος* annulus, & *ἰδ* forma. B. *Het ringwys krakebeen*. G. Das ringgleiche knorpelbein. Gall. *Cartilage cricoide*. A. The Ring like cartilage vel gristle.

CRICOTHYROIDES, est par muscutorum ab annulari cartilagine ortum, & in scutiformem terminatum, nonnihil oblique movendo, rimulam Laryngis dilatat, ex *κρίκος* annulus, *θυρεός* scutum, & *ἰδ* forma. B. *Des rings schild-beens spieren*. G. Der schildbeins mausz. Gall. & A. *Crico thyroidiens*.

CRIMNOIDES seu CRIMNODES, est urina, cui crassa & farinacea sedimenta insunt, à *κρίμνος* farina, & *ἰδ* forma. B. *Meelachtige pis*. G. Dicke und dunckel harn. Gall. *Urine Farineuse*. A. Urine with a thick Sediment like to Meal.

CRINALE, est Instrumentum quoddam Chirurgicum, Ophthalmicum, in Ægylopes cura commodissimum, cuius inventor est Aquapendens.

CRINIS, seu **PILUS**, corpus notissimum est, teres, solidum, filamenti instar, quod facillimè in quamcunque partem flectitur, microscopio perlustratum, transparent est : sæpe nodosum, extremitas ejus instar penicilli sæpe fissâ, radix sive bulbus ob figuram dicta intra cutim reconditur, verosimiliter cava est & vasculosa, ut pennæ avium

in radicibus, quæ vasculosa pars folliculo includitur, in fetis & majoribus pilis conspicuo; oriuntur pili ex ipsis pinguedinis interpositis glandulis, vel folliculis; defendendæ cuti & firmandis poris, inserviunt in cute, ut & in aliis partibus, ut in cavo narium anteriore &c. dividuntur in capillos, in crines & pilos. B. *Hair*. G. Das Haar. Gall. *Cheveux*. A. Hair.

CRINON, lilium, dicitur & κρίνον, à κρίνω secerno, quod folia ejus sint distincta, vel à κρίνω judicio, est enim κρίτηριον & indicium veris, vocatur & λείριον. Vide *Lilium*.

CRINONES, sunt vermiculi cutanei, qui & *Dracunculi* vocantur. G. Miteßer.

CRINONIA, idem quod *Crinon*.

CRISIMA, sunt signa decernentia, & judicantia, à κρίνω judico.

CRISIS, Veteribus erat subita, & repentina mutatio in morbo, ad salutem vel ad mortem contingens. Aliquando significat humorum secretionem. Sed magis frequens, & usitata est illius acceptio pro judicio super morbum habito. *Crisis* alia est *Perfecta*, alia *Imperfecta*: *Perfecta* est, quæ ægrum perfectè, & integrè à morbo liberat: estque vel *Salutaris*, vel *Lethalis*. 1. Ut sit optimis signis Judicata. 2. Manifesta. 3. Ut die critica contingat. 4. Fida. 5. Secura. 6. Conveniens morbo & ægrotanti. *Crisis Imperfecta* est, in qua morbus perfectè non judicatur; sed tantum secundum partem, & alteri crisi futuræ locum post se relinquit; eaque duplex est, *altera ad melius*; *altera* verò ad *deterius*. Ad *melius* ea est, quæ non omninò tollit morbum, sed facit ut eum æger alacrius ferat. Ad *deterius* est, quæ morbum reddit vehementiorem, & periculosiorem. Crisim à Lunæ & siderum motu, & influentiis dependere, eorumque aspectus quadratos, oppositos, aut συζυγίους sequi, verum non est: à materiæ utique majori, vel minori maturatione crises videntur dependere, sed in hisce regionibus non observantur, à κρίνω judico, secerno. B. *Ordeel / raining*. G. Crisis, Urtheil. Gall. *Une Crise*. A. A Crisis or judgment.

CRISPINUS & CRESPINUS, est *Berberis*: haud dubiè Græci à spinarum acuminatis cuspidibus Oxycanthan nominant: hinc Latinis fortè quasi *Cretica Spina*, unde voce contracta sonat *Crespinus*; vel devenit ab Itali-

ca voce *Crespino*, sive à *Spina*. Vide *Berberis*.

CRISTÆ, sunt carnis excrescentiæ circa anum pullulantes ex præpostera Venere ortæ, ad quarum radices ple-rumque scissuræ seu Rhagades adfunt. **B. Hanck-hams-wpzigc uitwassen.** G. Ein Hanen kams gleiches aufz-wachs. Gall. *Crêtes*. A. Excrescences on the Anus like a cocks comb.

CRISTA GALLI, est pars tertia ossis ethmoidis, sive processus interior gallorum cristæ haud absimilis, inter ol-factorios nervos, sive processus cerebri papillares assur-gens, cui insigitur extremitas sinus tertii duræ meningis. **B. Een Hanen-kams been.** G. Das Hanen-kams bein. Gall. *Crête de coq*. A. A kind of a triangular process like to the comb of a cock. Cocks-combehone.

CRISTA GALLI, Gr. ἀλεκτωρολόφος, sic dicitur à flo-rum figura, cum eorum folliculis. Vide *Alectorolophus*.

CRITERIUM, idem quod *Crisis*.

CRITHAMUM, idem quod *Crithmum*.

CRITHÆ, est hordeum; dicitur quasi κριθὸν, secretum vel separatum, quod huic frumento multa opus sint ad se-cernendas glumas. Vel παρὰ τὸ προκριθῆναι τοῦ ἀπροδεδῶν; ἀποδεδῶν γὰρ ἡ τριτοῦ πρὸ τοῦ καρπῶν, quod hordeum glandi-bus præferabatur; vel ἀπὸ τοῦ διακριθῆναι, quod eo reper-to, & in usum recepto, glandibus spretis à brutis homi-nes distincti sint, à κριθῶν secerno. Vide *Hordeum*.

CRITHÆ, vide *Hordeolum*, estque tuberculum par-vum, oblongum, palpebræ cilio, qua pili sunt, adnaf-cens; & sic ab hordei similitudine, dictum. **B. Een front-je of schietje der oog-schieten.** Gall. *l'Orgeolet ou Or-gueil*. Item pudendum virile.

CRITMUM, CRITHMUS, CRITHAMUM, & CRE-TA, est Eæniculum marinum, vocatur & *Crethmum*, est planta, quæ habet caules sesquipedem circiter longos, ra-mosos, crassos, lignosos, interdum repentes, aliquando rectos: folia trifariam divisa, carnosa, angusta, atro-vi-rentia: flos est rosaceus & umbellatus, plurimis scilicet petalis in orbem positis, & calici infidentibus: is autem abit in fructum compositum ex duobus seminibus conjun-ctis involucrum aliquod habentibus, quod per maturita-tem deponunt, striatis, oblongis, albis, planis, odoratis: crescit in regionibus calidis super saxa circa mare: an à

αἰών, quòd semen aliquod contineat, instar grani hordei aut tritici? An à *αἰών* secerno, quia urinam & menses secernit? B. *Zee-venckel*. G. Meer-fenchel, Zee-fenchel. Vacillen-kraut. Gall. *Bacile*, *Fenouil marin*, *Perce Pierre* ou *Passe Pierre*. A. Sampire.

CRITICI DIES, sunt, in quibus subita morbi conversio fit. Eorum tres sunt *differentiæ*: alii *verè & perfectè critici*, dicuntur, alii *Indices*, alii *Intercidentes*. *Perfectè critici*, *Principes* aut *Radicales* appellantur, quoniam, quæ his diebus contingunt crises, omnes perfectæ criseos notas habent: ejusmodi sunt septenarii tres, nimirum septimus, decimus quartus, & vigesimus. *Indices*, qui *contemplabiles*, & *internuncii* nominantur, sunt, qui crisin septenario die futuram indicant: suntque numero tres: quartus, undecimus, decimus septimus. *Intercidentes*, qui & intercalares, seu irrepentes, vel provocatorii nominantur, sunt qui inter principes, & indices intercidunt, crisesque imperfectas moliuntur, suntque tertius, quintus, nonus, decimus tertius, & decimus nonus. Reliqui verò dies, qui neque principes sunt, neque indices, neque intercidentes, *vacui & medicinales* appellantur: suntque sextus, octavus, decimus, duodecimus, decimus sextus & decimus octavus. Dierum criticorum computatio instituenda est ab ea hora, in qua æger percipit manifestam actionum suarum læsionem. Hoc obiter notandum quòd dierum criticorum supputationes, in hisce regionibus calculis Hippocraticis non exactè respondeant. Illi dies omnes dependent, à materiæ morbificæ citiori vel tardiori maturatione, à *αἰών*, judico. B. *Oordel daen*. G. Die tagen aus denen man die veränderung der Kranckheiten Urtheilet. Gall. *Les jours Critiques*, ou *de Crise*. A. Critical days.

CRITICA SIGNA, sunt, quæ ex crisi, vel ad salutem vel ad mortem, desumuntur, suntque alia *Antecedentia* quæ vel tempus criseum prænunciant, vel speciem criseos significant; alia concomitantia, quæ cum ipsa specie criseos simul apparent. Alia denique *Subsequentia* nominantur, quæ ostendunt an sanitas imperfecta sit expectanda, vel an metus sit recidivæ.

CROCOMAGMA est compositio cujus basis est crocus.

CROCUS, est planta, quæ habet folia angusta, graminea,

nea, striata, linea media alba divisa, septem ut plurimum, theca membranacea involuta : flos est liliaceus, monopetalus, inferius tubulatus, in sex partes profundè dissectus, pediculo insidens : Pistillum è fundo floris surgit in terna capillamenta capitata & cristata divisum : calix verò deinde abit in fructum oblongum, trigonum, in tria loculamenta divisum, feminibusque fætum subrotundis : radix gemina, carnosâ tuberosa, quarum altera, quæ minor est alteri majori fibrosæ insidet, utraque verò involucro membranoso obducitur : crocus sæpius adulteratur nunc staminibus carnis bubulæ salitæ, nunc cnici floribus sive carthami, vel Calendulæ; vel illum nimis humidum reddendo. Hujus variæ sunt species, Vernalis enim & Autumnalis, quæ colore aliisque circumstantiis variant. Ex India, Gallia, Anglia aliisque locis nobis adfertur. *Crocus*, ex sententia Scholiastis Callimachi dicitur *παρὰ τὸ ἐν κρυεῖ θάλλειν*, ex eo quòd in frigore floreat, vel dicitur quasi *κροκίς* vel *κρόκη*, id est *Trama*, *Filum*, *Villum* seu *Subtegmen* : id quòd stamini inseritur, intertextiturve; cujusmodi sunt croci stamina, seu villi, qui *κροκιδες* appellantur; qui cum soli in usum veniant, per excellentiam croci nomine donantur. Alii dicunt vocari à Croco juvene, qui propter amorem Smilacis virginis, in florem sui nominis versus est. *Ovidius* hoc modo canit.

Et Crocum in parvos versum cum Smilace Flores.

B. *Saffraan*. G. *Saffran*. Gall. *Saffran*. A. *Saffron*.

CROCUS, Chymicis est calx pulvereâ ad croceum vergens colorem, vel est quilibet pulvis colorem croci æmulans, paratur ex marte, venere, antimonio &c. ut crocus martis, veneris, metallorum &c.

CROMNYON, est *Cερα*, dictum est quòd oculi pupillam comprimi cogat, ὅτι κόρας μύομενον, vel ὅτι αὐτὴ ὁσφραίνεται ὁρμῆται ἢ ὁσφριοντες τὰς κόρας μύομεν, oculos enim claudere & emittere lachrymas consueverunt, qui ipsum naribus oculisve admovent. Alii, sed minus rectè Etymologiam à κόρα caput derivant, quia ejus bulbus capitulum referat.

CROTAPHITES, dicuntur muscoli, venæ, & arteriæ temporales, κρόταφον enim tempus, fortè à κρατία verbero, pulso, quia arteriæ in eodem loco continuò pulsant : quandoque etiam *Crotaphium* pro dolore capitis sumitur. Vide *Temporalis Musculus*.

CRO-

CROTAPHIUM, vide in *Crotaphites*.

CRUCIALIS INCISIO, vide *Incisio Crucialis*.

CRUCIATA, est *Gentianæ* species, quæ habet caulem pedem circiter altum, tenuem, mollem, debilem, quadratum, villosum, nodosum : folia in caule in crucis formam disposita, quaterna, hirsuta, parva, oblonga : flores parvi sunt, verticillati, coloris flavi : baccae post florem geminae, ferè sphaericæ, cutim siccam & villosam habentes : radix tenuis : juxta fossas, aquarum rivulos, & quandoque agrorum margines crescit : nomen accepit, quòd radix secundum longitudinem tripartito, aut quadripartito fissa sit, cum foliis cauli cruciatim incumbentibus. Hinc Gr. Σταυρότυπον appellatur : vocatur etiam asperula aurea. Gall. *Croisette*.

CRUCIBULUM, seu **TIGILLUM**, est vas fusorium ex terra in igne contumacissima, factum, acutius bafi & ferè in ampliorem capacitatem formâ triangulari, vel rotunda desinentem, ad fundenda & eliquanda mineralia, & metalla formatum. Fit etiam crucibuli species, quæ vulgò testa appellatur, fundendis metallis adæquata. B. *En smelt-kroes*. G. *Ein muffel, schmetztiegel*. Gall. *un Creuset*. A. A Crucible.

CRUDITAS MORBORUM, dicitur cum materia morbi per vim Vitæ nondum satis attenuata, ut circulo sanguinis restitui, atque sic ex corpore per secretoria expelli queat, sed adhuc prædita eâ mole, figurâ, cohaesione, mobilitate, inertia, ut augeat vel faciat morbum. B. *Enrpyheid der zielste*.

CRUDITAS VENTRICULI, est, cum cibi ex defectu alimenti, aut alterius causa, non legitimè fermentantur, & in Chylum transmutantur : estque triplex *Apepsia*, *Bradypepsia*, & *Dyspepsia*, de quibus suo loco specialiter.

CRUOR, Gr. αἷμα, ἵμαρ. Vide *Sanguis*. *Helmontius* Sanguinem à Cruore distinguit : Sanguinem contineri, dicit in arteriis; Cruorem verò in venis. Cruor à currendo, vel à corde dicitur, currit enim per venas ad cor. B. *Adcrlyk bloed*. G. *Das Bluth*. Gall. *Sang*. A. *The Blood*.

CRURÆUS MUSCULUS, subiacet musculis vastis, femoris ossis involucro ubique, extrema præter, affixus, hujus quatuor tendinæ expansiones in unum quasi collectæ validum fingunt tendinem communem, ipsius officium

cium est tibia cum cæteris musculis extendere. B. *Schenkel-spiet*. G. Der Schenkel-mausz. Gall. *Muscle Crural*. A. The Crural or leg muscle.

CRUS, five MAGNUS PES, Gr. Σκέλος, & Κνήμη, dicitur totum id membrum corporis humani, quod à natibus ad digitorum pedis extremitates extenditur, constans ex femore, tibia, & pede cum digitis propriè dicto. B. *De Schenkel*. G. Der Schenkel. Gall. *la Jambe*. A. The Leg.

CRUSTA LACTEA, est species Achoris, hac tamen cum distinctione, quod Achor tantum caput, verum Crusta lactea obtingit infantibus in lactationis principio, atque non solum faciem occupat, ast universam ferè corporis cutim inquinat. Crusta lactea albicat, Achores verò alium colorem obtinent.

CRUSTA VERMICULARIS, idem quod *Velamentum Bombycinum*.

CRUSTA ULCERIS, vide *Esfchara*.

CRUSTULA, idem quod *Ecchymoma* in oculo, hoc est sanguis, qui ad conjunctivam tunicam à suis deiscendit arteriis cum ipsæ crepuerint, à percussione, vulnere, ulcere &c.

CRYMDES, est febris continua ardens cum inflammatione circa Pulmonem, & proinde ob circulationem sanguinis inæqualem, frigus magnum partes externas occupat, ex κρύμδς frigus, alior, & εἶδος forma.

CYSORCHIS, est testiculorum virilium in abdomine occultatio. Ex κρύπτω abscondo, & ὄρχις testiculus.

CRYSTALLI, sunt pustulæ per universum corpus dispersæ lupini magnitudine, albæ ac instar crytalli diaphanæ.

CRYSTALLINA TUNICA, vide *Arachnoides Tunica* & *Aranea*.

CRYSTALLINUS HUMOR OCULI, etiam *glacialis* dictus, ipse intra tunicæ uveæ aperturam, quasi vitrum foramini impositum, antè habet humorem aqueum, posterius humorem vitreum, cui necitur ope membranulæ pellucidæ, à Choroide reflectæ, radios undique adventantes colligit, ac refringit : hujus substantiâ instar glutinis, aut gummi arboris, admodum pellucida est, ac consistentia instar ceræ colliquescentis prædita, licet comprimi possit, haud tamen spontè diffluit, duriorque est humore vitreo,

vitreo, figura ejus in homine, ad speciem lentis accedit, cujus nempe superficies extima planior, ac intima gibbior. CrySTALLINUS humor dicitur, quia olim humor credebatur esse, sed hodiè per Anatomicorum injectiones constat, quòd componatur ex multis segmentis sphaericis, sibi immediatè impositis, pellucidissimis, merè vasculosis, humorem pellucidissimum vehentibus, tamen *Membranulâ* propriâ *Araneâ* dicta includitur; corpus hoc convexiori suâ parte vitreo insidet humori ibi loci, ubi fovea satis notabilis vitreo est insculpta, cujus figuræ exactissimè respondet atque hâc ratione præcipuam dictæ cavitatis partem implet, non verò totam, liberè hæret in parte anteriore, & vitreo necitur parte posteriore & lateribus. ἀνεύθριγος, & συσπλω concreasco. B. *Het kryställine vogt.* G. Die Cryställine feuchtigkeit. Gall. *Humeur Cryställine.* A. Cryställine humor of the eye.

CRYSTALLISATIO, est alicujus salis depurati in crystallos redactio. Proprium est salium, quibus & Tartarum & Saccharum addere licet. Videlicet hæc in liquore aqueo soluta, si in frigidum locum reposita fuerint, con crescunt in crystallos. Ubi nota, si nimium liquoris adsit, antequam reponantur, aliquantulum exhalandum esse. Porro, postquam primâ vice Crytalli exemptæ fuerint, quia reliquis in liquore sc. restantibus crytallis liquor disproportionatus est, exhalet nonnihil, hinc reponatur iterum. Sacchari crytallificatio fit mediante calore, in nimiam enim spissitudinem sacchari syrupus coquitur, deinde ollis, figuram metæ habentibus infunditur, deinde in Caldariis reponuntur, & quod superfluum per metæ cuspidem inversam (perforata enim est) destillat, & quod crytallificandum metæ lateribus adhæret. B. *Krytallificatie.* G. Crytallizierung. Gall. & A. Crytallification.

CRYSTALLOIDES TUNICA, idem quod *Aranca tunica.*

CRYSTALLUS, lapis transparens est, aquam in glaciem conversam omnino referens. Gemmam si vocare licet, modo omnium mollissimam dixeris, vel à similitudine coloris, quâ gemmas colorata Crytallus refert, pseudo-gemmam verbi gratiâ, pseudo-berillum, pseudo-topazium, pseudo-saphirum, pseudo-smaragdum, quæ veris gemmis molliores sunt. Sic & Iris vocata genma à colore, quem fronti
ap.

applicata exhibet. Cryſtalli ſpecies eſt. Invenitur variis in locis, etiam in Germania, Bohemia, Ungaria, Cypro & Luſitania, & nonnunquam in agris. Porro, quanquam coloratæ minimè negligendæ ſint, ac præcipuè pſeudo adamas, quæ aliis nobilior, attamen in præparationibus Chymicis recipitur Cryſtallus propriè ſic dicta, quæ eligenda eſt puriſſima, pellucidiffima, ac eximiè intenſa. Dicitur *Cryſtallus* à κρύβω, gelu, & σίλλω contraho. B. *Kryſtal*. G. *Cryſtall*. Gall. *Cryſtal*. A. *Cryſtal*.

CUBEBE, fructus ſunt aromatici, piperis magnitudine ſerè, unicum petiolum ſinguli habent. Sapor piperis inſtar eſt. Creſcit eodem ſerè modo ac piper, hederæ modo per arbores repit. Fructus racematim cohæret. Flos eſt odoratus. Adfertur ex India orientali. B. *Steert-peper*. G. *Cubeben*, Schwantz-pfeffer. Gall. *Cubebe*. A. *Cubebes*.

CUBIFORME, vide *Cuboides*.

CUBITÆA arteria; vox nullius auctoritatis aut analogiæ. Cur non ſimpliciter *cubiti*? Aut, ut eleganter *Riolanus ulnam recta percurrens*. Idem indicandum de **RADIÆA**, pro quo dicas *arteria radii*, aut, cum *Riolano*, ramus radio attenſus. Puto talia conſicta eſſe ad exemplum quorundam Græcorum, ut *ῥαδιαία*, *σφαιναία*. Sed in adverbis Græcis alia eſt ratio, alia & diverſa in Latinis.

CUBITÆUS, muſculus *internus* eſt vel *externus*. *Primus* oritur à condylo offis humeri interno, confundens principium cum palmari ſublimi, per interiorem & anteriorem cubitus partem extenditur, inferitur forti tendine officulo carpi, quod primi ordinis eſt extimum, ſupra digitum minimum. Alter *externus*, ab externa brachii apophyſi emergens, juxta cubi externi longitudinem ſtratus, auricularem infra digitum propè metacarpios quartum tendine deſinit ſpectabili. Vocantur quoque *Ulnares*. B. *Elleboogſ ſpier*. G. *Der ellebogen mauſz*. Gall. *Muſcles cubital interne & externe*. A. *The benders of the wreaſt*.

CUBITUS, *Plauto* gibber brachii. ὠλέκρανον *Athenienſibus*, ἀγκών *Ruſo*. κύβιτον, κύβωλον. Eſt media pars inter humeri os & carpum; componitur ex duplici offe, ulna ſc. & radio: quorum extrema quidem commiſſa ſunt; inter media autem ab invicem ſecedunt, quamvis membranoſo ligamento copulata, à κύπτω pronus ſum, inclino caput, nempè, in cubitum. B. *Elleboog / vooz-arm*. G.

Ein

Ein Ellebogen. Gall. *l'avant bras, ie Coude*. A. The Elbow.

CUBITUS, est mensura quanta patet à cubiti flexura usque ad summum medium digitum, quæ sex palmis digitivè viginti quatuor constat. Gall. *une Coudée*.

CUBOIDES seu CUBIFORME, est quartum os tarfi in utroque pede, quod & *os tesserae, grandinosum*, & *πολύμορφον* vocatur, ex κύβου cubus, & εἶδος forma. B. *Pet tærling-been*. G. Das Wuerffel-bein. Gall. *l'Os Cuboide*. A. The Die like bone.

CUCULUS uetus Rondeletio laudatus, pen. prod.

Cessisset magna compellans voce cuculum. Hor. 1. Sat. 7.

Ita *Plautus* & in *Pseudolo*, & *Afinaria* penult. prod. & opportune quidem hoc accentu pronunciationem volueris importunæ imitatur. Eadem sententia est *Becmanni*, *Torrentini*, *Paræi*, aliorumque eruditissimorum hominum, ut necesse sit & *Buchananum* penult. corripientem sibi excidisse, & adulterinum illum *Martiali* attributum peccare versiculum :

Quamvis per plures cuculus cantaverit annos,
& spurium illum *Ovidio* in *Philom.* attributum :

Et cuculi cuculant, fritinnit rauca cicada.

CUCULLARIS MUSCULUS, seu TRAPEZIUS, est primus scapulæ musculus à figura *Cucullaris* dictus. Incipit ab occipite & colli vertebrarum spinis, & subinde pluribus dorsi superioribus; inseritur tendine lato partim spinæ scapulæ, partim acromio & claviculæ. B. *De Anon-nih-kaps spier*. G. Der Gucken gleiche mause. Gall. *Muscle Trapeze*. A. A muscle in forme of a Monks cowl, or hood.

CUCUMA, idem quod *Abenum*.

CUCUMER, CUCUMIS, Est planta, quæ habet caules plurimos, villosos, repentes; quibus alternatim adnascuntur folia, ampla, lata, angulosa, incisa & dentata, aspera, repentia, flores sunt monopetali, campaniformes, patentes, quinquifidi, flavi, ex quibus alii steriles sunt, nulli embryoni adhærentes, alii sæcundi embryoni infidentes, qui deinde abit in fructum variæ & singularis figuræ, (est enim oblongus, rotundus aut tortuosus,) carnosum, edulem, mollem, viridem aut flavescentem, verrucis aliquando præditum, corticem tenerum habentem, teretem in terna vel quatuor loculamenta divisum, semi-

na oblonga, plana, alba, continentia, in medio paululum tumida seu convexa, candicantia, ad extremitatem acuta, seminibus melonum angustiora, corticem durum habentia, in quo latet amygdala dulcis, unctuosâ, saporis grati: radix fibrosa, alba, recta: hæc planta in hortis colitur. Varroni dicitur à curvore, quasi curvimer; plerumque enim incurvantur. Gr. Σίκυς & Σίκυς à σίκω & κίεν concutere, ire, quia hæc planta longè latèque ramos suos spargit, vel à κύειν, quod scilicet appetentiam concumbendi minimè stimulet. Sunt qui *Anguriam* appellant. B. *Hommerg.* G. Gurcke, Cucummer. Gall. *Concombre*. A. A Cucumber.

CUCUPHA, est integumentum capitis, fit ex cephalicis magis odoratis, quæ in pulverem redacta, cotone mofchato excipiuntur, & inter pannum sericum interpunctantur, quod adversus catarrhos (ut dicuntur) aliosque capitis morbos super caput geritur, vel pileo intus affluitur. B. *Gen kruid-mutgjen.* G. Ein Kräutermutzlein. Gall. *Bonnêt odoriferant, ou Cephalique.* A. An odoriferous cap for the head.

CUCURBITA, est vas Chymicum turbinatum ex terra vel vitro confectum, destillationibus per alembicum instituendis, aptum. Quandoque etiam pro cucurbitula sumitur. B. *Gen kolf/ zppglas.* G. Ein kolb, cucurbit, kurbs. Gall. *Cucurbite.* A. A cucurbite, or Gourd-like vessel.

CUCURBITA, est planta, quæ habet plures caules sarmentosos instar digiti crassos, longos, repentes, aut scandentes cum capreolis: folia sunt ampla, magna, rotunda, mollia, lanuginosa, in margine aliquantulum crenata; flores albi, campaniformes, ut plurimum quinquifidi, villosi; ex quibus quidam steriles sunt, nulli embryoni insidentes; alii verò fecundi, seu insidentes embryoni; qui abit in fructum, in quibusdam speciebus teretem & longum, in aliis lageniformem, vel inflexum, in sex loculamenta plerumque divisum, facta seminibus pallidis, planis, oblongis, hinc obtusis, inde latioribus, & quasi introrsum emarginatis, seu auriculatis duabus apophysis, quasi angulosis eminentibus, & duabus lineis per longitudinem excurrentibus notatis; hic fructus habet corticem durum, lignosum, flavescentem; ejus caro est fungosa, me-

medullosa, alba & insipida : radix tenera & fibrosa ; hæc planta in hortis colitur : Latini vocârunt à concurvatu, quod facile, si quid obstiterit, quod minùs extendatur, concurveſcat. Græci ex adverſo vocabulum impoſuere, *Κολοκύθη*, nominantes, quod ſc. pumili brevêſque ſint partus, quos paſſim enititur, cùm tamen corporis mole, omnes herbarum arborumve fructus videantur ſuperare. *B. Hauwoerden.* G. Ein Kurbs, Kurbis. Gall. *Callebaſſe*, *Courge*. A. Gourd.

CUCURBITINI LUMBRICI, ſunt vermes lati ſemini cucurbitæ ſimiles, omnium longiſſimi, quamplurimas ulnas interdum æquantes, in humanis inteſtinis reperiûndi; vocantur quoque *Teniae. Lumbrici lati.* *B. Hauwoerde.* *zaat-gelyke wormen.* G. Kurbs ſamen gleiche wurmen. Gall. *Vers Cucurbitins.* A. Worms like the ſeed of a gourd.

CUCURBITULA ſeu CUCURBITA, eſt vas ventricoſum, ex vitro vel ſtanno conflatum, quod corpori cum ſcarificatione; vel ſine applicatur, ad ſanguinem extrahendum : ſi ſine ſcarificatione inſtituitur, *Cucurbita ceca & Ventôſa* appellatur : Gr. *σικὸν κενόν* vocant. *B. Een blind de kop.* G. Blind-kœpff. Gall. *Ventouſe* vel *Ventouſe ſeche.* A. A blind Cupping-glaſſ. Cucurbitulæ apponuntur in partibus maximè carnoſis, ubi vaſa magna & nervi lædi non poſſunt. *Traction* illa quæ ſit in cucurbitulis applicatis hoc modo peragitur : poſt cutis ſcarificationem, aër in cucurbitula cõtentus vi flammæ vel ſtupæ incenſæ rareſcit & dilatatur, poſtea verò frigefacto & condensato aëre interno minùs ſpatium occupatur, tum aër externus premens carnem, ſanguinem in cavitatem cucurbitulæ propellit. Gr. *σικὸν κατὰ χάσμα* appellant. Cucurbitularum duo genera ſunt, *inquit* Celfus, *æneum & corneum.* *Ænea*, alterâ parte patet, altera clauſa eſt. *Cornea*, alterâ parte æquè patet, altera foramen habet exiguum. In *æneum* linamentum ardens conjicitur, ac ſic os ejus corpori adaptatur, inprimiturque, donec inhæreat. *Cornea*, per ſe corpori imponitur; deinde ubi eâ parte, quâ exiguum foramen eſt, ore ſpiritus adductus eſt, ſuperque cera cavum id clauſum eſt, æquè inhæreſcit. At ſi cætera defecerunt, caliculus quoque aut pultarius, oris compreffioris, ei rei commodè aptatur. Ubi inhæſit, ſi concifa ante ſcalpello

cutis est, sanguinem extrahit : si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quæ intus est, lædit, illo modo, ubi inflatio, hoc imponi solet. *Corneis* hodiè utuntur *Ægyptii*, ut patet ex *Prosp. Alpino*. B. *Koppen / laet.koppen / kop-glazen / potten*. G. *Kœpfen*, *schrepffen*, ein *screpff*, *bad-kopff*. Gall. *Ventouse*. A. A *Cupping-glass*.

CULEUS, est Veterum magna mensura, quæ capit urnas quadraginta.

CULMUS, frumenti calamus est, qui spicam sustinet.

CULUS, vide *Anus*.

CUMINUM, seu CYMINUM, Planta est officinalis ; species est carui, habet caulem in multos ramos divisum : folia sunt ut Fæniculi minutim incisa, sed minora : flores in umbellam crescunt in summitate ramorum, coloris albi : semina his succedunt bina sibi invicem juncta, oblonga, striata, minima, acuta ab utraque parte, coloris cinerei, viridescentis aut flavescentis, odoris penetrantis & ingrati, saporis plerumque acris sub-amarescentis ; radix tenuis, oblonga, quæ perit semine maturo. Cæterum satis convenit cum fæniculo, dicitur *παρὰ τὸ κύειν* prægnans esse. *Sato*, inquit Plinius, *pavitum terra* : prægnantibus enim salutare, vel *ἀπὸ τοῦ κύμνου*, quod fundum ollæ fictilis denotat, *b* in *i* vel *v* mutato. Fundus ollæ fictilis sordidus ab igne esse solet. Homines enim parcos, sordidosque *κυμνο-πεῖσας* vocârunt. Alii derivant à *καίω* calefacio, quia calefacit, sed minus rectè, ut mihi videtur. B. *Komyn*. G. *Kuemmich*, *Kuemmell*. Gall. *Cumin*. A. *Cummin*.

CUNEIFORME OS, dicitur à cuneo, cujus formam referri volunt : Antiquis *πολύμορφον* *Multiforme*, ob varios, quibus asperatur intus & extra, processus, in media cerebri basi situm habet, eique basis instar substernitur, ita ut omnia ferè capitis, maxillæque superioris ossa tangat. Hinc quoque *Basilare os* dicitur & *Sphenoides os*. Vide *Basis*. B. *Det wigge-been*. G. *Dasz Keilgleiche-bein*. Gall. *l'Os Sphenoïde*, *Basilaire*, ou *Cuneiforme*. A. *The Wedge like bone*.

CUNEIFORMIA OSSA, sunt quæ quintum, sextum & septimum os tarsi constituunt. *Sphenoides*, *Innominata* & *Calcoidea Fallopio* dicta. B. *De wigge-beentjes*. G. *Das keil beinlein*. Gall. *les os Cuneiformes*. A. *The Little wedge like bones in the foot*.

Cu-

CUNICULI pinguedo, penult. corr.

Gaudet in effosis habitare cuniculus antris. Mart. 13.60.

CUNNUS, est pudendum muliebre, ex Clitoride, Nymphis, Labiis &c. constans à κύνω pario, concipio. Vocatur etiam Natura Plin. Muliebria Eid. Cunus Horatio Virg. Hortus Ovid. Genitale arvom Virg. utrumque honesta metaphora. sic κῆτος Luertio, νέμος Hefych. Interfemineum Apul. vulva, porcus Varroni ad imitationem Gr. φύσις Artemidoro, κυῖς κλείς Rufo. σάκανδρος, ἀπόρρητος μυχός Suida. δόρυλλος Etymol. βλήχον, τρήμα, ὑσσακός, μέγας, μέλαθρον Hefych. κλητάρεις, φερμίσιον Aristoph. διασφάζ Eustathio, γίγροι ἐπίσειον ἵκταρ Hippocr. κενταύρος teste Eustathio, apud Theopompum, ὄρθαγόρας, & βυσσος Aristoph. γλωττοκομείον Eubulo comico, σινδικόν teste Stephano παιδοπαρεῖς, γίνεσις Epigr. δῖατα, σάρεος. B. De Vrouwolphheid. G. Die Weibliche scham, das geburtglied. Gall. La Vulve, la partie Hontense d'une Femme. A. The Privie parts of a womam.

CUPELLA, COPELLA & CAPELLA five CATINUS, est catillus ex cineribus ossium eiixiviatis depuratisque, aut aliis rebus compositus, in quò, dum summo igni resistere potest, aurum & argentum à bracteis suis depuratur. Vide Catillus Cinereus. B. Een Kapel / een hom. G. Ein Kapell. Gall. Coupelle. A. A Test Cupell.

CUPRESSUS, idem quod Cypressus.

CUPRUM, vide æs.

CURATIO, seu MEDELA, est recta ratio & ordo inveniendi per intentiones & indicationes, certa cuique morbo remedia, quibus sanitas amissa restituatur. Gr. θεραπεία. B. Genezinge. G. Genesung; Artzney, Cur, Heilung. Gall. Curation, Guérison. A. An healing or Curing.

CURCULIO, idem quod Cion.

CURCUMA, pro cypero Indica, vox recentior Officinarum, nomen ei ab inæqualitate radicis, lupatis equorum simili, quæ olim, hodieque nodis ferreis olivarum instar sibi cohærentibus distinguuntur, κέρκωμα nuncupatis, ut probè in Theophrasto suo observavit, Bodeus a Stapel, & antè eum Pollux. l. 1. c. 2. Unde Hefychio: ἐν κυρμῷ, ἐν κερκῶμα, & Achin. c. 271. 'Εἰ δ' ἀνεν δεισμῶν σιδημῶν, ἢ κερκῶμων. &c. Penult. ergo producit, quia est a Græco κέρκωμαν. Borrich.

CURCUMA, five CROCUS INDICUS, est radix exotica,

tica, non tantum croceo colore apparens, sed & eodem alia tingens. Duplex communiter est, aliquando longa, aliquando radice rotunda: hæc multo acrior priori existit, atque cum zingibere sæpe affertur: folia habet & flosculos cannæ Indicæ junioris simillimos, qui plura desiderat, consulat Hortum Lugduno-Batavum, ab *Hermanno* editum, derivatur ab arabica voce *Curcum*: estque crocus Indicus. Sed alii nomen inditum putant ab inæqualitate, quam habet, lupatis equorum simili; lupata multis nodis ferreis sibi cohærentibus olivarum instar quondam fiebant, hodieque etiam fiunt. B. *Geelzugt-wortel* / *Curcunia* / *Indiaanse Saffraan*. G. Gelbwurtz, Geelsucht-wurtz. Gall. *Curcuma*. A. Turneric.

CUSCUTA, & *CASSUTHA*, est planta officinalis, an à *Cassius*, quia plantis noceat? An à *Cassia*, rete venatorium, quod plantas reti quasi involvat? An à custodire, quod plantas circumvolvendo custodiat? B. *Schoorste / wange / bilt-kruud*. G. Filtz-kraut, Flachtz-seyden, Todtern, Seyden-kraut. Gall. *Goute du Lin*, *Cuscute*. A. Dodder.

CUSPIS & *HAMUS*, est fasciæ species: sunt binæ fasciolæ, quæ & convenientem longitudinem habent, & duorum digitorum latitudinem non excedunt, mediæ humerorum capita complexæ dependent, & tam à dorso, quam ab umbilico fibulâ excipiuntur, post hæc inter se junguntur: quo facto obvolvitur geranis in speciem fisciellæ. B. *Spits-band & Angel-band*.

CUSTOS OCULI, est instrumentum, quo in operationibus quibusdam circa oculum præcavetur, ne oculus lædatur. B. *Een oogbewaarder*. G. Augwächter. Gall. *Gardien des yeux*. A. The Preserver of the eyes.

CUTICULA, est operimentum cutis, sine sensu, membranæ modo, supra universam cutim foris extensa, innumeris porulis pervia, ad externarum injuriarum declinationem, vasorum cutaneorum occlusionem, & dum nudos nervos tegit, ad perfectiorem qualitatum tactilium perceptionem, squammulis minimis accommodata, in sulcos areasque exsculpta. Nutritur, nam amissa denuo restituitur, licet ejus vasa minus sint conspicua. Non condensatur frigore, quoniam in foetibus abortivis, eam sæpe ostendi. Nec vaporibus oleosis condensatur, propterea quod

vapores condensati, facillimo negotio eluuntur. Gr. *ἐπιδερμὶς*. vid. *Epidermis*. B. *Het velletjen / opperhuidjen* G. Ein Häutlein, dasz æusserste häutlein. Gall. *La sur peau, l'Epiderme*. A. The cuticle or liteskin.

CUTIS, in vivo homine. Nam *Pellis* est à carne jam diducta, quæ & *Exuvia* : Illa *χρῶς*, hæc verò *δέρμα*, *παρὰ τὸ δέειν*, & *δορὰ*, & *εἰρῶ* *Lycophr.* *παρὰ τὸ εἰρῶν τὸ σῶμα ἐμφεινόμενον*, & *ρίν* *Homero*, *ἀνθεκτική* *Herodoto*, *δερδιστή*. Estque velamentum totius corporis externum, si-
ve membrana satis crassa, ex filamentis vasorum sangui-
neorum, Lymphaticorum, nervorum, variè inter se com-
plicatis contexta, quibus glandulæ numerosæ, & lymphæ
ductus, si-ve sudoris & vaporum vasa excretoria densissi-
mè interponuntur; plurimis poris hinc inde pervia est, va-
riis in locis sensibilibus ad necessariorum introitum & exi-
tum perforata, ut circa os, nares, oculos, aures, puden-
dum, anum, &c. in capite est crassissima; in cervice, dor-
so, &c. mediocriter dura est; rarior in facie, pene & scro-
to; tenuis in lateribus, tenuissima in labiis, in quibusdam
locis ut in cubito, fronte, plantis pedum &c. firmiter co-
hæret. B. *De huid*. G. Die Haut, oder Fell. Gall. *la Peau*.
A. The Skin.

CYAMUS, est faba : Eustachius dictum vult *παρὰ τὸ νέαν αἷμα*, prægnans esse sanguine, vel solummodo à νέαν quòd granis intus prægnans esset, vel quòd facie prætu-
mida viseretur. Lat. *Faba*.

CYANUS, Est planta, quæ habet caules multifidos,
angulosos, lanuginosos, excavatos, ramosos, albescentes :
folia sunt oblonga, angusta, profundè incisa ut dentis Leo-
nis; villosa, coloris viridis pallescentis : flores in summi-
tate ramorum crescunt, magni flosculi, plurimis scilicet
flosculis sed dissimilibus constantes : alii enim, qui medi-
tullium occupant, cæteris minores sunt, in lacinias æqua-
les divisi; cæteri verò ad circumferentiam positi, longè
maiores sunt, magisque conspicui, & veluti bilabiati, utri-
que embryoni insident, & calice squammoso non aculea-
to comprehenduntur : Embryo autem dein abit in semen
oblongum pappis instructum : radix minima, lignosa, fi-
brosa : crescit inter segetes : nobnullis *Baptifecula*, quod
secantibus & metentibus officiat, retusa, in ejus occurfu,
falce. Nam & seculam Veteres falcem dixerunt. Rectius

tamen *Blaptifecula* vocaretur, quod κλέπται Græcis, nocere significat. Nostri *Florem frumentorum* nominant, quod sc. in frumentario nascatur agro. *Cyanus* hæc, planta dicitur ob florem, quem profert, cæruleum, aut quod honorem, nomenque dederit cæruleo colori, an à χαῖς aer, cælum? B. τῆς οὐρῆς-βλῆμ. G. Korn-blume. Gall. *Aubisoin*, *Blaveole*, *Bleuet* *Peroole*. A. Blew bottles, corn flower.

CYATHUS, Barbaris *Bickarium*, forsan à Germanico, G. ein Becher. Arab. corruptè *Alcuatus* & *Alcuatum*, item Cuathum, mutatâ in tenuem asperâ, nomen duxit, παρά τό χάει, à fundendo nempè, vel ut aliis placet, hauriendo vino in Græcorum conviviis, ubi simpulo sacrificiis relicto successit: undè à Gr. κυάθιζω, *Planto* Cyathiffare, idem quod *Propertio* ad cyathos, & *Juvenali* Sat. XIIII. *Suetonio* ad Cyathum stare, hoc est, pocula miscere, seu ritu Veterum conviviis solenni, cyatho poscentibus convivis potum admetiri. De quo rei literariæ Dictator *Scaliger*, *Suida* pressius cum *Phavorino* ἀντλητήριον, μέτρον ὀρχῆς, *Hesych.* μικρόν, ἢ ἀντλητήριον. Mensura est tam aridorum quam liquidorum, non, ut quibusdam visum, poculum vulgare, verum sextarii pars octava; sed ad drachmarum pondus decima, secundum Atticos, duodecima Simlero & Menæ, quomodo *Plinius* accipit. Oribas. Drach. XII. observatione communi, cui *Fernelius* subscribit, quibus addit *Ægineta* DIV. quod *Angelocrat.* ζιβ. βι. & θj. expressit. *Nicandri* interpret *περί μέτρου*: ὀκύαθον, inquit ἔχει μίαν μικράς, ἥτοι μέτρα μικρά δύο τὸ γὰρ μέτρον ἔχει σαθρόν, σαγίαν τριῶν, ἥτοι ἑγλίαν ἡμισὺν εἰς ἄλλοις δὲ φασὶν ὅτε ὀκύαθον ἔχει σαθρόν ἑγλίας μίαν ἡμισίαν. *Hesychius* ἑγλίαν β. ad stipulante *Phavorino* & *Fuchzio*, qui ad cap. 6. sect. I. Antidotarii *Myresp.* notat *Nicolao* esse ζij. etli Veteribus Græcis pro diversâ liquorum ratione variet, sunt qui putant continere vini unciam unam, dragmas quinque & scrupulum unum, vel sesquiunciam olei.

CYCLAMEN, seu ARTHANITA, dicitur ἀπὸ τοῦ κύκλου ab orbe, tum ob folii circinatum ambitum, tum ob orbicularem bulbum, vocatur etiam ἰχθυοειδὲς, quod pisces eo necantur. Romani *Raptum terræ*, quoniam ejus radix in terra velut Raptum extuberat. Quâ sanè ratione *Terræ tuber*, quod in molem quandam intumeat: aut *Umbilicum terræ*, quoniam ut Umbilicus circinata forma emergit,

git, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. *Panem porcinum* haud dubie primum vocarunt bubulci, qui pecori suo radicem hujus gratam pabulis cognoverunt. Cæteri antiquum cyclamini nomen ignorantes, quod sæpius radicem in orbem circum actam, intuerentur, quæ non in globum intumescens, sed veluti pressa sese in latitudinem explicaret, quâ formâ quotidiano usu panes visuntur *Terræ panem* coeperunt appellare. B. *Werkens-brood / Hard-appel*. G. Erd-appfel, Sau-brodt. Gall. *Pain de Poirceau*. A. Sow-bread.

CYCLISCI, sunt scalpra semilunaria, operationibus Chirurgicis accommodata, à κύκλῳ circulus.

CYCLOPHORIA SANGUINIS, idem quod *Periodus sanguinis*. Ex κύκλῳ circulus, & φέρω, fero.

CYDONIA MALUS, vide *Cydonia*.

CYEMA, idem quod *Embrion*, à κύω pario.

CYLINDRUS, est emplastrum oblongâ formâ, voluminum Medicis *Magdaleo*, μαγδαλίσσα. B. *Ein zalt-rolle / rolle*. G. Ein pflasterrolle. A. A plaister made into the form of a Roll.

CYLLOSIS, vide in *Cyllum*.

CYLLUM, est crus exterius luxatum. Item claudus & curvus, à κυλλός claudum reddo, unde *Cylloſis* claudicatio.

CYMA, CYMÆ, sunt teneri cauliculi, *juli* dicti, vel potius, cymæ sunt herbarum delicatiores tenerioresque colliculi, quos à prima germinatione, in summa stirpe proferunt. Nam cum vernum tempus appetit, primum quoque foliorum pullulatu, præclufis adhuc florum calicibus, quosdam quasi turiones, olus subministrat, in quibus floris primum, mox seminis fætus concluditur. B. *Spruite / Scheute*. G. Die Kelmen, Schœſlein der Kräuter. Gall. *Sommité, la Cyme, les Tendrons des chous*. A. Little Shoots. or Sprouts.

CYMBALARIA, putant à cymbalio nomen corruptè traxisse hanc herbam.

CYMCIFORME OS, vide *Naviculare os*.

CYMINUM, vide *Cuminum*.

CYNANCHE, & κυνάγχη *Aurel.* quod canes ac lupos frequenter afficiat: est internorum musculorum laryngis inflammatio, cum respiratione difficillima & febris continua. Ex κύων canis & ἄγχω ango. Vide *Angina*.

CYNANTHEMIS, est cotula foetida, seu flos caninus, ex κύων canis, & ἄνθεμις ab ἄνθος flos.

CYNANTHROPIA, est rabies canina, quâ ægri lucem & quævis clara ac splendida fugiunt, aquam metuunt, ac ad ejus conspectum & commemorationem contremiscunt. Nasquitur plerumque ex veneno rabidi animalis, ut Canis, Lupi, &c. homini per morsum vel quovis alio modo, communicato, ex κύων canis, ἄνθρωπος homo & ὁπτομαι video. B. Een dolle honts beet. G. Der von einem tollen hunde gebissen ist. Gall. la Rage, Morsure de Chien enragé. A. Madneß caused by the biting of a mad dog. Nonnunquam designat delirium melancholicum, in quo homines sese credunt in canes mutatos, quorum actiones omnes æmulantur.

CYNICUS SPASMUS, vide *Spasmus Cynicus*.

CYNOBOTANE, est herba canina seu cotyla fætida, ex κύων canis & βοτάνη herba.

CYNOCOPRUS est stercus caninum, ex κύων canis & κόπρος stercus.

CYNOGRAMBE, κύνισα & Λινόζωσις, est brassica canina, seu mercurialis. Ex κύων canis, & κρόμβη brassica.

CYNODES OREXIS, est appetitus caninus, five fames præter modum aucta, nullo utcumque copioso cibo sedanda. Oritur ex fermento ventriculi nimium aucto, vel acrimonia quadam, vel robore fibrarum nimio. Ex κύων canis, εἶδος forma, & ὀρεγνυμι. B. Honts hunger. G. Hunds hunger. Gall. Fain canine. A. Canine appetite, or dog like hunger.

CYNODESMUS, est vinculum, quo membri genitalis cuticula cum glande colligatur, ex κύων canis, eo quod *Caninum vinculum* nuncupatur, & δισμός vinculum, à δια vincio. B. Honds-band. G. Hunds-band. Gall. Lien de chien. A. Band of the dog.

CYNODONTES, sunt dentes illi inter molares & incisores positi, quatuor numero. *Canini*, *Columellares* & *Oculares* dicti, ex κύων canis & ὀδὸς dens. B. Honts-tanden / oog-tanden. G. Die Spitz-zähne, oder Augen-zahn. Gall. Dents canines, ou œillieres. A. The eye Teeth.

CYNOGLOSSUM, est Herba, quæ habet plures caules duos pedes altos, ramosos, lanuginosos: folia sunt longa, angusta, acuta, lanuginosa, mollia, albescentia, odor-

odoris penetrantis : flos monopetalus, infundibuli-formis, & multifidus, hujus pistillum abit in fructum, ex quatuor capsulis constantem; ut plurimum asperis, & semine ferè plano factis, placenta pyramidata & quadrilatera affixis : radix oblonga, crassitie digitali, foris ex atro rubens, intus albida, saporis fatui mucosi, aliquando subdulcis, odoris graviusculi, aliquid fœtidi canis redolentis, narcotici, si crescit in locis uliginosis, in siccioribus inodora fere, admota naribus somnum conciliat. Lingua canina, ob canis linguæ similitudinem, quam folia referunt, dicta. Vel quia hujus plantæ foliis credebant sic demulcere posse vulnera, sic ut à lingua canina fit. Ex *κύων* canis, & *γλῶσσα* lingua. B. *Honds-tonge*. G. *Hunds zung*. Gall. *Langue de Chien*. A. *Hounds-tongue*.

CYNOREXIS, idem quod *Cynodes Orexis*.

CYNORHODOS, est rosa canina, ex *κύων* canis & *ῥοσ* rosa. B. *Honds-rose*. G. *Hunds-rosen*. Gall. *Rose de Chien*, *Rosier Sauvage*, *Eglantier*, *Chinorodon*, *Gratecu*. A. *Dogs rose* or *wild Rose*.

CYNOSBATOS, est Rubus caninus; ex *κύων* canis, & *βατος* rubus, idem quod *Cynorrhodos*.

CYNOSORCHIS, est testiculus caninus, satyrii species, ex *κύων* canis, & *ορχις* testiculus. B. *Honds-kulckens*. G. *Hund knaben*, *knaben-kraut*. Gall. *Satirion de Chien*, *Couillon de Chien*. A. *Dogs-stone* like *Statyrion wort*.

CYPARISSUS, idem quod *Cypressus*.

CYPERUS, duplex est, *Longus* & *Rotundus*. Longus, five odoratus, vel officinarum habet folia porri, sed longiora, duriora, tenuiora & acutiora : caulis est rectus, duos circiter pedes altus, sine nodis, trigonus, medulla alba plenus, flos apetalus est, plurimis scilicet petalis constans in capitulum squammosum collectus; in squammarum autem alis oritur pistillum, quod deinde abit in semen plerumque triangulare : radix oblonga, crassa instar cygni plumæ, nodosa & geniculata, contorta, repens, fractu continuax, fibrosa, flexilis, foris coloris subobscuri, intus grisei, saporis suavis, sub acris, & aromatici paululum exsiccantis, odoris fragrantis, ad nardum accedentis. Cyperus rotundus, habet radicem rotundam, olivæ magnitudine & figurâ, foris rufam, scabram, intus albam, pluribus

ribus ex uno capite, tenuibus quasi filis dependentibus, saporis & odoris ejusdem cum cypero longo; crescit in India Orientali nempè in Java, & aliis in locis. Adfertur ex Italia, Syria, Alexandria, India &c. est Junci species, à radicis effigie, quæ pixidulam aut poculum, vasculumve pusillum imitatur, dictus videtur, siquidem apud Theophrastum folliculus ulmi κύπελλον τῆς πελειᾶς legatur. Juxta aquas faciliè succrescit, & radices odorem gratum spargunt. B. *Cyper-wortel*. G. Cyperwurtz. Gall. *Souchet-long*, *Souchet rond*. A. Cyperus.

CYPHEOS trochisci, penult. corrip. quia *Galeno lib. 2. de Antid.* per scribuntur :

Ἐπεὶ ἐν κύφῳ ἐμνημόνευσεν ὁ Δαμοκράτης &c.

CYPHOMA, idem quod *Cyphosis*.

CYPHOS, idem quod *Cyphosis*.

CYPHOSIS, Lat. *Incurvatio*, est spinæ dorsalis versùs posteriora incurvatio, à κύπτω inclino. B. *Gen bult / gebugchelt*. G. Ein Buckel, ein Hocker. Gall. *Bosse*. A. A Bunch back.

CYPRESSUS seu CUPRESSUS, est arbor frondis amænæ, procera, valdè ramosa, pyramidalis : lignum habet durum, compactum, odoratum, coloris flavescentis cariei non faciliè obnoxium : folia squammatis sibi mutuo incumbunt, profundè sunt incisa, ut in Tamarisco, sed magis carnosa, duriora, & firmiora : flos mas amentaceus, squamosus, apices pulverulentos habens : fructus est quasi nux nucis moschatæ magnitudine, subrotundus, ficcus, griseus, dehiscens in multos quasi clavos, sub quibus femina angulosa, plana, rubicunda, medullosa : hæc arbor semper viret, distinguitur in marem, qui ramis est extra se expansis, quæ verò ramos in metæ fastigium erectos habet, dicitur femina : crescit in Græcia, Italia, Hispania, Creta & Asia, quæ in regionibus calidis crescit, fundit resinam, quæ per incisionem in trunco arboris, factam, educitur. Derivatur ἀπὸ τοῦ κύειν παρὶς τὰς ἀκρεμνίας, à *partu parilium ramorum*. Poëtæ tamen cupressum à Cyparisso in hanc arborem converso dictam putant, Plutoni sacra est. B. *Cypres-boom*. G. Cypressen-baum. Gall. *Cypres*. A. The Cypress-tree.

CYPRINUS LAPIS, penult. producit *Oppiano*. Vide & *Adjectiva in INUS ab animatis derivata*.

CY-

CYPRUS seu ALCANNA, est Arbuscula : dici videtur à Venere, quæ Græcis appellatur *κύπρις*, quoniam fœminæ sese eadem tingunt.

CYRTOMA, est gibbus dorfi. Item tumor contra sanitatem in quacunque corporis parte excitatus, à *κύρτω* incurvō.

CYRVOISIS, idem quod *Cyrtoma*.

CYSSAROS, est intestinum rectum, item podex : *κύσσω* enim five *κύσσω* podex.

CYSTHEPATICUS DUCTUS, est is, qui in ductum hepaticum & folliculum fellis implantatur. Inspice Anotomiam nostram.

CYSTICA, sunt Medicamenta adversus Vesicæ morbos, à *κύστις* vesica.

CYSTICUS DUCTUS, five BILARIUS, idem quod *Porus Bilarius*.

CYTINUS, & flos sativæ punicæ. Plinius cytinum interpretatur primum partum punicæ florere incipientis, à *κύω* prægnans sum.

CYSTIS, est vesica urinaria, aut fellis, à *κύω* prægnans sum, quia aliquid continet.

CYSTIS CHOLIDOCHUS, idem quod *Folliculus fellis*.

CYSTOTOMIA, est vesicæ sectio, sed per illam intelligitur *Lithotomia*, vide suo loco.

CYSTUS FELLIS, idem quod *Folliculus Fellis*.

CYTISUS, est frutex, qui crescit ad altitudinem quatuor vel quinque pedum : caules sunt tenues, lignosi, in multos ramos angulosos, flexiles, & virides se extendentes : folia terna, acuta, villosa : flores sunt papilionacei, leguminosi, coloris flavi, raro albi : flori succedit siliqua plana, ampla, nigra, villosa, in duas partes dehiscens, fæta seminibus planis & oblongis : radix divisa est in multos ramos, nervosos, flexiles, flavos : tota plantâ habet odorem penetrantem, & saporem amarum : crescit in locis desertis & montibus : sic dictus à Cythilo vel Cythno insula, in qua inventus est, & abundat. Malunt alii à Cynthyâ insula, quæ è Cycladibus est, nomen accepisse. Gall. *Citise*.

D.

Δ Olim per hanc literam majusculam mysticè febrem quartanam denotabant.

DACRYDIUM, est succus Scammonii induratus, & cydonio excavato inditus, qui pasta obductus in furno vel sub cineribus assètur, & postea exemptus servetur usui, purgans est, creditur autem Scammonii vis violenta sic corrigi, & hâc præparatione applicatâ tutius operari. Latinis *Lachrymula*; δακρυ enim est lachryma.

DACRYODES, sive **LACRYMOSUS**, est ulcus continuo saniem aut ichorem effundens. Gr. δακρυώδης ἔλκος à δακρύν lacrymo.

DACRYON, idem quod *Lacryma*, à δακρύν lacrymo.

DACTYLIOS, podex est, sunt qui eo nomine rectum intestinum intelligunt, nonnunquam circulus est, pastillus sive orbiculus, quo in Medicina utimur, à δάκτυλος digitus.

DACTYLUS, est fructus palmæ, oblongo-rotundus, dulcis, intus durissimum continens nucleum. Arbor procera est, viginti passuum & amplius, crescit in Judæa, Syria, Ægypto, Africa, India &c. Folia ensibus similia habet, deorsum cannarum modo decidentia. Vere floret. Ramus enim quodam involucro oblongo, vesicæ modo, ad ver usque clauso, & tunc aperto præditus, flores emit tit parvos, albos, odoratos, racematim deorsum ab involucro residentes, ac pendentes. Autumno fructus maturantur. Cujus ramum una cum dactylis appendentibus hic loci me vidisse memini, à Latinis appellatur *digitus*. Codices fortè malè dactylum habent pro Balano, quod glans est: & illi fructus glandes sunt, ergo: similitudinem enim cum digitis nequaquam repræsentant. Dicitur & φολιζ. hinc compositio illa *Diaphanicum* dicta, inde nomen habet, recipit enim dactylorum pulpam. B. **Dadelen** / **Dalen**. G. Datteln. Gall. *Dattes ou Dactes*. A. a Date.

DANICH, pendet grana octo, idem quod *Lupinus*.

DAPHNE, est laurus: cujus folia, dum uruntur, sonant, crepitant, à δαίω vel δα uro, & φωνή sonitum do. Alii à Daphne puella in Laurum conversa denominationem trahunt. Vide *Laurus*.

DAPHNE ALEXANDRINA, vide *Laurus Alexandrina*.

DAPHN

DAPHNOIDES, est Laureola, sic ob Lauri similitudinem dicta, ex δάφνη laurus & ἰδίῳ forma.

DARSIS, est excoriatio cutis, à δάρα excorio. Vide *Intertrigo*.

DARTUS, est membrana scroti, quæ cellulosæ tunicae est lamella interior, cui accrescit musculus corrugator; estque vera bursula, ambiens Testem undique, cui ab altera parte alia similis accrescit, sicque septum dictum constituunt, vel potius faciunt duo scrota, unicuique testis unum, hinc propriè septum dici non debet à δάρα pellis.

DASYMMA, est palpebrae internæ inæqualitas superficialis cum rubore, à δασύς hirsutus.

DATURA, est Solani species. Derivatur ab indica voce *Datiro* & *Tatel* seu *Datel*. Vide *Stramonium*.

DAUCUS, duplex est vel creticus vel vulgaris: creticus est planta, quæ habet caulem sesquipedem circiter altum, rotundum, striatum, villosum: folia incisa instar fœniculi, sed tenuius, lanuginosa: flos est rosaceus & umbellatus, plurimis scilicet petalis constans inæqualibus in orbem positus, & calici insidentibus; is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum, rostro avium æmulis, striatis, hinc gibbis, inde verò planis, parum villosis, albescentibus; saporis acris aromatici, grati, odoris debilis: radix est longa, digiti crassitie, fibrosa, odorata, saporis pastinacæ: crescit in Insula creta sive Candia, colitur etiam in hortis: Daucus vulgaris habet semina compressa, cinerea, dauco cretico breviora, latiora, circa marginem utrinque villo oblita, saporis dauco cretico debilioris, odoris fragrantis; unde hæc planta à quibusdam Nidus avis dicitur, quia umbella est instar nidi avis. Est planta, quæ ἀπὸ τοῦ δάου, quod tormina sedet quietemque inducat, flatus discutiendo nomen accepit. B. *Arcontjes kruid* / *Bogel nest*. G. Mohren-kummel. Gall. *Pasténade*, ou *Carotte Sauvage*, *Panais*. A. Birds-nest, Wild-carrot.

DEALBATIO, sive **LEUCOSIS**, pertinet ad artem cosmeticam, quâ facies, dentes, cicatrices, vel aliud quid dealbantur. Utuntur hac voce quoque Spagyrici. B. *Wit-makinge*. G. Weiszmachung. Gall. *Blanchissement*. A. Whiting, Bleaching.

DEARTICULATIO, sive **ABARTICULATIO**, idem quod *Diarthrosis*. DEAU-

DEAURATIO, dicitur quando pilulae ob amaritiam evitandam auro solatio obducuntur. Item Tinctura fucata metallorum, monetarum &c. in colorem aureum. Gr. χρυσόωσις. B. Vergulding. G. Verguldung. Gall. Dorure. A. A Gilding.

DEBILITAS, est quando quis viribus minus pollet seu musculos corporis satis movere nequit, quod vel ex lipothymia vel syncope, vel ex inedia quoque, vel ex morbo, Laxitate fibrarum, vel alio quovis modo exoritur. Gr. ἀσθένεια. B. Zwaakheid. G. Zwachheit. Gall. Faiblesse, *Debilité*. A. Feebleness, or Weakness.

DECANTATIO, & **DECUPELATIO**, est liquoris lymphidi à fecibus effusio. B. Abgieting. G. Abgießung. Gall. Verser par inclination. A. Decantation.

DECIDENTIA, idem quod *Catatopsis*. Dicitur quoque neuter status, qui ex statu optimo & temperato versus morbum inclinat. Inde vox *Morbus ex Decidentia*.

DECLINATIO morbi, est, quando à statu & vigore recedit, & aeger extra discrimen ponitur: nemo enim in declinatione, nisi accidentaliter, moritur. Vide *Agne*. Per *Declinationem* aliquid effundere, est quando vas continens declinatur, ita ut liquor sensim effundatur, ne sedimentum moveatur, & liquorem turbet.

DECOCTIO & **DECOCTUM**, vide *Apozema*.

DECOMPOSITUM, auget significationem compositi, estque illud quod jam in compositione (ut dicunt) per corruptionem & generationem convenit.

DECORTICATIO, est, quando res, ut radices, femina, fructus &c. à suo cortice liberantur. B. Abschelnge / ontchojsinge. G. Abschelung der rinde. Gall. Affection d'oter l'écorce, ou de peler. A. A Pulling of the bark.

DECREPITATIO, de sale communi & similibus inriaticis salibus dicitur, quæ cum ad ignem sine fusionem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt, donec aquosam partem amiserunt. B. Krakinge. G. Das Krachen. Gall. & A. *Decrepitation*.

DECUPELATIO, idem quod *Decantatio*.

DECUSSIS, idem quod *Denarius*.

DECUSSIS, Antiquis ad X. literæ figuram fiebat, quæ Latinis decem significat. Hinc *Decussari* est in speciem litteræ X. diduci.

DECUS

DECUSSORIUM, est instrumentum Chirurgicum; quo dura mater leviter pressa, accuratè cranio adjungitur, ut pus intra cranium & meningem crassam collectum evacuetur, per foramen trepano factum. B. *Neerdruk-tung*. G. Niederdrucker. Gall. *Decussoire*.

DEFATIGATIO, denotat incommodum leve, quod ab exercitio, vel labore vehementiore, aut protractiore accidit, unde quietis appetentes minus alacres evadunt. Hæc imbecilibus, valetudinariis, ægris & reconvalescentibus facile supervenit, item iis qui non assueverunt laboribus & exercitiis, aut qui noctu vigilarunt, aut qui jejunium, alvi fluxum, vel alia passi sunt. B. *Permoetsheid*. G. Muedigkeit. Gall. *Fatigue*, *Lassitude*. A. Weariness.

DEFECTIO ANIMI, vide *Lipothymia*.

DEFENSIVUM, à defendere, est Medicamentum Chirurgicum vulgare, quo imminetia symptomata à parte affecta præcaveantur. B. *Een defensief / verhoed-middel*. G. Ein dämpf und beschirm mittel. Gall. & A. *Defensif*.

DEFLAGRATIO, est Operatio Chymica, quâ Medicamenta deflagrantur, hoc est, per ignem subito purgantur, ut est nitri cum sulphure, antimonii cum nitro, unde subito flamma exoritur. B. *An de vlam zetten*. G. Brunst, Verbrennung. Gall. *Deflagration*, *Incendie*, *Embrasement*. A. A deflagration or Burning. Item denotat Febrium intermissionem. Vide *Apyrexia*.

DEFLUVIUM CAPILLORUM, vide *Alopecia*.

DEFLUXUS, idem quod *Catarrhus*.

DEFRUTUM, est mustum ad dimidias coctum, ut *Sapa* ad tertias partes. B. *Gekookte most tot de helft*. G. Gekochter Most. Gall. *Vin cuit*; *Rasiné*. A. Wine where of the half part is sodden away.

DEGLUTITIO, est actio animalis, quâ alimentum in ore masticatum aut aliud liquidius absorptum, in ventriculum per oesophagum, protruditur ex ore & faucibus: quæ actio cum sit intricatissima, explicatuque longiore egeat, ex physiologis petenda. Vide Clar. H. Boerhaave in *Instit. Medic.* B. *Dooz;welging*. G. Die Verschlingung, Verschluckung. Gall. *Deglutition*. A. A swallowing down.

DEJECTIO, seu **EGESTIO**, & **EJECTIO**, est excre-

crementorum alvi per anum depositio. Quæ varia est tum in statu sanitatis tum morboſa, liquida nempe, mediocris conſiſtentie, vericolor, alba, flava, nigra, viridis &c. B. Abgang. G. Abgang, Stuhlgang. Gall. & A. A *Dejection*, or *going to Stool*.

DEJECTORIA, vide *Catoretica*.

DELAPſIO, eſt quædam decidentia, ut delapſio uteri, ani, intetini &c. B. *utruſ* / *utzmiking*. G. *Aufzfall*. Gall. *Deſcente*. A. A *palling down*.

DELETERIUM, eſt quodvis venenofum, à *δολος*, elica, quâ animalibus exitus paratur, vel à *δολος* noceo, decipio, deludo.

DELIGATIO, eſt pars *Chirurgia*, quæ vulnera, ulcera, oſſa fracta &c. deligat. Eſtque vel ſimplex vel compoſita. Simplex eſt æqualis vel inæqualis. Æqualis eſt tantum rotunda, quæ membrum affectum circumquaque ſine ulla in partem alterutram declinatione complectitur. Inæqualis in aſciam & ſimam dividitur: tamen ſaltem ratione majoritatis & minoritatis differunt; aſcia parum a rotunda declinat, ſima verò multum. Variæ ſalciationis ſunt differentie, ſumptæ à partium, quæ vinciuntur, vel quorundam animalium, vel aliarum rerum ſimilitudine. Gr. *επιδερσις*. B. *Verbinding*. G. *Verbindung*. Gall. *L'Appareil*, *Deligation*. A. A *binding*.

DELIQUIUM ANIMI, ſive SUBITUS ANIMI CASUS, ſuis non caret gradibus; dicitur enim *Eclypſis*, *Lipothymia*, *Lipopſychia*, *Apopſychia*, *Syncope*, *Aſphyxia* &c. quæ ſunt totidem gradus. Obſervandum igitur primò, quod *Animi deliquium* hæc ſæpe antecedunt; Cardialgia ſc. Anxietas ex improviſo, cordis quaſi compreſſio, oſcitatio, ventris murmur, gravitas vel dolor capitis, vertigo, tinnitus aurium, caligines, varii colores oculo obverſantes, pandiculationes, horrores, frigus extremorum, pallor & pulſus mutatio. Secundo, his apparentibus & ingravementibus, inſequuntur lapſus ſi ſteterint vel federint; major pallor & frigus intantum, pulſus rarus, parvus, tardus, debilis, unguium livor, reſpiratio minuta, denique motus ubique & ſenſus intercepti; at in *Syncope* pulſus planè ceſſat, ut & reſpiratio & motus omnis, ſudor irigidus & viſcidus exprimitur, urina ſæpe, alvi feces aut ſemen efluunt. Tertiò, quod ſoluto paroxiſmo,

xyfino, qui brevior esse vel longior solet, suspiria fiunt, languor adest, imbecillitas, lassitudo, pigritia. Sed uti *Animi deliquium* gradum sternit ad *Syncopen*, ita *Syncope*, prima mortis linea est. Quartò, hoc malum multis aliis morbis accidere solet, cum nempe vires prosternuntur, uti ex iis quæ de imbecillitate dicta sunt patet, ideò reperitur in febribus, in Asthmate, Hydrope, doloribus &c. Aliquando ab Hæreditate est, sed valetudinarii, Cachectici, Hypochondriaci, reconvalescentes, pueri, senes, macilenti, obesi facile in id incidunt; verum alii id patiuntur ab odoribus, à conspectu rerum, quæ offendent, ab esu etiam infcio rerum, quarum fastidio laborant, ab exercitiis vehementioribus, à nimio & repentino gaudio, à purgatione, venæ sectione, sudore, æstu, puris magna effusione, à gravi dolore, à venenis, aut ab ictibus vel morsibus animalium venenatorum. Dicitur & *Defectio*. *Defectio Virium*; *Languor Virium*, *Imbecillitas*, *Debilitas*, Gr. ἀτονία, ἀσθενεία, ἑκλυσις, ἀρρώστια τῆς δυνάμειος. B. *Flauwte / magteloosheid / ommagt*. G. Ohnmacht. Gall. *Defaillance*. A. A Fainting or swooning. Faintesse, Feeblesse.

DELIQUIMUM CHYMICUM, est destillatio per inferiora mediante igne: vel calcis in cellis humidis suspensæ deliquatio & in humorem lixiviosum resolutio. B. *Smeltinge*. G. Niederwertz distiliren. Gall. *Distillation par defaillance*. A. The dissolving of any hard body into liquor in a moist place as salt &c.

DELIRIUM, est idearum ortus non respondens externis causis, sed internæ cerebri dispositioni, una cum iudicio ex his sequente, & animi affectu, motuque corporis inde sequente: atque his quidem per gradus auctis, solitariis, vel combinatis, varia deliriorum genera fiunt. Pōnit semper cerebri medulloſi affectionem morboſam à quacunq̃ue causa ortam. Gr. παραφροσύνη. *Hippocrates* & *Galenus* variis vocabulis utuntur. *Hippocrates* quidem ad levem desipientiam significandam ferè vocabulo παραφροσύνη & ληῶσαι sive παραληεῖσαι; *Galenus* vocabulo παραπαιῶσαι, παρακεῖσαι, sicut ad gravem significandam ἐκσῆναι, μανῆναι & ἐκμανῆναι, utitur, παρακοφαι verò de utraque usurpant. Species varix sunt, undè σιωπηροὶ qui pauca loquuntur: alii & sermone delirant, & ridicula, aliena,

magnifica vel maledica non saltem cogitant, sed & proloquuntur : alii denique opere & factis cogitata exequuntur & hæc omnia præstant vel μετὰ γλῶσσαν, vel μετὰ νοῦν, sed hi omnes delirantium ordines ad certas differentias redacti sunt. Sub delirio in genere dicto comprehenduntur παραφροσύνη, φρενίτης, μελαγχολία, μανία, & alii qui hac referuntur, affectus. Delirium iterum est cum vel sine febre. Cum febre φρενίτης vocatur, & quod simplex appellatur delirium, Gr. λῆθς vel παραφροσα, vel παρὰ λῆθς symptomata nimirum febrium ardentium. B. *Widderschoofdigheid / Ligthoofdigheid*. G. Haupt-krankheit, Unwitz, Aberwitz, Wahnwitz. Gall. *Radotement, Réverie, Forcenement, Delire, Forcenerie, Reverie*. A. *A doating, doting, or dotage*.

DELPHINIUM, est flos regius, est planta procera, ramosa, quæ habet folia in longas partes divisa, & ferè instar sæniculi incisa : flos est polypetalus, anomalus, ex pluribus nempe petalis dissimilibus constans, quorum superius in caudam attenuatur, excipitque aliud petalum bifidum & pariter caudatum : horum autem meditullium occupat pistillum, quod deinde abit in fructum, in quo velut in capitulum colliguntur vaginæ, secundum longitudinem dehiscences, seminibusque fætæ ut plurimum angulatis, nigris, saporis amari & ingrati : colitur hæc planta in hortis, propter pulchritudinem floris sic dicitur, quod ejus flores nondum expliciti similitudinem cum pisce delphino habent : vocatur etiam *Consolida Regalis* à virtute consolidante & floris pulchritudine : dicitur etiam Equestre calcar, Equitis calcar, calcatrippa. B. *Widderschoofdigheit*. G. Ritter-si oren. Gall. *Pied d'alonette*. A. *Larks spur, Larks foot, Larks knaw*.

DELTOIDES, est musculus instar Δ Græcum, triangularis; oritur à clavicula, humero sive Acromio, & scapulæ processu spiniformi, articulum humeri suo ventre tegit, inseritur parti anteriori & magis superiori quàm mediæ ossis humeri; à nobis & aliis in varios musculos dispescitur. Humerum attollit, à figura Δ & αἰδς forma. B. *De Widderschoofdighe spier*. G. Der dreyhauptige maulz. Gall. *Muscle deltoide*. A. *The deltoide muscle*.

DEMENTIA, inter species delirii refertur. Idem quod *Ania*.

DEMERSIO sive **IMMERSIO**, est, quando Chymicis metallum aliquod liquori solventi submergitur. B. **Induïsseling**. G. Eintauchung, Versenckung. Gall. *Demersion*. A. A dipping.

DEMULCENTIA medicamenta sunt, quæ possunt figuras medicamentorum, vel humorum nostrorum morbosorum, vel venenorum acrium ita immutare, ut ex figura acri, transeant in obtusam & inertem : duplicia sunt, vel generalia, quæ omnia acrium genera, qualiscunque sint naturæ, indiscriminatim & ex æquo involvunt, non figuras eorum mutando, sed tantummodo quasi in vaginula includendo: vel specifica, quæ certam solummodo acrium speciem obtundunt. B. **Verzagtende middelen**.

DENARIUS, est unciae pars septima: uncia enim continet septem denarios. Vide *Aureus* Gall. *Denier*.

DENDROIDES, est planta arbori similis, ex δένδρον arbor, & εἶδος forma.

DENDROLACHANA, oleri arbores: sic vocantur olera, cum ferè in arboris altitudinem assurgunt; ex δένδρον arbor, & λάχανον olus.

DENDROLIBANUS, est Rosmarinus, quia arbuscula quasi sit, vocatur δένδρον arbor, & λίβανος, quod Thus seu Olibanum oleat.

DENDROMALACHNE, est malva arborefcens; ex δένδρον arbor, & μαλάχη malva.

DENDRON, arbor. δένδρον quia δεινῶς δέρεται graviter & molestè decorticatur, vel à δένω struo, ædifico, quia ex iis ædificia &c. eriguntur, struuntur.

DENS CANINUS, sive Satyrion Erythronium: est planta, quæ habet folia bina, aliquando terna, repentia, cyclaminis similia; flos liliaceus, ex sex petalis compositus, pendulis & repandis, quorum meditullium occupat pitillum, quod deinde abit in fructum subrotundum, in tria loculamenta divisum, seminibusque sætum oblongis, flavescentibus: radix oblonga, carnosa, alba, dentis canini forma: sic vocatur, quia ejus floris folia dentem caninum referant vel etiam radix. Gall. *Dent de Chien*.

DENS LEONIS, est *Taraxicum*, Cichorei sylvestris species: sic dicitur quod folium sinuatim per lacinias dentæulatum sit, & *Rostrum* quoque *porcinum* nominatur. Vide *Taraxicum*.

DENTARIA, five coralloides; est planta quæ habet folia quinquefolia, septem in uno latere disposita, oblonga, acuta, dentata, viridia, aspera: flores sunt albi, purpurescentes, cruciformes, quadrifidi, ex calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu siliquam, septo intermedio, cui valvæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque factam plerumque subrotundis; valvæ per maturitatem in helicis formam convolvuntur, magnoque cum impetu semina ejiciunt: radix carnosa, squammosa, ac veluti dentibus incisa: hæc planta crescit in montibus: sic dicitur, quod ejus radix dentiformis, & in corallii modum nodosa sit. Gall. *Dentaire*.

DENTAGRA, vide *Forfex*.

DENTALIUM, est conchula parva, tubulosa, alba, glabra, dentatam rimam habens, ingreditur unguento citrino.

DENTARPAGA, vide *Forfex*.

DENTES, Gr. ὀδόντες, sunt ossicula utriusque maxillæ per gomphosin infixa; adultis plerumque triginta & duo; vel viginti octo tribuuntur, quantum extra gingivas eminent sine periosteo contpiciuntur, sed in maxillæ cavernis membranâ à gingivis vasculosam, firma illa reddentem accipiunt. Continuo crescunt, secus ex frequenti detritione comminuerentur, non tantum arteriis & venis, sed & nervis prospiciuntur, à gingivis oriundis, ipsisque immixtis, quod dolor vehemens aliquando arguit. Quatuor anteriores *Primores*, *Incisores* *Ididoro*, *Tomici* Celso. Gr. Τομῆς, διγαστήρις, κένυς, Τομήται, γιγαστινοί, B. *Boter-tanden* / *lag-tanden*. G. Die fœrderste breite Zähne, die beisser. Gall. *Les dents de devant ou incisives*. A. The fore teeth. Qui à lateribus insequuntur acuti magis sunt, vocanturque *Canini*, *Oculares* & *Columellares*. Gr. κυνοδόντις, ὀφθαλμοὶ, & γομφιοί. B. *De Hondst-tanden* / *oog-tanden*. G. Die Augen-zähne, spisz-zähne. Gall. *Les dents Oeillères*. A. The dog teeth or the eye teeth. Posteriores qui tunc sequuntur *Molares* appellantur, & habent majores superficies, & duas, tres vel quatuor radices, cum priores unicam tantum accepere. Hisee cibi duriusculi à prioribus incisi molâ quasi in pulmentum conteruntur. B. *Bak tanden* / *maal-tanden*. G. Die stockzähne, die backen-zähne, grosse-zähne. Gall. *Les dents molaires*,

du machelieres. A. The jaw teeth or the grinders. Qui post annum trigessimum & quadragesimum interdum erumpunt, *Morim & sapientia dentes* sunt. Item *Genuini*, Cic. *Intim* Eid. Κελευθονες, Ο ψιγιοι, Σαφορισηες appellantur. Dentalis vertebræ secundæ prominentia, dentis quoque nomine venit. Omnes dentes in genere vocari solent. B. *De tanden.* G. Die Zähne. Gall. *les Dents.* A. The Teeth.

DENTIDUCUM, vide in *Forfex*.

DENTIFRICIUM, est Medicamentum ad dealbandos, extergendos & stabiliendos dentes, gingivasque roborandas paratum. Gr. *δοντοτριμμα, ουγκυα οονταρι.* B. *Tant-pocet.* G. Zahn-pulver. Gall. *Dentifrice, poudre à froter ou nettoyer les dents.* A. Poudre to rub the teeth to make them white.

DENTILLARIA, idem quod *Dentaria*.

DENTIUM DOLOR, idem quod *Odontalgia*.

DENTIO, idem quod *Dentitio*.

DENTITIO, est tempus illud, quo infantium dentes erumpere incipiunt, quod fit mense septimo vel ferius; & citius superiores, nonnullis citius inferiores, & in his anteriores prius: tempore dentitionis sæpè, febres; convulsiones, alvi profluvia, &c. exoriuntur. Gr. *δοντοφυα* *Agin.* *δοντιασις*, à qua differt *δαζισμης* Galeno, sive *δαζισμυδς*, ut ab *Hippocr.* vocatur, pruritus ille gingivarum, quem dentientes pueri sentiunt. B. *De tyd wannen de tanden komen / tandinge.* G. Zähnen, zahn gewinnen. Gall. *La venue ou sortie de dents.* A. Breeding of teeth.

DENTO, est is, qui dentes eminentiores, prominulos, & os productum habet.

DEOBSTRUENTIA sive DEOPPILANTIA, sunt Medicamenta, quæ obstructions aperiunt.

DEOPPILANTIA, idem quod *Deobstruentia*.

DEPHLEGMATIO, est operatio, quâ reiteratâ destillatione aqua superflua à spiritibus, vel puriori parte separatur. B. *Dan syn water-zuiveren / dephlegmeren.* G. Von wasser säubern, abziehen. Gall. & A. *Dephlegmation.*

DEPILATORIUM, idem quod *Psilothron.* Gall. *Depilatoire.*

DEPLUMATIO, idem est quod *Ptilosis*, ubi palpebræ una cum tumore calloso, pili quoque earundem cadunt; estque composita affectio ex *Madarosi & Sclerophthalmia.*

Verum semper conjunctum non habet pilorum defluvium.

DEPURATIO, est rei alicujus puræ ab impuro separatio, ut est despumatio, clarificatio. B. *Zuivering*. G. *Säuberung*. Gall. *Depuration*.

DERIVATIO, est actio quâ humor, pus, urina, sanguis &c. qui in partem influxit, & nondum impactus est, artis ope per locum vicinum educatur, vel ex loco uno in alium allicitur, cujus resistantia aliquomodo tollitur; uti fit per V.S. Cucurbitulas, Epispastica, Frictiones &c. B. *Verleiding*. G. *Ableitung*. Gall. & A. *Derivation*.

DERMA, idem quod *Cutis*, à *δέρω* cutim detraho.

DESCENSORIUM, est fornax Chymicis familiaris, destillationibus per descensum inserviens. B. *En Oven daar men mede na om lage destilleert*. G. *Ein Ofen dar in man unter sich treibt*. Gall. *Fourneau pour distiller par descensum*. A. *Descensorie*.

DESCENSUM, seu per descensum destillare, vide *Deliquium*.

DESICCATIO, est superflui humoris vel humiditatis per calorem evaporatio. B. *uitdrooging*. G. *Austrueckung*. Gall. *Desechement*. A. *Desiccation or drying*.

DESICCATIVUM, est unguentum vel emplastrum, humores tenues ulceri instillantes exsiccans, à desiccare. B. *Opdrogend middel*. G. *Treugende, abtreckende mittel*. Gall. *Un desiccatif*. A. *A desiccative or drying medicine*.

DESIPIENTIA, est delirii species. Idem quod *Paraphrosyne*.

DESPUMATIO, est alicujus rei, ut syrupi, mellis &c. inter coquendum, spumæ detractio. B. *Schuiminge*. G. *Abschaumung*. Gall. & A. *Despumation*.

DESQUAMATIO, Gr. *ἐκλεπισις*, est, quando in carie ossis vel alias, ab osse squamæ quædam abscedunt. B. *Been-schilfering*. G. *Ausnehmung der beinen*. Gall. *Exfoliation, Desquamation*. A. *A scaling of bones*.

DESTILLATIO, eodem modo fumitur ut *Catarrhus*, vide suo loco.

DESTILLATIO, est partium spirituosarum, humidarum vel oleosarum, in halitus fumosve vi ignis extenuatarum, atque elevatarum extractio: destillatio fit per vesicam, cucurbitam, retortam, deliquium, filtrum, descensum, &c. eaque in balneo mariæ, arenâ, vaporibus, fimo, sole,

sole, reverberio, &c. peragitur. B. *Deerdruppinge distilleeringe*. G. Distillierung, brennung. Gall. *Distillation*. A. Idem.

DETERGENTIA, à *detergere*, vide *Abstergentia*.

DETONATIO, est deflagrationis modus cum sonitu, ex gr. cum sulphurea quædam, cum nitro permixta, ignique admota, pulveris pyrii instar, cum strepitu & fulgore deflagrant: ut in præparatione antimonii diaphoretici, & in accensione auri tonantis. Vide *Deflagratio*. B. *Ontplof*, *sinne*. G. Verpueffung. Gall. & A. *Detonation*.

DEUNX, sunt unciae undecim, libra Medica five Romana, continet uncias duodecim, ideòque *deunx* est quasi dæffet uncia.

DEUTEROPATHIA, est morbus ab alio morbo originem ducens, ex gr. si caput ex alterius partis vitio laborat, vel communicatâ ad id materiâ morbificâ, relicto priore foco, ex *διυτρε* secundus, & *πέρω* patior.

DEXTANS, est nomen ponderis pendens uncias decem. B. *Tien oncen*.

DIA, *per, ex*, est præpositio, quæ sæpè additur præparationibus Medicamentosis, ut *Diaprunum*, hoc est compositio ex prunis, sic dicitur *diasena*, *diareos*, *diaphœnicum* &c.

DIABETES, sic *Galeno* dicitur. *Dipsacus Aeginete* ab immensa siti quam invehit. Vel ut alii à serpentis quoddam genere, quod *Dipsacus* appellatur & in *Lybia* præsertim reperitur, quod morfu suo venenum quoddam in homines insinuet, à quo sitis inextinguibilis inducitur, *διάσπασις ὕδατος* *ὑδρεῖς ἀνὶ δα*, quasi *Hydrops in matulam*. Hinc est quod hunc affectum *Matulam inter cutim*, alii *Urinæ profluvium* & *siphonem* nuncupant. Rarissimus est affectus, quem *Gal.* se bis tantum vidisse refert 6. de Loc. aff. Cap. 3. est urinæ fluxus valdè copiosus cum siti intolerabili, & summo virium prolapso, imò urina non tantum, sed potus, & is parum vel nihil immutatus egeritur sub forma Chyli vel Lactis. Quos affligit, emaciantur, debilitantur, & præ siti, ardoreque viscerum vix se continent, & urinam cohibentes mox sentiunt lumbos, coxas & testes cum ardore, & gravitate intumescere, oritur autem à laxitate fibrarum in fistulis urinosis, & aquosa indole liquorum corporis, à *διεσπασίᾳ* pervado. B. *Water-zucht*

in de pis pot / pis-bloed. G. Harn flusz. Gall. *Diabete*, *Flux d'urine*, *écoulement d'urine continuel*. A. A Diabetes or incontinency of urine.

DIABROSIS, est solutio continui per exesionem, à *διαβρώσκειν* peredo. B. *Θοορ-cting*. G. Durchfressung, Zernagung. Gall. & A. *Corrosion*.

DIACARTHAMUM, penult. corr. Vide *Carthamum*. Sunt qui existiment compositiones pharmaceuticas à Dia incipientes Arabibus deberi, sed falluntur; *Galenus* enim de *composit. Medic. secund. gen.* frequenter ita loquitur: ἢ διὰ δικτάμνου; ἢ διὰ δυοῖν ἀριστολοχιοῖν; ἢ δι' ἀσφάλτου; τροχίσκοι διὰ τῶν ἀλικακάρων; ἢ διὰ τῶν χυλῶν; *idem* de *compos. medic. secund. loca*, sæpè ingeminat, διὰ ῥόδου ἀραιῶν, διὰ ῥόδου το μελα, &c.

DIACHORESIS, & **DIACHOREMA**, est excretio quorumvis excrementorum, ab ἀποχώραν secedo. B. nit; *werpsels / uitdypfels*. G. Unflat. Gall. *l'Ordure*. A. *Casting out*.

DIACHYLON, dicitur emplastrum ex succis quibusdam compositum, ut & de gummis, ex διὰ ex & χυλῶν succus. B. *Sap-pleister*. G. Safft-pflaster. Gall. *Emplastre Diachylon*. A. *Sap-plaister*.

DIACINEMA, dicitur cùm ossa de loco suo nonnihil recesserint, ex διὰ ex, & κινῶ moveo.

DIACLYSMA, est oris collutio, ad foetorem abigendum vel dentes, aut gingivas sordidas vel ægras confirmandas. Vocantur ἰπὶ τὸ πολὺ collutiones oris; parantur ex astringentibus variis, ut *Bistorta*, *Tormentilla*, *fl. Balaustiorum*, *cort. granatorum*, *gallis*, *alumine*, *ung. Ægyptiaco*, &c. sub eo quoque comprehenditur *Gargarisma* & *Apophlegmatismus*, à διακλύζω colluo. B. *Mont's spoeling*. Vide *Collutio*.

DIACODION, est Medicamentum ex papaveris capitibus, siliquis dulc. rad. glycyrrh. alth. & saccharo paratum, habetque syrupi consistentiam. Ex διὰ ex & καδία papaveris caput. B. *Boist sproop / Slaapbolle sproop*. G. Brust syrop. Gall. *Siropp pectoral*. A. A Syrup made of the tops of Poppies, Breast syrup.

DIACOPE, præcisionem, vel discissionem in aliqua parte significat, sive studio, sive casu, à διακόπτω præscindo. *Hippocrati* vulnus est omne quod altè descendit in pactum.

factumque est. *Galeno* est soluta in ossē capitis continuitas ab aliquo acuto occurrente, atque abscindente, vocaturque quoque *ἐγχοπή* & *ῥήξ*.

DIACOPRÆGIA, est Medicamentum ex simo capri-
no, adversus splenes & parotides, à *διὰ* ex, *κόπρη* ster-
cus, & *αιξ*, capra.

DIACRISIS, est distinctio & dijudicatio morborum &
symptomatum, à *διακρίνω* distinguo, dijudico.

DIACRITICA, idem quod *Diacrasis*.

DIADOCHÆ, est successio per crisiin, à *διαδοχῶμαι* sus-
cipio.

DIADOSIS, est alimenti distributio, sive per omnes
partes pervasio, ex *διὰ* per *δίδωμι* & do.

DIÆRESIS, est exesio vasorum, fit cum à causa ero-
dente, vel incidente, via aliqua, quæ adesse non debe-
bat, aperitur. Nam primò potest *διαίρεσις* fieri ab humori-
bus acris, qui erodendo unitatem solvunt, & viam pa-
refaciunt; quod etiam Medicamenta acria præstare pos-
sunt, modo crassarum partium sint. Nam tenuium partium
unitatem non rodunt, cum non hæreant diutius. Deinde
humores crassi & acidi *διαρροῦς* causa esse possunt, qui
partem distendendo rumpunt. Tertiò causæ plurimæ evi-
dentes *διαίρεσιν* faciunt, omnes scilicet, quæ contunden-
do, & distendendo unitatem vasorum solvunt; qualia sunt
motus vehemens, clamor, pondus grave, vulnerantia,
contudentia, casus, saltus & similia, inter quæ & flatus
referri possunt, qui retenti tantâ vi interdum corporis par-
tes distendunt, ut non solum corporis cavitates dilatent,
sed rumpendo etiam novas faciant, & ipsi quoque unita-
tem solvant. Item operatio Chirurgica quæ continuo se-
parat, & fit incisione, ustione, terebratione, rasione, li-
matione, ferratione, exesione, à *διαίρεσις*, divido. Vide
Diabrosis. B. *Doorknaginge der vaten*. Gall. *Dierese*.
A. A corroding of the vessels.

DIÆTA, est Methodus sanis moderatæ vivendi: at
Dieta agrorum est remedium in recto rerum, vitæ neces-
sariarum usu consistens: eâque ratione consistentiæ est
crassa, *mediocris* & *tenuis*. Crassa instituitur alimentis co-
piosis, firmis & solidis, multumque nutrire aptis, hæc
simpliciter plena est, quæ fiebat olim per ptisanam hordea-
ream integram. Vel est *plenior* & *crassior*; quæ fit per
car,

carnes pullorum & ova forbilia. Vel est *plenissima*, quæ etiam carnes castratorum concedit. *Mediocris* est, quæ ex mediocris substantiæ & quantitatis alimentis constat. Hæc olim per panem jure tinctum, vel etiam per carnes pullorum fiebat. *Tenuis* est quæ & alimentis paucis, tenuibus & infirmis perficitur, quæ ut plurimum acutis morbis convenit: eaque triplex est, *tenuis simpliciter*, quæ olim per ptisanæ succum fiebat. Vel *tenuior*, in qua meliocratum propinabatur; vel *tenuissima*, in qua nihil cibi æger sumebat. Verum nunc temporis diætæ non ita stricte observantur quàm olim, præsertim in hisce regionibus, à *διαίτα* nutrio. **Lebens wet / of Lebens manier.** G. Ein gewisse Ordnung mit essen und trincken. Gall. *Diete, Regime de vivre.* A. Diet.

DIÆRETICA, sunt Medicamenta corrodentia & excrementia, à *διαίτα*, divido.

DIÆTETICA, est pars Medicinæ præscribens cognitionem & usum rerum sex, quibus sanitas, & vita nostra, ejusque regimen maximè constat, ut imminentes morbi præcaveantur, & præsentès profligantur: Hæ sæpè dicuntur *res non naturales* à scholis: ut sunt aër, cibus & potus, motus & quies, somnus & vigilia, Animi Pathemata, excreta & retenta: quæ si modum excedant, morbos pariunt, ex *διαίτα* alo, nutrio. B. **Lebens wgs.** G. Manier und ordnung zu leben. Gall. *Partie de la Médecine qui enseigne la diete, & un reglement de vivre.* A. Diete.

DIAGNOSIS, est signorum præsentium cognitio: live cognitio, quâ præsentem morbi conditionem dignoscimus. Estque triplex partis *affectæ*, ipsius morbi, ejusque *causæ* recta investigatio, ex *διά* per, & *γινώσκω* cognosco. B. **Kenzeichen.** G. Kentzeichen. Gall. *Signe.* A. Diagnostick or the signs of a disease.

DIAGRYDIUM, vide *Scammonium*.

DIALEMMA, idem quod *Pyrexia*, ex *διά* in, & *ἀλπω* relinquo.

DIALEPSIS, est quædam interceptio: item intermissio quædam in fractura cum vulnere vel ulcere, ubi intermedium spatium relinquitur, pro ulceris aut vulneris curatione, itaque est intermissio deligationis, à *διαλέπω* inter relinquo.

DIANOIA, est mens præmeditata, à *διανέω* præmediter.

DIA.

DIAPASMA, Plinio, Medicamentum aridum ex sic-
cis pulveribus conflatum inspersile, quod aut vestibus ad
gratiam odoris, aut ulceri, vulnerique variâ ratione, aut
potui etiam ad luxum inspergitur, Gr. διάσμα, κατά-
σμα; καταπασσόν φάρμακον. *Oribasius* non malè discrimen
inter has voces ex *Antyllo* ponere mihi videtur, ut ἐμπάσ-
ματα sint, quæ sudoribus cohibendis, & commovendo
pruritu adhibentur, quæ *Sympasmata* & *Aspergines Au-
relianus* nominat: καταπασματα sunt, quæ ulceribus su-
perponuntur, ῥέγια etiam dicta: διαπάσματα verò conci-
liandæ fragrantiae ergo inventa.

DIAPYDESIS, est ea conditio vasorum, qua membra-
nacea latera ita divelluntur à causa inus extendente, ut
inter fibras nascantur interstitia hiantia, quæ emittunt in
cavitate contentum ex διά per, & πηδῶ salio, salto. B. uit-
tersting. G. Aufzbrechung. Gall. & A. *Dilaceration*.

DIAPEGMA, est instrumentum Chirurgicum, dictum
& *Intercolumne*, sive pars transversaria, ad crurum late-
rumque compaginem firmandam, à πηδῶ compingo.

DIAPHANUM, est omne quod pellucidum est, ut hu-
mores oculares, tunica cornea, septum lucidum &c. à
διαφαίνω pelluceo.

DIAPHÆNICUM, est compositio ex dactylis. Ex δια
& φῶν, ἔ Dactylus. B. *Conserf van Valen*.

DIAPHORESIS sive **TRANSPIRATIO** & **SUDA-
TIO**, est decedentia omnis generis effluviolorum per invisi-
biles corporis poros, ex διά per, & φέω fero. B. uitwaas-
feming.

DIAPHORETICA, Medicamenta sunt, quæ invisi-
blem perspirationem ex vasis cutaneis minimis augment, san-
guinem paululum magis agitando quàm naturaliter solet.
B. uitwaassende middelen. Gall. *Diaphoretiques*.

DIAPHRAGMA, φέβης seu *septum transversum*, &
dissertum ἰπποζῶνα *Arist.* est sepimentum musculosum tho-
racem ab abdomine distinguens, in medio tendinosum, ex-
terius in ambitu musculolum est; œsophagus, arteria mag-
na, vena cava &c. per illud transeunt: oritur inferiori par-
te dextrâ à tribus primis lumborum vertebra, sinistra ab
ultima & penultima thoracis, tendineo, ac mox carneo,
principio, fibris directis ascendit, tendinescitque; parte
superiori, principio membranaceo tenui statim carnoso ex
toto

toto margine cartilaginosorum apicum costarum inferiorum & infimâ parte sterni ortum, fibris centrum petentibus decurrit, tendinescit, prioribus confunditur, unâ agens ex convexo planum fit, hinc abdomen & contenta arctat & premit; hinc respirationi unâ cum cæteris musculis inservit, & motu suo excrementa alvina foras conveyit, à διαφράσσω sepio, munio. Tribuitur non tantum huic parti illud nomen, sed & Mediastino, septo in naribus, septo cerebrum in duo hemisphæria secanti, auris Tympani membranæ, aliisque, à διαφράσσω, sepio, munio. B. *Middel-rift / middel-schot*. G. Das Zwercckfell, brustfell, gehæge. Gall. *Diaphragme*. A. Midriff, or diaphragme.

DIAPHRATTONTES, sunt membranæ, pleura, dictæ, quæ thoracem intus succingunt, & in medio septum vulgò *Mediastinum*, relinquunt, à διαφράσσω sepio. Vide *Diaphragma*. B. *Middel-schot / middel-rift*. G. Das zwercchfell, brustfell im leib. Gall. *Diaphragmes*. A. The Pleura and mediastin.

DIAPHTHORA, est corruptio alicujus partis in corpore, à διαφθίω corrumpto. B. *Bederving*. G. Verderbung. Gall. *Corruption*. A. Corruption.

DIAPLASIS, est membri luxati vel fracti restitutio, à διαπλάσσω conformo.

DIAPLASMA, est unctio sive fomentum, à διαπλάσσω illino.

DIAPNOE, idem quod *Diaphoresis*, à διαπνίω perspiro. B. *uitwaasseming*. G. Die Aufzâmpfung. Gall. *Transpiration*. A. Exhalation.

DIAPYEMA, idem quod *Empyema*, ex δια per & πύον pus.

DIAPYETICA, sunt Medicamenta pus maturantia, à διαπνίω suppuo.

DIARIA FEBRIS, idem quod *Ephemera*.

DIARRHOEA, est copiosus alvi fluxus, in quo liquida egeruntur absque dolore, sanguine, pure. Diarrhoea in multis morbis evenit, præsertim in quibusdam febribus & habet suas species. I. *Gravis* est, ubi paucis intervallis, interdum fermè citra remissionem copiose per repetitos fluxus, nunc majores, nunc minores, excretis primò fecibus, humores expelluntur visceri, aquei, biliosi, flavi aut aliter constituti unâ cum mucò quodam fundum matulæ

tulæ occupante : adfunt Febris, Anxietas virium Lapsus, neque dolor urget, sed murmur auditur subinde, cum dejectio fit; podex tamen nonnihil dolet, Nausea vel vomitus sæpè incident, & potus vel cibus ingestus unà transit. II. *Serosa*, ubi tantum aquea & fluida prodeunt, cum Murmure, Tenesmo & aliquo dolore : hæc Phthisi, Hydropi, Scorbuto &c. familiaris est, ac subindè in iis, qui sient frigori sustinendo, minus validi, vel quæ à pedibus refrigeratis accidit. III. *Maligna*, quæ est in Peste, Febris malignis, Variolis, Morbillis cum recedere putantur ad interiora, contingit, in hac vires subito dejiciuntur & Anxietates non leves oriuntur. Humores sunt omnis generis, sæpè fætales, atque si à Variolis, etiam crustæ & pelliculæ in Excretis, quasi hâc viâ exirent variolæ, ipsæ apparent. IV. *Critica* dicta, quæ cum levamine evenit in morbis, vel etiam in sanis, quos nisi subindè Diarrhœa juverit, malè habent. V. *Hypercatbarsis*, sive *Superpurgatio*, id est Diarrhœa valida à Medicamento purgante, aut Emetico excitata, à διαρρῖς perfluo. B. *De Loop*. G. Bauch-flusz, durch-lauff, die Ruhr. Gall. *Flux de ventre*, *Cour de ventre*, *la Foire*, *Diarrhée*. A. A diarræa, Looseness or flux of the belly. Lusitan. *Biche*.

DIARTHROSIS, sive ABARTICULATIO, & COARTICULATIO, seu DEARTICULATIO, est compositio ossium ab invicem separatorum ad evidentem, validum, facilemque motum comparata : qualis est in brachio, manibus, femore, pede &c. Vide *Articulatio*. Ex δια per, ex, ἀρθρον membrum, articulus. B. *Unterschied der beenen / losse leding*. G. Gliederung. Gall. *Diarthrose*, *espece d' Articulation*. A. Conjunction of the Bones.

DIASCORDIUM, est Medicamentum aliquod compositum, electuarii consistentia, usitatissimum, à Fracastorio autore inventum, Antidoton famosum.

DIASTOLE, est, Arteriarum, Auricularum & ventriculorum Cordis per impressum sanguinem dilatatio, quæ actio est opposita Systoli, quâ sanguis per diastolen acceptus comprimitur, & expellitur; ex δια per, & εἰλω mitto. B. *Opening des hertzs*. G. Oeffnung des hertzens. Gall. *Diastole ou dilatation du cœur*. A. The dilatation of the heart.

DIATERETICA, est pars Hygieinæ, quâ sanitas firmatur.

ma conservatur, quæ pro ætate & constitutione hominis varia est, ex *διαίτα* victus ratio, & *την* servo. Vide *Diata*.

DIATESSARUM, est Medicamentum ex quatuor ingredientibus compositum, ex Aristolochia nempe, Gentiana, Baccis lauri & Myrrha, quæ Melle excipiuntur, ex *διὰ*, ex & *τεσσαρον* quatuor. B. **Connekens Triakel/ & Paarde Triakel**. Sed nomen nimis vile, pro tam egregio Medicamento.

DIATHESIS, est dispositio corporis sani vel morboſi, quâ ad actiones peragendas benè vel malè sumus dispositi, à *διαθήτης* dispono.

DIAZOMA, idem quod *Diaphragma* seu *Septum Transversum*, ex *διὰ* & *ζῶμα* cingulum.

DICHALCUM, est pondus duorum æreolorum, continens tertiam oboli partem: Obolus enim habet æreola sex.

DICHOPHYIA, est capillorum vitium, quando extrema eorum bifariam plerumque in partes finduntur, ex *δι-za* dupliciter, & *φύω* cresco. B. **Spltinge des harrs**.

DICROTUS, est pulsus bis feriens, ex *dis* bis, & *κρῶω* pulso. B. **Dubbelt slaande pols**.

DICTAMNUM, **DICTAMNUS**, species est Origani; planta est pulchra & visui grata, caules habet duos circiter pedes altos, villosos, purpureos, ramosos, aut in alas divisos; folia obrotunda, & parum acuta, lanuginosa, odorata, saporis acris: flores cum verticillis in longas & laxas spicas congeruntur, coloris purpurei, in singulo flore galea est erecta, bifida, subrotunda, barba tripartita: semina quatuor subrotunda, in capsula, quæ flori tanquam calix inservivit, inclusa; radix parva, numerosa: creſcit hæc planta in Candida, in monte Ida unde ad nos sicca defertur; nomen accepit ἀπὸ τοῦ τίκτειν à pariendo, quod parientibus opituletur, opemque promittat hæc planta. Gall. *Dictame de Candie ou de Crete*.

DICTAMNUS ALBUS, vide *Fraxinella*.

DIBYMI, sunt gemelli, unico partu editi. Item Testiculi, à *δύο* duo.

DIES CRITICI, vide *Critici dies*.

DIGASTRICUS sive **GRAPHOIDES**, est musculus biventer, qui à processu mammiformi ortum adipiscitur; descendens tendinem facit, quo per musculum stylohyoideum,

deum, & ligamentum annulare hyoidis transit, indè rursus carnosus fit, & in parte menti interiori mediâque interius definit; & maxillam inferiorem deorsum trahit, ex his, & γαστήρ venter. B. *Zwey-baukige spier*. G. Der zweybauchige mausz. Gall. *Muscle Digastrique*. A. The two bellied muscul.

DIGERENTIA, vocantur medicamenta, quæ vulneri, aut ulceri applicata, illa in hanc conditionem disponunt, ut bonum in iis nascatur pus, quod sit liquida allata conservando ab acredine, & vascula excrefcentia ita moderando, ut nec luxurient, nec exedantur nimis, vel arida fiant. *Digestiva* quoque vocantur. B. *Erreina: kende ding*. G. Eyer machende mittel. Call. *Digestifs*. A. Digestive.

DIGESTIO, est, cum tincturæ, infusiones, &c. blando ignis calore foveantur, ut res crudæ in iis latitantes dissolvantur, crassæ incidantur, viresque affuso liquido communicent, inutiles verò in fundo desidant; atque hæc peragitur arenâ calefactâ, fimo equino, athanore &c. B. *Digerering / dooz warnte uthaling*. G. Digerirung. Gall. & A. *Digestion*.

DIGESTIVA, vide *Digerentia*.

DIGITALIS, est planta, quæ habet caulem duos vel tres pedes altum, crassum instar pollicis, angulosum, villosum, rubicundum, excavatum: folia serè verbasco similia, oblonga, acuta, in margine incisa, villosa, superne atro-virentia, infernè incana: flores monopetali tam singularis structuræ, ut perfectè referant digitabula parte anteriori, in bina labia sunt dissecti, coloris purpurei, juxta caulium longitudinem plerumque nascentes, pedunculis brevibus villosis caulibus adhærentes; his floribus decisis sequitur fructus oblongus, villosus, in duas cavernulas divisus, semina exigua continens: radix est fibrosa, amara: hæc planta crescit in locis arenosis siccis, præsertim in montibus. Quæ à similitudine florum, qui digitale pulchre referunt ac exprimunt, nomen habet. B. *Dingerhords-kruid*. G. Fingerhut, finger-kraut. Gall. *Digitale*, *Gants nostre dame*. A. Fox glove.

DIGITUS, siye δάκτυλος. Singulis manibus, singulisque pedibus tribuuntur quinque. In Manu habemus *Pollicem*, *Indicem*, *Medium*, *Annularem*, & *Auricularem*. In

pedibus propriis nominibus non gaudent. Est item quædam mensuræ species, quibus rerum intervalla metiuntur. B. *Den duim / de wps vinger / middel vinger / ringvinger / pinch.* G. Der daum, der zeiger, der mittelfinger, der gold-finger, der klein finger. Gall. *Le ponce, le doigt indice le milieu, l'annulaire, le petit doigt.* A. Thumb, Fore finger, middle finger, ring-finger, little finger, *in Pede.* B. *Toozen.* Gall. *Orteils.*

DIGLOSSON, seu HYPOGLOTTON, vocatur etiam *Laurus Alexandrina*, Latinis *Bislingua*, quod supra folium, aliud foliolum linguæ simile, gerat, ex δις duplex, & γλῶσσα lingua.

DILATATIO, est, cum meatus vel receptacula plus debito distenduntur, ut in Varice, Aneurismate &c. Gr. *ἐρευσμός*, ab *ἐρέω* dilato, amplio. Item, significat diastolen cordis. B. *En verwyderinge.* G. Aufzbreitung, Aufzstreckung, Gall. & A. *Dilatation.*

DILATATORIUM, est instrumentum Chirurgicum quo uterus, vel os ejus dilatatur & aperitur; vocatur etiam *Speculum*, & *Dioptra*, quia per id in os vel uterum introspicimus. B. *En verwyderend instrument.* G. Ein Ausbreitend instrument. Gall. *Dilatatoire.* A. An instrument to stretch out, or open any place.

DILUENTIA, sunt quæ permixta alicui fluido, ejus partes magis fluidas, vel partes antea non fluidas, jam fluidas reddunt, eâ lege ne immutent partes ipsas. B. *Verduinnende middelen.* Gall. *Diluyans.*

DILUTUM, dicitur quod est mixtum: undè vinum aquâ mixtum dicitur *Dilutum*. *Dilutum* verò substantivum factum, est id liquidum, in quo aliquid certo tempore maceratum & infusum fuit: ut si in vas vini appositum absinthium fuerit, deindè post interjectum tempus abstractum, id vinum absinthii *Dilutum* vocatur, idem quod *Infusio*.

DINICA, sunt Medicamenta contra vertiginem, à *δινέω* circumago.

DINUS, idem quod Vertigo, à *δινέω* circumago.

DIOBOLON five GRAMMA, est obulorum duorum pondus, five scrupuli unius, ex δις & ᾠλα.

DIONYCIA, vide *Hedera*.

DIOPTRA, est speculum matricis, five dilatatorium, quo

quo uterus, in foetus mortui extractione ejusque ulcerationum inspectione, dilatando ampliatur, à *διωπτορεν* perspicio. B. *Een Moeder-verluyderend instrument / een Moeder-spiegel.* G. Ein Mutter-spiegel. Gall. *Dilatatoire de la matrice ou speculum matricis.* A. An Instrument to open the womb.

DIORTHOSIS, est operatio Chirurgica, quâ membra aut corpora curva in debitum statum restituuntur, à *διορθών* corrigo, emendo.

DIOTA, est vas circulatorium à duabus auribus, utrumque brachium lateribus applicatum amplexantibus, dictum. Hujus inferior pars est in modum cucurbitae, cui impositus est alembicus, in summo canalem, qui liquori infundendo inserviet, habens, in loco autem conveniente duobus rostris incurvatis & in cucurbitam à capitello humorem condensatum devehentibus praeditum, ex *διε* duo & *ῥε* auris. B. *Een vat niet twee ooren / een dubbelt vat.* G. Ein zweyhencklicht fasz, das zwey oehr hat. Gall. *Vaisseaux à deux anses.* A. A Vessel with two handles. Item est vasculum vel poculum, ex ligno odore confectum & resina incrustatum. B. *Een riekende beker.* G. Ein wolriechendes becherlein. Gall. *Coupe odorante.* A. A Sweet smelling cup.

DIPCADĪ, est species Hyacinthii botryoidis; ex vox barbarica, dicitur & *Tipcadī*.

DIPHRYGES, est genus recrementi metallici, quod subsidet, dum aes in fornace fusum aqua frigida perfunditur.

DIPLASIASMUS, est morborum reduplicatio: Item duo muscoli brachii circumductioni inservientes, à *δωπλόω* duplico, vel *διωπλάσσει* duplo major.

DIPLOE, est vas duplex, quod Chymicis usu venit, uti quando vas continens alio vasi arena, cineribus aut aqua repleto imponitur. B. *Dubbelt vat / een bad.* G. Ein zweyfach fasz. Gall. *Vaisseau double.* A. A double vessel: à *δωπλόω* duplico.

DIPLOE, seu **DIPLOSIS**, est Cranii duplex tabulatum, paries, squama, seu lamina. Dicitur & tabula, quarum inferior vitrea, ob teneritudinem appellatur. Sive potius est substantia cellulosa, inter utrasque lamellas, quibus constat cranium, interjecta, in qua continetur substan-

ua medullosa cranii. B. *Perfen-tafels / tafel-scheidfels* / het mergachtig deel tusschen beide de tafels van 't bekkemel. G. Die fugen der Hirn-schalen. Gall. *le Diplœ*.

DIPLOMA, idem quod *Diploë*. Sumitur aliquando pro linteo complicato, πτύμα *Agineta*, πτύμα εἰς δύο, διπλωμα *Hesychio*, *Plagella Celso*, *Aurel. B. Compres / gebouwen band / een opgerolde band*. G. Ein Truch tuch, ein distillier zeug. Gall. *Compresse*. A. Complicated linnen.

DIPSACUS, Est planta, quæ habet caulem quatuor vel quinque pedes altum, pollicis crassitie, erectum, firmum, ramosum, striatum, spinis quibusdam parvis cinctum: folia sunt longa, lata, bina opposita, juxta longitudinem caulis & ramorum in dorso & latere hirsuta, positu suo pelvis vel lavacri speciem constituunt, ubi humor semper continetur: flos est flosculosus, flosculis scilicet in capitulum quoddam collectis favis æmulum; capitulum autem componitur ex plurimis foliis imbricatis, squamarum instar positis, & axi medio affixis, è quorum alis surgunt flosculi multifidi, Embryonis parti supremæ insidentes, & abeuntes deinde in semen plerumque striatum quadrangulare, oblongum: radix lævis, candida, impenitè amara est. Est *Carduus fullonum*: ejus folia ita constituta sunt, ut circa truncum alterum excipiat alterum, ita ut catini instar aquam semper fervent, ac si truncus sitiret, vel nomen à contrario invenit, quoniam concavo alarum sinu, rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad abigendas sitis injurias abutitur, hinc à διψᾶ sitio. Latinis *Labrum Veneris*, nempè à catinato foliorum habitu hoc nomen contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, pelvis vel lavacri speciem constituunt, & intra se humorem nunquam non retinent. *Virga Pastoris* haud dubiè dicta est, ob longas virgas, quibus cardui ad poliendos pannos utiles insident, quas pastores fortè sumunt, & ea parte qua possit manu capi aculeis nudant, reliquâ autem aculeatâ parte gregem ducunt. *Carduus* verò *Fullonius* coepit appellari, quod ea rudes pannos, velut echino quodam expoliant, detractisque floccis concinnant. B. *Kaarden / Dolderg-kaarden*. G. *Carten-distel*, *Weber-karten*. Gall. *Chardon de Foulon*, *chardon à Bonnetier*, *chardon à carder*, *Verge à Berger*. A. *Tsafel*.

DIPSACUS, idem quod *Diabetes*.

DIPTAMNUM, idem quod *Diſſamnum*.

DISCRETORIUM, eſt idem quod *Diaphragma*. Sic dictum quia Thoracem & ventrem, caſu tamen, diſcernit.

DISCRIMEN, ſaſciarum ſpecies eſt, quæ in frontis phlebotomia & temporum, adhibetur.

DISCUTIENTIA, ſunt medicamenta, quæ liquidum in vaſis, vel extra ea, ſive ſtagnans, ſive coagulatum ſubtilitate ſua diſſolvunt, diſſipantque ſine ſolutione ſenſibili continui in externis. B. *Verdyppende middelen*. G. *Verreibende mittlen*. Gall. *Diſcuſſifs*. A. *Diſcuſſing medecines*.

DISLOCATIO, idem quod *Luxatio*.

DISPENSATIO, Pharmacopœis dicitur, quando ſimplicia alicujus compoſitionis ordine diſpenſantur, ne quid ingredientium obliviſci poſſit.

DISPENSATORIUM, dicitur *Liber Pharmaceuticus*, continens omnia Medicamenta tam ſimplicia quàm compoſita, ſecundùm mentem Doctorum, qui in hac vel illa urbe praxin exercent, uti eſt Amſtelodamenſe, Londinenſe, Bruxellenſe &c. Dicitur quoque *Pharmacopœia*. Ex hiſce Medicamentis ſecundùm normam, & doſin officina Pharmaceutica inſtruitur. B. *Gen Apotekers Winkelboek*. G. *Apoteker-buch*, *Apoteker taxe*. Gall. *Diſpenſatoire*. A. *A Diſpenſatory*.

DISPOSITIO, eſt habitus, quo ad actiones peragen-
das, benè, vel malè ſumus diſpoſiti. Vide *Diatheſis*.

DISSEPTUM, idem quod *Diaphragma*.

DISSIMILARES, partes ſunt, quæ in varias partes ſibi diſſimiles dividi poſſunt; ut manus, vena, muſculus, quibus opponuntur ſimilares. B. *Deeten die malkander niet gelyk zyn*. G. *Ungleiche theilen*. Gall. *Parties diſſimilaires*. A. *Diſſimilar parts*.

DISSOLVENTIA, idem quod *Diſcutientia*.

DISSOLUTIO, eſt, quando metalla, lapides, ſalia, reſinæ, aut aliud quid in ſpiritu vini aliove liquore diſſolvuntur. Vel quando corpora arte Chymicâ, in ſua elementa rediguntur. B. *Gen ontdoeninge / diſſolutie / ontbinding*. G. *Auſceſung*. Gall. & A. *Diſſolution*.

DISTENSIO, eſt, quando partes ab alio inflantur, dilatantur, & relaxantur, ut ex efferveſcentiis vel contractionibus in inteſtinis concitatis, oriuntur ſtatus & non raro preſſiones doloreſque. B. *Gen uittrekkinge*. G.

Aufzstreckung. Gall. *Distension*. A. Distension.

DISTICHIA, & **DISTICHIASIS**, est duplex pilorum in palpebris ordo. Item continuus Lachrymarum defluxus, à pilorum in palpebris, ordinariis pilis subnascens, punctione, ex *dis* malè, & *εἰς* incedo, vel ex *dis* & *εἰς* pilus. B. **Dubbele harkens der Oogschelen**.

DISTICHIUM, vocatur Hordeum minus seu æstivum: sic dictum quod spica tantum duos granorum ordines habeat.

DISTORSIO, est, cum partes situ aut figurâ peccant. B. **Verdappinge / verwinging**.

DISTRIBUTIO, intelligi potest de quocunque humore singulari per corpus distributo; ut cum chylus ex ventriculo & intestinis papillas intestinales (à Willisio *tunica glandulosa* dicta est) subeat, & per venas lacteas, ductumque chyloferum, in venam subclaviam exantlatur, ut unâ cum sanguine circuletur & purpureo colore induatur. Vel quando sanguis ex corde, & succus cerebialis ex nervis per totum corpus distribuatur, & talis distributio vocatur *διὰδοσις*. Verum de excrementis, dicitur *διαχωρησις*. B. **Distributie / uitdeilinge**. G. Aufztheilung. Gall. *Distribution, Division, Partage*. A. Distribution.

DIURESIS, est urinæ per renes secretio, quæ hoc modo peragitur: adjacent arteriis renalibus exiguæ glandulæ, vel laterales arteriolæ cincinnatæ, quibus serum à sanguine secernitur, & per canaliculos exiguos, (ex quibus renum substantia maximâ ex parte constat) ad carunculas papillares, & deinde ad pelvim, ureteres, vesicamque foras deducitur, ex *διὰ* per, *ῥέω* fluo. B. **Pis-schepping / pissen**. G. Harnen. Gall. *Secretion d'Urine*. A. Urine.

DIURETICA, seu **URETICA**, urinalia Medicamenta *Aurel.* sunt Medicamenta, quæ sanguinem incidendo & dissolvendo, serum per renes, ad vesicam copiosius determinant, ex *διὰ* per, *ῥέω* urina, & *ῥέω* fluo. B. **Pisdrivende middelen**. G. Harn oder wasser treibende mittlen. Gall. *Diuretiques*. A. Medicines Causing Urine, or piss-drivers.

DODECADACTYLUM, sive **DUODENUM**, est intestinorum tenuium primum, à ventriculi pyloro incipiens, & primo perpendiculariter, deinde horizontaliter, à dextra abdominis parte versus renem sinistram, excurrit: recipit,

capit, ad trium vel quatuor digitorum distantiam à pyloro, oscula ductus cholidochi & pancreatici, pro bilis & succi pancreatici susceptione: tunicarum ejus crassities major, quam reliquorum tenuium; sed cavitas ferè minor; glandulas Brunneri copiosissimas habet: terminatur ubi jejunum incipit, ex δώδεκα duodecim, & δάκτυλ digitus, ob longitudinem duodecim digitorum; quod tamen in nostris hominibus nunquam observatur; fortè Veteres ex brutorum inspectione hallucinabantur, fortè erunt digiti tantum transversi. B. *De twaalf vingerige darm.* G. Der zwölff finger darm. Gall. *Duodenum.* A. The gut duodenum.

DODECAPHARMACUM, est compositio constans ex duodecim simplicibus, ut unguentum Apostolorum. Ex δώδεκα, duodecim, & φάρμακον Medicamentum.

DODRANS, est pondus unciarum novem. Item mensura duodecim digitorum, alias palmus major Latinis, & Gr. σπιθαμή dicitur. Dodrantalis itaque cauliculus vocatur, qui longitudine duodeno æquat digitos.

DOGMATICA, MEDICINA, seu **RATIONALIS**, quæ ex observatis & analogia ratiocinatur hujus author fuit *Hippocrates*, & post eum *Galenus*, qui experientiae rationem addidit, ita à δοκίω censeo. B. *Gen regelnmatige Medecyne.* G. Eine regelmäßige und verständige Artzney. Gall. & A. *Medicine Dogmatique.*

DOGMATICI, sunt, qui experientiae rationes inquisitione. B. *Rechtmatige Medicyns.*

DOLICHOS, est similax hortensis seu phaseolus, est inter leguminum species, nomen accepit à longitudine siliquarum aut fructuum, δόλιχ enim est longus.

DOLIUM, idem quod Lolium, mutato L. in D.

DOLOR, Gr. ἄλγημα, ὀδύνη, πόνος. Quid sit, dici non debet, cum nemo sit, cui id persuadeas, nisi aut dolet, aut doluerit aliquando, quod animadverti debet adversus eos, qui putant, se bene definivisse, cum dolorem dixerint esse vel continui solutionem, vel periculum ruptionis fibrarum, vel denique summam distensionem, à qua ruptionis periculum abesse nequit, sed in iis non consistit dolor. Verum dolor est ingrata perceptio in mente orta, quod Nervus, ex Cerebro originem habens, tam valide per causas distendatur, ut periculum ruptionis incurrat.

Si autem rumpitur, non ampliùs ille dolet, sed rami nervosi laterales jam magis quàm antè distracti, cum sensum excitant. Pro varietate etiam variant nomina, ut *Algens*, si frigus adsit. *Gravativus*, si caput vel alia pars gravatur. *Pungens*, quando gladii instar pungit. *Ostocopus*, quando dolor circa ossa est. *Stupidus*, si vix sentiat, aut saltem ferri possit. *Tensivus*, quando tensio adsit. Sic à parte affecta, etiam varia sortitur nomina. In capite *Cephalalgia*, *Cephalæa*, *Hemicrania*, *Crapula*, &c. Circa articulos, *Arthritis* dicitur. In renibus *Nephritis*, in alvo *Colicus* &c. B. *Ppn / wee*. G. Der Schmerz. Gall. *Douleur*. A. A. Pain.

DONAX, idem quod *Calamus*.

DORIA HERBA, est species Solidaginis saracenicae. Nomen accepit ab *Andrea Doria*, Genuensi Duce, qui eam ex Africa attulit. Quidam Dorian à luteo aureoque colore, nomen accepisse dicunt: Aurum enim Gallis *Or* appellatur.

DORONICUM, est planta officinalis, quæ habet folia ampla, subrotunda, viridia, lanuginosa, cucumeris satis similia, sed magis exigua, & molliora: caulis pedem circiter altus est, parùm lanuginosus, rotundus, striatus, in summitate in plures ramusculos divisus, floriferos: flos est radiatus Astere major, flavus: hujusque discus ex flosculis, corona ex semiflosculis componitur, semen est paposum, minimum, nigricans, calidum est, ac sudoriferum insigne: radix composita ex radiculis oblongis, rotundis, tuberosis, nodosis, digiti minoris crassitie, ex viridi pallescentibus, plures ex uno capite tenuibus quasi filis dependent, saporis subacris, subdulcis, ad Glycyrrhizam accedentis, odoris nullius, saporis minùs aromatici, quàm Glycyrrhiza. Hæc quibusdam suspecta est & venenata habetur, quia quibusdam animalibus exitiosa deprehensa fuit, undè non Doronicum, sed dæmoniacum appellat Marantha, & fortè quia gustata in faucibus relinquit aliquam acrimoniam, & infestâ dulcedine os replet; qui venenatam dixerunt, crediderunt esse Aconitum Theophrasti à *δορον* & *νίχην*: sed illam venenatam esse adhuc minimè constat. Avicennæ *Durinigi* & *Doronigi*, atque hinc developitur *Doronicum*. G. Gæmbsen-wurtz, Schwindel-kraut. Gall. *Doronic*. A. Leopards-bane.

DOR-

DORSUM, seu Tergum, pars thoracis posterior dicitur. Gr. *σῶτον*. *Dorsum manus* vel *Pedis*, est exterior eorum facies. Ita gibba nati, scapulæ & illi ossis pars etiam dorsum appellatur. B. *De Aug.* G. Der Ruecken. Gall. *le Dos*, *l'Escbine*. A. The Backe.

DOSIS, est Medicamenti determinata portio, sive quantum unicâ vice exhibetur vel propinatur, à *δίδωμι* do. B. *Wiste*. G. Gewisse Mafz einer Artzney. Gall. *Dose*, *Priſe*. A. A Dose.

DOTHIEn, idem quod *Furunculus*.

DRABA, vide *Arabis*.

DRACHMA, est & pondus & mensura. *Ægyptiaca* fuit olim & *Attica*. Illa pendebat obolum, hæc verò scrupulos tres, vel obolos sex, ut & hodie in officinis. Octo constituunt unciam. Signatur signo ʒ olim *δραχμή* dicta fuit. Et signabatur cum A quod ab inferiore parte • habebat, quandoque manipulum significat, à *δραπέτομαι* prehendo, manu corripio. B. *Een drachme / een vierendeel loots*. G. Ein drachme, der vierte theil eines loths, een quintle. Gall. *Drachme*. A. A Dram.

DRACO HERBA, Est planta, quæ habet caules plures, tres pedes altos, tenues, duros, parum angulosos, folia plurima gerentes longa & angusta instar lini, odorata, coloris viridis, obscuri, splendentia, saporis acris, aromatici, cum dulcedine quadam grata Anisum referente : flores in summitate caulis crescunt instar abrotani, sed minimi, his succedunt fructus parvi, rotundi, & squammosi, qui singuli continent semen : radix longa, ramosa : est herba non insuavis odoris ac saporis : ejus nomen videtur fuisse *Taracon*, *Tarchon*, *Tragum*, *Tragium* &c. hinc mutato T in D, oritur *Draco*, & B. *Dragon*. G. Dragon. Gall. *Estragon*, *Dragon*. A. Taragon.

DRACŌ ARBOR, & **DRACONIS SANGUIS**, est arbor exotica, cujus lachrymæ rubicundum & sanguineum fundunt succum resinofum, undè ei nomen inpositum : additur *Draconis*, quoniam profluit ex arbore *Dracone* dicta, ex cujus cortice vel descisso, vel spontè destillat. B. *Waken-bloed*. G. Drachen-blut. Gall. *Sang de Dragon*. A. Dragons-blood.

DRACONIS SANGUIS, est *Lapathum Rubrum*, cujus folia costas habent obscure rubicundas, seu sanguineas.

neas. B. *Wraaken-bloud*. G. Drachen-blut. Gall. *Sang-Dragon*. A. Dragons-blood.

DRACONTHÆMA, idem quod *Sanguis draconis*. Ex *δράκων* draco & *αἷμα* sanguis.

DRACONTIA, Est planta, quæ habet unicum caulem tres pedes circiter altum, pollicis crassitie, erectum, cortice tectum cutim serpentis referentem : folia profundè incisa in magnas, varias, & profundas lacinias, angusta, polita, carnosæ, splendentia, caulibus longis & fungosis adhærentia, cætera ut in aro : radix est crassa, ferè rotunda, carnosæ, externè coloris flavescentis, internè albescentis, saporis dulcis : crescit hæc planta in locis umbrosis, præsertim in regionibus calidis. *Dracontium*, *Dracunculus*, *Serpentaria*. Nomen à figura sumpsit : caulis enim glaber purpureisque respersus lituris, versicolori facie, corpus anguinum repræsentat, & æquat longitudine. Vertex quoque sinuoso oris hiatu, linguam exerens cruentam, caput exprimit. Atque hinc est quòd Veteribus etiam Romanis *Colubrina* ac *Serpentaria* nuncupata sit : vel sic dicta, quòd è terra ad primas serpentium vernationes exeat, rursusque cum iisdem se in terram recondat, nec omninò occultata ea appareat serpens : dicitur & polyphyllus. B. *Sperer-wortel* / *Sperer-kruid*. G. Schlangenkraut, drachen-wurtz. Gall. *Serpentaire*. A. Dragon-wort.

DRACUNCULUS, idem quod *Dracontia*.

DRACUNCULUS, est ulcus quod nervum ipsum pervadit : Item lumbricus longus, planus, non admodum latus, albus, qui cruribus Indorum frequenter innascitur, à *δράκων* draco. B. *Wraak-gezweer* / *Wraak-worm*. G. Drach-geschwær, drach-wurm. Gall. *Serpentaire*. A. A Dragon ulcer vel worm so called.

DRAGETA, idem quod *Tragea*.

DRAGMA, idem quod *Manipulus*.

DRAGMIS, idem quod *Pugillus*.

DRASTICA, sunt Medicamenta præsentissima & multarum virium; in specie sic vocantur purgantia fortiora. à *δράω* facio. B. *Dan stonden aan helpende middelen*. G. Bewahrte Artzney.

DROPACISMUS, est medicamentum externum, partibus rubefaciendis, adeoque motum in iis excitando, dictum, quo membra externa omnia extenuata; resoluta, fri-

frigida & humida, oblini solent. Estque vel simplex vel compositus. *Simplex* ex pice modica oleo liquata, constat. *Compositus* præter picem oleo liquatam, recipit etiam piper, pyrethrum, bitumen, semen rorismarini: & si opus sit siccare, *Sulphur vivum*, *salem*, *cinerem sarmentorum*; sin vellicare *Euphorbium*. Forma varia est, quidam enim emplastri referunt, alii cataplasmatidis formam. Lat. *Picatio*, à *δέγω* decerpo, colligo. B. *Ein pik-pleister* / *zais om het hair uit te trekken*. G. Ein Pech-pflaster. Gall. *Dropacisme*.

DROPAX, idem quod *Dropacismus*.

DROSOMELI, vide *Manna*.

DRUS, seu *Δεῦς*, quercus, à *δέγω* excortico, ejus enim cortex *Βυροδίσκος* usui est: vel à *δέρω* erumpo, pullulo. Veteres omne genus arboris *δένος* appellatione intellexerunt: posterioribus *δέν* omnem arborem glandiferam tantum significat, & præsertim *Quercum*. Etymologia fit quoque à *δέλω* seu *δείω* arboribus & herbis vireo.

DRYPEPES, *Oliva*, sic vocatur quod fructus ex arbore cadant, ex *δέν* arbor, ut apud Veteres, & *πίπτω* cado.

DRYOPTERIS, est Filicis species, & propriè Polypodium quercinum, ex *δέν* quercus, & *πτερίς* ala, quod folia alarum in modum se expandant.

DRYPIS, est planta spinosa, à *πρὸ τοῦ δρύπτειν* à lancinando, pungendo, vellicando.

DUCTUS ADIPOSI, vide *Sacculi Adiposi*.

DUCTUS AQUOSI, vide *Venæ Lymphaticæ*.

DUCTUS BILARIUS, vide *Porus Bilaris*.

DUCTUS CHYLIFERUS, est canalis, qui à superiori Réceptaculi parte oritur, sive est tantummodo Réceptaculum in arctiorem canalem protractum simili, tenui, membranosa, satis tamen firma, tunica formatum, valvulis instructum, idcirco ubi chylo repletus, candidus apparet, ubi verò inanis collabitur, ægrè, nec nisi ab exercitato reperitur, ab hac origine (sæpè duplici, mox coeunte) flexuoso quodammodo (quandoque insulam formans) mox recto itinere adscendit, in media corporum vertebrarum thoracis sede, medio inter venam sine pari à dextris & aortam descendentem à sinistris loco; ita tamen ut aorta ipsi maximam partem incumbat: & hic est locus ille, ubi certissimè in quocumque cadavere reperiri potest ille

ille ductus; nam licet inanis & collapsus sit omninò, levè ibidem loci, inter azygam & aortam vulnuscùlo pleuræ inflicto, atque illa paululùm distracta, certò reperitur: pergìt dein. à descripto loco, semper incumbens vertebriis, sub Oesophago, subter arcum venæ azygæ; (quæ arcum venosum in dextro latere, uti arteriosum aorta in sinistro format,) inde supra corpora vertebrarum sinistrorsum inclinat, pergìt subter soporalem arteriam sinistram, usque ad medium ultimæ cervicis vertebræ, toto hoc decursu, sæpè infulas majores, minores, vario loco efformans; decurrit in cellulosa quadam substantia, sæpè ut alibi in corpore, pinguedine infarcta, sub pleura membrana, adeoque extra thoracis cavum, æquè ac vasa spermatica, ureteres &c. hâc ratione extra cavitatem abdominis, sub peritonæo decurrere dicuntur: postquam ad mediam ultimæ cervicis vertebræ sedem sinistrorsum inclinando adscendit, ibi arcus forma incurvatus, sinistrorsum deorsum tendit, pone venam jugularem internam sinistram, & terminatur ubi plurimùm in venam subclaviam sinistram, à parte postica, sub valvulis venæ jugularis internæ: præter valvulas semi utriculares, & geminatas, quæ in toto hoc ductu reperiuntur, quæque parte suâ convexâ receptaculum chyli, parte concavâ venam subclaviam respiciunt, datur & altera semilunaris, aperturæ ductus thoracici in venam subclaviam apposita, ita ut cornua ejus venam subclaviam respiciant, admittens liquidum ex ductu in venam subclaviam, sed regressum ipsi negans. Usus est Chylum & Lympham versùs cor, ex intestinis, & partibus inferioribus vehere & adducere: hinc non incongruè dici potest, vena cava chyli & lymphæ. vid. *Sacculus chyliferus*. B. *De gyl-leider / gyl-boeder / dauw-boeder / boesthuis*. G. Der gylfuehrer, der brust-kanal. Gall. *Le conduit du Chyle ou Thoracique*. A. The Thoracik duct.

DUCTUS COMMUNIS. vid. *Vesica fellis*.

DUCTUS HYGROBLEPHARI, sunt quidam ductus, qui intra palpebras succum exonerant lymphaticum, quo oculi continuò, ne arecant, irrigantur, ex ὑγρὸν, humidum & βλεφάρων, palpebra. B. *Oogledeus bevoigtigers*. Der Auglieder Wasser Røhre. Gall. *Les Conduits aqueux*. A. The ducts wherewith the eyes are moistened.

DUCTUS HYGROPTALMICI, idem ac *ductus Hy-*

graphlephari, ex ὑγρὸν humidum & ὀφθαλμὸς oculus.

DUCTUS LACHRYMALES, sunt, qui omnem lympham, quâ oculi irrigantur, suscipiunt, & per narium ossa incedentes in nares sese exonerant. B. *Traanbuiszen*. G. Der thränen kanal. Gall. *Trous lachrymaux*, *Conduits lacrymaux*, *Sacs lachrymaux*, *Conduits de Larme*. A. The lachrymal ducts.

DUCTUS PANCREATICUS, est canaliculus, ex pancreate ortum ducens, qui juxta, vel non procul à ductu bilario intestino inferitur; succum vehit Lymphaticum, quem in intestinum duodenum mittit, ad cibum (à fermento acido ventriculi & bilis admixtione) volatilifandum & fermentandum: Doctiss. *de Graaf* succum subacidum ex ipso ductu emulgere novit; alii etiam Medici cordati, inter quos *Phil. Matthæus Junior*, *Dam. Paisenius*, *Dom. Michaël Behm &c.* de succo istoc acido non parum ambigunt, & de morbis quibusdam, quos ex effervescentiis acidi succi pancreatici cum bile in duodeno derivat *Excell. Dom. Sylvius*, hætenus valde dubitant. Nos autem interdum pr. sanitatem acidum inveniri affirmamus, sæpè etiam salsum, & austerum; frequentius tamen insipidum & volatile, vide Anat. nostram Reform. B. *De albleis-buis / de groote filters-buis*. G. Der Pancreatische kanal. Gall. *Conduit Pancreatique*, ou *Conduit de Virsung*. A. The pancreatick duct.

DUCTUS RORIFERUS, sic à *Nobiliss. Bilsio* dictus, idem est quod *Ductus Chyliferus*.

DUCTUS SALIVARES, sive salivarii, sunt meatus qui à glandulis maxillaribus, parotidibus, sublingualibus, & glandulis parvis, per totam membranam oris, præcipue per labra, palatum, buccas & linguam dispersis producti, succum salivalem effundunt in os, ad cibi solidioris dilutionem, missionem, solutionem, masticationem, deglutationem, & nonnullam fermentationem promovendam. B. *Specksel-baten*. G. Geiffer sætze, speichel røehre. Gall. *Conduits salivaires*. A. The salivall ducts.

DUCTUS THORACICUS, idem quod *Ductus Chyliferus*.

DUCTUS UMBILICALIS, vide *Funiculus Umbilicalis*.

DUCTUS URINARIUS, idem quod *Ureter & Urethra*.

DUCTUS VIRSUNGIANUS, sic dictus ab inventore 1642. *Joan. Georgio Wirfung*. Idem quod *Ductus Pancreaticus*.

DUELLA, est Veterum pondus, pendens octo scrupulos.

DULCAMARA; seu GLYCYPICRIS, est Solani species, sic dicta quod saporem inter dulcem & amarum habeat; flore & fructu quidem refert solanum, verum ad distinctionem aliorum solanorum, dicitur solanum scandens, & non habet vires narcoticas solanorum; si pars recenter avulsa manducetur, per totum os amaritiam diffundit, & paulò post dulcedinem mellitam. B. *Wils-ranken*. G. *Hunds-kraut*, je länger, je lieber, bitter-süß. Gall. *Dulcamere*. A. Woody Nightshade or bitter-sweet.

DULCEDO AMORIS, vide *Clitoris*.

DULCORATIO, idem quod *Edulcoratio*.

DUELLA, est tertia unciae pars, octonis scrupulis terminata.

DUODENUM INTESTINUM, vide *Dodecadaetylum*.

DUPONDIIUM, pendet Drachmas quatuor, seu semiunciam. B. *En Hood*. G. Ein Loth. Gall. *Demi once*. A. An half ounce.

DURA MATER, vide *Mater dura*.

DYSÆSTHESIA, est difficultas seu vitium sensuum, ex δύς difficile, & αἰσθάνομαι sentio.

DYSCINESIA, est movendi impotentia, sive sit immutata, sive abolita. B. *Onnagt om te bewegen*. G. Da man sich nicht bewegen kan. Gall. *Impuissance à se mouvoir*.

DYSCRASIA, est inæqualis particularum in sanguine, vel succo nervoso mixtura, à δύς difficile, & κρᾶσις mixceo, tempero. B. *Ongehalte / onnatigheid*. G. Veränderte gestaltnis. Gall. *Dyscrasie*. A. Idem.

DYSECOIA, est audiendi difficultas, ex δύς difficile & ἀκούω audio. B. *Swaarhoorig*. G. Harthörung, Taubheit. Gall. *Ouïe dure*. A. Heaviness of hearing.

DYSELSES, (cui opponitur *Euelces*, vide suo loco) est is, qui ulceribus curatu difficillimis laborat, ex δύς difficile, & ἔλκος ulcer. B. *Die quade zweren heest*. G. Der böse geschwer hat.

DYSENTERIA, Lat. *Termina*, est Diarrhoea cum Tenesmo

neſſimo leuiore vel graviore, totiuſque ventris torminibus, ac ſanguinis, etiam puris excretionem; hiſce accedunt anxietates magnæ, dejectiones frequentes, quæ ſæpè habent brevía intervalla, deinde mucus & pelliculæ prodeunt, quando Dyſenteria alba dici ſolet; ſiti adhuc, febri, inquietudine, viriumque imbecillitate laborant. Sed Dyſenteria aliquando Epidemicæ ſunt, aut cum peſte, & in urbibus vel caſtris multos uno tempore affligunt. Nonnunquam excreta halitum exſpirant qui adſtantes inficiunt, à δὺς difficile, ἔντερον inteſtinum & ῥέω fluo. B. *Woo-loop / rood mciſzoen / bloedgang*. G. Die rothe Ruhr, der blutgang. Gall. *Dyſenterie, Trenchée de ventre, Flux de ſang*. A. The Bloody flux or dyſentey. Luſit. *Biche*.

DYSEPULOTICA, ſunt ulcera maligna, curationem reſpuentia, ex δὺς difficulter, ἐπὶ ſuper & ἑλθ integer. Sed potiùs ab ὄλλυμι perniciem infero, derivandum cenſent. B. *Wceren die niet willen tocheelen*. Gall. *Ulceres malins*.

DYSODES, δύσοσμος vel δύσιδμος. Eſt omne illud quod malè olet, ut excrementa. Ei opponitur *Euodes*, ex δὺς difficile, & ὄζω oleo. B. *Stinkende dingen*. G. Stinkende ſachen.

DYSOREXIA, eſt appetitus diminutus, ex mala ſucorum in ventriculo diſpoſitione, ex δὺς difficile, & ὀρίγω cupio. B. *Crage ect-luſt*. G. Wenn man keine luſt zu eſſen hat. Gall. *Degout, ſans appetit*.

DYSPATHIA, eſt patiendi difficultas, cui opponitur *Eupathia*, ex δὺς difficile, & πάχω patior. B. *Onpatienſtig*. G. Ungedultig.

DYSPEPSIA, eſt difficultas cibos concoquendi, ſeu attenuandi, & ſubigendi per liquida affuſa in ventriculo & inteſtinis, undè non rarò hi ſequentes ſuam naturam, quam extra corpus animale induiſſent in ſimili calido humidoque loco, in nidorem, vel aciditatem convertuntur, ei oppoſitum eſt *Eupepsia*, ex δὺς & πίπτω coquo. B. *Moepelpke verdonwinge*. G. Undauligkeit des magens. Gall. *Digeſtion difficile*.

DYSPHONIA, eſt loquendi difficultas, ex mala organorum diſpoſitione, ex δὺς difficilè, & φωνέω voco. B. *En ſware ſtem*. G. Schwere zu ſprechen.

DYSPHORIA, eſt tolerandi vel patiendi difficultas, ex δὺς ægrè, & φορέω patior, tolero. DYS-

DYSPNOEA, est respirandi difficultas, cum dolore & fatigatione ab organis Respirationis vitiatis, obsessis, aut irritatis orta. Habetque duos gradus, nempe Asthma & Orthopnæam, de quibus suo loco, ex *δύς* difficile & *πνέω* spiro. B. *Moepelpke adem*. G. Schwer athem, engbrüstigkeit, keuchen. Gall. *Respiration embarrassée, difficulté de respirer*. A. Difficultie of breathing.

DYSTHEREPEUTA, sunt morbi curatu difficiles, ex *δύς* pervicaciter, & *θεραπεύω* curo. B. *Ziekten die zwaarte genezen zyn*. G. Krancheiten die nicht leichtlich weg gehen. Gall. *Maladies difficiles à guerir*.

DYSTHYMIA, est animi ægrotudo, ex *δύς* ægrè, & *θυμός* animus. B. *Zwaarhertig*. G. Schwermuthig. Gall. *Melancolie*. A. Heavie spirited, Heavie-minded.

DYSTOCIA, est partus difficilis, five præter ordinarium cursum fætûs in lucem, editio. Hoc fit quando nempe obliquè, transversim vel pedibus primo egreditur, vel cum viæ ex inflammatione, vel aliàs angustæ sint, vel cum fætus magnus, debilis, obesus, vel mortuus sit, ex *δύς* difficile, & *τίτω* pario. B. *Een moepelpke baring*. G. Schwære arbeit im geburt. Gall. *Accouchement laborieux; Travail difficile*. A. Difficult birth or hard labour.

DYSURIA, est mingendî difficultas, ab organis malè dispositis, aut à calculo, arenis vel viscidis humoribus obstructis, plerùmque cum ardore urinæ, ex *δύς* malè, *ῥέω* urina, & *ῥίω* fluo. B. *Een moepelpkheid in 't water maken*. G. Harnstrenge, harn-wænde. Gall. *Difficulté d'Urine*. A. Difficultie in pissing.

E.

EBENUM, **EBENUS**, vel **HEBENUS**, est arbor durissimi, gravissimi & nigerrimi ligni. Procul dubio ejus origo debetur voci Arabicæ *Alban*, *Albanos*, *Abenus*: Hinc facilioris elocutionis gratia *Ebenus*. B. *Ebben-hout boom*. G. Eben-holtz-baum. Gall. *Ebene*. A. Ebony tree.

EBISCUS, idem quod *Hibiscus*, vide *Althæa*.

EBULLITIO, ab ebullire, est liquorum, mediante igne rarefactio. Vel quando alcalia & acida mutuo commiscentur, ut in effervescentiis. B. *Opzieding*. G. Das Sieden, Aufkochen. Gall. *Ebullition*. A. A Boiling, Bubling.

EBULU-

EBULUS, seu sambucus humilis à quo vix differt, nisi quod sit multò humilior. Græcis ἐύβουλον, ex εὖ benè, & βουλή consilium, quia ægris benè consulat, atque ebullientes fervidosque humores per alvum ducat. Gr. χαμαί-ἀντη. B. *Hadig*. G. Attig, niederholder. Gall. *Yeble*. A. Dwarf elder.

ECBOLICA, sunt Medicamenta, quæ foetum in partu difficili expellunt. Item Medicamenta quæ abortum concitant, ab ἐκβάλλω dejicio.

ECCATHARTICA, vide *Catharticum*, ab ἐκκαθαίρω expurgo.

ECCHYLOMA, idem quod *Extractum*.

ECCHYMONA, **ECCHYMOSIS**, est cutis fugillatio, à sanguinis extravasatione ex vasculis minimis cutaneis, cava quædam formantis, ab ἐκχύω effundo, & αἷμα sanguis. B. *Blaauwe vlekken*. G. Die Streichmasen, Blaw flecken. Gall. *Echymose*. A. Blew-nessle in the Shin.

ECCHYMOSIS, idem quod *Ecchymoma*.

ECCOPE, idem quod *Extirpatio*, ab ἐκκόπτω excindo. *Eccope*, est quoque ossis incisio perpendicularis absque continui dissolutione, remanente tantum ligno. Hippocrates nominat *Hedram*, Latini *Vestigium* vel *sedem*.

ECCOPROTICA, idem quod *Cathartica*, sed leniora ab ἐκκοπρω alvum depono. Vid. *Ectoprotica*.

ECCRIMOCRITICA, sunt judicia de excretis particularibus ab ἐκκρίνω fecerno, & κρίνω judico.

ECCRISIS, est excrementorum secretio, ab ἐκκρίνω fecerno.

ECHIDNIUM, est diminutivum ab *Echium*, vide suo loco.

ECHINOMELOCACTOS, est Melocarduus, planta Indica, ex ἐχίνῳ Echinus, qui echini animalis in modum spinis undique est obductus, & μέλον melo, pomum, & κάκτῳ carduus.

ECHINOPODA, quidam Genistam esse putant, ex ἐχίνῳ Echinus, ob spinas quas habet, & πῶς pes.

ECHINUS, est quicquid numerosâ congerie aculeorum stipatur, sive tegmen, sive caput, sive cacumen fuerit, sic dictus quod globoso spinarum agmine maris herinaceum mentiatur. Sic vocari possunt castaneæ, capita carduorum &c.

ECHIUM, **VIPERINA**, seu *Ἀλκισιάνθιον*, est herba, quæ habet caules lanuginosos, virides, & punctis nigris instructos : folia oblonga, angusta, lanuginosa, aspera, saporis insulsi : flos monopetalus, infundibuliformis, ex angusto in latum instar cornu venatoris expansus ; superior pars supra reliquas eminent, formatque quasi galeam : ex calice autem ad basin usque ut plurimum secto surgit pistillum, posticæ floris parti adinstar clavi infixum, & quatuor veluti stipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem semina viperini capitis æmula, quæ in calice ipso longè ampliato maturescunt ; undè herba viperina dicitur : vel quod contra ferarum ictus sint utilia semina : vel quod florescit planta capitulis viperæ similibus, ἔχιδνα enim & ἔχιδνα vipera est. *B. Slangen-hoofd / Slangenkruid.* *G. Wild Ochsen-zung.* *Gall. Herbe aux vipères, Buglosse sauvage.* *A. Vipers Bugloss.*

ECLEGMA, sive **LINCTUS**, quem *Arabes Loch & Lohoch* sic appellant, aliis *Illinctus*, & ἐκλεικτὸν est Medicamentum internum, quod consistentia inter syrupum & opiatum medium est, ex variis thoracis adversus asperæ & pulmonum affectus, ut lingatur, concinnatus, ab ἐκλίσσω lingo, lambo. *B. Een slikking / slikking / slikmarkt.* *G. Eine latwerge, lecksafft.* *Gall. Eclegme.* *A. Lambitive or Lohock.*

ECLIPSIS, est animi defectus : Idem quod *Eclysis* ; ab ἐκλείπω deficio.

ECLYSIS, *Animi Defectus*, ab ἐκλύω delinquo. Vide *Deliquium animi*.

ECPHRACTICUM, est Medicamentum incidens & deobstruens. Vide *Attenuantia*, ab ἐκφράσσω deobstruo.

ECPHRAXIS, est alicujus partis, per Medicamenta incidentia deobstructio, ab ἐκφράσσω deobstruo.

ECPHYSESIS, est efflatio vel exspiratio confertim facta, ab ἐκφυσάω efflo. *A. Vid. Efflatus.*

ECPHYSIS, vide *Apophysis*. Item *Duodenum* significat. Vide *Dodecadactylum*, ab ἐκφύω excreasco.

ECPIESMA, est succus expressus. Item fœces quæ ab expresso remanent. Item Calvariæ fractura, in qua partes cranii fractæ, meninges premunt, ab ἐκπίεζω exprimo.

ECPIESMUS, est quædam expressio, sed maximè oculorum protuberantia, ab ἐκπίεζω exprimo. *B. Een uitwipking der oogten.* EC-

ECPLEXIS, est perterrefactio seu stupor, ab ἐκπλήσσω perterrefacio. **B. Verbaastheid / Verschrikking.** **G.** Erschrecknuß, Erstarrung. **Gall.** *Epouvante.* **A.** Sudden fear or astonishment.

ECPNEUMATOSIS, vide *Exspiratio*.

ECPPTOSIS, idem quod *Excidentia* & *Luxatio*, ab ἐκπίπτω excido.

ECPYCTICA, sunt Medicamenta condensantia, Idem quod *Incrassantia*, ab ἐκπυκνάζω condenseo.

ECPYEMA, idem quod *Empyema*, ab ἐκπύον ex, & pus.

ECPYESIS, vide *Ecpyema*.

ECRHYTHMUS, est pulsus, qui nullius ætatis rhythmum seu modulum observat, ab ἐκ ex, & ῥίθμος modulus. **B. Een ongeregelde pols.** **G.** Ein unordentlicher puls. **Gall.** *Le pouls deréglé.* **A.** An irregular pulse.

ECSARCOMA, idem quod *Hyperfarcosis*, ab ἐκ, ex, & σάρεζ caro.

ECSTASIS, est delirium sive mentis commotio, sive fuerit cum silentio, sive cum furore, interdum vigiliæ adsunt, interdum coma, ab ἐκίστημι, graviter deliro. Dicitur etiam is, qui ita uni rei meditandæ intentus est, quasi in cælum esset sublatus. **B. Bupten syn zelven syn.** **G.** Erstummung, erstarrung. **Gall.** *Extase.* **A.** A ectasie, a trance, a swooning.

ECTASIS, cutis est quædam in longitudinem & latitudinem extensio, ab ἐκτείνω, extendo. **B. uitrekking des huids.** **G.** Aufzspannung der haut. **Gall.** *Extension de la peau.* **A.** a of Stretching of the skin.

ECTHLIMMA, est ulceratio, à violenta compressione, in cutis superficie oborta, ab ἐκλθίω exprimo.

ECTHYMATATA, sunt pustulæ, sive cutis quædam efflorescentiæ, ut in Variolis, &c. ab ἐκθυμιάω exhalo, evaporo. **B. Puiffen.** **G.** Ein Blatter. **Gall.** *Ampoules, Boutons.* **A.** Wheale, or push in the Skin.

ECTOPROTICA, sunt Medicamenta purgantia, at quæ tam leniter stomachum & Intestina modo stimulant, ut hæc intus contenta tantum reddant, id est, stercus naturale expellant. **B. Zagte purgeer-middelen.**

ECTILLOTICA, sunt Medicamenta, quæ callos & clavos absumunt, crinesque evellunt, ab ἐκτίλλω eyello. **B. Weer verdryvende middelen.**

ECTOME, idem quod *Exstirpatio*, ab ἐκτίμνω excindo.

ECTROPIUM, est vitium palpebrarum, quando inferior palpebra brevior est superiore ut oculum claudere non possit, item genæ &c. aut ejus inversio, ab ἐκτρέπω evertō. B. *Intrekkinge der oogen of wangen*. Gall. *Erailement des paupieres*.

ECTROTICA, sunt Medicamenta quæ abortum inferunt, ab ἐκτιτρώσκω abortio. B. *Misbal makende ding*. G. Unzeitige geburt vereursachende mittlen.

ECTYLOTICA, sunt Medicamenta callum consumentia, ab ἐκ ex, & τολός callus.

ECZEMATA, sunt pustulæ rubicundæ fervidæ, & flammæ; quidam Hydroa pro Eczemate, sed malè, sumunt, ab ἐκζέω effervesco. B. *Duurige puisten*. G. Feuer blæterlein. Gall. *Ampouille ardente*. A. Burning or red pushes.

EDULCORATIO, & DULCORATIO, dicitur, quando calcinatâ sale gravidâ, aquâ (ut plurimum calida) abluuntur, quâ ablutione sal inibi contentum aquæ immiscetur. Vel dulcorare etiam dicitur, quando potiones, addito saccharo aut syrupis convenientibus, gratiores redduntur. B. *Afzoeting*. G. Suesmachen. Gall. *Adoucissement*. A. A making sweet, or edulcoration.

EFFERVESCENTIA, ab EFFERVERE, est subitus & intestinus inter sales oppositos ut alcali & acidum, interveniente aqua, cum tendentia ad mutuam destructionem, motus, quem nonnunquam calor aut flamma subsequitur, ut in calce viva, fœno madidè reposito, & miscelis Chymicis. B. *Opgeistinge / opbuijing / opwellling / opziedinge*. G. Das aufffieden, auffkochen. Gall. *Effervescence*. A. Idem.

EFFLATUS, est valida aëris ex ore cōarctato expressio, quod fit per musculos abdominales, viscera ibi contenta fursum, adeoque Diaphragma in Thoracem prementes, & sic Aërem in Pulmonibus contentum expellentes, clauso interim foramine narium per velum pendulum palatinum. B. *Blaazinge*. Gr. ἐκφύσησις. Gall. *Soufflement*.

EFFLORATIO, sive EFFLORESCENTIA, idem quod *Exanthema*.

EFFLORESCENTIA, idem quod *Exanthema*.

EFFLUVIUM, idem quod *Aporrhœa*.

EGES-

EGESTIO, idem quod *Dejectio*.

EJACULATORIA, EJACULANTIA VASA, vide *vasa deferentia*.

EJECTIO, idem quod *Dejectio*.

EISPNOE, idem quod *Inspiratio*.

ELÆA, olea, ἀλαῖα lævis, quia ejus oleum læve est & glabrum.

ELÆAGNUS, ejus nomen diversis imponitur arbusculis, ex ἐλαία olea & ἄγνος Castus, hinc Agnus castus ita appellatur. Ego tamen imaginari nequeo, undè ἐλαίαγνε nomen acceperit, quum nec facie, nec flore, nec folio, nec fructu ullam cum oleo similitudinem habet.

ELÆOSACCHARUM, oleum est stillatitium cum saccharo mixtum, inter terendum pauxillum vitelli ovi recentissimi, purissimi, intermisceri potest tam saccharo quàm oleo, ut reductio olei in aptiorem miscendo formam facilius abeat; sed tum mistum non potest tandiu servari sine rancedine ex ἔλαιον, oleum, & saccharum. B. *Geolpde suiker*. G. Zucker mit Oele. Gall. *Sucre huileux*. A. Oil and sugar mingled together.

ELÆOSELINUM, seu ELEOSELINUM, est Apium palustre, ex ἔλα palus, & σέλιον apium. Hinc etiam appellatur ὕδροσέλιον, sive *Apium aquaticum*.

ELAPHOBOSCU, est pastinaca, ab ἐλαφ cervus, & βόσκειω pascō, quasi cervi pabulum; quod cervi eam plantam primum demonstrarint: hoc enim pabulo cervos serpentibus resistere, fama est.

ELAPHOSCORODON, est cervinum allium, ex ἐλαφ cervus, & σκρόδον allium.

ELASTICA VIS, est fibrarum solidarum corporis animalis virtus quædam, quâ distractæ per causam cedunt, renituntur, nec solvuntur & causa cessante, sponte se in pristinum statum restituunt. B. *De vccerende kragt*. G. Elasticitæt. Gall. *Le Ressort*. A. An elastick force.

ELATE, est abies, dicitur παρὰ τὸ ἱλᾶν, ὃ εἰς εἰς ὕψος ἀνατετάσθαι, quod in præcellam proceritatem assurgat.

ELATERIUM, strictè est succus ille viridis, luridus, & viscosus, ex fructibus maturis cucumerum sylvestrium vel suâ sponte vel leni compressione emissus, collectus, & inspissatus, qui veterum est elaterium: vel ex tota planta expressus, coctus, inspissatus in spissam duramque

consistentiam redactus ; coloris fusci , instar extracti ; saporis amari , nauseosi & vinosi. Sed latè erit item omne Medicamentum forte , quo alvus purgando subducitur , ab ἐλαόνω agito , expello. B. **En sterk purgeer-middel van wilde komkommer.** G. Ein starck purgerend-mittel von waldt Cucummern. Gall. *Le Suc de Comcômbre sauvage.* A. The jugace of wild Cucumbers.

ELATINE, quibusdam Veronicæ , quibusdam Helxines species , fortè quasi μικρὰ ἐλάττων ἐλξίνη , parva seu minor Helxine.

ELCTICA, vide *Attrahentia* , ab ἔλκω traho.

ELCUS, vide *Helcus*.

ELEAGNUS, idem quod *Eleagnus*.

ELECTRUM, vide *Succinum*.

ELECTUARIUM, ab ELECTIONE , dictum , est confectio ex speciebus , pulpis , gummis , syrupo vel melle excepta , consistentiâ conservæ instar crassâ. Estque *simplex* vel *compositum*. *Simplex* tantum ex pulpa cassiæ , tamarindorum , vel prunorum constat : *Compositum* verò ut plurimum ex speciebus , pulpis , succis condensatis , gummis , &c. quæ melle vel syrupo excipiuntur. Electuaria sunt digerentia , laxantia , purgantia , confortantia , alexipharmaca &c. B. **Electuarien / te samen gestelde conserve.** G. Ein aufz geprester safft , lathwerge. Gall. *Un Electuaire.* A. An Electuarie.

ELEMENTA , seu PRINCIPIA , sunt corpora simplicissima , quæ nec ex se invicem sunt , neque ex aliis , sed ex quibus sunt omnia , & in quæ resolvuntur. Elementa quibusdam Chemicis dicuntur quinque , *spiritus* , *sal* , *sulphur* , *aqua* , & *terra* , quorum postrema duo passiva , cætera activa dicuntur. Alii enumerant tria , *Salem* nempe , *Sulphur* & *Mercurium* , minus tamen rectè. *Puripateticorum* Schola quatuor existere , docet , *Ignem* sc. *Aërem* , *Aquam* & *Terram*. Verum isthæc elementa omnia sunt ex aliis composita , propterea ex eorum Elemento quippiam constare , idem est quasi diceret , arborem ex radice , trunco , ramis , foliis , floribus &c. esse compositam. Omnium simplicius incedit *Cartesius* , qui materiam constituit *Primam* , *Secundam* & *Tertiam* , hoc est lumen emittens , idem transmittens , & idem reflectens. Vide tractatum nostrum de Fermentatione. Gr. Στοιχείον. B.

De Elementen / hooft-stoffen. G. Ein Element. Gall. *Elemens.* A. The first principles or elements.

ELEMI, gummi five refina, aut Lachryma pellucida, albicans, cum flavis particulis mixta, in massam redacta, suavem accensa halans suffitu odorem, venit ex Æthiopia, ubi ex arbore manat, quam oleum nonnulli volunt, alii cedrum, alii aliam arborem. Dicitur & *Elemni*.

ELEMNI, idem quod *Elemi*.

ELEOCHRYSON, & HELEOCHRYSON, recentioribus Botanicis ἐλιχρυτον & ἐλείχρυσον vocatur; fortè ἡλυόχρυτον Plinii. Planta est, quæ habet caulem in multos ramos divisum, lignosum, lanuginosum, album, pedem vel sesquipedem altum, habentem parva folia villosa, albescentia: gymnomo sperma est flore flosculo aureo & calyce aureo, undè nomen ἀπὸ τῆς ἐλῆς & χρυσῆ, quòd color ejus sit instar Solis, & Auri: dicitur hinc coma aurea, & stæchas citrina. Gall. *Immortelle, ou Amaranthe jaune*.

ELEOSELINUM, idem quod *Eleoselinum*.

ELEOSACCHARUM, vide *Eleosaccharum*.

ELEPHANTIASIS ARABUM, de quo morbo, ne verbum quidem fecerunt Græci; Arabes ejus mentionem passim faciunt, quæ varicibus cognata est, atque ex istis ortum habet, & tantum pedum tumor est. Agit de hoc *Avicenna* ubi de Varicibus tractat: Rhases dissentit tamen ab his, & Græcos sequitur *Haly Abbas*, qui Elephantem dicit esse morbum omnia corporis membra corrumpentem, & quasi cancrum universalem. Verum nec ipse sibi constat, cum scribit: Ulcera, quæ in pedibus & cruribus fiunt, Elephas vocantur. Et Elephanticus morbus apostema est melancholicum, quod in cruribus & pedibus apparet, & ejus signum est, quòd pedis figuræ similis sit. Reliqui omnes seorsim de lepra & elephantia agunt, & elephantiam pedum tumorem esse dicunt à sanguine melancholico & pituitoso & varicibus ortum, ob quem pedes ægri pedibus elephantis figura & crassitie similes fiunt. Atque tumoris hoc genus in mendicantibus sæpè conspicitur, qui in viis publicis stipem petendo victum quaerunt. B. *Laseri / Melaatsheid / Elephants ziekte.* G. Ein Kranckheit wie der aussatz, oder Maltzey, schuppe Haut. Gall. *Ladrevie, Lepre.* A. The Leprosie.

ELEPHANTIASIS GRÆCORUM, quam Arabes le-

pram vocant. Appellatur autem *Elephas* & *Elephantiasis*, & *Elephantia* ab elephante, ob similitudinem quam hic morbus habet cum elephante: nimirum, ut nonnulli putant, quod eo morbo laborantes magni ut elephantes, fiant; quæ inepta est notatio, cum elephantiaci non majores fiant, nisi quis non magnitudinem corporis elephantiasi laborantium, sed morbi magnitudinem respiciat, vel quòd malum in cruribus serpens, efficiat ea elephantis ritu ferè rigida & æqualia: vel quod inter alios morbos vehemens, ac validus sit veluti elephas, vel quod membra & cutis tumida, scabra, rugosa, tuberosa, & inæqualis, ut elephantum reddatur. *Galenus* de tumoribus cap. 14. malum hoc cum incipit, etiam σατιριασμὸν nominari scribit, eo quòd facies similis Satyrorum faciei reddatur. Nam labia fiunt crassa, nasusque tumet atque ideò depressus apparet, aures tabescunt, maxillæ rubore perfunduntur, in fronte hinc indè tumores quasi quædam cornua apparent; quanquam alii ea etiam de causâ Σαυριασμὸν hoc malum nominari censeant, quòd in orsu valdè libidinosi sint, quoniam videlicet malæ faciei iisdem cum rubore attolluntur, & musculis maxillaribus veluti convulsionem patientibus, mentum ipsum dilatatur, quemadmodum etiam ridentibus evenire solet, similitudine quadam ad picturas Satyrorum, quos ἀπὸ τοῦ σισηγέλου *Cal. Rhodiginus* ita nominatos putat, quòd ore hiante labiisque diductis instar ridentium cantent & ludant, vel ut nonnulli, quòd Satyris in Venerem propensione & libidine similes sint. *Celsus* ita describit, totum, *inquit*, corpus afficitur, ita ut ossa quoque vitari dicantur: summæ partes corporis, crebras maculas, crebrosque tumores habent. Rubor horum paulatim in atrum colorem convertitur: summa cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisque quasi squamis quibusdam asperatur, corpus emarcescit, os, suræ, & pedes intumescunt. Ubi vetus est morbus, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur, febricula oritur, quæ faciliè tot malis obrutum hominem consumit, nobis sic observatur.

ELEPHANTIASIS, five LEPROA & LEPROSIS, ut plurimum morbus cutaneus est, *primò* constat ex tuberculis in facie, malis, fronte, pectore, brachiis & circa coxas. Colore sunt livido ut canceri, absque tamen dolore,
mo-

mobiles sunt ; cum ita adveniunt , hujus morbi certum signum est & præfagium, nam semper cum istis tuberibus incedit. *Secundò* in faucibus ad linguæ radicem tubercula sunt, ut in grandinosis porcis apparent ; eorum color flavus est vel lividus, quæ sunt certa lepræ signa. *Tertiò* desinunt in ulcerationes planas & latas, raro cute profundiores, cum labiis duris & tumidis, & quod mirum est sine dolore, & serpunt, & si in uno loco sanentur, in altero denuo renascuntur, digitos manuum ac pedum vulgo occupant, internodia quoque & loca plana, item cubitum aliaque loca. Ulcerationes hæc certum præbent indicium, sed quia leprosi simulant, illam plagam ab aduisione provenire, ad similia signa quoque attendendum est. Notatu denique dignum, huic ulcerum generi, imò & in tumoribus nullum adesse dolorem aut sensibilitatem, si acupungantur. *Quartò*, ulcera quoque in ipsis naribus inveniuntur, quibus integer nasus cum ossibus sæpè depascitur : Denique ipsum palatum non intactum relinquunt tantum, verum & uvulam & asperam arteriam invadunt, undè & tandem vitam deponunt. *Quintò*, circa narium & aurium extremitates intumescencia est, cum incrassatione & extensione. *Sextò*, pellicula adest, quâ tota obducitur oculi pupilla. *Septimò*, totius cutis scabrities conspicitur, quæ quasi intumescit sicca redditur & scabra, rimas agit & fissuras patitur : Obducitur squamis fursuribusque caput, præsertim & cilia ; cutis porro pallida est, flava item, livida, & colore vivo orbata. *Octavò*, decidunt capilli, barba, sive quòd pili rarecant, sive quòd pili ex ciliis enascentes consumantur. Ungues denique finduntur, intorquentur, & ut brutorum ungulæ eodem modo excrescunt. Postea quidem muscoli & præsertim respiratorii aliquatenus mutilantur, idque propter tubera & exulcerationes : Lingua fit rauca, ob pelliculam visus amittitur, nec non & sensus tactus ob tubera & exulcerationes : & si contingat, circa extremitates fit. Post aliquot tempus, postque plurimas intumescencias, vasa sanguinea ita coarctantur, ut si acus immittatur, nullus sanguis, sed sanies effluat. Fœcundi sunt & ad coitum ardentiores, quia à coitu prohibentur. Atque hæc sunt *φαινόμενα* quæ nobis elucescunt de hisce videatur Aretæus. B. *Λαζερι / Ολιφαντς-ζiekte*. G. Ein Kranckheit wie der aufsatz, oder

Maltzey. Gall. *Ladrerie*, *Lepre*. A. The Leprosie.

ELEVATOR, idem quod *Elevatorium*.

ELEVATORIUM, ab elevando dictum, est instrumen-
tum Chirurgicum, quo crania depressa elevantur. B. *Gen-
hef-boom* / *been-hefter* / *hef-tuig*. G. Ein Aufheber.
Gall. *Elevatoire*. A. An elevator, a chirurgicks instrument.

ELICHRYSON, idem quod *Eleochryson*.

ELIXATIO, est, quando res coquendo emolliuntur.
B. *Hokinge* / *opziedinge*. G. Auffiedung. Gall. *Elixat-
ion*. A. Seething or boiling.

ELIXIR, dicitur ab Arabica voce *Electschir*, sive *Elie-
schir*, sive *Aleschis*; quibusdam ab *ἐλκω* traho, aut ab *ἐλίσω*
auxilior, estque tinctura seu essentia alicujus rei, per spi-
ritum vini aut aliud simile menstruum, extracta; idem est
quod *Tinctura*. B. *uitreksel*. G. Quintessentz, Elixir. Gall.
Extract, *Elixir*, *Quintessence*. A. Elixir, the quintessen-
ce, of any thing.

ELLEBORUS, HELLEBORUM, Melampodium seu
VERATRUM, dantur duæ species, albi & nigri, Hel-
leborus niger; est planta, quæ habet caules ex radice erum-
pentes, longos, rotundos, succo plenos, punctis purpu-
reis instar serpentariæ notatos, horum singuli habent no-
vem folia ut plurimum digitata, satis firma & crassa, viri-
dissima, polita, in margine incisa; flores instar Rosæ ex-
pansi sunt, ex horum meditullio surgit pistillum plurimis
corniculis inter stamina & petala jacentibus cinctum cir-
ca basim, quod abit in fructum, in quo velut in capitu-
lum colliguntur vaginæ membranaceæ, in cornu plerum-
que desinentes, secundum longitudinem dehiscentes, se-
minibus factæ plerumque subrotundis vel ovatis: radix
tenuis, fibrosa, nigricans, ex uno capite prodeuns, sapo-
ris acris pungitivi, amari, nauseosi: est illud famosum
purgans Hippocratis; nomen accepit ἀπὸ τοῦ ἐλεῖν τῇ βορῇ,
quod esu perimat, cibumque corporis eripiat: ἐλεῖν enim
est *Capere*, & βορὰ pabulum, esca. Hinc quoque *Ellebo-
rastrum*, & *Elleborine* derivantur. Helleborus albus dif-
fert à nigro, quod corniculis careat, & semen habeat mar-
ginatum, & radicem albam: *Elleborine* cognominatur à
foliorum cum Ellebori albi potius similitudine quam ab
effectu. B. *Nies-kruid* / *Heilig kerst-kruid*. G. Nies-
wurtz. Gall. *Ellebore*. A. Snees-wort, Bears-foot, Christ-
mas-flower, Hellebore.

EL.

ELMINTHES, & HELMINTHES, sunt vermiculi parvi, in intestinis, præsertim recto, geniti, ab ἐλμινθιάμας lumbricos patior. B. **Mæren**. G. Wuermleins. Gall. *Vermine*. A. Little Worms.

ELODES & HELODES, febris continuò affligens cum maximo sudore, ita ut ægri ob humiditatem in paludibus degere videantur, & exinde penè exsolvantur. Fortè erit species *Sudoris Anglici*, ab ἑλῶ palus, & ἰδῶ forma. B. **Zweet-koofts**. G. Das Schwits Fieber. Gall. *Fievre Suante*. A. The Sweating-feaver.

ELONGATIO, Gr. παραρθρωμα, est luxationis imperfectæ species, quando ligamentum alicujus articuli tantùm elongatur, ita ut os ex junctura non prorsus exeat. B. **uittrekking / verlenging**. G. Verlengung. Gall. *Alongement*.

ELUXATIO, idem quod *Luxatio*.

ELYMOS, est panicum, ab εἰλω (fortè) involvo, quod ejus semina involucris involvantur, vel ab ἑλν, à calore solari, quem amat.

ELYTHROIDES, vaginalis dicta, est tunica propriarum prima, darto nexa virilemque testem vaginæ n modum includens, à peritonæo producta, five capsula, quæ includuntur vasa spermatica; singulo testiculo privatam vaginam concedit ab ἑλυθρον, vagina, involucrum, & ἰδῶ forma. B. **Schrede-blics**. G. Hod-sack, ein haut bedeckende die hodlein. Gall. *Tunique Vaginale*. A. The Vaginal coat of the womb.

EMBAPHIUM, five acetabulum, aut vasculum, quo Medicamenta aut alimenta induntur, vel mensurantur. Item vas in quod intingitur, ab ἐν, in, & βάπτω immergo, intingo. B. **Ein Bahrken**.

EMBASIS, est balnei species, in quo quis aqua calida lavatur, ab ἐμβάλω ingredior. B. **Ein Bad**. G. Ein Bad. Gall. *Bain*. A. A sort of an hot bath.

EMBROCACIO, idem quod *Embroche*.

EMCROCHA, idem quod *Embroche*.

EMBROCHE, seu irrigatio, instillatio, stillicidium, fomentationis genus est, quando humor ex alto, pluviae instar, in partem aliquam destillatur, quæ sit vel prolu-tione ex vasculo proboscide inclinata, vel destillatione, vel ex gutturnio. Adhibetur *Primò* super futuram cor-onalem,

nalem, in cerebri intemperiebus, finiturque humor per sagittalem futuram decurrere. *Secundò* ad principium spinalis medullæ in nervorum morbis, finiturque humor per totam spinam defluere. *Tertiò* ad calefaciendum vel exsiccandum ventriculum, finiturque materia per totum abdomen excurrere, si intestina quoque imbecillia sint, hepatis ceratum fantalinum applicatur, quum ejus incensio metuatur. Embrocharum materia est aqua communis thermarum, decoctum ex herbis, lac, oleum, prout partis affectus & necessitas requirat, aliis est fomentationis species, quæ sit, quando calida manus parti affectæ imponitur; vel quando sponsia, stupa convenienti liquore repleta, adhibetur, ab ἐμβροχῶ intingo.

EMBRYON, est rudimentum fætûs in utero materno, ab ἐμβρύῳ pullulo. B. *Een onbolwasse vucht.* G. Unzeitige Frucht, das Kind in Mutterleibe. Gall. *Embryon*; *Germe.* A. The rudiment of a child, or an embryo.

EMBRYOTHLASTES, Chirurgis instrumentum est usuale, ad contundenda ossa in extrahendo fætu accommodatum, ab ἐμβρυον fætus imperfectus & θλάω contundo. B. *Een instrument om een kind af te halen.* G. Eine Haek. Gall. *Un Crochet.* A. A Crochet.

EMBRYULCUS, uncus ferreus, fætui extrahendo destinatus, ab ἐμβρυον fætus imperfectus, & ἔλκω traho. Idem quod *Embryothlastes.*

EMBRYOTOMIA, est fætûs dissectio anatomica, ex ἐμβρυον fætus rudimentum, & τέμνω seco. B. *De ontleding van een onbolwasse Vucht.*

EMETICUM sive VOMITORIUM, est Medicamentum, quod particulis suis irritativis Ventriculi fibras versus superiora contrahit, & quicquid Ventriculo contentum molestum est, per os expellit. Conficitur ex decoctis, tincturis, infusionibus, &c. ideòque ut plurimum in liquida forma propinatur, licet in pilulis, pulveribus &c. etiam ægris porrigatur, ab ἐμέω vomo. B. *Een bzaak-drank / bzaak-middel.* G. Spey-tranck. Gall. *Vomitif, emetique.* A. A vomit or an Emetick, Medicine.

EMETOLOGIA, est descriptio de vomitoriis, ab ἐμέω vomo, & λόγος sermo. B. *Beschrypping van de bzaak-middelen.* G. Beschreibung der Spey-trancken. Gall. *Une description des vomitifs.* A. A Description of a vomit.

EME-

EMETOS, vide *Vomitus*, ab ἐμέω, vomo.

EMMENAGOGA, sunt Medicamenta menses mulierum subsistentes, vel non satis fluentes cientia, ex ἐν in, μὲν, mensis, & ἄγω duco. Hoc est quod intra spatium unius mensis fit. B. *Bloedwekkende middelen*.

EMMENIA, idem quod *Catamenia* & *Menses*, ex ἐν in, & μὲν mensis.

EMMOTON, est Medicamentum liquidum, quod penicillis vulnerariis vel linteo conserpto exceptum, pustulis aut ulcerum sinibus injicitur, ab ἐν in, & μοτὸς linteum quod vulneribus inditur. Hinc μοτόω indo tale linamentum.

EMOLLIENTIA, ab *Emollire*, seu Μαλακτικὰ, sunt, quæ calefaciendo, dissolvendo, dissipando & penetrando, partes solidas molles reddunt, à Μαλάσσω emollio. B. *Verzagtende dingen*. G. Erweichende mittlen.

EMPASMA, est pulvis astringens, halitum ex ore fetidum corrigens, vel qui nimium sudoris effluxum cohibet, idem quod *Catapasma*.

EMPEIRIA, seu EMPIRIA, vide *Empirica*, est experientia in arte medica observationibus absque ratione innixa, ex ἐν in, & πείρα experientia. B. *Erbaring*. G. Erfahrung. Gall. *Empirisme*. A. Experience, practise.

EMPETALON, idem quod *Eupetalon*.

EMPETRON, vide *Saxifraga*.

EMPETRUM est frutex, qui habet caules ramosos, flexiles, lignosos, repentis, valdè extensos, cortice fusco rubicundo instructos: folia sunt parva, oblonga, habitus Ericæ: flos mas, apetalus, staminibus constans: fructus alio loco plantæ natus baccæ similis est, fætus seminibus ossis & cartilagineis: radix lignosa, dura: hæc planta crescit in montibus & locis Saxosis, ab ἐν & πῆρε Saxum.

EMPHRAXIS, est obstructio in quacunque parte facta, ab ἐμφράσσω obstruo. B. *Verstopping*. G. Verstopfung. Gall. *Obstruction*. A. A Stopping, or obstruction.

EMPHRACTICA, sunt, quæ poros obstruunt, ab ἐμφράσσω obstruo. Idem quod *Emplattomena*.

EMPHYSEMA, est inflatio, ab aëre hospitante in aliqua cavitate, ut in tympanitide, vel in cellulis panniculi adiposi ubicunque loci, vocatur etiam Gr. Εμψυματώσις ab ἐμψυάω inflo. B. *Opblazinge*. G. Das aufblasen, schwellen. Gall. *Enflure*, *Emphise*, *bour-Soufflure*. A. A Puffing up.

EM-

EMPHYTON THERMON, est calidum innatum, seu calor ex parentum semine primò in *fœtu seminatus*, qui postea, inchoatâ, respiratione & fœtu per se subsistente, sensim perit. Calidum hoc, cum Philosophi tum Medici *Spiritum insitum & nativum* nominant, & ex tribus constare partibus asserunt, videlicet ex *Humido primigenio, insito spiritu, & calore*. Undè *Fernelius* definit *calidum innatum*, quodd sit *humidum primigenium, insito spiritu, & calore undique perfusum*. Verum isthæc Veterum nugamenta nihil ad nos pertinent: calidum enim illud, locum duntaxat habet in recens natis. Quodque inspirando & alimenta fumendo perennatur, ab *ἐμφύω* innascor, & *ἰσχυρίζω* calefacio. B. *Die ingeboren wärme*. G. *Angebohrne, eingeplantste wärme*. Gall. *Chaleur naturelle, innée*. A. The innate heat.

EMPIRICA MEDICINA; vide *Empeiria*. Sed præter hanc secta olim fuit in Medicina, cujus Author fuit *Acron Agrigentinus*, juxta alias *Serapion*; qui neglectis rationibus, posthabitatque rerum investigatione & Anatomie, solis experimentis nitebantur, & in incognitis morbis ad similes affectus & similia remedia confugiebant. Floruit hæc secta potissimum apud *Ægyptios*, apud quos teste *Herodoto*, singuli morbi singulos ferè Medicos habebant. Progressu autem temporis homines experientiæ rationem addere studebant, & ita paulatim ante *Hippocratem* apud *Cnidios, Rhodios & Coös* nova secta subnasci cœpit, quæ primò dicta fuit *Dogmatica* seu *Rationalis*, ab *ἐμπειρία*, tento. B. *Proefkundige Medicijne*. G. *Probierte und bewehrte artzney*. Gall. *Medecine Empirique*. A. Quack Medicine.

EMPIRICI, sunt Medici, qui in curandis morbis experimentis solummodo contenti sunt, neglectâ ratione. Vide *Empirica Medicina*. B. *Quackzälvers / Landloos pers.* G. Ein Landfahrer. Gall. *Medecins empiriques; Charlatans*. A. Mountebanks, or Empericks.

EMPLASTICA, idem quod *Emplattomena*.

EMPLASTRUM, est Medicamentum topicum, quod linteo, vel pelli tenui inductum, cuti applicatur, eique tenacius adhæret. Componitur vulgò ex oleis, aut iis, quæ olei consistentiam ferè habent, qualia sunt axungie, medullæ, butyrum, mucilagines; item ex pulveribus, & cera,

cera, aut iis, quæ ad ceræ consistentiam accedunt, ut resina, pix, gummi &c. cujus massa adhuc calida in teretes & longas figuras sive magdaleones cylindraceas formatur, ab ἐμπλάσσω fingo, formo, illino. B. *Zalf/ Plaster. G. Pflaster. Gall. Emplastre. A. A Plaster.*

EMPLATTOMENA, seu EMLASTICA, & Εμφρακτικά, sunt medicamenta, quæ applicata corpori humano, illi sua tenacitate adhærent, meatusque externos ingrediendo constipant simul, id est, perspirationem istius partis unâ impediunt, ab ἐμπλάσσω illino. B. *Medicpne dic de sweetgaten stopt. Gall. Remedcs, qui empechent la transpiration.*

EMPNEUMATOSIS, sive INSPIRATIO, est adductio Aëris per os, nares, glottidem, tracheam, in Pulmones, quâ Pulmonales vesicæ expanduntur, & ab invicem recedunt, causam habens Thoracis dilatationem, per musculos Subclavios, Intercostrales, & depressionem diaphragmatis deorsum in abdomen: per inspirationem conciliatur vasis pulmonalibus libertas aperturæ pro sanguine à Corde dextro appulso. ab ἐμπνέω inspiro. B. *Inademing. G. Das Athem holen. Gall. Inspiration. A. An Inspiration.*

EMPROSTHOTONOS, est convulsio cervicis & reliqui corporis versùs anteriora, ita ut mentum pectori applicetur & femora ventri, cum rigore, qui aliquandiu hanc insolitam figuram retinet, ab ἐμπροσθεν antè, & τείνω tendo. B. *Door-overtrekking/ hals-spanning-voor-waarts. G. Das spannen des hinter theils am halsz. Gall. Espece de convulsion. A. A Convulsion in the fore part of the body.*

EMPYEMA, propriè dicitur puris in thoracis cavitate collectio, sed si latius sumatur, etiam pro pure in abdomine, aut alibi collecto accipi potest, dicitur & *Ecpyema*, & *Ecpyesis*, ab ἐν intus, & πύον pus. B. *Een etterboest. G. Eyter-brust, eyterige materie im brust. Gall. Empyeme, Apostume soit dans la Poitrine, ou dans le bas ventre. A. An impostume in the cavity of the breast.*

EMPYREUMA, adustum quid significat, quando aquæ recens destillatæ ingratum odorem & saporem habent, vel est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet. Item olea adusta, *Empyreuma olere dicimus.* Item reliquiæ alicujus febris post paroxysmum,
ab

ab ἐμπυρέω accendo. B. **Verbzandheid**. G. Das anbrennen. Gall. *Empyreume*, qui sent le brûlé. A. Any Thing that tastes, as ibit were burnt.

EMULGENTIA VASA, sed melius *Renalia*, dicuntur venæ & arteriæ, quæ renes subeunt. B. **Nier-vaten**. G. Nieren-fäße. Gall. *Vaisseaux emulgens*. A. The reins of emulgent vessels.

EMULSIO, ab **EMULGERE**, est Medicamentum potulentum, lactis colorem æmulans, ex seminum quorundam & aliorum expressio oleo cum affuso commodo liquore validè agitando educto, compositum, cujus colaturæ syrupi, laudanum, &c. adjiciuntur. B. **En melkje**. G. Ein Emulsion, ein tranck wie milch. Gall. *Emulsion*, *lait d'Amandes*. A. Idem.

EMUNCTORIA, sunt cavitates, in quibus aliquid excernitur, ut nares pituitam recipiunt : aures humorem flavum crassiusculum : alvus excrementa alvina : vesica urinam, &c. B. **Ontfang-buizen**. G. Höhlen darin sich die feuchtigkeit sammlet. Gall. *Emunatoires*. A. Emunctory vessels.

EMUNDANS, Medicamentum est, quod externè applicatum, deterget & abluit simul per vehiculum aquosum, quod externè ulceribus vel vulneribus adhæret. B. **Supperend middel**.

ENÆMON, est Medicamentum sanguinem sistens, vel quod astringendo, refrigerando & exsiccando meatus vavorum apertorum claudit, sanguinis fluiditatem, motumque vehementiorem imminuit, vel sistit, ex ἐν in, & αἷμα sanguis. B. **En bloedstempend middel**. G. Blut stillende Mitten. Gall. *Remede qui Etanche le sang*. A. A Medicine to stop bleeding.

ENÆOREMA, sive **NUBECULA**, aut **NUBES**, est crassamentum illud, quod urinæ innatat, vel in urinæ medio suspensum continetur, ab ἐναρία in sublime attollo. B. **De wolken in de pis**. G. Die wolcklein schwebende mitten in dasz wasser. Gall. *Petite nuée dans l'urine*. A. The contents that swim in the middle of the urine.

ENARTHROSIS, est articulatio, cum cavitas excipiens profunda admodum, & caput quod in eam inferitur, oblongum est. Atque hæc conspicitur in femore & acetabulo, quod lîchio vulgo tribuitur, ab ἐν in, & ἄρθρον

ἄρθρον artus. B. **Inkreding.** G. Gliederung. Gall. *Enarthrose*. A. An articulation.

ENCANTHIS, est caruncula lachrymalis, five excrescentia spongiosa, glandulosa angulorum oculi internorum, ex *ἐν* in, & *καυθός* hirquus. B. **Het Traan-fliertje.**

ENCATHISMA, idem quod *Inseffus*, ab *ἐν* in, & *κάτω* infra, & *ἵζομαι* sedeo.

ENCAUMA, seu **INUSTIO**, in aliqua parte non tantum significat. Sed etiam oculi ulcus, cum crusta foeda in nigro aut albo post febrem sæpè excitatum. In nigro profundius quàm in albo, undè & humores sensim emanant, & visus extinguitur, ab *ἐγκαύω* inuro. B. **Inbranding.** G. Einbrennung. Gall. *Ulcere sordide*. A. A Burning inward.

ENCEPHALOS, est, quodcunque cranii mœnis concluditur; ut cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, corpus callosum, corpus striatum &c. ab *ἐν* in, & *κεφαλή* caput. B. **Het herten gestel.** G. Das hirn. Gall. *Cerveau*, vel *Cervelle*. A. The brain.

ENCHARAXIS, vide *Scarificatio*, à *χαράσσω* scarifico.

ENCHEIRESIS ANATOMICA, est prompta & expedita, circa res secandas, actio, quâ *Anatomicus* summâ agilitate cadavera incidendo eorum partes demonstrat, ab *ἐγχεῖν* manum adinoveo. B. **Deerdigheid in de Ontleed-konst.**

ENCHERIDÆ, sunt grumi, qui in Emplastris inter liquefaciendum inveniuntur.

ENCHRISTUM, est unguentum aut linimentum, quo pars affecta illinitur, ab *ἐγχεῖν* inungo.

ENCHUSA, idem quod *Anchusa*.

ENCHYOMA, est sanguinis effusio, quâ partes externæ lividæ & nigrae conspiciuntur, ut in scorbuto, & suffillationibus oculorum, aliarumque partium. Dicitur etiam *Vibex*. B. **Striemen / Blaauwigheid.** G. Blaue Striemen. Gall. *Meurtrissure*. A. An affusion or flusking of blood in any part. Item sanguinis effusio, quando nimium ejus motus citatior fit, ut in ira, & gaudio effuso, ab *ἐγχεῖν* infundo, & *χυμός* humor.

ENCHYTA, seu **INFUNDIBULUM**, est instrumentum, quo liquida in oculos, nares vel aures instillantur, ab *ἐγχύνω* infundo. B. **En Trechter.** G. Ein Trichter. Gall. *Un Entonnoir*. A. A Funell.

Z

EN.

ENCLYSMA, idem quod *Clyster*, ab ἐν intus, & κλύω abluo.

ENCOPE, est partis alicujus incisio, ut in Gangræna, &c. ab ἐνκόπτω incido. B. *Insupding*. G. *Einschneidung*. Gall. *Incision*. A. A. *Cutting*.

ENCRANIUM, idem quod *Cerebellum*, ab ἐν in, & κρανίον calvaria.

ENDEIXIS, est morborum indicatio, quâ demonstratur, quid sit faciendum: ex.gr. vulnus indicat deligationem. Alvi obstructio indicat purgationem sive ἄνω vel κάτω. Suntque *Conservatoria* vel *Curatoria*, ab ἐνδείκνυμι demonstro. B. *Anzeigt* / *Intentie* / *Manoys*. G. *Anzeigung*. Gall. *Indication*, *Intention*. A. *Indications*.

ENDEMIUS, sive MORBUS VERNACULUS; & COMMUNIS, est, qui omni tempore plurimos in una regione invadit, à causa, loco vel regioni propria; & inquilina proveniens. Ut Scorbutus Hollandis, ab ἐν in, & δῆμος populus. B. *Land-ziekte*. G. *Land-krankheit*, eine Seuche. Gall. *Maladie endémique*. A. A disease incident to one country.

ENDEMUS, idem quod *Endemius*.

ENDIVIA, seu INTUBUM. Hæc corrupta ab Intubo voce, in Hertruria passim *Endivia* appellatur. Dicitur etiam *Seris*, *Seriola*, & *Scariola*. B. *Endivic*. G. *Endivien*. Gall. *Endive ou Scariole*. A. *Endive*.

ENEMA, idem quod *Clyster*. Ibidis Ægyptiæ inventum, ab ἐνίεμι immitto.

ENERGIA, est agitatio vel operatio spirituum animalium, vel sanguinis, ab ἐνεργέω, operor. B. *Werkinge*. G. *Wirckung krafft*. Gall. *Energie*, *Efficace*. A. *Efficacie*, *Force*.

ENERVATIO, est debilitas circa tendines & nervos. B. *Swakhed* / *Stragtelootheid*. G. *Krafftloß*, *Schwachheit*. Gall. *Epuisement*, *Debilité*. A. A *Weakening*.

ENGIZOMA, est calvæ ictus, in quo offensum os, ad interiorem cerebri membranam descendit, eamque premit. Item instrumentum, quo in ejusmodi affectibus utimur, ab ἐγγίζω appropinquo.

ENGONIOS, est brachii, vel cruris flexura, ab ἐν in, & γωνία angulus.

ENIXUM SAL, per illud intelligunt sal quoddam, ex acido

acido & alcali participans, dicitur quoque *sal neutrum* quia nec alcali verè est, nec acidum; & hujusmodi sunt *sal commune, fossile, nitrum, alumen, vitriolum &c.* B. *Zuur-zout.* G. Saur-salz. Gall. *Sel neutre.* A. Sowre-salt.

ENS, ab ESSE, est alicujus mixti pars essentialis.

ENSIFORMIS CARTILAGO, Gr. *ἔνδοειδής*, est infima ossis sterni pars, ensis instar mucronata. B. *Hertzenbezel / zweertachtig kraakbeen.* G. Das hertzenblat, das schwerd gleiche knorpel. Gall. *le Cartilage Ensiforme ou Xiphoide.* A. The Sword-like cartilage.

ENTALIUM, testaceum quoddam marinum est, fistulæ modo longum & concavum, album, foris striatum, intus læve, rarò longitudinem digiti superans, ingreditur ung. Citrino.

ENTERON, est fistula longa, membranacea, Mesenterio, ne confundantur intestina, annexa, flexuris variis dotata: suntque numero sex (nisi quis oesophagum, ventriculum, & vesicam, intestinis annumerari velit, perinde erit, ei non adversabor, cum eandem habent tum substantiam tum ferè actionem) Duodenum, Jejunum, Ileum, Cæcum, Colon, & Rectum; superiora tria *tenuia*, inferiora *crassa*: vel potiùs *angusta & lata* appellantur. Hoc verficulo complectuntur.

*Sunt duodenum, jejunum, post ileon atque
Cæcum, quod colon sequitur, tenet ultima rectum.*

Tunicas habent quatuor; externa *membranosa* est, à peritonæo orta; secunda *fibrosa* seu carnosà, cujus fibræ exteriores *longæ*, interiores verò *rotundæ* sunt, sibi invicem ad angulos rectos superjacentes; tertia *nervosa* est, & oscula vasorum tum lacteorum, tum sanguiferorum in se continet, cui intus & quarta *glandulosa* seu potiùs papillosa adhæret, quâ mediante chylus absorbetur venisque lacteis communicatur. Intestinatorum *Magnitudo* seu *Longitudo* ut plurimum sexies plus minùs superat longitudinem hominis cujus sunt. Vocantur item intestina, *ἐνδοίδια, ἑνδοία, χορδαί Aurelian, ἑνκάρτα*, ab *ἐντὸς* intus. B. *De Darmen* G. Das Gedærm, das eingeweid. Gall. *Les Boyaux, les Entrailles, les Intestins.* A. The entrailles, guts. Rectum intestinum. B. *Den rechten-darm / endel-darm.* G. Der after oder mast-darm, arsch-darm. Gall. *l'Intestin*

testin rectum ou droit. A. The strait, vel Arse-gut.

ENTERENCHYTA, est instrumentum, quo Clysteres immittuntur: vocatur & *Siphon* & *Syringa*. B. **Clyster-spuit / springe**. G. Eine Rœhre, spruetze, klystier rœhre. Gall. *Siringues*. A. Clyster pipe.

ENTEROCELE, sive Hernia intestinalis, est intestinorum præsertim ilei, per processus peritonæi dilatatos, ad inguina vel scrotum prolapsus, ab ἔντερον intestinum, & κήλη tumor. B. **Gebroken / gescheurt / darm-bruch**. G. Ein bruch der gedærme, darm-bruch. Gall. *Déscente, Hernie, Rompure*. A. A rupture when the bowells fall into the cods.

ENTEROEPIPLOCELE, est species herniæ, quando omentum & intestina simul in scrotum per dilatatum peritonæum, ejusque processum devolvuntur & prolabuntur, ex ἔντερον intestinum, ἐπίπλοον omentum & κήλη tumor. B. **Net en Darm-bruch**. G. Netz und Darm-bruch. Gall. *l'Entero-epiplocele ou descente des intestins & de l'Epiploon*. A. A rupture when the Omentum of the intestines fall together into the cods.

ENTEROMPHALOS, est *Hernia umbilicalis*, cum intestina ob peritonæum hic faciliè dilatandum, in umbilico protuberant, quod mulierculis gravidis non rarò contingit, & post partum non rarò remanet, ex ἔντερον intestinum, & ὀμφαλὸς umbilicus. Idem quod *Exomphalos*. B. **Nabel-bruch**. G. Nabel bruch. Gall. *Hernie du nombril*. A. A Navel rupture.

ENTRICHOMATA, dicuntur tarfi, sive extremi palpebrarum ambitus, undè excrescunt cilia.

ENTYPOSIS, est humeri acetabulum. Articulatio humeri item est cum brachio, diciturque ὀμοκοτύλη.

ENULA CAMPANA, vide *Helenium*.

ENYPNION, est insomnium, ab ἐν in, & ὕπνος somnus. B. **En droom**. G. Ein traum. Gall. *Un Songe*. A. A Dreame.

ΕΡΑCME, idem quod *Anabasis*, ab ἐπαυμάζω increasco.

ΕΡΑCMASTICA, est febris continuò invalescens, ab ἐπαυμάζω invalesco. B. **En groepende kooztz**.

ΕΡΑGOGIUM, est membri genitalis præputium, & ut *Gorræo* placet, malè affectum, quod nec reduci faciliè potest, ab ἐράγω adduco. B. **De Doozhuid**. G. Die Vorhaut. Gall. *le Prépuce*. A. The fore Skin. ΕΡΑ-

EPANADIPLOSIS, seu REDUPLICATION, vide *Anadiplosis*.

EPAPHÆRESIS, est phlebotomia iterata, ab ἐπαφαίρειν demo.

EPAR, vide *Hepar*.

EPARMATA, sunt tumores glandularum parotidum ponè aures ab ἐπαρξία attollo, eo quod aures, hoc vitio, eriguntur.

EPHEBÆUM, est locus ab Hypogastrio ad pudendum usque. Dicitur *Sumen*, *Pecten*, *Pubes*, *Aqualiculus* &c. ex ἐπὶ supra, & ἤδη pubes.

EPHELIS, est sanguinolentum illud, quod in Hæmoptysi expuitur. Item crusta ulceribus superinducta, ex ἐπὶ supra, & ἕλκος ulcer.

EPHELIS sive LENTIGO, est macula ruscida, ab insolatione ut plurimum excitata, vere & æstate maximè increbescit, idque potissimum in iis, qui cutim rarissimam habent, verum circa hyemem rursus evanescit; figura est magnitudine morsus pulicaris: maculæ hæ non raro totam faciem defædant, ex ἐπὶ supra, & ἕλκος sol. B. *Sproet*: ten. G. *Sommerflecken*, *sonnenflecken*. Gall. *Des Lentilles*. A. *Freckles*.

EPHEMERA sive DIARIA, est febris continua, omnium levissima inter continuas, quæ ultra diem non extenditur, si diem excedat, *Synochus simplex* appellatur, ex ἐπὶ supra, & ἡμέρα dies. B. *Een daagse-koozts*. G. *Das eintägige fieber*. Gall. *Fievre d'un jour*, *Fievre éphémère*. A. *A quotidian Fever*.

EPHEMERUM, est planta, quæ sic appellatur, quod eodem, quo assumptum est, die interimat, vel quod quo die nascatur, eodem intereat, ex ἐπὶ in, sub, & ἡμέρα dies. Sed est & alterum *Ephemerum* non *lethale*, sic dictum, quod flos illius confectim marcescat, nec longiùs uno alterove die commoretur, vulgò *Lilium Convallium*, quod in opacis & lucis nascatur, appellatur. Ephemerum venenosum, vocatur etiam Colchicum.

EPHIALTES, idem quod *Incubus*.

EPIDROSIS, est sudoris proventus, ab ἐπὶ supra, & ἰδρῶς sudor.

EPHIPPIUM, sive SELLA EQUINA seu TURCICA, est pars ossis sphenoidis, in cranio intus conspicua,

excavata cum quatuor eminentiis sellæ in modum, cui glandula pituitaria infidet, ex *ἐπι* supra, & *ἵππ* equus. B. *Het Zadel-been*. G. Das Sattel-bein. Gall. *Cavité de l'os sphenoïde qui ressemble à une selle à piquer, & qu'on appelle la sel du Turc*. A. A bone of the os sphenoids like to a saddle.

EPIALA sive QUERCERA, est febris continua, in qua calor & frigus simul percipiuntur eodem tempore, nam plurimæ febres incipiunt cum frigore, quod in calorem terminatur, sed hæc febris id speciale habet, quod simul & calor & frigus adsint, & cum invicem pugnare videantur ab *ἥπιον* mite, & *ἀλλάζω* caleo. B. *En heet-koude koozts*.

EPIALTES, idem quod *Incubus*.

EPICARPIUM, est Medicamentum externum, emplastri vel cataplasmatitis instar, quod pulsibus seu carpis manuum, febribus intermittentibus depellendis, vel in convulsionibus applicatur, ex *ἐπι* super, & *καρπός* carpus. B. *Pols-pleisters*. G. Pulsz-pflaster. Gall. *Epicarpes remèdes qu'on applique aux poulx*. A. A wrist plaister.

EPICAUMA, est ulceratio crustosa oculorum nigredini obtingens, ex *ἐπι* supra, & *καύω* uro. Idem quod *Encauma*.

EPICERASTICA, sunt Medicamenta quæ humores acres obtundunt & temperant, ex *ἐπι* supra, & *κεράννυμι* tempero.

EPICHÊIRESIS, idem quod *Encheiresis*, ab *ἐνχειρίω* manum adhibeo.

EPICOLICÆ REGIONES, sive LATERALES, LAURENTIUS LUMBARES, & BARTHOLINUS, ex *Aristotele*, *λαγῶνες* nominat, quasi diceret *Libidinis partes*; sed à *Glissonio* *Epicolica* dicitur ea pars, quæ coli intestini partibus incumbit: Unde denominationem accepit.

EPICOPHOSIS, idem quod *Cophosis*.

EPICRASIS, evacuatio quædam est per vices instituta, ab *ἐπικεράννυμι*. attempero. B. *By verpozing*. A. A criticall evacuation of bad humours.

EPICRISIS, est morbi dijudicatio, ab *ἐπικρίνω* judico.

EPICRUSIS, est levibus serulis, partium mollium, percussio, Japonensibus familiaris, ab *ἐπικρέω* percutio.

EPICYEMA, est superfœtatio, sive super imprægnatio,

tio, cum muliere jam imprægnata, alio post tempus imprægnatur fœtu; undè differt à gemellis, quod hi contemperanei sint, illi verò observati sunt aliquot mensium differentiam habuisse, nec quoque eodem tempore uterque ex utero prodit, sed distantia mensium aliquot interdum intercedit, hoc tamen rarissimè contingit, ab ἐπι super, & ἄνω gravis sum. B. Een dubbeld verzwangering / oberbezugting. G. Über eine empfangene frucht. Gall. *Superfætation*. A. Idem.

EPIDEMIUS, est morbus communis, à causâ communi invehitur, & vario tempore nunc in una, nunc in pluribus regionibus multos simul invadens: ut pestes, febres malignæ &c. Causa videtur hæere in Aëre, victu, & dispositione corporis, quibus in certum statum redactis semina morbi adolescere posse videntur, & vim exercere in corpus animalis ita dispositi; dum verò causâ tam communis est, feminium primum in aëre generatum & allatum fuisse verosimile est, ex ἐπι supra, & ὅμοιο populus. B. Een doorgaans in zwang-gaande ziekte. G. Eine Seuche die gemeinlich an einem orth regieret. Gall. *Maladie Epidemique*. A. A Common disease.

EPIDERMIS, est membrana tenuis, totam cutim, cuius quasi pars est arcê ambiens, reliquis corporis integumentis superincumbens, ob tenerrima sua vascula, & ligamentula subtilissima, minimâ vi facilè solvenda, integrè à subjacentibus separabilis, in plurimas lamellas divisibilis, vasis constans nullis, quæ ullâ arte visibilia reddi queunt, nullo sensu prædita, tota squammosa, squammis adeò parvis; ut incredibile, in sulcos areasque exsculpta, quæ ad apices digitorum spirales, maximè spectabiles, in medio horum sulcorum tutò condita hærent vasa sudorifera, in utroque autem sulci latere parallela priori series papillarum nervearum: undè liquet vasa sudoris, vasa exhalantia, papillas tactus, hoc tenui, nec impediante sensum, nec crescente, munimento defendi. Videatur *Cuticula*, ex ἐπι supra, & δερμα cutis.

EPIDESIS, seu DELIGATIO, est ligamenti injectio, ad cruoris fluxum sistendum, ex ἐπι super, & δέω vincio.

EPIDESMUS, est fasciarum superligatio, ab ἐπι super, & δέω subligo. B. Boben-zwagtel. Gall. *Bandage*.

EPIDIDYMIS, sive PARASTATA, Latine *Supergemina*.

nalis, est vas tortuosum & variis flexibus velut varicosum corpus, quod testium dorso affixum est, idemque constituens. Majori suo globo testis annectitur, constat ex uno vase seu ductu ex teste continuato, longitudinem quinque ulnarum facile excedenti, minori capite seu globo vasi deferenti conjungitur, ex ἐπὶ supra, & διδυμὸς testiculus. B. *De opper-klootjes*. G. Die oberste hœdlein. Gall. *Epididyme*. A. Idem.

EPIGASTRIUM, est anterior pars infimi ventris, cuius pars superior *Hypochondrium*; Media *Regio Umbilicalis*; Inferior verò *Hypogastrium* vocatur, ex ἐπὶ super, & γαστήρ venter. B. *Middel boven-buik*. G. Der mittel bauch. Gall. *l'Epigastre ou la region Epigastrique*. A. The upper part of the belly.

EPIGINEMA, est id quod morbis, velut symptoma supervenit. Item ordo partium in generatione, qui per successum fit, à γίνομαι fio, nascor.

EPIGINESIS, idem quod *Epiginema*.

EPIGLOSSUM, est laurus Alexandrina, sic dicitur quod supra ejus folium, aliud foliolum instar linguæ habeat, ex ἐπὶ supra, & γλῶσσα lingua.

EPIGLOTTIS, sive *EPIGLOTTALIS*, est quinta laryngis cartilago, Lingulæ formâ, valdè mobilis, glottidis sive rimulæ operimentum, cum Cibi & potus deglutiuntur, ne quid incidat in eam: vocatur item sublinguium, Græce χόνδρος *Poll.* ex ἐπὶ supra, γλῶσσα lingua, & τίθημι pono. B. *Strotlap / het tongskên*. G. Das Athem zeunglein, zæpflein im hals. Gall. *l'Epiglote*. A. The epiglottis.

EPIGONATIS, est mola seu patella genu, ex ἐπὶ supra, γόνυ genu, & τίθημι pono.

EPILEPSIA, sive *MORBUS CADUCUS*, à casu *Comitialis* dictus, quia ægri derepente in terram prosternuntur: vel *Herculeus*, quia difficulter curationem admittit. Item *Lunaticus* sive Σεληνιακός, quod ad lunæ cursum paroxysmus eveniat. *Lues Sontica*, *Deifica*, *Morbus sacer* &c. appellatur. Estque interpolata totius corporis convulsio, omnes actiones totius corporis lædens. Adfunt subitus prolapsus, si æger steterit, Motus convulsivi totius ferè corporis, oculi circumvolvuntur, abolitio sensûs & memoriæ, spuma circa os, effluxus seminis, stercoreis, urinæ, respiratio frequens & inæqualis, sonitus incongruus:

atque hæc phænomena nonnihil variant, juxta gradus : in universali omnia hæc ferè sunt, non item in mitiori, vel in Epilepsia puerorum, quæ in dentitione, febri &c. evenit. Est porro vaga, vel certis temporibus rediens, hæreditaria, vel contingens, recens, vel inveterata &c. ab ἐπιλαμβάνω invado, prehendo. B. *De vallende ziekte / sint jans eubel / maan-ziekte.* G. Die schwere noth, fallende oder böse kranckheit, böszwehe, fallende fuchtag. Gall. *Epilepsie, mal caduc.* A. The falling sickness.

EPILEPSIA INTESTINALIS, nihil aliud est, quàm convulsio, quæ à rebus intestina irritantibus oritur, quod infantibus sæpè evenit.

EPILEPSIA PUERORUM, vide in *Epilepsia.*

EPILEPTICA, sunt Medicamenta adversus epilepsiam.

EPILOGISMUS, est Medicorum suffragium, ab ἐπιλογία dico post.

EPIDEMIUM, vindicta Romanis. Est planta, quæ habet folia hederacea, ampla, acuta, lata, viridia, satis dura, in margine dentata, terna juncta pediculis tenuibus, & rotundis : intra hæc assurgit caulis pedem circiter altus, qui habet flores parvos, pulchros, coloris variegati, sunt cruciformes, quatuor scilicet petalis tubulatis constantes ; ex quorum calice surgit pistillum, quod deinde abit in fructum, seu siliquam unicapfularem, bivalvem & feminibus sætam ferè rotundis : radix in multos ramos divisa, in inferiori parte fibrosa : crescit in locis humidis, ut in pratis.

EPIMELIS, dicitur Mespilus ; sic dicitur, quòd juxta malos nascatur, ex ἐπι ad, juxta, & μέλον malus.

EPINYCTIDES, sunt pustulæ humorem emanantes, noctu præsertim sævientes & cruciantes, sublivido colore vel subnigro vel albo, si aperiantur sanies effluit, cum inflammatione, ab ἐπι supra, ὑπὸ nox, & τίθημι pono. B. *Nacht-gezwollen.* G. Nacht-geschwulst, die nacht-blattern. Gall. *Enflures de nuit.* A. Night swellings.

EPIPAROXYSMUS, est, quando ægri plures febrium exacerbationes, quàm solent, patiuntur, quod in febribus inordinatis contingit, ab ἐπιπαροξύνω iterum exacerbo.

EPIPHÆNOMENA, sunt signa quæ morbis postea superveniunt, ab ἐπιφαίνει insuper appareo.

EPIPHORA, est impetus quidam, ut dicitur, humorum,

rum, five sanguinis, five alterius humoris inflammatorius, in totum corpus vel in aliquam partem. Per impetum, intelligenda potius est humorum quædam subsistentia, in qua alii humores, ab arteriis affluentes, morantefque, incalescunt & phlogosin constituunt. Est & inflammatio propriè oculorum, & latè dicitur de totius corporis inflammatione, ἐπιφύω infero. B. *Ög-ontsteking*. G. Entzündung der augen. Gall. *Le flux de larmes chaudes, & acres, qui accompagne les grandes ophthalmies, ou en general toute defluxion d'humeurs en quelque partie que ce soit*. A. An Inflammation of the eyes.

EPIPHYSIS seu APPENDIX, ADNASCENTIA, ADDITAMENTUM, est os ossi adnatum, per contiguitatem simplicem & immediatam, quamvis non adeò planâ superficie, sed nonnihil mutuo capitum sinuumque ingressu instar ginglymi, licet absque motu, ergo potius dicenda est illa articulatio epiphyseos cum ossè, indentatio; epiphyfes accrescunt duobus diversis locis, vel ossium extremitatibus, vel ipsorum lateribus, ut in femore, ubi duæ epiphyes sunt trochanteres dictæ, non tantum junguntur cum aliis ossibus per indentationem, sed etiam ope cartilaginis, quæ sensim indurescit, & in adultis nimîâ compressionè ossescit ita, ut tóta junctura dispareat in his, & tunc epiphyfes degenerant in apophyses; ab ἐπιφύω accresco. B. *Een aangewasse been*. G. Anwachsung. Gall. *Epiphyse*. A. Idem.

EPIPLASMA, in genere idem quod *Cataplasma*. Sed in specie dicitur de farina triticea in hydrelæo cocta & vulneribus imposita.

EPIPLOCELE, est *Omenti Ramex* sive *Hernia*, in qua Omentum in scrotum per processum peritonæi dilatatum, prolabitur, ex ἐπιπλοον omentum, & χήλη tumor. B. *Een net- breek*. G. Netz-bruch. Gall. *Epiplocele ou Hernie de la coëffe*. A. A rupture when the omentum falls into the cods.

EPIPLOCOMISTÆ, sunt homines obesi & ventre tumidi, quibus est pingue, & magnæ molis omentum, idque in sæminis *Conceptioni* impedimentum quandoque fuisse, scriptorum monumenta testantur; idcirco & omenti gestatores appellantur, ἐπιπλοον omentum, & κομίζω gero, sero. B. *Dikke buik*. G. Ein dick bauch. Gall. *Ventru*. A. Fat or big-bellied.

EPIPLOMPHALUM, est Hernia umbilicalis, quando ab omento tumido dilatatum peritonæum ex abdomine in umbilico nimis protuberat, ab ἐπιπλοῶν omentum, & ὄμφαλον umbilicus. B. *Nabel-bruch*. G. Nabel-bruch. Gall. *Hernie de nombril*. A. The Navel rupture.

EPIPLOON, OMENTUM, seu **RETICULUM**, est operimentum membranaceum intestinis superstratum, eorumque convolutionibus aliquomodo insinuatum, originem à ventriculi fundo, & Intestini coli dorso ducit, quibus adhæret, nempe à peritonæi duplicatura; internè est liberum; est autem membrana duplicata ubique, internè vacua, hinc figura est instar retis seu Aucupis marsupii; plurimis vasis sanguineis, ductibus, & folliculis adiposis abundat; usus est intestina & ventriculum, pinguedine suâ instar pulvinaris fovere. & pinguedinem recipere, quæ calore, motu, attritu, perpetuò in oculis hisce oleosis mirificè attenuatur, acrior, volatilior, bili similis redditur, ita ut tandem ex sacculis his adunatis, inque ductus quosdam patentibus, collecta hæc materies oleosa, mutataque ita expellatur ex omento, & per binas venas Epiploicam dextram & sinistram deferatur ad hepar, undè materiem bili in hepate suppeditat. Ab ἐπιπλωτικῶν supernavigo. B. *Det Det*. G. Das Netz des Eingeweids, Darm-netzlein. Gall. *l'Epiploon ou Coëffe qui couvre les intestins*. A. The Caule.

EPIPOROMA, callus dicitur vel tophus in articulis enatus, & induratus, ab ἐπιπώρω induro.

EPISARCIDIUM, vel **HYPOSARCIDIUM**, idem quod *Anasarca*, ex ἐπὶ insuper, & σὰρξ caro.

EPISCHION, est os pubis, seu pecten. Os transversum & latum in imò ventre quod pubi subjacet, & intestina munit, ex ἐπὶ super & ἰχίον os coxæ. B. *Schaambeem*. G. Das Scham-bein. Gall. *l'Os Pubis*. A. The privie bonne.

EPISCOPALES VALVULÆ, à figura sic dictæ, vocantur & *Mitralæ* & *Sigmoides*, tales duæ in vena pulmonari reperiuntur, ne sanguis è corde veniens refluat. B. *De Bisschops gelpkenende miters klappliezen*. G. Die Mutzen gleiche hæutlein im hertze. Gall. *Valvules mitrales*. A. The Mitral valves.

EPISEMASIA, est ipsa morborum invasio; sive illud tem-

tempus, quo morbus primò notatur, & propriè *Significatio* dicitur, ab ἐπισημείω infuper significo.

EPISION, est pubis regio sive *Aqualiculus*.

EPISPHERIA, sunt gyri & anfractus exteriori substantiæ cerebri insigniti, uti vasa sanguifera, per cerebri substantiam distributa, ex ἐπὶ supra, & σφαῖρα globus.

EPISPASTICA, sunt quæ derivant liquidum in partem, cui applicantur, tantâ vi ut vasa tenerrima, lymphatica, & sudori & materiæ perspirabili dicata, rumpant; liquor autem effusus ab Epidermide illæsa, in vesiculas elevata, retinetur; hinc illa medicamenta, quæ id præstant constare debent ex partibus tam acribus & tenuibus, ut per epidermidem illæsam transeuntes sese lateribus dictorum vasculorum infigant, atque aperiant; epidermidem verò intactam relinquunt, quia vasa, si adsunt, paulo adsunt numero, & vis vitæ ibi valdè debilis. Idem quod *Attrahentia*, ab ἐπισπᾶω attraho.

EPISTOMIA, sunt extrema vasorum oscula, ex ἐπὶ ad, & στόμα os. Chemicis sic dicuntur spiracula in furnis, quæ *Ventilia* & *Registra* quoque vocantur. B. *Het togt of windgat*.

EPISTROPHÆUS, est colli vertebra secunda, sic dicitur à vertendo: nam ex medio ejus corpore assurgit appendix instar dentis canini, circa quam caput cum prima vertebra vertitur. Olim prima eodem nomine veniebat, ab ἐπιστρέφω circumverto. B. *Den draper*. G. Die andere gelencke des halses. Gall. *La seconde vertebre du col, qui a une eminence en maniere de Pivot ou de dent*. A. The first joint or Vertebra of the Neck.

EPITHEMA, est Medicamentum externum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati, linteo stupave exceptum admovetur, ab ἐπιτίθημι impono. B. *En betting / stoving*. G. Ein warmes tuch, damit einmman einen gliedmas wärme zufugt. Gall. *Fomentation*. A. A kind of fomentation used chiefley to the more noble parts.

EPITHYMBRUM, EPITHYMBRA, est musci species Thymbræ adnascens, ex ἐπὶ ad, & θύμβρα Thymbra.

EPITHYUM, est musci species, Thymo adnascens, ex ἐπὶ ad, & θύμῳ Thymus.

EPOMIS, est superior humeri pars, quæ & *Acromium* nominatur, ex ἐπὶ supra, & ὤμῳ humerus. EPOM-

EPOMPHALUM, est Emplastrum vel aliud quid, quod extuberantiis umbilici applicatur, ex ἐπι supra, & ὀμφαλῶς umbilicus. B. **Navel-pleister**. G. Navel-pflaster. Gall. *Emplastre pour le nombril*. A. Navel-plaister.

EPSEMA, est decoctio musti in defrutum, ab ἐψω coquo.

EPULIS, est in gingivis excrescentia, ad intimos molares contingens, ita ut oris apertio impediatur, ex ἐπι supra, & ἔλαο gingiva. B. **Bastert tand-bleig**. G. Auswachs des zahnfleisches. A. An excrescence of besh in the gums.

EPULOTICA, idem quod *Cicatrizantia*, ab ἐπυλῶ cicatricem infero.

EQUISETUM, Est planta duplex, majus aquaticum, & Equisetum minus terrestre vel arvense longioribus festis: Prius habet caules sesquipedem vel duos pedes altos, rotundos, asperos, excavatos, plurimis tubis in se invicem inarticulatis instructos, quæ articulatio nodos format per intervalla: folia teretia, pyxidatim articulata, cava: flores sunt apetalii, flaminei, apice fungiformi donati, spicati, fructus in equiseti speciebus, quæ floribus carent, sunt grana nigra aspera & fracta: radix est repentinissima, nigricans: hæc planta crescit in pratis & circa flumina. Altera equiseti species ab hac tantum differt in eo, quod folia & asparagi sunt longiores, tenuiores, molliores: Gr. ἐπυρεῖς, est Planta caudæ seu seræ equinæ æmula. B. **Paarde-staart**. G. Rosz-schwantz, Pferd schwantz, Schafftheu. Gall. *Prêle, Queue de Cheval*. A. Horse taile.

ERANTHEMUM, seu Delphinium, camomilla, sic dicitur quod verè floreat, ἔρ enim est ver, & ἄνθος flos.

EREBINTHUS, est cicer: sic dicitur quod femina in vasculo, quasi flatu distento, bina ferat ad instar testiculorum (quod tamen non de omni, sed de quodam ciceris genere verum est) vel quod maximè venerem excitat. Vide quoque vocem *Orobis*.

ERGASTERIUM, furni pars.

ERICA, Est frutex, qui habet caules vel virgulta numerosa, dura, lignosa, ramosa, pedem unum vel sesquipedem alta, coloris rubicundi fusci, aut obscuri; folia exigua aliquantulum dura & aspera, semper virentia, Tamariscum referentia: flos monopetalus, campaniformis, nudus, sæpè urceolum referens: ovarium in fundo fit fructus subrotundus, quadrifariam hians, quadrilocularis, fectus

foetus feminibus exiguis imò flore ut calice, tectus : radix lignosa est, se in terra extendens : hæc arbuscula crescit in sylvis, & sterili squalido, palustri, & spongioso solo viget : deducitur à verbo Græco *ερίκω* frango, confringo : an, quia frangat, abradatque, idque scopis ex Erica colligatis, inque fasciculum redactis? an ab *ἐρημ* desertum, quod in desertis & sterilibus locis proveniat? At corrupta vox à Myrica, quod eam aliquomodo referat? B. *Wride*. G. Heide. Gall. *Bruyere*. A. Heath or Ling.

ERICERUM, Gr. *Ερίκηνον*, Collyrii species est, cujus aliquot differentias *Aëtius* enumerat. Denominationem à fructu ericis accepisse videtur.

ERIGERUM, seu SENECIO, sic dici volunt, quod vere tam citò ejus flores in lanuginem vertantur : atque senescat, seu quasi vernus senex, ab *ἔρ* Ver, & *νέων* senex, undè & quoque *Senecio* dicitur. Vide *Senecio*.

ERINUS, est nomen variis plantis impositum ; Latinis *Caprificum* sonat, sic vocantur quædam Campanulæ, Bazilici, & Ezulæ species, an ab *ἐρ*, quod cum ex arbore velut contendendum sit & luctandum, ut maturet fructus suos.

ERIOPHORUS BULBUS, quasi diceret bulbus laniferus, idque propter lanuginem, quæ inter radicum laminas, est ex *ἐρίον* lana, & *φίρω* fero.

ERODENTIA, sunt Medicamenta, quæ peregrinum tenax adhærens in ulceribus, & ipsa vasorum ramenta tenuissima semi corrupta resolvunt, & consumunt. B. *Wegstende middelen*.

EROSIO, idem quod *Corrosio*.

ERPES, vide *Herpes*.

ERRHINUM, Barbaris *Nasale* & *Caputpurgium*, est Medicamentum, quod metæ formâ naribus inditum, sine sternutatione, humores & præsertim viscidos evacuat. Estque liquidum, molle vel solidum. *Liquidum* fit vel ex succis herbarum errhinarum, & cephalicarum, ope vini, aut alterius liquoris, extractis, quibus aliquando spiritus vini admiscetur, *Vel* ex decocto simplicium idoneorum, additis nonnunquam succis, melle, oleo, vel succis excepto, & ad unguenti formam decocto. *Solidum*, vel formâ pulveris datur, & hoc in sternutatoriis maximè locum habet, *vel* formâ turundæ & dicitur *Nasale*, paraturque
ex

ex pulveribus idoneis, mucilagine, cerâ, vel terebinthinâ exceptis, ab ἐν in, & ρίς nasus. B. *Nies-water*. G. Eine arszney die das niesen bringt. Gall. *Sternutatoire*. A. A Sternutatory.

ERUCA, Planta officinalis antiscorbutica, est, cujus variæ dantur species, tum fativæ, tum sylvestres: fativa habet caules parùm lanuginosos, duos circiter pedes altos: folia sinapi albi minora, tenera, glabra, sine lanugine: flos cruciformis, quadrifidus, coloris sub cærulei albi, punctis nigris notatus; flori succedit filiqua longa, divisa in duos loculos, continentes semina subrotunda, flava: radix alba, tenuis, lignosa: hæc planta crescit in pratis, sapor ejus singularis: sylvestris parùm à precedenti differt. Dici volunt; quod ob acrem saporem linguam erodat: hæc enim, ubi degustaveris, os & linguam satis acriter vellit. Græcis ἐνζυμων, quoniam jura commendet, habeatque in eisdem peculiarem gratiam, ex ἐν benè, & Σομὸς jus, esculentum. B. *Raket*. G. Raucken, Raucken-kraut. Gall. *Roquette*. A. Rakett.

ERUCTATIO, vide *Ructatio*.

ERVILIA, & ERVUM, est leguminis minoris species, dicitur ab *Eruendo*, capitur enim & manu vellitur. Hinc fortè nostris G. *Erten* / *Eruten* & *Erweten*.

ERYNGIUM, & ERINGIUM, est Cardui species: est planta, quæ habet caulem sesquipedem vel duos pedes altum, rotundum, striatum, medulla alba repletum, in summitate in multos ramos divisum: folia sunt ampla, profundè incisa, dura, spinosa, alternatim in caule disposita: in summitate caulis sunt capitula squammosa aculeata, unita foliis quam plurimis repentibus, oblongis, latis, villosis: flores ad umbelliferos referuntur: formâ capitulorum cum dipsaco convenit: radix est longa, digiti crassitie, & interdum pollicis, foris nigricans, intus alba, saporis subdulcis & grati; discissa & pressa succum dat croceum: hæc planta crescit in locis arenosis, in campis, maris littoribus. Dicitur & *Iringus*, ab ἐρύγγειν, ab eructando putant, quòd capræ, quæ morsu furculum Eryngii præciderint, vel deglutiverint, cunctam gregem ponè sequentem, quasi stupore attonitum sistant, donec Eryngium ructu rejecerint, ast Eryngium non manducat capra. Sed ἐρύγγιον vel ἐρύγγιον aliis dicitur, ab ἐρύγω amo, & ἔγγειν, nem.

nempè ex ἰ pro ἐν & πρὸς, quod suis capitibus aspectu sit amabile, gaudet enim plurimis capitibus, hinc *centumcapita* appellatur. Vel dicitur quòd τῶ ἥεν sit εἰρηλῆ, quòd verno etiam tempore molestum sit suis spinis, quibus facile lædit. Vel quòd radicem habeat longè latèque per agros serpentem rusticis admodum molestam. B. *Kruis-distel / endeloos*. G. Sichen-kraut, manns-treu, roden-distel, brackend-distel. Gall. *Panicault, Chardon Roland, Chardon à cent têtes*. A. Sea holly or eryngo.

ERYSIMUM, Est planta, quæ habet caulem duos circiter pedes altum, rubicundum, villosum, ramos quosdam flexiles dimittentem: folia bina, sibi invicem opposita, sinapi referentia, profundè incisa: flores sunt exigui, quadrifidi, flavi, cruciformes; flori succedit filiqua tenuis, rotunda, septo medio divisa in duo loculamenta, feminibusque facta, ut plurimum exiguis & rotundis, saporis acris & fervidi: radix alba, lignosa, acris, digiti minimi crassitie: hæc planta crescit in locis desertis & inter olera recensetur, nomen accepit ἀπὸ τοῦ ἐρείκειν, à multiplici foliorum sectione. Vel ἀπὸ τοῦ ἐρύειν, quod ob suam caliditatem maximâ trahendi vi præditum sit, quod inter fruges refertur, nomen invenit ab adverso, quasi ἐρύτιμον, quod minimè pretiosum & nobile est. Vocatur etiam *Irion* & *Rapistrum*. B. *Edel Klette*. G. Wegsenst, Hedderich. Gall. *Velar; Ravenou*. A. Hedgemustard.

ERYSIPELAS, Ignis sancti Antonii, ignis facer *Columell*, ignis *Sammonico*, ἐρεθόπιας Poll. πῦρ ἀγρίου Hippocrati. Est tumor præter sanitatem in cute, aut quâcunque parte carneâ, vel membranosa excitatus, rubicundus, flavescens, latus, non altè ascendens, nec pulsans, sed cum dolore punctorio, à sanguine in valis Lymphaticis impresso & hærente productus. Aliquando elevatur in bullas, ac si cantharidum emplastris essent excitatæ, tuncque dicitur nobis. B. *De Belroos*. In genere tamen dicitur *De Roos / St. Anthonis vuur* / ex ἐρυθρον πέλαις propè, fermè, varias habet differentias, prout altiùs affurgit, vel depressiùs est, aut majori aut minori cum calore, ut Tumor *Erysipelatodes, Phlegmonodes, Oedematodes, Scirrhomodes &c.* G. Die Rose, das Heylige feuer, St. Antonius feur, das Rothlauff, die brennende Raach, die Rosesse. Gall. *Erysipèlle, le feu Saint Antoine, la Rose*. Si occupaverit

occupaverit faciem, *la Rose au visage* dicitur. A. St. Antonies Fire.

ERYSIPELATODES, est tumor Erysipelati similis, sive Erysipelas spurium, ex *ερυσίπολος* inflammatio, & *ιδ* forma. B. *hooſagtig*.

ERYTHREMATA, sunt rubores pulicares, in febris pestilentialibus frequentes, ab *ερυθρίδα* rubesco. B. *Pletiken als bloſe bren*. G. Kleine flecken.

ERYTHROIDES MEMBRANA, est post *Elythroidem* secunda, *rubea* dicta, testem involvens, externè adhæret vaginali tunicæ, internè verò albugineæ. *Rubea* dicitur à colore, nam *ερυτρον* est rubrum, & *ιδ* forma. B. *Het roode bal-vlies*.

ESCHARA, Gr. *ἐσχάρα*, est crusta ulceribus superinducta, vel cauterio aut ruptorio excitata, ab *ἔχω* habeo, & *ερα* terra; quia se habet instar terræ damnatæ, vel ab *ἐχαεῶν* crustam induco. B. *De koſt*. G. Grind, rufe, ræude. Gall. *Eſchare*, *Crouſte d'ulcere*. A. An Eſcar.

ESCHAROTICA, idem quod *Cauſtica*, ab *ἐχαεῶν* crustam induco.

ESCULUS, est arbor glandifera, fortè sic dicta, quod ejus glandes comedantur. Vide *Æſculus*.

ESCURA, idem quod *Eſchara*.

ESSENTIA, essentiæ vocabulum significat accuratè loquendo balsamicam rei partem (seu in qua vires potissimum resident) à crassiori separatam, quare cum exactissima rei separatio beneficio extractionis peragatur, sit ut pars illa balsamica à crassiore corpore extracta essentia κατ' *ἐξοχήν* dicatur, alias à modo fiendi extractum, nonnunquam attribuitur essentiæ vocabulum succis expressis ac spissatis. Verùm præstaret hoc proprio suo nomine, quo minùs confusio oriatur, nominare. Sunt & qui elæ sacchara essentias vocant, sed abusivè. B. *Wezentheit / het pit*. G. *Dasz wesen*. Gall. *Effence*. A. *Essence*.

ESSENTIA QUINTA, sive **CLYSSUS**, est Medicamentum, ex integris constituentium particulis energeticis sive activis constans, separatis ab inertibus. B. *De vyfde wezentheit / de quinte essentie / het pit of kragtigſte der Medicamenten*. G. Die nessel-fucht, quintessenz. Gall. & A. *Quint essence*.

ESSERE, **SORA** & **SARE**, etiam nominant: sunt

tubercula parva, ad rubrum vergentia, duriuscula, cum intigni pruritu subitò universum corpus occupantia, non scœus ac si ab apibus, vel vespis vel culicibus, homo demorsus, aut urticis percussus esset: Non ita tamen post longum tempus evanescunt, nulloque ichore vel aliâ humiditate affluente, cutis pristinam levitatem & colorem recuperat. Dissert ab *Epinyctide*, quod in hoc affectu ichor manat, in Essere non item.

ESTHIOMENOS, est herpes exedens, causa est, quod papulæ cutis humorem quendam acrem in se contineant, qui ob perspirationem inhibitam corrumpitur, & acrimonia sua non tantum cutim, sed etiam subjectas partes corrodit, ab *εσθίων* comedo, *ἔγω* repo. B. *Haarwurm*. G. Ein Haar-wurm, Haupt-gruend. Gall. *Esthiomene*; *herpes*. A. An inflammation in the Shin, Sharp of biting.

ESULA seu EZULA, est Tithymali species, quæ distinguitur in majorem & minorem, hæc plures habet caules pedem altos, ramosos, folia gerentes angusta instar pini, lacte turgentia: flos ut in Tithymalo majori de quo sub titulo Tithymali; radix oblonga, esula majori tenuior foris fusca, intus ex flavo albescens, lacte acri turgida: dicitur & Pityusa. Nomen diductum à *πιτυύση* videtur; duabus enim syllabis sublatis, remanet, *ἔσα*, cujus diminutivum *Ufula*, & vocali primâ mutata *Esula*. B. *kleine spurge*. Gall. *Petite Esule*. A. little small spurge.

ETHMOIDES, OS CRIBRIFORME, est ex octo ossibus capitis unum, situm est ad partem inferiorem ossis Frontis immediatè supra nasum internum, sex apophysibus donatum, & plurimis foraminibus pervium pro nervorum olfactoriorum transitu, ab *ἔθμος* cribrum, & *εἶδος* forma. B. *Het zeefbeen*. G. Das sieb gleiche bein. Gall. *l'Os Ethmoide*. A. Thebone like à sieve.

EVACUATIO, est quæcunque depletio contentorum ex quolibet cavo corporis, Gr. *κένωσις*, est vel arte vel per se. *Arte* si sanguis evacuetur, aut purgando, vomendo &c. vitiosi humores ex ventriculo & intestinis evacuentur. *Per se* ut in hæmorrhagia, menstruorum evacuatione, mictione, sæcum alvinarum evacuatione &c. B. *untieyng*. G. Aufszuehrung, das entledigen. Gall. & A. Evacuation.

EVAPORATIO, idem quod *Diaphoresis*. Item fit, quando succi, lixivia, aliaque leni igne evaporando in spissio-

spiffiorem consistentiam rediguntur. B. *uitwaassening / uitdamping*. G. Aufzdempffen. Gall. *Evaporation*. A. *Evaporation*.

EUCHROA, est color & nitor bonus, ab εὔ benè, & χρῶμα color.

EUCHYLOS, est qui succis bonis abundat. Ita alimenta, quæ bonum succum præbent, dicuntur, esse boni succi, ex εὔ benè, & χυλός succus. B. *Goedsappig*. G. Voll von gutem safft. Gall. *De bon suc*. A. Good nourishment.

EUCHYMIA, est optima succorum temperies & constitutio, ab εὔ benè, & χυμός succus. B. *Een wel gestelt heit der sappen*. G. Suiker safft. Gall. *De bon suc*. A. Good nourishment.

EUCRASIA, est *Temperamentum bonum*, five illa corporis conditio, quâ tum solida, tum fluida, pro ætate & sexu, optimè sunt disposita, & in se invicem agunt, ita ut sanitas in cunctis obtineat: Εὐκρατος benè temperatus, ab εὔ benè & κράνυμι misceo. B. *Een goede getempertheit*. G. Gut temperament, gesundheit. Gall. *Un bon temperament*. A. A good habit of body.

EUDIAPNEUSTOS, qui benè perspirat & optimam habet *Diaphoresin*, ex εὔ benè, δια per, & πνέω spiro. B. *Die wel dootwaassene*. Illi semper sani sunt.

EUECTICA, idem quod *Gymnastica*, five *Medicinæ* pars, quâ aptis exercitiis bonus habitus acquiritur, ab εὔ benè & ἔξ habitus.

EUELCE, Laborans ex ulceribus, curatu facillimis, ab εὔ benè, & ἔλκε ulcerus. Cujus oppositum est *Dyselces*. Vide suo loco.

EUEXIA, est optima, & sana habitudo, ab εὔ benè, & ἔξ habitus. Cui opponitur *Cachexia*, malus habitus.

EUFORBIUM, idem quod *Euphorbium*.

EUFRASIA, idem quod *Euphrasia*.

EUGEOS, est uterus, sic dicitur ob analogiam cum terra fertili, hoc nomine etiam *Hymen* appellatur, ab εὔ benè, & γαῖα seu γῆ terra.

EUODES, est odor excrementorum suavis, ab εὔ benè, & ὀσμή olfacio. Cui opponitur *Dysodes*, malè olens.

EUONYMOS, Est arbuscula, cujus lignum est durum, coloris flavi, albescentis; habetque folia oblonga, acuta, dentata, mollia; calicem monophyllum, quinquifidum,

aut quadrifidum; florem rosaceum, tetrapetalum vel pentapetalum, staminibus quatuor vel quinque factum; Ovarium in fundo calicis instructum tuba bifida, unde fit fructus membranaceus, angulatus, in loculamenta quatuor divisus, quorum singulum continet semen longum, solidum, crocei coloris externè, continens medullam albam, saporis amari & ingrati; hæc arbuscula habet odorem penetrantem, & crescit in locis incultis ita dicitur quasi boni nominis per Antiphrasin; unde quædam Exemplaria habent *Anonymos*, vide *Anonymus*, ex ὄνομα bene, & ὄνομα nomen; vocatur etiam Fusanus. B. *Papen-hout*. G. Spindel-baum. Gall. *Fusain*, *Bonnet de Prestre*. A. Spindel tree, or Prickwood.

EUOSMA, idem quod *Euodes*.

EUPATORIUM, Est planta ramosa, cujus caulis quatuor vel quinque pedes est altus, rectus, rotundus, lanuginosus, viridis purpureus, medullâ albâ repletus, & ubi dissecatur, odoris est aromatici & grati: folia sunt hinc inde per intervalla posita, oblonga, plurima simul juncta, acuta, in margine dentata, villosa, saporis amari: flos in umbellam congeitus plurimis flosculis (ex quibus longa capilamenta plerumque surgunt) constat multifidis, embryoni insidentibus, & calice longo, tereti, ac squamoso comprehensis: Embryo autem abit in semen pappis instructum: radix est fibrosa, alba, amara, crescit in locis humidis aquosis. Nomen volunt invenisse Regem Eupatorem, qui illam herbam primus invenit. Sed fortè sic dicitur, quod Hepatis morbis medeatur, unde *Hepatorium* quoque appellatur, & tum derivatur ab ὄνομα bene & ἥπαρ Hepar. B. *Boelkens-kruid* / *Woninginnen-kruid*. G. Wasser-dost, Kunigund-kraut, Hirtzguntzel, Alb-kraut, Hirtzen-klee, ondermennig. Gall. *Eupatoire*. A. Eupatory, or Agrimony.

EUPATHIA, seu **EUPHORIA**, est affectio, quæ faciliè fertur, ex ὄνομα bene, & πάθος affectus, cui opponitur *Dyspathia*, vide suo loco.

EUPEPSIA, cui opponitur *Dyspepsia*. Est coctio ventriculi facilis, unde alimenta dicuntur *Eupepta*, quæ faciliè in ventriculo dissolvuntur, ex ὄνομα bene, & πepsis coquo. B. *Ern goede koking*. G. Gute verdauung. Gall. *Une bonne digestion*. A. A good digestion.

EU-

EUPHORBIIUM, est gummi concretum acerrimum, ex fauciatâ herba ejusdem nominis extractum; quæ est frutex hominis longitudinem superans, cujus cortex est durus, & spinosus: folia digitum longa, crassa, figura quadrangulari, in singulis angulis multas exiguas spinas habentia: flores pentapetali, coloris viridis subflavescentis, succedit fructus pisi magnitudine triangularis, in tria loculamenta divisus, unico facta semine oblongo. Nasctur in modum ac si singula folia repræsentarent aculeatos cucumeres; totum enim folium spinis albis oblitum est, ita ut manibus prehendi absque læsura non possit: Plantam hanc hic Amstelodami viventem vidi. Gummi igitur ex incisis foliis emanans sole induratur, illud debet esse purum, aliquando & spinas aliasque festucas admixtas habet, flavescit aliquomodo, aliquando albescit. Admodum & naribus & linguæ acre est, & vehementer alvum ducit. Venit ex Lybia, Mauritania, Peru &c. nomen adinventum primùm Juba Lybiæ Rex in monte Atlante ultra Herculis columnas, appellavitque *Euphorbium* Medici sui nomine, & Fratris Musæ, à quo divus Augustus fuit conservatus. Facile quoque nomen diduci posset ab εὐφορίῳ, modo facile ferri tolerarique posset, est enim vehemens Catharticum. Gall. *Euphorbe*.

EUPHORIA, idem quod *Eupathia*, ab εὐφορίῳ facile tolero. B. *Gen maskelys verdag*.

EUPHRAGIA, **EUPHRASIA**, vel **EUFRASIA**, Est parva planta, quæ plures habet caules tenues, villosos, nigricantes: folia parva, oblonga, venosa, minutim incisa: flos monopetalus, anomalus, personatus, in duo labia distinctus, quorum superius surrectum, & multifariam sectum; inferius verò in tres partes dividitur, quæ singulæ quoque bifidæ sunt, coloris albi, multis punctis purpureis & flavis notatus: ex calice surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod abit in fructum seu testam, exiguam, oblongam, in duo loculamenta divisam, seminibusque factam exiguis & albis: radix exigua, lignosa: crescit hæc planta in locis incultis circa vias. Sic ejus nomen à Græcæ linguæ imperitis Pharmacopolis depravatum est, cum olim εὐφροσύνη dicta sit, quod nimirum oculos, quorum caliginem discutit, delectet, ex εὐ & εὐφρων lætus. Hinc quoque *Ophthalmica* vocatur. B.

Oogentrooft / **flaar-oog**. G. Augen-troft. Gall. *Euphraise*. A. Eyebright.

EUPHROSYNE, idem quod *Euphrasia*.

EUPNOEA, est respiratio probè constituta, five respirandi facilitas, ab εὖ benè, & πνέω spiro. B. **Een makke lyke ademing**. G. Leichter athem. Gall. *Respiration facile*. A. An Easil breathing.

EUPORIA, est Medicamentorum præparandi facilitas, vel eorum operationis promptitudo, ex εὖ benè & πορεύω gradior. B. **Vaardige Medicyne**. G. Bewährte artzney. Gall. *Une Medecine éprouvée*.

EUPORISTON. Gr. εὐπόριστον. Est medicina facilè parabilis & obvia. G. Ein haufmittel.

EURHYTMUS, est pulsus in homine sano, Rhythmus seu ordinem benè servans, ex εὖ benè & ῥυθμός modulus. B. **Ordentelyke pols**. G. Ordentlicher pulsschlag. Gall. *Le Puls regulier*, *egal*. A. An Orderley Pulse.

EUSARCOS, Gr. εὐσαρκός, benè carnosus, seu torosus, five quadratus, ab εὖ benè, & σάξζ caro. B. **Wel in 't vleesch**. G. Voll mit fleisch. Gall. *Charnu*. A. Fleshy.

EUSEMIA, est bonorum signorum præsentia, ab εὖ benè, & εἶμα signum. B. **Een goed teken**. G. Ein gut zeichen. Gall. *Un bon signe*. A. A good sign.

EUSITIA, est bonus appetitus, ab εὖ benè, & σιτέω alo, nutrio, pascō, fagino. B. **Goeden appetijt**. G. Gut appetit. Gall. *Bon appetit*. A. A good appetite.

EUSPLANCHNOS, est is qui optima & robusta habet viscera, ab εὖ benè, & ἀσλαχνον viscus. B. **Die goede ingewanden heeft**.

EUSTOMACHUS, est benè constitutus stomachus: item cibus stomacho conveniens, ab εὖ benè, & εὐμαχος sinistrum ventriculi orificium. Quod & pro toto ventriculo sæpè sumitur. B. **Een goede maag**. G. Ein guter magen. Gall. *Un bon estomac*. A. A good stomach.

EUTHANASIA, est facilis & levis sine convulsionibus dolorificis mors, ex εὖ benè, & θάνατος mors. B. **Een gemakelyke dood**.

EUTHYPOROS, est rectus incessus, ab εὐθύς rectus, & πορεύω incedo.

EUTHROPHIA, est recta corporis nutritio, ab εὖ benè, & τροφή alimentum.

E U -

EUTOCOS, seu FÆCUNDA, quæ benè gerit, & facîle parturit, ab εὖ benè, & τόκος fætus, à τίκτω pario.

EUTONOS, qui firmus est, & debitum membrorum tenorem habet, ab εὖ benè, & τόνος tensio, à τείνω tendo.

EUTROPHIA, est optima nutritio, ab εὖ benè, τρέφω nutrio. B. Een goede voeding. G. Das gedeyen, zunehmen. Gall. Une bonne nutrition. A. A good nourishment.

EXACERBATIO, idem quod *Paroxysmus*.

EXÆRESIS, sic vocatur Chirurgiæ pars, quæ extrahit peregrina è corpore nostro, quæ ei nocebant, ab ἐξ ex & αἶρω, traho, demo. B. uithalinge. G. Aufzziehung. Gall. & A. Extraction.

EXAGIUM, est Veterum pondus scrupulos quatuor pendens.

EXALTATIO, Gr. Μεταρρυσμός seu SUBLIMATIO, est operatio, quâ res affectionibus mutata, ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur; vel est subtilisatio, res sensim dissolvendo, in puriorem & majorem virtutis suæ gradum transponens, & fit circulatione, ablutio, vel fermentatione. B. Opheffing / verhooging. G. Erhöhung, verbesserung. Gall. & A. Exaltation.

EXAMBLOSIS, idem quod *Abortus*. Gr. Εξαμβλωσις & Εξαμβλωμα, ab ἐξ ex & ἀμβλῶσις Abortus.

EXANASTOMOSIS, est osculorum, sive extremitatum vasorum apertio, ab ἐξ ex, ἀνομῶω aperio, relaxo. B. Opening der mouden der vaten.

EXANTHEMA, est EFFLORESCENTIA, seu EFFLORATIO, quædam super cutem apparens instar earum macularum quæ etiam in totius corporis cute apparent, à *Sennerto* dupliciter describitur; unum est quod colorem cutis saltem mutat, ut fit in febribus petechialibus, morbillis, maculis scorbuticis, hepaticis, lentigine &c. alterum in quo tubercula quædam in cute erumpunt, quæ papillarum nomine venire solent, ut variolæ, papulæ, pustulæ &c. ab ἐξανθῆω effloresco. B. uithottende blakke / puiſte. G. Blattern, bocken. Gall. Exanthème, Efflorescence. A. A pheale or pash.

EXARTHREMA, idem quod *Luxatio*, & quidem totalis, quando totus articulus ex sede sua naturali excidit: ab ἐξαρτέω, ex artubus sum dimotus. B. Onthd. G. Verrenckung, Gall. & A. Luxation.

EXARTICULATIO, idem quod *Luxatio*.

EXCATHISMA seu SEMICUPIUM, est balneum ex aqua calida.

EXCIDENTIA five ECPTOSIS, idem quod *Luxatio*.

EXCEPTIO, est incorporatio aut permixtio pulverum siccorum cum humiditate quapiam : hoc pacto *Electuaria* conficiuntur, cum melle aut syrupo pulveres & pulpæ excipiuntur : & pulveres pilularum cum syrupo, melle, vino, aut succo.

EXCIPULUM CHYMICUM, vide *Receptaculum Chymicum*.

EXCISIO, five ECCOPE, idem quod *Extirpatio*.

EXCIPULUM, idem quod *Recipiens*.

EXCORIATIO, idem quod *Darfis*.

EXCORTICATIO, est corticis exterioris denudatio, quod Pharmacopœis usitatum est circa radices, fructus, semina &c. B. *En ontbasting*. G. Abschelung der rinde. Gall. *l'Ecorcement*. A. Apeling awy of the bark.

EXCREMENTUM, Gr. Διαχρέμα, Περιττώμα, notat omne quicquid ab alimentis post coctionem separatum, crassius, indissolutumque existens è corpore est secernendum, vel quicquid cum sanguine circumivit, & subtilius atque acrius est, quàm ut corpus ampliùs nutriat, illive intersuiat, per excretoria corporis eliminatur, ut sudor, aurium sordes, alvi & vesicæ excremena &c. B. *uitdygzelg / dyek*. G. Unflat, roth. Gall. *Excrement, l'Ordure du corps*. A. The Offall, the refuse of any thing or excrements.

EXCRESCENTIA, idem quod *Hyperfarcosis*.

EXCRETIO, Gr. Διαχρέσις, est actio excernendi. Vide *Excrementum*.

EXELCISMUS, est ossium à superficie in profunditatem deductio, ab ἐξελκω extraho. B. *Indrukkinge des beens*. G. Einfallen der beinen. Gall. *Compression de l'os*.

EXERCITATIO, est motus corporis humani vehemens & voluntarius, sanitatis tuendæ, vel habitus boni comparandi gratiâ factus. Gr. Ἀσκησις, Ἀσκημα, Γυμνάσιον. B. *Oefening*. G. Uebung. Gall. *Exercitation, Exercice*. A. Exercise.

EXERCITIUM, est motus, quo corpus sanitatis gratiâ exercetur & movetur, estque *triplex*. I. Quod tantum

tum ab aliis fit, ut in equitatione, navigatione, & curru.
 2. Partim ab aliis & semetipfis, ut in gladiatoribus & luxatoribus. 3. A. semetipfis tantum, ut in ambulatione & pila, omnium optimè quod fit pilâ parvâ, vulgò **palletten**. *Exercitium* seu finis illius iterum triplex est; vel ad calorem, vel ad sudorem, vel ad anhelitum, & hoc sufficit. B. **En oefening**. G. Ein uebung. Gall. *Exercice*. A. Exercise.

EXHALTATIO. Gr. *Ἀναθυμίασις*. Idem quod *Evaporation*.

EXINANITIO. Gr. *κένωσις*. Idem quod *Evacuatio*.

EXISCIOS, est, quando os femoris luxatum est. Unde & illi, quibus nates rotundæ exstant & coxa eminet, dicuntur *Ἐσχίοι*, ab *ἐξ* ex, & *ἰσχίον* coxa. B. **Bankheup-ontzigtig**. G. Verrenckung der huefft. Gall. *Luxation de la hanche*. A. Luxation of the thigh bone.

EXOMPHALOS, est umbilici protuberantia, infantibus frequens, ab *ἐξ* ex, & *ὀμφαλός* umbilicus. B. **uitbulding des nabels**. G. Das heraufz wachsen des nabels. Gall. *Protuberance du nombril*. A. Protuberance of the Navel.

EXOPHTHALMIA, est oculi extra ordinarium situm protuberantia, ab *ἐκ* ex, & *ὀφθαλμός* oculus. B. **En uitpuilinge der oogen**. G. Das heraufz wachsen der augen. Gall. *Protuberance des yeux*. A. A Protuberance of the eyes.

EXOSTOSIS, est ossium extuberantia & excrescentia, seu ossium tubera, & eminentiæ inordinatæ à Lue venerea aut aliâs, ab *ἐξ* ex, & *ὀστέον* os. B. **uitwassing des beens / been-knobbels**. G. Ueberbein, aufzwachsen der beinen. Gall. *Exostose, excroissance de l'Os*. A. A Extuberance of the bones.

EXPECTORANTIA, Medicamenta sunt, quæ valent morbosam materiam intra Pulmonum bronchia contentam per Laryngem expellere. B. **Bozst-middelen**.

EXPLORATORIUM, idem quod *Specillum*.

EXPLOSIO, erat juxta quorundam medicorum hypothesein actio spirituum, quâ nervi subito contrahuntur: Causa dicebatur, quando spiritibus animalibus particulæ heterogeneæ accrescunt, vel in confusionem aguntur. Sed est potius operatio quædam Chymica, quâ res accensæ

subitò inflammantur, ut fit, si cum nitro accendatur Antimonii pulvis. B. *Ontploffing*. G. Das rauschen, getöcs. Gall. & A. *Explosion*.

EXPRESSIO ab EXPRIMERE, est, quando amygdala, aliave semina pingua post debitam contusionem, aut decocta, aut herbæ tufæ ob olea aut succum prælo exprimuntur.

EXPULSIO, idem quod *Expultrix vis*.

EXPULTRIX VIS, five facultas. Antiquis dicebatur illa actio seu facultas, quâ excrementa excernebantur, sed non necesse est ad cæcas vires confugere, cum scimus ea omnia à spiritibus animalibus fieri, motu scilicet peristaltico.

EXSOLUTIO, idem quod *Eclysis*.

EXSPIRATIO, seu ECPNEUMATOSIS, est aëris in Pulmone contenti per asperam arteriam, os & nares expulsio; cujus causa consistit in Thoracis dilatati collapsu, adeoque compressione Pulmonis; tum compressu musculorum abdominalium in viscera, proin in diaphragma; & denique in vi propria contractili fibrarum musculosarum Pulmonem constituentium. B. *uitademing*. G. Die aufzblasung. Gall. *Exspiration*. A. Idem.

EXSTASIS, est iudicii & imaginationis depravatio, maniacis & melancholicis familiaris, quâ diu cogitando circa unum objectum, mens quasi fixa stat absque iudicio ab *ἐξ* ex, & *ἵστημι* statuo. B. *Gen verrukking van zinuen*. Gall. *Exstase*.

EXSUCCATIO, idem quod *Ecchymoma*.

EXSUDATIO, idem quod *Ephidrosis*.

EXSUFFLATIO, idem quod *Ecphysefis*.

EXTA, Gr. *σπλάγνα*, idem quod *Viscera*.

EXTASIS, idem quod *Exstasis*.

EXTENSIO, idem quod *Anataxis*.

EXTENUATIO, est totius corporis macritudo. Gr. *λεπτωμένος*, & *λεπτίωσις*. B. *Der magering*. G. Magerheit, oder mager werden. Gall. *Extenuation*, *Maigreur*. A. *Leanness*.

EXTERGENTIA, idem quod *Abstergentia*.

EXTINCTIO, dicitur de lapidibus, v.g. CrySTALLIS, filicibus &c. toties candefactis, totiesque aquâ extinctis, usque dum evaserint friabiles: ac interdum metalla ignita liquo-

liquore aliquo extinguuntur, ut hic earum virium particeps. Ferrum aquâ, Aurumve vino extinctum, cujusmodi extinctiones crebrò in usum Medicum adhibentur. *Extinguere* etiam est, quando argentum vivum terebinthina, aliove liquido ita involvitur, ut nec micula ejus amplius conspici possit. B. *untblussing*. G. *Aussleichung*. Gall. *Extinction*. A. Quenching.

EXTIRPATIO, est partis solidæ propter sphacelum, cancerum &c. abscissio. Præstat, duorum, trium, pluriumve digitorum spatium ab articulo, excisionem fieri, nisi mortificatio se extenderit ad brachii aut femoris superioria, hic enim articulum ipsum eligere cogimur. Certior est ablatio in parte sana, majori licet cum dolore. Gr. Ἀποκοπή, & Ἐκτομή. B. *Erstirpatie* / *afsettinge*. G. *Abschneidung*. Gall. *Extirpation*.

EXTRACTIO, ab **EXTRAHERE**, est resolutio, quâ corporis mixti partes subtiliores à crassioribus ope menstrui solventis segregantur: Ex gr. quando mediante spiritu vini vires ex quocunque Medicamento extrahuntur, tunc illud, quod post menstrui evaporationem relinquitur, vocatur *Extractum*. B. *Gen uittrechlung*. G. *Aufziehung*. Gall. *Extraction*. A. An Extractio. Gr. Ἐκχύλωσις, Ἐκχύλωμα. Chirurgicè quoque sumitur pro extractione rei è corpore humano, e.g. dentis, calculi, polypi, globuli plumbei &c.

EXTRACTUM, Gr. ὀπός, undè *Opium* & Ἐκχύλωμα, est purum, sincerum & efficax illud, quod à partibus minùs efficacioribus, mediante liquore, segregatum & ad justam consistentiam inspissatum est. B. *Gen uittrechzel*. G. *Dasz aufgezogen ist*. Gall. *Extrait*. A. An extract.

EXTRAVASATUM, dicitur de humore vel sanguine, qui è vasis effluxit, sive adhuc hæreat intra partes corporis molliores, sive penitus ex corpore effluerit. Gall. *Extravase*.

EXTUBERATIO, idem quod *Apophysis*.

EXULCERATIO, Gr. Ἐλκωμα Ἐλλωσις, est solutio continui, à materia erodente originem trahens, in mollioribus corporis partibus, cum imminuta magnitudine. Differt ab abscessu, quod abscessus producitur per se, prægressâ tantùm Inflammatione. Exulceratio item est magna, parva, lata, brevis, angusta, recta, transversa, sinuosa, æqua-

æqualis, inæqualis, &c. B. *En verzweringe*. G. Verwundung, verfehrung der haut. Gall. *Exulceration, Blesfure, Entameure de la peau*. A. An Exulceration.

EXUMBILICATIO, est *Hernia Umbilicalis*, seu Umbilici procidentia. Idem quod *Exomphalos*.

EXUSTIO, est, quando quis ab igne læsus fuerit. Estque triplex, *prima* lædit cuticulam, & cum vesiculis aquosis elevatur; *secunda* ipsam quoque cutim; *tertia* partes etiam cuti subjectas. Gr. *ἑλκυσσις*. Illa *Exustio* sæpè studio & arte Chirurgicâ fit, ope cauteriorum candentium. B. *Brandig*. G. Brand, brunst, verbrennen. Gall. *Bruslure*. A. A burning.

EZULA, vide *Esula*.

F.

F Significat in fine formularum *Fiat*.

F. L. A. Est Fiat Lege Artis.

F. S. A. Est fiat secundum Artem.

FABA, habet caules tres pedes circiter altos, quadratos, excavatos: folia sunt oblonga obrotunda, crassa, pinnata, bina velut conjugata ad costam, quæ in mucronem abit: flores sunt leguminosi, oblongi, coloris aliquando albi, striis nigris instructi, aliquando purpurei, nigricantes: flori succedit filiqua longa, crassa, carnosa, unicapularis, facta feminibus reniformibus oblongis, elatis vel ovalibus, coloris varii, plerumque albi: radix longa, partim recta, & partim repens, fibrosa: Gr. *κράμβη*, & *φάσηλος*, à Faliscis hoc vocabulum Latinis una immutata litera, dicebant enim *Habam*, quam Latini *Fabam*, propter literarum cognominationem *F. & H.* B. *Boonen*. Gall. *Feve*.

FABA SANCTI IGNATII, sunt fructus Nucis vomicæ legitimæ Serapionis Camelli, habentes carnem amarā, flavā, avellanæ nucis magnitudine, variæ tamen formæ: sunt hi nodosi, durissimi, corneæ substantiæ, coloris inter album & glaucum medii: Ex India orientali affertur, estque celebre antifebrile in Tertiana.

FABARIA, sic appellatur Telephii quædam species, idque à foliorum figura & crassitie à faba. Vide *Telephium*.

FACIES VULTUS, Gr. *πρόσωπον*. Anterior capitis pars non capillata, continens oculos, nasum, os, labia, men-

mentum, genas, frontem &c. B. *Het aangezicht*. G. Das angelicht, antlitz. Gall. *La Face, le Visage*. A. The Face, the Visage.

FACIES HIPPOCRATICA, dicitur, quando nares acutæ sunt, oculi concavi, tempora collapsa, auriculæ frigidaë & contractæ, auriumque lobi inversi, quin cutis, circa frontem dura, tum circumtensa & arida, color totius faciei pallidus, lividus, plumbeus aut niger. B. *Gen Hippocraats wezen*. G. Bleiche farbe, uebel aufzehen. Gall. *La Face, vel le visage d'Hippocrate; l'air Ethique*. A. The Face, or Visage of Hippocrates.

FACULTAS, sive *Δύναμις*, aut *Vis*, est actio quæ ab homine, vel solo corpore, vel corpore & mente, peragitur. Vid. Actio. B. *Magt / kragt*. G. Macht, vermögen. Gall. *Faculté, pouvoir, puissance*. A. Faculty, power.

FÆCULA, vide *Fecula*.

FÆX, vel FÆCES, sunt reliquiæ, quæ post fermentationem deponuntur. Subsidentia item est liquorum, spissitudinem habentium, ex tenuioribus se separantium, ex quorum specie habentur fæculæ. B. *Gist / evel / droesem / grondsoep / onzuiverheid*. G. Trüfen, hesen. Gall. *Lie, Fondrille*. A. The Dreggs, lees or groundes. Vide Excrementa.

FAGITRITICUM, & FAGOTRITICUM, idem quod *Fagopyrum*.

FAGOPYRUM, est frumenti species, sive planta, duos pedes vel duos cum dimidio, alta, quæ habet caulem rotundum, mollem, excavatum, rubicundum: folia in initio obrotunda, postea angulosa, hederam referentia, sed minora: flos est apetalus, parvus, albus, in spicis vel racemis aut muscariis habet octo stamina è calice quinque partito surgentia: Ovarium in calicis fundo innascitur in placenta eleganter globulis in orbem positis ornata, est triquetrum tres emittens tubas, fit semen triquetrum, nigricans, farinosum, intus album: radix fibrosa annua: colitur in agris, & nullum solum quantumvis aridum, & macrum respuit, sic dicta à feminis figura, quod Faginam glandem, figura triquetra, & colore sordido, quodammodo refert, licet quantitate multo minus: est enim vox ex Latino nomine Fagus, & Gr. *πυγὸς* Triticum, Frumentum, composita: hinc loco *πυγὸς* dicitur *Fagotriticum*,
vel

vel appellatur *Fegopyrum*, φηγὺς enim arbor glandifera est. B. *Boek-wit*. G. Heydenkorn. Gall. *Blé noir*, ou *sarracin*; *Dragée aux Pourceaux*. A. Buck-wheat.

FAGUS, est arbor glandifera, magna, crassa, ramosa, cujus cortex mediocriter crassius, politus, coloris grisei cinerei: lignum est durum, album: folia populi sunt minora, nigra, tenuia, mollia: flos mas, amentaceus, glomeratus, constans staminibus plurimis è calice campaniformi surgentibus: fructus in eadem arbore, à floribus separati nascuntur, callosi, acuminati, quadrifido apice dehiscentes, foeti binis seminibus trigonis, duris, polius, rubicundis, internè habentibus medullam albam, edulem, saporis dulcis cum aliqua adstriptione: hæc arbor crescit in pratis, & locis montanis, & magnam umbram facit. Gr. φηγὺς, ita dicta ἀπὸ τοῦ φάγειν, à comedendo, quod ante inventas fruges (ut fabulantur Poëtæ) homines ejus arboris glandibus solebant victitare: dicitur etiam Græcis ὄζυγ, ὄζυα, ὄζεα, à foliorum forma, & forsan calicis & fructus sapore. B. *Beuken-boom*. G. Buch-baum, buche. Gall. *Hestre*, ou *Fau*, *Fouteau*, *Fayant*. A. Beech.

FALX, est duræ meningis duplicatio, sinum *Falciformem* dictum continens, figurâ falcem referens, inferius sinui tertio annexam, hinc autem anteriora versùs progressa, cristæ galli implantatur; hujus autem membranæ expansione, sub suturæ coronalis cursu posita cerebrum in dextrum & sinistrum hemisphærium dividitur. B. *Öfikkhel*. G. Ein fichel. Gall. *La Faux*. A. A Sickle.

FAMES, dicitur *Ordinaria* sive *Sana*, quæ est alimentorum appetitus, quo animal à vellicatione nervi paris vagi, & intercostalis in ventriculo, ab humoris per arterias cœliacas, vel tunicam glandulosam huc delati, vel salivæ continuò deglutitæ acrimonia, tum attritu mutuo laterum ventriculi ad invicem, excitatum, cibum sibi, ut ejus remedium, appetit: vel est præter ordinem vel præter sanitatem, quæ est depravata, ut *Pica*, *Malacia*, *Canina*, *Bovina*, *Abolita* &c. Gr. λιμὸς, πείνη. B. *Honger*. G. Hunger. Gall. *Faim*, *appetit*. A. A Famine, Hunger.

FAMES CANINA, vide *Cynodes Orexis*.

FARCIMALIS TUNICA, idem quod *Allantoides*.

FARCTURA, vel FARTURA, dicitur quando animalia exenterata, aut fructus excavati medicamentosis rebus,

bus, suas vires communicantibus, à pharmacopœis replentur.

FARFARA, est Tussilago seu Ungula caballina, dicta Gr. Βήχιον, sic appellatur, quod ejus folia Populi albæ, seu Farfari foliis similia sint: hinc etiam *Populago* vocatur. Vide *Tussilago*.

FARFARUS, est Populus alba, an à farre, farinæ species? An à Sabinorum flumine *Farfarus* dictus?

FARINA, est Plantarum pulvis molendo contritus, uti Farina lini, althææ, iridis, orobi, hordei &c. quæ usum in Medicina habet. Gr. Ἀλφίτον, Ἀλευρον. B. *Meal*. G. Mehl. Gall. *Farine*. A. Meal.

FASCIA, *Fascicula* Ciceroni, *Anadesmos* apud *Herotianum*, Τελαμών, Παραιοημα *Thucydid*, Καμπάδιον *Suidæ*, Ἀνάδεσμος, Ἐπίδεσμος, Σπείρις, Ὀθόνιον, Τελαμών Σινδονίτης, *Polluci*. Est vinculum longum, & mediocriter latum, ad usum Chirurgicos idoneum: Fasciæ sunt glomeratæ, longæ & æqualiter latæ, in orbem convolutæ: aliæ scissæ, quæ uno quidem constant linteo, sed eo vel extremis vel mediis partibus scisso: aliæ assutæ, quæ ex fasciis & habenis in varia capita desinentibus, constant. Longitudine etiam differunt, quod aliæ sint longiores, aliæ breviores; ita & de latitudine se res habet. B. *Feinwintzel*. Ligatura si fuerit octodecim capitum, dicitur *de boerwypze ligatuur*. G. Eine binde, windel. Gall. *Bande, Doloire, le Mouffe, le Renverse, le Rampant, Bandulette*. A. A Swadling-band.

FASCIA LATA & FASCIALIS MUSCULUS, vide *Membranofus Musculus*.

FASCIA LATA, est lumbricus intestinalis latus, ulnarum multarum longitudine, teres & albicans. B. *Windel-worm / Swagtel-worm*. G. Ein Bindel-wuerm.

FASCIATIO, est quædam fasciarum, circa membrum curandum, circumductio & convolutio. B. *Feinwindinge*. G. Das wickeln, winden. Gall. *Bandage*. A. A Winding or binding-up.

FASCICULUS, vide *Manipulus*.

FASELUS, vide *Phaseolus*.

FASTIDIUM CIBI, idem quod *Anorexia*.

FAUCES & FRUMEN, idem quod *Pharynx*. quod vide. B. *De rachen / koutwen*. G. Speisrœhre.

FA-

FAVUS, vide in *Achor*, Gr. Κήρεια.

FEBRIFUGUM, Gr. Αντιπυρετικόν, Remedium adversus febris insultus. B. *Middeelen tegen de koozts*. G. Artzney gegen das Fieber. Gall. *Remede contre la Fièvre*. A. A Remedy against a Fever.

FEBRIS, Gr. πυρετός, est sanguinis velocitas aucta; adeoque motus Cordis & Arteriarum frequentior, ita ut inde functiones Naturales lædantur: his enim notis solis, nempe pulsû frequentiori, cognoscitur Febris; verum multa plerumque comitantur symptomata, in variis Febribus varia, uti sunt horripilatio, frigus, vomitus, tremor, calor, sudor &c. quæ in eadem Febre vario tempore quoque variant. Variæ licet dentur febrium species, ut Diaria, Intermittentes Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, & ejusdem sortis Remittentes, Erraticæ, Continuæ symptomatice, &c. Unica tamen est febris, cujus species prætensæ gradibus ut magis, & minus ab invicem tantum differunt, quatenus in velociori pulsû earum Natura ponitur. B. *De koozts*. G. Das kalte, das fieber. Gall. *La Fièvre*. A. An Ague, a Fever. G. Febrem Erraticam vocant unbeständige fieber. Febris intermittens. B. *Gaande en komende koozts*. G. Kalte-wehe, fieber das da ablæsset und eine zeitlang innehælt. Gall. *Fièvre intermittente*. A. Intermittent Fever. Febris continua. B. *Een gedurige koozts*. G. Ein stæt unauff hœrendes Fieber. Gall. *Fièvre continuë, Continue*. A. Continual Fever. Febris quotidiana. B. *Dagelphse koozts*. G. Das tægliche fieber. Gall. *Fièvre quotidiène*. Tertian Febris. B. *d'Anderendaagse koozts*. G. Drytægige fieber. Gall. *Fièvre tierce*. Febris Quartana. B. *Derdendaagse koozts*. G. Viertægige fieber. Gall. *Fièvre quarte*. A. A tertian Fever, or quartan ague. Ephemera. B. *Een daagse koozts*. G. Das tægliche Fieber. Gall. *Ephemere, Fièvre Journaliere*. A. The Ephemere Fever.

FEBRIS UNGARICA THERIODES, seu LUES PANNONIÆ, vulgò *Cerebri vermis*. Iste morbus à *Schenkio* descriptus. Erat morbus castrensis, circa tertiam vel quartam à meridie horam invadebat, ejusque ἐπισσημασία cum levi rigore, qui frigus potius vel superficialium horrorem, quam rigorem præ se ferret, observabatur. Post horulæ dodrantem æstus illum exceperit, qui noctes

noctes & dies sequentes affiduè excruciatos detinuit. Continebantur de capitis dolore, imò & molestia erat circa eniformem cartilaginem & durities, & si summis digitis illum locum attigisset, præ dolore ejulabant. Ab initio fitis adeò intensa, ut vel urinis non esset extingibilis. Postridie vel ad summum tertio die deliria ingruiebant, ita tamen, quod inter delirandum, dum sibimet non constarent, sermones tamen incompósitos quisque de sua arte, quæstu, aut genere vitæ plerùmque haberet. Exacerbationes circa vesperam: per noctem recrudebat morbus; lingua torrida, labia fissâ, quibusdam sputum sanguinis. Nonnulli diarrhœa laborabant, alii sanguinem coagulatum, alii loturæ carnis instar deiciebant; quidam colici erant, vel lateralis dolor eos vexabat. Plurimis surditates oboriebantur, parotides frequentes. Erant qui paralyfin passi, tuberculum, sed pessimum, in pedis dorso accipiebant, adeò ut nonnullis crure tenus pedes sint amputati. Vini potatores interiire. Papulæ sive puncturæ publicum morsulis similes omnibus equidem fuerunt, latiores aliis, minores aliis universum corpus quibusdam, majore tamen ex parte regionem thoracis & dorsum circa spinalem medullam occupantes, quamvis frequentes juxta scapulas & in brachiis apparent, coloris saturi plerùmque, nisi in morituris quibusdam in lividum & atrum tendebant. *B. ungerse pest. G. Ungerische siechte. Gall. Fievre pestilentielle d'Hongrie. A. Pestilence of Hungary.*

FECULA & FÆCULA, Gr. *Τεῖζ*, Fæcis species est, Feculæ dicuntur esse pulveres in certis vegetabilium expressionibus, subsidentes, ut Fecula Bryoniæ, Aronis &c. Species est amyli. *B. Meerzaisel. G. Trusen, dasz dicke und trube auff den grund. Gall. La Lie. A. The Lees.*

FEGOPYRUM, idem quod *Fagopyrum*.

FEL, idem quod *Bilis*.

FEMEN, vide *Femur*.

FEMUR, FEMEN, Gr. *Μῆδς*, est superior pars pedis à natibus usque ad genu, à ferendo dicitur, eo quod animal ferat & sustineat, unico ossè, sed maximo constat & longissimo totius corporis, cujus pars antica & externa magis gibba, interna & postica magis lîma. *Femen* vocant Grammatici interiorem, carnosiorumque pulpam esse; *Femur* verò anteriorem & adverso homini propiorem.

B. Het dpe-bern. G. Der schenckel. Gall. *Le Femur, la Cuisse*. A. The Thigh. *Femen*. B. Het innerlyke deel der dpe. G. Das inwendig am obern schenckel. Gall. *Le dedans de la Cuisse*. A. The inner part of the thigh.

FENESTRA, Gr. *ὄveis*, in concha auris duo habentur Foramina, statim post tympanum occurrentia, unum dicitur *Ovale*, alterum verò *Rotundum*. B. Fen Fenster. G. Ein Fenster. Gall. *Fenestre*. A. A Window.

FERMENTATIO, definitur, quòd sit intestinus motus Vegetabilibus corporibus inductus, eadem ita mutans, ut destillationi subjecta primò prodant Spiritum inflammabilem, tenuem, volatilem, acrem, aquæ miscibilem: vel prodant liquorem minùs volatilem, acrem, non Inflammabilem, acidum, aquæ pariter miscibilem, acetum dictum: ea sit vel *per se*, quæ suâ sponte concitatur, ut in actionibus spontaneis; vel *arte*, quando rebus fermentandis aliquid additur, ut in pane, aliisque videre est. *Fermentatio* non fit tam subito uti effervescentiæ, sed lentè, quia acidum & alcali ab aliis oleosis particulis detinetur, ideòque lentè peragitur. B. Gestinge / Kpzinge. G. Das Säuern, brausen, vergähren. Gall. *Fermentation*. A. Idem

FERRUM, est metallum, omnium minimè ductile, igne non fixum, nam fumat, scintillas quasi à combustili materie spargit, pondere assiduo minuitur; diu ante fluxionem ignitum, sonorum, coloris candidi, specificæ gravitatis ad aquam, ut 7852 ad 1000. Solvitur facillimè ab omni sale, rubescens cum iisdem, sales solventes facillimè perdit, in scorias consumitur ferruginosas, facillimè destruitur inter omnia metalla, magnetem trahit. B. Ezer. G. Eisen. Gall. *Fer*. A. Iron.

FERRUM EQUINUM, est planta parva, quæ habet plures caules exiguos, angulosos, tenues, repentes: folia securidacæ, sed minora, pinnatim digesta, & per extremam oram lateſcentia, leviterque in circuli formam fissâ: flores sunt leguminosi, flavi, ex cujus calice surgit pistillum, quod deindè abit in filiquam compressam, articulis distinctam Innatis, ferrum equinum perforatum referentibus, in qualibet quasi articuli parte hærent semina ejusdem formæ: radix lignosa, exigua, alba, fibris circumcincta: hæc planta crescit in regionibus calidis, præsertim in locis desertis: est Leguminis minoris species, sic dicta, quòd creditur,
fi

si equi eam calcent, ungulas ferreas decidere: sed hoc, experientiâ teste, verum non est, sed alii dictum volunt, quod ejus semen soleam equi ferream referat. B. *Paardse-
pzer.* Gall. *Fer à Cheval.*

FERULA, est planta cujus caulis septem vel octo pedes altus, crassus, fungosus, medulla repletus, in summitate ramosus, circa autumnum durus & lignosus evadit: folia fœniculi, sed latiora, viridia: flos est rosaceus, umbellatus, plurimis scilicet petalis constans in orbem positus & calici insidentibus: is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum peramplis, ovatis, planis & tenuibus, involucrum sæpè deponentibus: dici volunt à Promethei furto: quem Poëtæ fingunt, Minervæ auxilio fretum, ascendisse cælum, ibique Ferula ad currum folis admota, ignem rursum in terras derulisse; vel quod ignem Jovi furto abstulerit. Potius *Ferula* à ferendo commodius dici potest, quod scapi illius pedamenta fruticibus & senibus baculi ac scipiones essent; vel à feriendo, quia ejus ope puerorum in scholis manus feriuntur. Hinc Martialis hanc vocat sceptrum Pædagogorum, hinc dicit

Invisa nimium pueris, gratæque Magistris,

Clara, Prometheo munere, ligna sumus.

& alibi

Ferulaque tristes sceptrâ pædagogorum cessent.

Gall. *Ferule.* Herba est ex quo *Sagapenum* colligitur. Sed Ferulæ ad artem quoque chirurgicam pertinent, suntque assulæ leves, quæ ad locorum ingenium materiam nactæ fuerunt diversam, ex arborum nimirum corticibus, vel cortice herbæ Ferulæ, undè nomen acceperunt, conficiuntur. Item ex ligno abietino, capsulis, papyro conglutinata vel corio, quæ ossibus solutis & luxatis, postquam restituta fuerunt, adaptari solent. Gr. Νέσθηξ. B. *Erals
hen.* G. Die bein schienen. Gall. *Carton, Atelle, Tablette
de bois legere.* A. Tablet of light wood.

FERULAGO, idem quod *Ferula*.

FESTUCA, Gr. Ἀγρίωψ, frumenti species, an quia festinanter proveniat?

FIBRA AURIS, idem quod *Lobus auris*.

FIBRÆ, id est Filamenta sive Villi in Vegetabilibus.
1. Sunt veluti stamina rebus nonnullis intertexta, v. g. arboribus, foliis &c. 2. Sunt capillamenta extrinsecus ad-

nascentia, ex gr. radicibus &c. hinc fibrosa vocatur radix, quæ in minimas fibrillas seu filamenta capillo tenuiora divisa, evoluta humano testiculo non absimilis est : hæc maximè vulgaris & simplicissima, undique sese explicat, & nutrimentum haurit, quamquam pori ob fibrarum tenuitatem sensus nostros hætenus fugiant. B. *Dezelen / Haartjes / Waadjes*. G. Hærlein, Zæserlein. Gall. *Filets, Cheveux, Fibres*. A. Small sproutslikehairs.

FIBRÆ, dicuntur in corpore animali partes solidæ, tenuissimæ, oblongæ, non cavæ, simplicissimæ, ex particulis elementaribus fluidorum per vasa circulantium sibi mutuo vi Vitali appositis compositæ; ex quarum applicatione ad invicem, vel intertextu miro inter se, fiunt membranae tenuissimæ, solidæ, simplicissimæ, quæ convolutæ formant vas minimum simplicissimum cavum. Dicuntur à situ Rectæ, vel Obliquæ, vel Circulares. Gr. ἰνὸς, Δοῶδες. B. *Dezelen*. G. Fæserlein. Gall. *Fibres filaments*. A. Sprouts, filets.

FIBRILLÆ, idem quod *Fibræ*.

FIBULA, Gr. Ἀγκυρῆ. Fit & fibularum apud Antiquos mentio. Si enim in carne, ut *Celsus* scribit, vulnus est, hiatque, neque in unum faciliè oræ attrahuntur, futura quidem aliena est, imponendæ verò fibulae sunt, Ἀγκυρῆας Græci nominant, quæ oras paulum tantum contrahant, quo minus lata postea cicatrix fiat. Et cum notissimus fuerit modus uniendi vulneris oras per fibulas, factum est, ut fibularum nec materia nec forma satis ab Antiquis descripta sit. *Guide* factas fuisse fibulas scribit è ferreis quasi circulis aut semicirculis ab utraque parte recurvis, quorum hami labris vulneris utrinque infixi sibi ad amussim respondebant, verum cum hoc modo infigere & infixos tenere ejusmodi hamos in carne sentiente & cute nihil aliud fuisset, quam tot aculeos pungentes cum intolerabili dolore ibi servare, non est credibile Antiquos per fibulas tale instrumentum ferreum cuti infixum summos dolores excitans intelligere. Probabilior est *G. Fallopii* opinio, quæ docet esse futuram actualem cum acu, quæ hodiè est frequentissima, quâ ambo labia vulneris acu filum duplicatum trahente trajiciuntur, & super vulnus tribus involu- tionibus ambo fili capiti colliguntur, & in nodum ne- ctuntur. Sequentia scribit *Sanctorius* : de fibulis non est quod mul-

multa dicamus, cum earum usus ferme extinctus sit, & licet hæ ab Antiquis non describantur, non ob id tamen quomodo his uti possimus, tradere non desunt, ut falso *Argenterius* arbitratur. Erat enim nota non tantum apud Medicos earum forma, sed & apud quosdam Veteres, quandoquidem in vulneribus fibulæ ex acia molli non nimis torta, ut & futuræ conficiebantur, ut *Corn. Celsus* conscripsit. Siquidem Chirurgi illi ab uno latere vulneris semicirculum quendam ex *acia*, quem vulgò *Asola*, hi vero fibulam nuncupabant; deinde utrumque acia alligabant, tum ut labia illa attracta ob vulneris latitudinem magnitudinemque fortius alligarentur, tum ut sanies liberius percolari posset. Quibusdam *Acia*, *Vinculum*, *Ligatura*, *Colligatio*, *Obligatio*, *Ligamentum*, *Δεσμός* &c. vocatur, qui plura desiderat, adeat incomparabilem *J. Rhodium*, de *Acia* dissertantem. B. *Gespe*. G. Eine spange, hafft hæfftlein. Gall. *Boucle*, *Agraffe*. A. A Buckle vel Claspe.

FIBULA, sive os tibiæ minus, *Celfo Sura*: *Hippocratis & Galeni* temporibus usque ad *J. Pollucis* ætatem *Περόνη* nominabatur, à similitudine ferramentorum, quibus trabes in ædificiis combinantur; etiam *Hippocrati* aliquoties brachii radius. Fibula in modum tibiæ musculos conjungere videtur; est os posterius inter femur & tarsum, tibia tenuius, eique extrinsecus attensum, ut radius cubito. Parte superiore caput rotundum genu non attingit, sed infra subsistit: At parte inferiore, infra tibiā pergit, ideòque æquè longum os est atque tibia: in medio ab invicem dehiscunt tibia & fibula, ob musculos pedis ibi locatos, quo intervallo ligamentum tenue & latum, secundum longitudinem hæc ossa jungit. Committitur etiam tibiæ ligamento communi superius & inferius. Inferius caput in acutum tendens, appendicem habet, quæ crassescens, gignit processum, dictum *Malleolum externum*, protuberantem illum locum externum, excarnem ad pedem, interno humiliorem. B. *Het Kuitbeen*. G. Wadebein, die röhre im untern schenckel. Gall. *Le Peroné*. A. The lesser and outer bone of the leg.

FICUS, Est arbor mediocris altitudinis, cujus caulis non rectus: cortex est politus, licet aliquantulum asper, coloris cinerei: lignum fungosum, intus medullosum, al-

bum : folia sunt magna, ampla, crassa, quinquifida, vitis similia, sed majora : flosculi hermaphroditi, monopectali; longi, tubulorum formâ, oriuntur cum ovariis, quæ sunt capsulæ testaceæ natæ in utriculis pulposis, positæ intra tracheas : fructus pyriformis, figuræ rotundæ ac depressæ, coloris ex flavo fusci : intus copiosissimis granulis per pulpam infarctus, saporis dulcis, odoris debilis, non ingrati, fructus non maturus dicitur grossulus, ubi crassior, sed nondum tamen maturus dicitur grossus seu grossa, & ficus demum, ubi maturuit, siccatus, carica seu ficus passia : Gr. Σῦκον & Σῦκη, hinc mutato σῦ in Fi, faciliè Ficus resultare videtur, fructus est satis notus; verum à similitudine dicuntur quoque excrescentiæ circa anum aliasque partes, similitudinem ficuum habentes. Si thymi multum excrescant, ficus seu sycofes appellantur. Nominantur & *Mariscæ*, *Sycosis* & *Sycoma*. B. *Uppg-werren*. G. Feigen, wartzten. Gall. *Figure*. A. A Fig.

FIGENTIA, sunt, quæ volatilia domant, & acida concentrant. Vide *Fixatio*. B. *Wast-makende dingen*.

FILAGO, Est planta mollia lanuginosa, habens folia parva, oblonga, incana, mollia : flores sunt flosculosi, plurimis scilicet flosculis constantes, stellæ adinstar divisis, embryoni insidentibus; & calice squammoso, hæmiphærico, non lucido neque insigni quodam colore prædito; Embryo autem deindè abit in semen pappis instructum : est Gnaphalii species, sic dicta fortè, quod ejus folia filis lanuginosis sint obducta. B. *Hoer-kruid*. G. *Rhurkraut*. Gall. *Herbe à coton*. A. Cotton-weede.

FILICULA, est Trichomanes, vel adiantum; hujus plantæ variæ sunt species, dim. à *Filix*. Vide quoque *Polypodium*.

FILIPENDULA, folia habet pimpinellæ saxifragæ, sed angustiora, profundius incisa, plura ad unam costam quasi per paria conjugata, coloris viridis, obscuri, splendentis : ex his assurgunt plures caules pedem circiter alti, duri, striati, rotundi, rubicundi, versùs superiora in alas divisi, in summitate habentes flores rosaceos, plurimis scilicet petalis in orbem positæ constantes, ex quorum calice monophyllo, & multicuspidato surgit pistillum, quod deindè abit in fructum ferè globosum, cujus semina in capitulum dolii æmulum colliguntur : radices glandulosæ,

sæ, olivares aut longiores, minusque ventricosæ, Asphodeli more, foris ex rubro nigricantes, intus albescentes, acrimoniâ quandam cum adstrictione, dulcedine, & levi amaritudine sapientes: dicitur à numerosis & rotundis in radice glandibus, quæ velut ex filo quodam pendere videntur. Gr. *Oenanthe*. *Rode steen-breke / wilde gerwe*. G. Rother stein-brech, wilde garbe. Gall. *Filipendule*. A. Drop-wort.

FILIUS ANTE PATREM, dicitur de specie quadam *Lyfimachii*, cujus vaginulæ feminales ante flores conspiciuntur, item de *Colchico*, *Croco*, *Pulsatilla*, cæterisque plantis, cujus flores ante folia prodeunt.

FILIX, Est planta, cujus variæ sunt species, imprimis mas & fœmina; *Filix mas* habet folia, ex radice erumpentia, magna, ampla, aspera, dura, friabilia, viridia, odoris fortis, & grati, longa, in alas extensa, habentia multa alia foliola, vel in margine incisa; nullos habent flores apparentes, sed in dorso habent pulvisculum fuscum, & rubicundum, qui pulvisculus sunt semina plantæ juxta sententiam *Cæsalpini*, qui observavit, quod ubi ejus folia in terram fuerunt delapsa, postea similis planta creverit: verum *Tournefortius* de utriusque filicis femine curiosè annotavit; scilicet quod filicis maris vulgaris fructus foliis innascuntur bino plerumque ordine, pinnulis affixi clavi ope, alterâ parte retusi; detractâ vel corrugatâ membranâ quâdam convexâ, quæ ferri equini formam habet, sese objicit oculis numerosa congeries vesicularum fœmæ ovariarum annulo elasticâ vi donato munitarum, cujus contractione rumpuntur illæ, seminaque fundunt minutissima. *Filicis fœminæ* verò & aliarum specierum fructus seu vesiculæ ovatæ occurrunt in sinibus quibusdam, namque autumnino pinnularum margo plerumque producit, incurvatur & complicatur: radix *Filicis maris* est carnosa, crassa, fibrosa & nigra: Hæc planta nullum caulem habet: crescit ubique in sylvis, & neglectis incultisque locis. Est herba aliformis, creditur ex Græco derivari, quando *πτερίς* mutatur in *Pilix*, & sic in *Filix*, sed alii à *πτερίς* ala conantur originem demonstrare. B. *Darn*. G. *Fahren-kraut*. Gall. *Fougère*. A. *Ferne*.

FILTRATIO, Chymica vox est, & species dicitur *Destillationis per descensum*, quia guttæ cadendo decidunt.

dunt. Modus quo filtratio fit, est triplex. *Primus* est per pannum expansum, ut fit in syrups clarificandis. *Alter* per *Manicam Hippocratis*, hoc est per saccum, superius latum, sed in coni punctum inferius terminans, pro vinis aromaticis colandis, ut in festis nuptialibus, & variis Medicationibus pro delicatulis usui venit. *Tertius*, & Chymicis magis familiaris, est colatio per chartam emporeticam, hoc est, si papyrus fuerit quadratæ figuræ, duplicatur, & illa Duplicatura reduplicatur, ad angulos rectos, hoc est tota papyrus sive charta quadruplicatur, post hæc iterum explicatur, instar cuculli Monachorum vel infundibuli & imponitur infundibulo, seu tritorio, deinde liquor clarificandus infunditur, & clarus guttatim decedit, relictis in filtro sæcibus. B. *Filtreringe*. G. Filtrirung. Gall. & A. Filtration.

FILTRUM, est pannus lanceus, vel charta bibula, per quam liquores percolantur ad clarificandum, ut fit per *manicam Hippocratis*. B. *Filtrer-tuig* / *doozyg-tuig* / *leht-tuig*. G. Ein filtz. Gall. *Tamis*. A. A Strainer.

FIMBRIÆ, sunt vestium extremitates, à quibus & fimbriata folia dicuntur, quæ in ambitu in quasdam fimbrias exeunt: Sunt & pendulæ extremitates tubarum uteri.

FISSURA, Gr. *ῥαγὴ*, est ossis quædam solutio continui, præsertim secundum longitudinem; quamvis & mollibus partibus quoque attribuitur, ut in fissuris labiorum, digitorum, manuum &c. B. *En spleet*. G. Ein spalt. Gall. *Fente*. A. A Cleft.

FISTACIUM, idem quod *Pistacium*.

FISTULA, Gr. *σὺγγη*, sumitur pro Canna oblonga & cavata, ideòque haberi potest pro siphunculo, quo liquor aliquis intestinis, auri, utero, vulneri &c. immittitur. Sic *Urethra*, fistula urinaria est. *Trachea*, fistula respiratoria. Item sinus est angustus & longus, seu ulcus sinuosum, angustum, callosum & curatu difficillimum, quod plerumque ex abscessu ortum habet. Fistulæ à sinuoso ulcere, in eo differunt, quòd fistulæ callosæ & duræ sint, non item ulcus. Aliquando *Fistula* pro *Fontanella* sumitur, de qua suo loco. B. *En ypp* / *speut* / *fistel* / *etter-hol*. G. Fisteln, rohrwunden, flusz-loch, rohr-oder hohl geschware. Gall. *Une fistule*. A. Pippe.

FISTULA LACHRYMALIS, est morbus, cujus vitio lym-

lympha lacrymosa non per carunculam in nasum determinatur, sed per palpebras in genas cadit, qui fieri potest ex variis causis; inprimis verò ex vitio palpebrarum, carunculæ lachrymalis, punctorum lachrymalium, vel sacci lachrymalis, quæ partes variè affici possunt. B. **Traanfistel / oog-fistel.** G. Fistel der augen-winckel, augen-fistel. Gall. *Fistule Lacrymale.* A. Fistle of the eye.

FISTULA PULMONIS, idem quod *Aspera Arteria.*

FISTULA SACRA, est spinæ pars forata, quam Gr. *ἰσραν σφύγινα* vocant.

FISTULA URINARIA, idem quod *Urethra.*

FISTULARIA, est Cristæ galli species, sic dicta, quia ejus caules cavi sunt, & successu temporis in fistulas seu calamos mutantur. Vide *Pedicularis.* Gr. *Ἀλεκτωρόλοφος.* B. *Watelen / Hanekammekens.* G. Rœdel, laulz-kraut. Gall. *Pediculaire des Prez.* A. Pipe Weed, the cock comb.

FIXA, sunt, quæ vel magna ignis tortura non exaltantur, vel elewantur, ut *Salia Fixa.* B. **Daste dingen.**

FIXATIO, est materiæ fugacis quædam, ne avolet, retinentia. Gr. *πῆξις*, & *Πηγιωσις.* B. **Dastmakinge.** G. Figierung. Gall. & A. Fixation.

FLAGELLÆ, dicuntur cymæ arborum & ipsarum summæ partes, quæ ad cujuscunque venti flatum moventur: undè etiam nomen traxerunt ab eo quod flatibus petantur. *Flagella* etiam sunt vitium rami oblongiores & productiores, aliis tamen minores, ab ipsis brachiis fursùm ascendentes: dicta flabella priùs, à venti flatu scilicet.

FLAMMA & FLAMMULA, fictitium quid est; putaverunt quidam cordi inesse flammam quandam, sed illud esse falsum, inspiciant qui corda perscrutantur, ad me quod attinet, nec in hominibus, nec in brutis vivis unquam vidi vel minimam scintillæ flammam, Gr. *Βιολύχιοι* dicitur, ac si esset vitæ lampas. Sed si benè velimus Philosophari, in eo vita consistit, ut circulatio sanguinis celerrimè circumvehatur. B. **En blam.** G. Ein flamm. Gall. *Flamme.* A. Flame.

FLAMMULA, est Clematis species, dicta ob flammeum & igneum saporem, & vim erodendi cutim. Item *Ranunculus* est. Vide *Batrachium.*

FLATUS, sunt explosiones materiæ aëreæ agitata calore, vel fermentatione aut effervescentiâ assumptorum,

quæ dum ex una parte Ventriculi aut Intestinatorum in aliam propellitur, excitat *Bombos* & *Borborygmus*. B. **Wind**. Wind im leibe, blähungen. Gall. *Des Vents*. A. A blowing wind.

FLORES CHYMICI, subtiliores corporis partes sunt per sublimationem à partibus crassioribus sub forma sicca separatae. B. **Bloem**. G. Blumen. Gall. *Fleurs*. A. Chymick Flowers.

FLOS FEBRUARII, est *Leucoion Album*, sive Hexaphyllon album bulbosum. Sic vocatur, quod Februarii mense, & die Divo Valentino sacro, ubi cælum clementius fuerit, apparet. In Aprili, ubi appropinquare coeperit Majus, evanescit.

FLOS FRUMENTORUM, vide *Cyanus*.

FLUOR ALBUS, sive **FLUOR UTERINUS**, est præternaturalis humoris pituitosi & albi, vel varii coloris & odoris per muliebria excretio, orta à nimia vasorum uterinorum laxitate & debilitate, nubiles, maritatas, vetulas, steriles, gravidas, vario tempore invadens. Gr. *ῥυμαζοῖς*. B. **Witte bloemen** / **Witte bloed**. G. Weiße flusz. Gall. *Fleurs blanches*. A. The white flixe.

FLUOR MULIEBRIS, vide *Fluor Albus*.

FLUOR UTERINUS, vide *Fluor Albus*.

FLUXIO, idem quod *Catarrhus*.

FLUXUS ALVINUS, idem quod *Diarrhœa*.

FLUXUS CHYLOSUS, idem quod *Celiaca passio*.

FLUXUS HEPATICUS, est Dysenteriae species, cum excreta sint instar loturæ carniū, copiosus plerumque est & nocturnus, sed absque dolore, valde tamen vires demoliens, sæpè post Dysenteriam contingit: Sic vocatur quia interdum sanguis coagulatus, splendens & niger, ac si essent hepatis frusta, adest. B. **Leber-bloed** / **Leberg-doozloop**. G. Leber fließung. Gall. *Flux hepaticue*. A. The fluxe of the liver.

FOCILE MAJUS, est ulna cubiti; vel tibia pedis. *Focile minus*, est cubiti radius, vel pedis fibula. B. **Groote en kleine elle ppp**.

FOCUS, Gr. *ἑστία* dicitur esse locus in mesenterio, unde & febrium originem olim deducebant. B. **Fen nest**. G. Eine feuerstett, der heerd. Gall. *Le Foyer*. A. An Hearth

FODINA, est quidem *Fovea* seu *Cuniculus*, sed & mina

mina quædam hujus vel illius mineræ. Item minor labyrinthus in aurium offe.

FOEMINA, Modiolus est, vide *Modiolus*.

FOENICULUM, est planta officinalis, quæ habet caulem quinque vel sex pedes altum, rectum, cannulatum, coloris viridis fusci, medulla fungosa repletum, ramosum: odoris grati; folia in lacinias capillaceas divisa, coloris viridis obscuri, odoris grati, saporis dulcis aromatici: flos est rosaceus, umbellatus, plurimis scilicet petalis in orbem positis constans, & calici insidentibus, qui ab it fructum ex duobus seminibus compositum oblongis, crassiusculis, hinc gibbis & striatis, inde verò planis: datur & altera species, quæ est fœniculum dulce, majore & albo semine; radix oblonga, recta, digitum crassa, pallida, saporis subdulcis, & aromatici: Gr. *Μάριθρον*, sic appellari putant, quòd quasi fœnum in hyemes arefactum ac marcidum reponatur. Alii tamen dictum putant, quòd fatum magno cum fœnore semen reddat. Marathron à marcescendo, quod ad condienda plurima, cum inaruerit commendatissimum sit, à *μαίρω* splendo, quia oculorum splendorem & claritatem conservat, aut à *μαραίνειν*, marcere, quia facilè marcet. B. *Denkel*. G. Fenchel. Gall. *Fenouil de doux*, *Fenouil de Florence*. A. Fennell.

FOENUM, est gramen arefactum, sic dictum, à fœnore, cum sine cura fœnus præbeat, in pabulum resectum. Vel à foetu, quod herbæ eadem manentes, quotannis novas pariant. Gr. *χίτρον*. B. *Hoop*. G. Hew, Heu. Gall. *Forn*. A. Haye, Hay.

FOENUM GRÆCUM, & FOENIGRÆCUM, est Trifolii inter & leguminis minoris species habet caulem unicum, dimidium pedem altum, tenuem, excavatum, in ramos divisum: folia terna in uno pedunculo instar trifolii gerentem, parva, aliquando oblonga, interdum magis ampla quàm longa, aut semirotunda, dentata: flores ex foliorum alis erumpunt, leguminosi, exigui, albi: flori succedit siliqua plana, longa, acuta, corniformis, facta plerumque feminibus rhomboidiformibus, ab angulo uno ad alterum linea cava notatis, flavis, saporis mucilaginosi, odoris & saporis ingrati: radix simplex, lignosa. Undè ita appellatur invenire nequeo: fortè quod in Græcia inter fœnum plurimum reperiatur. Gr. *Τήλιν, Κεραίτις, Αΐν*

Αἰγόκερος, Βόκερος: atque sic dicitur à cornuum figura siliquarum, vocatur *Aegoceros* à caprini cornu similitudine, quemadmodum à Bubuli *Buceros*. Nonnullis *Siliqua*; aliis *Silicia*; quibusdam *Silicula* appellatur. B. **Grier hoop**. G. Bocks-hörn. Gall. *Fenugrec*. A. Fene-Greek.

FOETOR ORIS, est putredo circa dentes & gingivas: aliquando oritur ex pulmonibus & sanguine phthifico, vel scorbutico, aliquando ex stomacho. Foetor verò in genere oritur ab humoribus stagnantibus, effusis, corruptis, vel venenatis; ut & ab omni causa, quæ sales & olea nimium attenuat, & volatilia reddit, ut est inedia, calor, motus nimius, acrimonia nimia assumpti. B. **Stinkende adem / stank**. G. Stinckender athem. Gall. *Halaine puante*, *puanteur*. A. A stinking breath.

FOETUS, Gr. Κόημα, est conceptus, quando foemina concepit, ab initio dicitur *Embryon*, postea cum formam adeptus fuerit, propriè foetus dici potest. B. **De brugt**. G. Die frucht. Gall. *Le Fœtus*. A. The young.

FOLIACEUM ORNAMENTUM, est simbria in extremitate tubæ Fallopianæ, quâ ovum ex ovario muliebri, quasi tot digitis excipitur, & per tubam in uterum desertur. B. **Het loof-werk**. G. Blat-zierd. Gall. *la Frange membraneuse*, ou *le Pavillon de la Trompe de Fallope*. A. Garnishing of the leafs.

FOLIUM INDICUM, idem quod *Malabattrum*.

FOLLICULUS, est theca rei cujuslibet tenuis, quæ granum vel semen continet involutum, sic membranosa cutis, *Acini Folliculus* dicitur.

FOLLICULUS FELLIS, est vesicula, quæ hepatis concavo annectitur, in qua bilis colligitur, quæ suo tempore per ductum choledochum, in intestinum duodenum exantlatur. Gr. Κύσις χοληδόχου. vid. *Vesica fellis*. B. **De Gal-blaas**. G. Die Gall-blâse. *Vespe du fiel*. A. The gall bladder.

FOMENTUM CELSO, Fomentatio Ulp. Fetus *Plin.* est Medicati externi genus, quod corpori admotum ipsum fovet & calefacit. Θίσμασμα, estque duplex, & aridum & humidum, illud πυρία, πυρίασις *Diosc.* & πυρίαμα: hoc κατάντλημα *Diosc.* & κατάντλησις dicitur, quod effuso humore adhibetur: Estque vapor, liquor aut decoctum variis partibus, beneficio lintei, filtri, spongiæ, vel vesicæ,

ficæ , fovendi causâ applicandum. B. *Stobinge / verwarming*. G. Erwärmung , ein warmes tuch , damit man dem leibe wärme zufuegt. Gall. *Fomentation* A. A Cherishing or keeping warme.

FONTANELLA, seu FONTICULUS, dicitur in scæ-
tubus & recens natis , intra frontis os & duo fincipitis ,
apertura quadrangularis. B. *De Fontenel des Hoofds*.
G. Flusz loch des haupsz. Gall. *Fontanelle*. Item ulcuscu-
lum arte Chirurgicâ , in sanis corporis partibus excita-
tum, ut per id humores superflui & corrupti evacuentur,
morbi curentur , vel etiam anticipentur : Fontanellæ ex-
citantur cauterio actuali vel potentiali , lanceolâ & forci-
pe : in Fonticulis excitandis notandum est , semper locum
inter duos musculos eligendum esse. B. *Fontanellen /*
Etterbzagten. G. Fontanelle , Etterhohl. Gall. *Une Fi-*
stule. A. An Issue.

FONTALIS, idem quod *Potamogeiton*.

FONTICULI, idem quod *Fontanelle*.

FORAMEN OVALE, dicitur apertura magna, media
inter cordis sinum venosum dextrum finistrumque , quo-
rum paries intergerinus hoc foramine perforatus est : quo
fit , ut sanguis ex sinu & aure dextra exire hoc foramine
possit in sinum finistrum , eique additam auriculam : è si-
nistro autem sinu aureque in dextrum sinum & aurem fa-
cilè penetrare nequit , impediante membranâ quâdam ,
valvulæ officium præbente. Membrana hæc ex majore
parte ambitûs foraminis è parte sinûs sinistri orta , totique
prætenta foramini in duo quasi cornua abit , quæ ultra
anterioriorem foraminis partem procurrunt aliquantulum si-
militer à parte sinûs sinistri , evanescuntque in eandem
partem parietis intergerini finium. Itaque tali hoc fora-
men obductum est membrana , ut per se nunquam valdè
pateat ; si verò sanguis sinûs sinistri urgeat parietem inter-
gerinum finium , urgeat etiam membranam , explicet ,
tendat , obtendatque foramini exquisitè , ut nihil elabi pos-
sit : si contra urgeat sanguis sinûs dextri , pellat membra-
nam aliquantum in sinum finistrum , ac sic viam sibi ob-
liquam aperiat inter cornua ejus anterioremque foraminis
partem , totum enim foramen aperiri nequit , quoniam è
maxima parte ambitûs ejus valvula nascitur. Valvula te-
nuis est , ut explicari facilè possit , repellique à sanguine
sinûs

sinus dextri : densa simul est , & quasi tendinea , ut sat haberet roboris. Foramen ovale quod etiam fenestra ovalis vocatur est apertura à figura ovalis dicta , in parte posteriori & superna conchæ internæ è regione membranæ tympani posita , habens situm stapedi parallelum , & configurationem ipsius basi respondentem , foramen illud stapes replet suâ basi , & membranulæ tenuissimæ tenerriam illud occludenti accrescit , servatâ interim mobilitate requisitâ. Foramen rotundum quod & fenestra rotunda dicitur , est altera appertura , quæ in tympani supernis partibus reperitur , scilicet in tympani cavitatis parte posteriori , è regione tympani membranæ sita , paulò inferior quàm fenestra ovalis , versûsque occiput , priori minor & declivior , figuram incertam , nunc ovalem , nunc circularem habens , rotunda tamen vulgò dicta , sic sita in foco quasi elliptici hujus spatii centro membranæ tympani opposito , patet in scalam inferiorem cochleæ , clauditur membranula tenui , pellucida , tenera , tensa , elastica , tremula , infixa striæ excavatæ in medio meatu : cum verò nullo prædita sit musculo hæc membrana , variis gradibus tendi , adeoque variis diversis tremoribus distinctissimè recipiendis aptari , hinc cum variis diversis sonis harmonicè contremiscere , ut facit quidem membrana fenestræ ovalis , non potest : hujus ergò tremores non erunt adeò accurati & distinctè , ac sunt illi , qui ope membranæ tympani & ossiculorum membranæ fenestræ ovalis imprimuntur ; adeoque sonorum diversitas ope membranæ fenestræ rotundæ distinctè exhiberi non potest , sed illa tantum confusum strepitum , aut simplicem bombum efficere videtur. Hinc fortè læso vel obstructo meatu auditorio , læsa vel rupta tympani membrana , destructis ossiculis auditus &c. ope tubæ Eustachianæ , & membranæ foraminis rotundi , simplex adhuc bombi perceptio fieri potest. B. *Het ronde gat en het epywze gat in het tympanum.* Gall. *La Fenêtre Ovale , la Fenêtre Ronde.*

FORCEPS , est instrumentum , quo partes demortuæ & corruptæ , item res quæ corpori inesse non debeant , apprehenduntur , abscinduntur , vel evelluntur. Forcipes sunt , figura varia , ut longæ , curvæ , dentatæ , rostratæ , femilunares , speculum oris , matris &c. quæ pro diversa figura diversum usum obtinent. Varia nomina Belgica for-

tium-

tiantur, ut B. *Trekhtangen / pellicaanen / hranebekken / korentangen / ravensbekken / papegapsbekken / mond en moeders spiegels / etc.* G. Eine zange. Gall. *Pincettes Pellican &c.* A. A Pair of Nippers.

FORCEPS DECEPTORIA, est instrumentum incisorium, cujus acuta pars dum latet, ægroti, qui incisionem non admittunt, Chirurgicâ manu decipiuntur. B. *Bedrieg-tang.*

FORFEX, est instrumentum evellendis dentibus aptum vocatur item *Odontagra*, sive *Dentagra*. ὀδονταγρῶν Erasist. *Dentiducum*, *Dentarpagaga* Varoni. B. *En tandt-rekker.* G. Ein zahn-brecher zange, pelican. Gall. *Davier Pellican.* A. Sheares. Item est bifidum secans chalybeum Instrumentum. B. *En schaar.* Gall. *Des Ciseaux.*

FORMICA, non tantum insectum est, sed & verrucæ species, Gr. *Μυρμηκία*, id est *verruca formicaria*, tumens & callosa, colore nigricans, basi latâ & cute sessili, in excisione dolores adferens, moriunculis formicæ simillimos, undè & ei nomen. *Wierus* testatur esse morbum ab Hispanis nobis communicatum, venenatum, malignum ac contumacem serpiginem; sumit initium à venteris, progrediturque ab iis per universum corpus cum doloribus & intolerabili pruritu, 1 eutonice. G. Das zitter mahl, flechten. B. *Kruipende mier.* G. Ein Omeisz. Gall. *Fourmi.* A. A ant, emmete, pismire.

FORMICANS PULSUS, est pulsus inæqualis, motui formicarum similis, vel potius vermiculans imminutus adeoque minorem vim cordis, & quantitatem sanguinis indicat. B. *En mier gelpke pols.* G. Ein schwacher puls.

FORMICATIO, vide in *Formica*.

FORMIX, idem quod *Esthiomenos Herpes*, vel *Noli me tangere* aut *Lupus*.

FORMULA, Gr. *Γραμματεῖον*, est præscriptum, quod à Medicis præscribitur, quædam paranda medicamenta indicans Pharmacopæis in ægrorum emolumentum. Vulg. *Receptum*. B. *En recept / Doctoor's ordinantie.* G. Ein recept. Gall. *Formule.* A. A form or receipt.

FORNAX, Gr. *καμίνος*, dicitur & *Furnus*. Vide *Furnus*.

FORNIX, est substantia cerebri callosa, nomen sortita, quod ædificia testitudinis instar, ita & sinus ventriculorum,

rum, ac molem deorsum inclinantis cerebri sustinere videtur. Subnixa est cruribus tribus, quorum duo posterius, versus cerebri basin deorsum porriguntur, & spinæ medullæ radicem, juxta latera complexa, singulari subiecta prominentia, recurvoque velut vallo, sinum inferiorem ventriculorum anteriorum utrinque designant. Gr. *καμάριον ψαλλιδοειδές* *Galeno*. B. *Het welffel*. G. *Eingewölb*. Gall. *Voute à trois piliers*. A. The Vault of the brain.

FOSSA MAGNA, est pudendi muliebris interior cavitas, sive *Rima magna*, quæ & ob figuram *Navicularis* dici potest. B. *d'Opening der Drouwelphheid*. Gall. *Le Sinus*.

FOTUS, idem quod *Fomentum*.

FOVEA, idem quod *Fossa magna*.

FOVEA CORDIS, idem quod *Anticardium*.

FRACTURA OSSIS, est continui in duris corporis partibus solutio, quæ ab externo, & duro instrumento, vi partem frangens, efficitur, cujus differentia à forma, parte, & accidentibus desumuntur. Gr. *κλάσις, κλάσμα, κάταγμα*. B. *Een been-breuk*. G. *Ein bein-bruch*. Gall. *Fracture d'os*. A. A. Breaking or rupture of a bone.

FRÆNULUM, est ligamentum membranaceum sub linguæ anteriori parte: hoc in recens natis quandoque totam linguam inferius occupat, eamque minus mobilem pro peragendis suis officiis reddit, unde divelli Chirurghi scalpello solent. B. *De span-ader / tong-riem*. G. *Die zung-riem*. Gall. *Le Filet, Nêrf sous la langue*. A. A the bridle of the tongue.

FRÆNULUM, seu FRÆNUM PENIS, est membrana, quâ præputium glandi alligatur, Gr. *καυοδέσμων*. Alii *Cannem* vocant. B. *De band*. G. *Die riem*. Gall. *Le Filet, le Nerf le Frain*. A. The ligament, vel bridle of the fore skin.

FRAGARIA, Est planta, quæ habet radices fibrosas, oblongas, coloris fusci aut nigricantis, repentes, ex quibus emergunt flagella per terram repentia, undè novæ radices & plantæ nascuntur, & caules tenues, longi, villosi, habentes folia terna ad centrum conjuncta, rugosa, nervosa, summo pediculo insidentia: flores sunt rosacei, plurimis petalis in orbem positis constantes, ex quorum calice multifido surgit pistillum, quod deindè abit in fructum ferè globosum vel ovato acuminatum, cujus placen-
tæ

træ modo carnosæ, modo ficcæ adhærescunt multa femina; odoris admodum fragrantis est, & saporis subdulcis, vinosi: Hæc planta crescit inprimis in montibus, & locis umbrosis & sylvis. A fragro, seu odorem gratum emitto, quem fraga emittunt. Gr. *Κίραρον* sive fragariæ fructus. B. *Hardbezien-kruid*. G. Erdbeer-kraut. Gall. *Fraisier*. A. Strawberry bush.

FRANGULA, seu *Alnus nigra*, est arbuscula, quæ plures habet caules novem vel decem pedes altos, pollicem crassos, rectos, in plures ramos divisos: ejus cortex externè niger, internè flavus & croceus: lignum album, & fragile, medullam rufescentem continens: folia Alni vel cerasi, sed rotundiora, & magis nigra: flos est rosaceus, plurimis scilicet petalis inter divisuras calicis monophylli positus, constans: è calicis autem fundo surgit pistillum, quod deinde abit in fructum seu baccam mollem duobus plerumque seminibus fætam planis & subrotundis: sic appellatur, quòd ejus ramuli facilè frangantur; dicitur etiam arbor fætida, à fætido tum colore, tum odore, tum sapore. Gall. *Aulne noire*, *Bourgene*.

FRAXINELLA, Est planta, quæ habet caules, duos circiter pedes altos, rotundos, villosos, rubicundos, medulla repletos: folia Fraxini sunt, pinnata, sed minora: flores polypetali, anomali, horum petala ita disponuntur, ut flos quasi bilabiatus appareat, post florem apparent plurimæ vaginulæ, elasticæ, quæ cum impetu ejiciunt semina plana, magna, nigra, acuta, & splendentia: radix longa, alba, digiti minimi crassitie, odoris penetrantis, saporis amari: hæc planta crescit in regionibus calidis: dicitur Fraxinella à similitudine foliorum, quam cum fraxino arbore habent; ideòque diminutivum à fraxino esto: hujus radix in officinis vulgò dictamnus albus vocatur, quia ejus odorem, saporem, & vires habet, & albus, quia radices albas habet, ad differentiam cretici nihil cum veterum dictamno commune habet. B. *Essen kruid*. G. Weisser diptam, escherwurtz. Gall. *Dictam blanc*. A. White dittony.

FRAXINUS ARBOR, est magna, crassa, recta, ramosa, cortice testâ polito, cinereo, viridescente: Lignum est durum, politum, album: folia sunt oblonga, bina, pinnatim nata ad communem costam, cujus apex

definit in folium impar saporis parum amari & acris : flos mas , apetalus , cujus stamina apice gemino plerumque donantur : ovarium oblongum , ovatum , compressum , instructum tuba bifida ; in femina per maturitatem fit fructus planus , membranaceus , linguiformis , fetus semine medulloso similis figuræ ; saporis acris & amari : hæc arbor crescit in locis humidis circa flumina & in sylvis. An à fragore filiquarum , quem , ventis agitatae edant ? B. *Eschen-boom*. G. *Eschen-baum*. Gall. *Frêne*. A. The Ash-tree.

FRICATIO, seu FRICTIO, Gr. *τρίψις*, & *ἀνάρτησις*, *sicca* est vel *humida*. *Sicca* est , quando corpus vel membrum solis manibus , aut linteis pannisve laneis siccis fricatur , quæ & chirothecis peragi aliquando solebat. *Humida* fiebat vel aquâ , vel oleo , vel ambobus simul admixtis. Varia habentur genera , ut *Mollis*, *Dura*, *Intermedia*, *Multa*, *Pauca*, &c. B. *Dyrbinge*. G. Das reiben , kratzen. Gall. *Frottement*, *friction*. A. A rubbing.

FRITILLARIA, est planta , quæ habet caulem , pedem circiter altum , tenuem , rotundum , internè fungosum , coloris virido purpurei vel nigri : folia mediocriter longa , angusta , excavata : flos est liliaceus , campaniformis , hexapetalus , pendulus , nudus , plerumque tessellatus , sex staminibus fetus , ovarium complectens : Ovarium est instructum tuba bifida , triplici cavitate pergente usque ad cava Ovarii , fit fructus oblongus , ferens semina plana , gemina serie ordinata : radix duobus tuberibus carnosissimis constat , ex quorum medio caulis affurgit : hæc planta crescit in pratis , & colitur in hortis : dicitur , quod ejus flores maculis pingantur in modum fritilli. Vocatur & *Meleagris*. B. *Hibits-epren*. G. Bretspiel-blum. Gall. *Fritillaire*, *le Meleagris*. A. Fritillari.

FRONS, Gr. *μετωπον*, est superior faciei pars , terminata superciliis , temporibus , & crinibus capitis : quibusdam à ferendo dicitur , quia præ se fert animæ signa. B. *Het boozhoof / de stern*. G. Die stirn. Gall. *Le front*. A. The fore head , front.

FRONS , inter vegetabilia interdum pro ramo ponitur. Propriè tamen dicitur id quod ipse ramus circumquaque producit , multa interdum folia habens , & nonnihil corticis , ac veluti cauliculi.

FRON-

FRONTALE, est medicamentum externum, quod frequenter, ad capitis dolorem & fervorem, fronti applicatur. Constat ut plurimum ex herbis, floribus, seminibus, farinis, & aceto rosaceo madefactis. Gr. *Προμετωπιδιον*. B. *Doozhooft-middel*. G. Stirn artzney. Gall. *Frontal*. A. A frontlet.

FRUCTUS, sunt grandiores illi ac succulenti plantarum foetus, & seminum receptacula, ut poma, pyra, pruna &c. vel, quod carne & semine compactum est. Frequenter tamen pro eo, quod involucrio perinde quasi carne, & semine coactum est, accipi solet. B. *Frucht*. G. Fruchten. Gall. *Fruits*. A. Fruit.

FRUMENTUM, dicitur à fruendo, quod maximo cum fructu ejus usus est. Estque quod geniculato culmo, & arundinaceis constat foliis, semenque panificio & pultibus aptum, in spicis aut jubis producit. B. *Itroon*. Gall. *Bled*.

FRUTEX, est planta inter herbas & arbores media perennis, & gemmicara, ad arboris magnitudinem non assurgens; ad ligneam tamen indolem proximè accedens, vel quod à radice caudice multiplici, ramosumque sese attollit, ut rubus. B. *Wessler*. G. Eine stände, gesträuch. Gall. *Arbrisseau*. A. Shrub. Vide *Thamnos*.

FUCUS, est plantæ genus, quæ crescit in aquis, primò multos caules tenues, angustos & compressos germinat, qui sese postea extendunt in parvos ramos, habentes folia ampla, oblonga, quercum referentia, sed minora, substantiâ suâ tenaci, membranosa, flexili, plerumque polita, aliquantulum lanuginosa, caulibus suis adhærentia: adsunt tubercula vacua, aut bulbulæ aut vesiculæ cum seminibus, oblongæ, vel obrotundæ, aliquando majores, interdum minores: hæc planta est plerumque humilis, aliquando tamen ad duorum pedum altitudinem crescit, recens capta est coloris flavi virideicentis, sed siccata fit coloris nigri, nunquam flores habet, ab illis vesiculis supradictis supra aquam sustinetur. Gr. *Φύκος*, est herba marina, an à *φύω* cresco ut quidam volunt? Est quædam species in Candiæ maritimis locis, quibus lintea, lana &c. purpureo colore inficiuntur: atque eo etiam scæminæ sibi fucum seu cosmeticum parant. Vide in *Alga* Hofmanni.

FULIGO, idem quod *Aporrhæa*.

Cc 2

FUL

FULMINATIO, idem quod *Detonatio*.

FUMARIA, est planta, quæ habet plures caules ad altitudinem pedis vel sesquipedis crescentes, quadratos, excavatos, coloris partim purpurei, partim albescentis: folia minutim incisâ, caulibus longis & angulosis adhærentia, lobata umbelliferarum instar: flores sunt polypetalî, anomali, papilionaceis æmuli, ex duobus tantum petalis constantes, quasi bilabiati, labio superiori in caudam abeunte cum inferiori ad pediculum conjuncto: hæc inter labia velut in palato, cujus os à ligula occupatur pistillum positum est vagina obvolutum, quod deinde abit in fructum membranaceum nunc longiorem, nunc brevior, factum semine parvo, rotundo, ex nigro viridescente, saporis amari & ingrati: radix mediocriter crassa, fibrosa, alba: Tota planta habet saporem amarum & ingratum, crescit in pratis. Sive Fumus Terræ, Gr. καπνὸς & κάρνις, sic dicta, quod ejus succus oculis inditus, veluti fumus lachrymas moveat, oculosque mordicet. B. *Quibe-herbel* / *aard-rook* / *grpse-com*. G. Taubenkropf, tauben-kœrbel, erd-rauch, ratzen-kœrbel. Gall. *Fumeterre*, *Pied de geline*. A. Fumitory.

FUMIGATIO CHYMICA, est corrosio metalli; per fumum vel vaporem. B. *Roekinge*. G. Ræucherung. Gall. & A. Fumigation.

FUMUS TERRÆ, idem quod *Fumaria*.

FUNCTIO, idem quod *Actio*.

FUNDA GALENI, est fascia, in quatuor partes divisa, in affectionibus maxillæ inferioris utilis, vel alibi fissis. B. *Slinger-band* / *een vierhoofdige windel* / *slinger-zwagtel*. G. Eine vierhauptige windel. Gall. *Fronde*, *Bandelête à quatre Chefs*. A. A Swathe consisting of four parts.

FUNGUS, est plantæ genus nullos flores, folia, nec semina apparentia habens, utriculis & aëriis fasciculis pedunculus constat, qui pedunculus est brevis, crassus, fungosus, instructus capitulo carnosio, crasso, spongioso, obrotundo, aut compresso, aut acuto, foliaceo, sæpè plurimas fistulas inferius habet in formam organi pneumatîci dispositas; falso creduntur nullum habere semen, nam inter lamellas habent uteros, qui infinita semina continent. Sed variæ sunt fungi species; quidam dici volunt à funere,

re, quod suo veneno vescentes ad funus ducat : sub forma excrescentiæ arboribus, fruticibusve quibusdam adnascuntur vel immediate è terra prodeunt, sub varia forma & figura, de quo consulendi Botanici. B. *Waddestoe-len / Quivels-brood / Kampernoeljen / Wadd-brood*. G. Ein schwamm, schwemme & pfifferling. Gall. *Champignon ou Potiron*. A. Toad-stoole, or Mushroom.

FUNGUS, est caro mollis & spongiosa, quæ vulneribus superincrescit. B. *Wastert of weelig vleis*. G. Schwammgewächs, glied schwamm. Gall. *Excrescence spongieuse, chair baveuse*. A. A Spungy Tumour.

FUNICULUS UMBILICALIS, live INTESTINULUM, LAQUEUS, seu ductus umbilicalis, est pars, funiculi modo contorta, oblonga, vasculosa, crassitie pollicis, longitudine quatuor quali spithamarum, in foetibus ab umbilico in placentam uterinam usque porrecta; continet arterias duas, venam unam, & urachum. B. *De Navel-streng*. G. Der schuur von der nabel, nabel-riem. Gall. *Le Cordon ombilical, ou du Nombri*. A. The Navel-string.

FUNIS ARBORUM, est Smilax levis, quia sese circum arbores volvat.

FURCALE OS, idem quod *Furcula*.

FURCULA, SUPERIOR, dicitur os sterni superius, alii etiam jugulum vocant; ita etiam claviculæ os appellatur.

FURCELLA, idem quod *Furcula*.

FURFURATIO, Gr. *πυρρλασις*, Latinis etiam *Porri-go*; affectus est, cum scalpentibus furfuribus similia ex capitis cute decidunt, & quidem plerumque cute eâ, quæ sub capillis est, item etiam è barba & superciliis. B. *Zemelagtighrid*. G. Der hauptgrind, die schwinden. Gall. *Teigne*. A. Scurf or daridraff.

FURNUS, est locus in quo ignis ad materiam Chymicè tractandam, dextrè & convenienter accommodatur: estque apertus vel tectus, rotundus, quadratus &c. De furnis consule authores. B. *Oven Oven*. G. Ein Ofen, Brenn-oven. Gall. *Fourneau*. A. A Furnace.

FUROR, idem quod *Mania*.

FUROR UTERINUS, est in foeminis, imò & in virginibus Salacitas & Satyriasis quædam, sed cum delirio, ita

ita ut non modo Venerem & Viros appetant, sed prostituunt sese primum sermone obscæno, eoque delectantur, deindè ipsæ eum instituunt, tum absque pudore se denudant, & sine discriminine etiam obvios quoque invadunt, & sollicitant. Cùm primum hic morbus incipit, fœminæ tristiores sunt & taciturnæ, oculos jactant lascivos, rubet, modo pallet facies præcipuè narratione rerum obscænarum, rubor elucet cum pulsu & respiratione mutatis, adhæc vix pedibus consistunt tripudio deditæ. Inconstanter plerumque amant hunc vel illum, quo conspecto, aut de quo cogitantes ilicò perturbantur. Deinceps rixantur, moerent, rident, garriunt, cantant, dubia loquuntur, demùm delirant, & pudorem decoquunt, ita ut nonnunquam in lecto nudæ decumbant, ut per plateas vagabundæ quærant, quibuscum sese commisceant, quos non benè excipere solent. Ab hoc morbo hodiè immune non est fermè sequioris sexûs genus, maximè autem meretrices. *Causa* videtur consistere in succo feminali, qui ad summum maturitatis gradum evectus virgines in furem agit; exemplum illud in brutis animalibus quotannis occurrit, ut in felibus, tauris, damis & cervis. Est quidem & alius affectus huic cognatus, quem *Uteri* vel *Matricis Fervorem* Antiqui appellarunt, quando nimirum universa substantia, & totum ejus corpus incalescit, cum dolore & lumborum gravitate, *horripilatione*, fastidio & urinæ ac excrementorum alvi suppressione; & fœmina coitum vehementer appetit, sed ob dolorem venere uti pertimescit. Gr. *ῥιςγομαχία*. B. *Wuetende moer / ritsigheid*. G. *Wuetende geilheit, wuetende mutter krancheit*. Gall. *Fureur de la Matrice, Rage d'Amour*. A. *Fury of the Womb, or Womb fury*.

FURUNCULUS, sive **DOTHIE**N, est tuberculum acutum ovi columbini magnitudine cum inflammatione, & dolore; maximèque ubi jam in pus vergit. Qui ubi apertus est, & exiit pus, subter apparet pars carnis in pus versa, corrupta, subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiamsi nulla curatio adhibeatur: maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior Medicina fiat, quæ maturiùs liberet. B. *Bloed-zweer / bloedbin / tpek. hertebuilt*. G. *Blut-geschwær*. Gall. *Furoncle ou Clou*. A. *A Boil*.

F U-

FUSIO, est liquatio cujuscunque materiæ fusilis per calorem ignis sæpè vehementissimi, ut fit in liquandis metallis & mineralibus; huic operi non rarò follis adhibetur. B. *Smeltinge*. G. Ein gusz, schmeltzung. Gall. *Fusion*. A. A Melting.

FUSTERNA, est superior pars Abietis, dicitur, quia nodosi solent esse fustes & baculi crebris nodis ut plurimum asperi, inferior pars vocatur è contra *Sapinea*.

G.

G Græcum r Medicis Uncia est.
G. GAGATES, est Asphaltum eousque vi naturæ perfectum, ut evadat nigrum, durum, terrenum, scissile, politum, graveolens, resplendens : propter duritiem vocatur *Lapis Gagates*, vel *Thracius Nicandri*.

GALA, idem quod *Lac*.

GALACTOPHORI DUCTUS, propriè sunt *Vasâ Lactea*, siue quæ chylum versùs cor ex intestinis per mesenterium & ductum thoracicum ducunt. Item dicuntur Ductus lactiferi, chylum (ut quidam Neotericorum finxerunt) ab intestinis recta via ad glandulas mammarias ducentes : Rectiùs tamen hoc nomen arteriis imponitur, ex eo quod unà cum cruore chylum mammis advehunt, in quibus lac, ad infantis usum sequestratur. Sic quoque vocantur tubuli ex glandulis mammaris lac in papillas ducentes, ex γαλὰ lac, & φέρω porto, duco. B. *Melkbuijen*. G. Milch-gefäße. Gall. *Les Conduits Laiteux*. A. The Milk vessels.

GALACTOPHERA, medicamenta sunt, quæ lactis copiam uberrimam faciunt, & ad mammarias glandulas determinant. B. *Melkmakende middelen*. Gr. γαλακτοποιητικά. à γάλα & ποίω.

GALACTOPROJECTICE FACULTAS, Gr. δαύμις γαλακτοποιητική, nihil aliud est quàm aptitudo ad sequestrandum lac : de lactis sequestratione vide in *Lac*.

GALANGA, radix est aromatica, colore saturo rubra, duplex est *Major & Minor*, sed minor majori melior est : nondum authores conveniunt de hac planta; quidam utramque speciem ad Iridum genus referre volunt ob radicis præsertim convenientiam, alii verò majorem tantum Iridibus accensendam esse censent, minorem verò frutici folia myrtum æmulantia gerenti annumerandam, credunt.

Majoris radix crassior; intus alba, ex java & Malabar adducitur : minoris verò tenuior, nodosa intus & extra rubescens, sapore acris instar piperis, odore suavis; hæc verò ex China adfertur & hujus major usus est in Med. Ex India & China nobis adferuntur : ita vocatur à voce Arabica Galingia. B. *Galiga*. G. *Galgant*. Gall. *Galanga*. A. *Galangal*.

GALBANETUM, est compositio Galbanum recipiens.

GALBANUM, est gummi, succus, aut lachryma Ferulæ Syriacæ, quam *Metopium* vocant (quo nomine aliis gummi idem venit) intensè flavum vel albidum, inflammabile; odore gravi Opopanacem referens, colore Tacamahacam. Optimum censetur cartilaginofum (alii granulatum volunt, sed rarissimè ob mollitiem in granis invenitur) flavum, sincerum, pingue, non lignotum, quod in se retineat nonnihil ex suis feminibus, & ipsis ferulæ sarmentis, gravis & ingrati odoris, nec nimis humidum, nec nimis aridum, cum accenditur flammam nutriens. Dicitur & *Chalbanum*.

GALEA, est dolor capitis, sic à loci similitudine dictus, quod totum caput in modum Galeæ comprehendat.

GALEA, pertinet quoque ad vasa Chymica, est enim vis cui retorta imponitur, ex terra aut alia materia confectum, ne retorta, nisi mediatè, ab igne tangatur. B. *een slapnute*. G. *Bappeln*, ein helm. Gall. *Le Chapeau*. A. *Cap*.

GALEA, etiam dicitur, quando caput foetus in lucem prodeuntis cum parte membranæ Amnios circumvestitur, cum Galea vulgò, *een Helm* / dicitur prodiisse. Sed si infans ex sexu feminino fuerit, *Vitta* dicitur, de quibus obstetrices plurimas fabulas nugantur. Gall. *Né Coiffé*.

GALEGA, est planta, quæ plures habet caules tres pedes altos, striatos, excavatos, ramosos : folia pinnata, bina conjugata, affixa costæ, in impar folium terminata, saporis leguminosi : flores sunt in spicam congesti, leguminosi, coloris albi, aut violacei albescentis : flori succedit siliqua teres & quasi cylindracea, facta feminibus oblongis, & veluti reniformibus : radix exigua, alba, perennis : Hæc planta crescit in locis humidis, circa flumina. Dicunt esse vocem corruptam à Polygala, à Fracastorio vocatur herba Gallica, an inde nomen habeat ? Lectoribus

bus judicandum relinquo. B. *Grutenkruid*. G. Geiszkraut.
A. Goates rue.

GALENICA MEDICINA, est quæ nititur fundamen-
tis *Galen*i, ideòque *Galenici* sunt qui artis suæ fundamen-
ta è *Galeno*, & philosophis petita, ratione probata, &
experientiâ confirmata amplectuntur, & hoc duplici κρι-
τηρι^ω verum à falso distinguunt. Nituntur præcipuè qua-
tuor elementis peripateticis, hinc illorum temperamenta,
humores &c. B. *Galenische Medicin*e. G. Galenische
Artzeney. Gall. *Medecine Galenique* A. The Physick of
Galen.

GALIANCONES, sunt, qui ob capitis humeri in alam
prolapsum brachium iusto brevius & gracilius habent,
partes verò circa cubitum tumentiores mustelæque cubito
præditi sunt, ideòque *Mustelanei* vocantur, à γαλέη mu-
itela, & ὤστρεον cubitus. B. *Knortarmig*. G. Krummbein,
kurtz von armen. Gall. *Qui ont les bras courts*. A. Short-
ness of the Arm.

GALIOESIS, vel **GALLOPSIS**, est species Urticæ
mortuæ, vel lamii, quæ habet multos caules quadratos;
folia ejus Marrubium referunt; flos est pulcher, coloris
flavi, & multis punctis coloris croci notatus: flori suc-
cedunt semina oblonga, in capsula, quæ flori tanquam
calix inservivit, contenta; hæc capsula in quinque partes
divisa, infundibulum refert: Hæc planta crescit circa ri-
pas & in montibus. A γαλέας ὄψις, facie & rictu muste-
læ, vel est nomen ex Græco & Latino compositum, quod
ejus flores prorsus Galeæ aspectum referant. Hujus sunt
variæ species. B. *Dode netelen*. G. Tode nessel, taub-
nessel. Gall. *Ortie morte*. A. Dead nettle.

GALLA, est tuberculum quoddam rotundum, foliis
quercinis accrescens instar spurii fructus. Muscarum quæ-
dam species est, quæ ova sua intra folia recondunt, &
unâ cum folio crescunt: ex ovis deindè fiunt vermiculi,
qui interiorem folii partem rodunt, & inde nascitur quasi
folii scirrhus, qui intumescens *Gallam* repræsentat. Si la-
tè fumatur, tubercula quoque denotarent, quæ in foliis
Salicis, Cynosbati, Hederæ terrestris, viticis &c. con-
spiciuntur, quæ & eodem modo producuntur, Gr. Κημὶς
dicta, fortè à κῆκος id est, fuliginè, quod Gallarum, pan-
nis nigro colore tingendis, magnus usus sit. B. *Gallnoten*.
G.

G. Eychapffell, Gallapffell. Gall. *Nois de Galle*. A. A oak-apple.

GALLICUS MORBUS, vide *Lues venerea*.

GALLINAGINIS CAPUT, vide *Caput Gallinaginis*.

GALLITRICHUM, rectius *callitrichum*, penult. corr. quia à τριζ τριχος.

"Ευχεται ἀπαρχόμενον, καὶ ἀλλῆς τριχας ἐν περιβάλλαν. *Hom. Od.* γ. Inconvenienter *officinæ* gallitrichon appellant, cum nomen inde inveniat, quod κάλλος faciat τριχῶν; quemadmodum nucis juglandis putamen *Dioscoridi* l. 1. c. 141. καλλιτριχόν ἐστιν, id est, capillis pulchritudinem, & robur inducit. Accedit quòd planta hæc non *Apulejo* tantum, sed & *Plinio* callitrichon vocetur, l. 22. c. 21. *quidam*, inquit *callitrichon* vocant, alii *polytrichon*, utrumque ab effectu, tingit enim capillum &c. Inconvenientius, cum jubentur *callitrichum* capere *officinæ*, capiunt *borminum*, nam callitrichum ex adianthorum genere esse fidem facit *Plinius* l. 22. c. 21. Vide *Callitrichum*.

GALLIUM, seu GALIUM, est Molluginis species, dicitur ἀπὸ γάλα πηγνύειν ἀντὶ πιτύας αὐτὸ, quòd coaguli vice lac coagulet ac cogat. B. *Wal-stroo*. G. *Weger-kraut*, wald-stroh, unfer-frauen bett-stroh, weg-stroh, leb kraut. Gall. *Petit Muguet ou caille lait*. A. *Ladies Bed-strow*.

GALREDA, seu GELATINA, succus est inspissatus, viscosus, lucidus, fitque plerumque ex coctis partibus animalium cartilaginosis, v.g. ex pedibus vituli. B. *Gelci* / *Ulm* / *Uit*. G. *Galerte*. Gall. *Gelée*. A. *Jelly*.

GANGLION, est tumor in partibus tendinosis & nervosis, à casu, ictu, vel alias excitatus, renitens, in latera pressus non divertitur, nec in orbem circumagitur, oriundus ab extravasata Lympha ex vasculis ruptis, intra vaginam tendinis hærente. Vocatur etiam corpusculum oblongum, olivare, durum, capsula veluti tectum, in qua moveri potest pressione digitorum, carnei utcunque coloris, substantia nervosa nodi instar, multis in locis corporis quibusdam nervis veluti circumnatum, ubi multi nervosi furculi coeunt; formatur ex concursu duorum vel plurium nervorum cum suis membranis. B. *Gen ze-nuw* / *knoop* / *pees-knoop*. G. *Ein uberbein*, schneknopff. Gall. *Ganglion ou noeud de Ners*. A. A *Tendinous knot*, or tumor.

G A N-

GANGRÆNA, dicitur & *Ignis Persicus*, est mollis alicujus partis, cadaverosa corruptela, cum foetoris, nigredinis & mortificationis initio conjuncta, inflammationem consequens à *μεραι* comedo. B. *Heest vuur*. G. Heiße brand, faul-fleisch, das wilde fleisch. Gall. & A. The Gangrene.

GARGARION, vide *Cion*, à *γαραριζω* os colluo.

GARGARISMA, est Medicamentum liquidum, fauces & adjacentes partes, gargarizando, sine deglutitione colluens. Estque *vel* decoctum in quo syrupi convenientes solvuntur; *vel* aquæ destillatæ, quibus syrupi admixti, quandoque & spiritus minerales adduntur. Sed recentiores Medici, omnes syropos imò & acidos spiritus ex Medicina exturbant. Dicitur & *Gargarismus*, *Collutio oris*. Δ. *αχλυσμα*, à *γαραριζω* os colluo. B. *En gozgel-drank* / *gozgel-water* / *keel-spoeling*. G. Gargelwasser. Gall. *Gargarisme*. A. A Gargarisme.

GARGARISMUS, idem quod *Gargarisma*.

GARUM, dicitur liquamen ex piscibus sale conditis, aut maceratis paratum, ita vocatum à garo pisce.

GARYOPHYLLATA, vide *Caryophyllata*.

GARYOPHYLLI, idem quod *Caryophylli*.

GAS, *Helmontii* loquendi terminus est, & denotat spiritum non coagulabilem: vel spiritus est vitæ nostræ *Lumen* & *Balsamus* præservans à corruptione. *Gas pingue sulphureum*, quod enecat homines, præsertim in cryptis subterraneis: *Gas Silvestre*; *Gas Ventosum*, quod aër. *Gas Succum*, est sublimatum: *Gas cerevisiæ*, est exhalans spiritus è doliis vel lacubus, quando fermentatur. *Gas Salinum* est aqua, item uvæ. Derivatur fortè à Belgico idiomate. B. *Gist* / *vel gest* / aut *ceest*.

GAster, Gr. *γαστήρ*, *Venter*. Interdum totum abdomen denotat; non raro pro ventriculo tantum sumitur. Nonnunquam etiam pro utero habetur.

GASTRICUS SUCCUS, est pellucidus, tenuis, spumofus, leniter falsus succus, qui continuo ex acinis ventriculi glandulosis in ejus cavitatem, pro cibo solvendo, miscendo, & diluendo, stillat. B. *Maag-sap* / *maag-gest*. G. Magen safft. Gall. *Suc de l'Estomac*. A. The Juice of the stomach.

GASTROCNEMIUM, est fura, sive pars tibiæ posterior,

rior, unde ejus musculi à tumore ventricoso, *Gastrocnemii* dicti sunt. Sic tibia dicitur *Anticnemium*, à γαστήρ venter, & κνήμη tibia. B. *De hant*. G. Die waden. Gall. *Le Gras de la jambe*. A. The Calf.

GASTROCNEMII MUSCULI, sic vocantur duo, orti à posteriori condylo externo ossis Femoris, ventrem carnosum magnum constituentes, tendinem confundunt cum aliis, qui Achillis dicitur, & inseritur calcaneo. B. *Huit spieren*. G. Der waden maulz. Gall. *Muscles Gastrocnemiens ou les Grands jumeaux*. A. The muscles of the Calf.

GASTROEPIPLOICA, est vena & arteria, quæ ad ventriculum & omentum porriguntur, ex γαστήρ venter, & ἐπιπλόον omentum. B. *Net en maag-baten*. G. Die Netz und magen gefässe. Gall. *Vaisseaux Gastro-Epiploïques*. A. The vessels of the cawl and the ventricle.

GASTRORRHAPHIA, est connexio sive satura in vulneribus abdominis adhibenda; ex γαστήρ venter, & ῥαφή futura. B. *Bux hegting*. G. Der bauch naht. Gall. *Gastrorrhaphie ou suture des playes du ventre*. A. Suture of the belly.

GASTROTOMIA, est sectio abdominis & uteri, uti in cæsarea sectione, ex γαστήρ venter, & τέμνω seco. B. *Buphsnyding*. G. Bauchschneidung. Gall. *Gastrotomie ou section du ventre*. A. Cutting of the belly.

GATTARIA, idem quod *Cattaria*.

GAUDIUM, est lætitia ex judicio boni acquisiti, vel acquirendi; vel oblectatio orta à quadam perceptione. Gr. Χαρά, Εὐφροσύνη. B. *Blydschap*. G. Fröwde. Gall. & A. *Joye*.

GELASINI, idem quod *Dentes Incisores*.

GEMMÆ, dicuntur lapides pretiosi & haud ineptè vocari possent lapides pellucidi; harum indoles vitro proximâ omni ferè dote; sed illud exsuperant duritie, soliditate, simplicitate, difficillimâ fusilitate ad ignem; videnturque sale & terrâ, perfectissimis, tenuissimis, intimè commistis, conflari: ut cinis salsus igne fusus virum dat. Gemma verò perspicua, absque admistu ullius coloris, quam proximè vitrum imitatur.

GEMMÆ SAL, salis communis species est, in fodi-
nis lapidum frangitur, specieque Crytallorum splendens
erui-

eruitur, undè Gemmeum, à gemmis ob colorem nuncupatur, dicitur alias *Sal Fossile* & hujus purior pars *Sal Gemmæ*. In variis Germaniæ locis reperitur. B. *Steen-zout*. G. *Stein-saltz*. Gall. *Sel Gemme*. A. *Sal Gem*.

GEMMA, in vite idem est quod *oculus*, quia veluti ocellus quidam conspicuus, aut Gemma quædam excellens conspici possit, cum primum è vite prodit, aut sarmento. Hæc ineunte vere sese ostendit, & ab ea primum flos, deindè fructus prodit tam in ipsis vitibus, quàm arboribus: furculi est compendium, in quo futuri senii partes latitant, iisdem, quibus rami componuntur, integratur partibus, originem suam debet nodo, qui tractu temporis in gemmam transit. B. *En botte / een gewas*. G. *Ein ræbaug, beer-kopff*. Gall. *Un Bourgeon, Bouton*. A. *A Joung Budde*.

GEMURSA, est morbi species inter pedis digitos, quæ ita olim Antiquis dicebatur.

GENA, MALA, Gr. *Μῆλον, Φαρειά, Κόκλοι* Hippocrati: est faciei pars à naso ad aures. Item, mentum & maxilla, quæ est superior vel inferior. B. *Wange / hoorn / appel van de wange*. G. *Die wangen*. Gall. *La Jouë*. A. *Thee cheek*.

GENERATIO, est actio corporea, quâ Vir junctus mulieri, illi communicat aliquid corporci, ex quo postea nascitur, & prodit corpus humanum, illud autem quod vir communicat est semen, quod fit sæcundum; si à fæmina prolifera acceptum, ejus ope aptum est transire in corpus humanum: Illud igitur semen à Viro ejectum in utero muliebris, ingressum Tubas Fallopianas, ovulo ex materno ovario abrupto communicatum, causa est cur nascatur postea Fætus. B. *Doozt-seling*. G. *Zeugen, gebæren*. Gall. *Generation*. A. *Ingendring, generation*.

GENICULATA, est planta amæni aspectus; sic dicta ob plurimos nodos, quasi genua.

GENICULI, sive **GENICULA**, sunt nodi, qui, in herbis, aut leguminibus, aut etiam suffruticibus apparent. Sic Geniculatæ radices nominantur, quæ nodis quibusdam interstinctæ protuberant, rotundæ & leviter capitulatæ Gr. *κνέμω*. B. *knoep*. G. *Ein knoetgen, kraut stengel*. Gall. *Noeuds, qui se trouvent aux tiges ou aux racines des herbes, & aux tuyaux de bled*. A. *The Knot*.

Gr.

GENIOGLOSSUM, five **MESOGLOSSUM**, est pars musculorum ab interna parte menti carnosio principio ortum, dilatatum progrediens radici linguae inseritur, & linguam versùs anteriora trahit, à μένυς mentum, & γλῶσσα lingua. B. *Des kins tong-spiereu.* G. *Der kinnen zungbeins maußz.* Gall. & A. *Genio-glosse.*

GENIOHYOIDES, sunt musculi à menti interna & humiliore sede sub Genioglossis orti, ad basin ossis hyoidis extensi terminantur: ex μένυς mentum, ἰψίλον os hyoides, & εἶδος forma. B. *Des kins tongbecus-spiereu.* G. *Der kinnen zungbeins maußz.* Gall. *Les Genio Hyodiens.* A. *Geniohyoide.*

GENISTA, **GENESTA**, vel **GENESTRA**, est frutex, qui crescit ad altitudinem sex vel septem pedum, cujus rami juncum referunt, rotundi, virides: folia sunt oblonga, acuta, alterno, aut verticillato ordine disposita: flores papilionacei, leguminosi, flavi, visui grati, saporis dulcis: his succedunt siliquæ planæ in duas partes dehiscentes, fætæ seminibus reniformibus, compressis, rubicundis, splendentibus, saporis ex dulci amaricantis nauseosi & ingrati: dum annosa sunt farinacei; crescit in regionibus calidis, ut in Gallia, & Hispania; variæ dantur genistæ species. Dici putant quod genu modo flexilis ad nexus sit: vel ut aliis placet, quia genubus medeatur dolentibus; dicitur etiam spartium Græcè σπάρτον à σπειω semino, quia spontè, seminatur. B. *Brem.* G. *Gent.* *genster*, pfriemen-kraut. Gall. *Genêt d'Espagne.* A. *Broom.*

GENISTELLA, est quasi minor Genista, ideòque ejus diminutivum. Gall. *Spargelle.*

GENSING, est herbæ Sinicæ *Gensing* dictæ radix digito longa, tenuior minimo digito, formâ rapæ siccatae, bilida, in extremitatibus filamentosa, flavescens, saporis subdulcis ex amaro: est pretiosissima, & à Sinentibus pro Panacea habetur; vocatur quoque *Nisin*, & *Ninsin*.

GENTIANA, est planta, quæ habet plures caules rectos, firmos, duos vel tres pedes altos: folia Hellebori albi, vel Plantaginis, nervosa, polita, coloris ex viridi pallescentis, quædam immediatè ex radice erumpunt, alia ex nodis caulium, bina conjugata: flos est monopetalus, campaniformis, vel patens vel tubulatus, & multifidus; pistillum sit fructus membranaceus ovato acuminatus, bival-

valvis unicapsularis, ubi insunt semina marginata & rotunda, coloris rubicundi : radix est crassa, longa, foris fusca, intus ex flavo rufescens, saporis intensè amari, odoris nullius, crescit hæc planta præsertim in montibus. primum inventa videtur à Gentio Illyriorum seu Slavoniæ Rege, à quo etiam cognomen habuit. B. *Paal-berger*. G. Entzian, kreutz-wurtz, bitter wurtz. Gall. *Gentiane*. A. Gentian, Fell-worte.

GENTIANELLA, est minor quasi Gentiana, ideòque ejus diminutivum.

GENU, est articulatio femoris cum osse tibiæ & suræ, superius tegitur osse *Patellâ* vel *Molâ* aut *Rotulâ* dicto. Gr. *γονη*. B. *De Knye*. G. Das Knie. Gall. *Le Genouil*. A. The Knee.

GERANIUM, est planta, quæ habet plures caules pedem vel sesquipedem altos, nodosos, villosos, rubicundos, ramosos : folia quædam ex radice erumpunt, alia ex ramorum & caulium nodis, pediculis longis & rubicundis adhærentia, villosa, divisa, vel instar Matricariæ laciniata, odoris pumicis, saporis adstringentis : flos rosaceus, purpureus, pentapetalus, horum petala in orbem disponuntur, ex hujus calice villosò surgit pistillum, quod deindè abit in fructum rostratum quinque striis per longitudinem incisum, quibus totidem adhærescunt capsula, in longam caudam desinentes, per maturitatem à basi ad apicem extrorsum se resolventes, & semine sætæ ut plurimum oblongo : radix exigua, coloris subflavi. Crescit hæc planta in locis umbrosis, petrosis, desertis : Latinis Rostrum Gruinum, à similitudine seminis rostriformis. *Γέρανιον* enim grus est; in ejus quippè vertice fastigia conflunt instantia, capitulis gruum cum rostellis similia, in quibus semen concluditur : dicitur etiam hæc planta veteribus Rupertiana, vel Ruberta, ob rubrum plantæ colorem & postea improprie Rupertiana & Robertiana, vocata fuit. B. *Oprevaars bek*, *Robbregts-kruud* G. Sichtkraut, gottes gnad, roth-lauffs-kraut. Gall. *Bec de Gruë*, *Bec de Cycogne*, *Herbe Robert*. A. Cransbill, Herb Robert.

GEROCOMIA, est pars Hygiæinæ, quæ senum vivendi rationem præscribit, ex *γερων* senex, & *κομείω* curam gero.

GERSA, ferè idem ac Fæcula; denotat alicujus radicis, ut Serpentariæ, Ari &c. pollen.

GESTA

GESTATIO, dicitur illud tempus, quod fœtus in utero materno moratur. B. *De dragt*. G. Das tragen, tragt. Gall. *Groffesse*. A. Bearing.

GIBBUS, est is, cui eminet dorsum. B. *Gebogchelt*. G. Ein hocker, buckel. Gall. *Bossu*, ou qui porte une Bosse. A. A buuch of the back.

GILLA & GRILLUS, est sal vitrioli emeticum. Quidam sumunt pro vitriolo sponte suâ in liquorem soluto, alii pro sale armoniaco liquato. *Gilla* est vox Arabica significans *Sal*.

GINGIBRACHIUM, est scorbutus, non tantum gingivas invadens, sed & brachia, comp. ex gingiva & brachium.

GINGIDIUM, est herba quædam Syriaca, quæ quoque alibi succrescit: cujus Etymologia adhuc me latet.

GINGIPEDIUM, est scorbuti symptoma gingivas non tantum depascens verum & ipsos pedes. Derivatur à gingiva & pes.

GINGIVA, Gr. *ὄνλον*, & *ἐνελον*, est caro dura variis lamellis sibi impositis conflata, quæ omnes sunt mera vasculorum sanguineorum reticula, quibus nonnullæ glandulæ interjacent; dentes instar valli cingens, iisque plurima vasa communicat; & in edentulis nonnihil etiam ad ciborum contritionem facit; quâ vel exesâ, relaxatâ vel nimis exsiccatâ, dentes vacillant vel excidunt. B. *Het tant-bleesch*. G. Das zahn-fleisch. Gall. *La Gengive*. A. The gums. In edentulis, uti infantibus & senibus, dicuntur. B. *Bagels & siebels*.

GINGLYMUS, seu **CARDINIFORMIS**, est conjunctio ossium cum motu manifesto, quâ unius ossis caput, in sinum alterius reconditur, vicissimque hujus caput in illius cavitatem excipitur, à *γινγλυμμομαι* per ginglymum jungo. B. *t'Samen inboeging*. G. Zusammen fuegung. Gall. *Ginglyme*, ou articulation en forme de Charnieres ou de Gonds. A. A Joyning together.

GLACIALIS HUMOR, vide *Humor Oculi*.

GLADIOLUS, est planta Iridi bulbosæ fatis similis; habetque folia longa, angusta, acuta, dura, fortia, striata, gladium figura referentia, caulem undique ambientia, & quasi in vagina includentia: caulis duos vel tres pedes altus est, rotundus, aliquantulum nodosus, coloris

fis ad purpureum accedentis; calix bifolius, binis foliolis vaginalibus ovarium & ei impositum tubum floris sustinet: flos monopetalus, liliaceus, in exortu infundibuliformis, supra verò ampliatus, & in sex magna segmenta fissus, quorum tria superiora, majora, latiora, plus erecta, tria inferiora, longiora, angustiora, deorsum quasi pendula, ita ut flos quasi bilabiatus appareat, habens tria stamina enata ex pariete interno tubi floris, & insidens apici ovarii: ovarium sit fructus oblongus, trilocularis, factus seminibus rubicundis, subrotundis, caliptra involutis, habetque tubam ortam ex centro apicis ovarii, & instructam tribus cimbis cavis pro apiculis suis: radix carnosae, tuberosae, geminae, altera, alteri incumbens: hæc planta crescit in pratis. Gr. *Ξιφίον* a *Ξίφος* gladius: est planta cujus folia gladium minorem referunt. B. *Zwaardenkruid*. G. Schwertel. Gall. *Glais*, *Glayeul*. A. Swordgrass.

GLANDULA, est corpusculum parvum, constans duabus membranulis infinitas arterias, venas, nervos, Lymphatica habentibus; hæ membranæ formant intus aliquod cavum, in quo terminantur quam plurima vascula, & suum succum effundunt, miscent; ex hoc cavo hic succus per lymphatica fertur in alias glandulas, denique in cisternam chyli; vel per emissarium in commune cavum deponitur, dividuntur omnes glandulæ in *Conglobatas* & *Conglomeratas*, quas vide suo loco. Est etiam morbi species, quæ glandula dicitur, ut sunt strumæ, scrophulæ, Bronchocele &c. Gr. *Αδέν*. B. *Ulier*. G. Schlier, trufel, drusen. Gall. *Glande*. A. Idem.

GLANDULA GUIDONIS, est tumor glandi similis, mollis, solus, mobilis, sine radicibus, & à circumjectis partibus, separatus: maximè in emunctoriis & juncturis proveniens. *Avicennæ* glandula videtur esse *Ganglion*.

GLANDULA PINEALIS, vide *Conarium*.

GLANDULA PITUITARIA, est corpusculum in sella equina ossis sphenoidis constitutum, reti mirabili investitum; superius ab infundibulo & fortè ex reti mirabili humorem serosum suscipit, quem in venas jugulares, vel vasa lymphatica amandat. B. *Slym-silier*. G. Schleim druesen. Gall. *Glande Pituitaire*. A. The snivel glandule.

GLANDULOSUM CORPUS, idem quod *Prostata*.

GLANS, idem quod *Balanus* & *Suppositorium*.

GLASTEIA BILIS, vide *Bilis*.

GLASTUM, Gr. ἱστάρις, est nomen incertæ originis, quamvis nonnulli à gelu deducere conantur: quia fortè exinde vitrum fit, quòd ignis ope in glaciem quali congelascit; fortè à nostro idiomate *Glas*, vel Anglorum *Glasse* denominari videtur. *Glastum* in veteri Gallorum lingua olim dicebatur, nunc *Guadum*. Hujus maximus proventus habetur in Umbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadum ita appellatum. B. *Werde / wentw.* G. Weydt, Pastel. Gall. *Pastel*. A. Idem.

GLAUCEO, idem quod *Glaucoma*.

GLAUCIUM, est planta, quæ habet folia ex radice erumpentia, longa, ampla, carnosa, crassa, villosa, verbasci similia, profundè incisa, dentata, & quasi crispata, repentia, hyeme semper viridia, caulibus crassis adhærentia: Caulis secundo tantum anno erumpit, fortis, durus, nodosus, non villosus, in multos ramos divisus, ex nodis suis folia minora & minus incisa, quàm inferius, germinans: calix bifolius & caducus: flores rosacei, tetrapetali, coloris lutei: floris pistillum abit in siliquam oblongam, exiguam & asperam, bicapsularem, quæ habet valvas septo medio adhærescentes, factam feminibus ut plurimum subrotundis, & nigris; radix longa, digitum crassa, nigricans; tota planta habet succum luteum, odoris ingrati, saporis amari: crescit in locis maritimis: occurrunt & hujus species fructu unicapulari quidem sed quadrisariam dehiscente: derivant à γλαυκός, cæsius, vel glaucus, sed quare, me latet; illud nomen variis imponitur plantis, an non fortè quia folia hujus plantæ colorem viridem marinum habent: vocatur etiam papaver corniculatum, quia est species papaveris siliquas habens instar cornu. Gall. *Pavot cornu*.

GLAUCOMA, est oculi vitium, sive transmutatio crystallini humoris in glaucum, à γλαυκός cæsius. B. *Grauw oogig.* G. Grawblaw. Gall. *Glaucome*. A. Gray of Colour.

GLAUCOSIS, idem quod *Glaucoma*.

GLAUX, est parva planta, quæ habet caules tenues, humiles, repentes; folia sunt Herniariæ æmula, & opposita, minuta, & succulenta: flos exiguus, monopetalus, campaniformis, costa adnascens ad formam alæ: huic deinde succedit fructus seu capsula membranosa, ut plurimum glo-

globosa, apice dehiscens, ac feminibus sæta exiguis, rubicundis, placentæ affixis; radix fibrosa: hæc planta crescit circa loca maritima. Est herba lactifera, derivari videtur à γαλα lac: hinc & γλάξ & γάλαξ, & contrahendo γλαυξ. Gall. *Herbe aux lait*.

GLENE, idem quod *Pupilla*. Item cavitas ossis, quæ aliud os in sinum suum recipit.

GLENOIDES, sunt duæ cavitates, in inferiore parte vertebræ primæ colli, ex γλήνη pupilla, & εἶδος forma.

GLOBULARIA, est planta, quæ habet caulem pedem circiter altum, rotundum, striatum, rubicundum, folia ad Bellidis formâ satis proximum accedunt, sed sunt magis dura, nervosa, saporis amari: flores flosculosi, plurimis scilicet flosculis constantes unilabiatis, multiseissis, & calice proprio comprehensis; è quorum fundo surgit pistillum, flosculi parti inferiori ad instar clavi infixum, quod deinde abit in semen, in capsula, quæ flosculi calix fuit, reconditum: capsulæ autem illæ insident placentæ, quæ meditullium occupat calicis communis: radix est lignosa, dura, foris rubra, intus alba, fibrosa: est Scabiosæ species floribus cæruleis, sic vocata à florum glomerulis globosive. Gall. *Globulaire*.

GLOBULUS NASI, est na i inferior pars cartilaginea & mobilis. B. *Spitz der nuss*. G. Das runde spitzlein. an der nase. Gall. *Le bout du Nez*.

GLOBULUS, seu NODUS, etiam significat tumorem rotundum & mobilem, & parum dolentem in labiorum parte glandulosa. B. *Gen Steen-knoop*.

GLOSSOCOMIUM, est instrumentum Chirurgicum, fractis membris accommodatum, à figura arculæ mercatorum dictum, quod olim à tergo gerebatur, ex γλῶσσα vinculi genus, & κομίζω curam gero, porto. B. *Bug / leeschroef / bank van Hippocrates*. G. Ein glossëcom, schemel von Hippocrates. Gall. *Glossöcome*. A. Glossöcone.

GLOSSOPETRA, est lapis ut plurimum triangularis, è basi crassiore & scabra in conum acutum & planum desinens; reliquo toto corpore lævis, & quasi corneus, sæpè minutis quibusdam dentibus ad latera crenatus, coloris cæsi, albi, lutei, rosei, cærulei, in variis mineris Angliæ, Lunenburgiæ, Melitæ reperiendus, diversæ magnitudinis; creditur quòd sit Lingua serpentum petre-

facta ob morsum *Pauli Apostoli*; alii tempore diluvii multas animalium partes, sic & has terra submersas, tempore petrefactas opinantur. B. *Serpents-tongn.* Gall. *Langue de Serpent.*

GLOTTIS, est Laringis rimula, quæ ab Epiglottide regitur, à γλωττα lingua.

GLUMA, est folliculus grani, quod in spica continetur, vel grani theca.

GLYCYPICRUM, est DULCAMARA, ex γλυκὺ dulce & πικρὸν amarum.

GLYCYRRHIZA, est planta, quæ plures caules dimittit tres vel quatuor pedes altos: folia sunt oblonga, viscosa, viridia, splendentia, in alas disposita instar Fraxini vel Acaciæ, bina conjugata ad costam in folium impar desinentem, saporis acerbi, subacidi: flores sunt leguminosi, purpurei: flori succedit siliqua unicapsularis, brevis, compressa, facta seminibus reniformibus: radix oblonga, sarmentosa, in multos ramos repentes divisa, digiti crassitie, externè coloris grisei aut rubicundi, internè flavi, saporis subacris mellei dulcissimi, tenuis odoris mellei: hæc planta crescit in regionibus calidis, præsertim in silvis, & in locis arenosis, optima ex insulis canariensibus adfertur, quæ pugni crassitiem adæquat, est dulcis radix, ex γλυκὺ dulce & ῥίζα radix. Nomen tum apud Græcos, tum etiam Latinos à dulcedine, quæ radix ejus prædita est, invenisse notius est, quàm dici debeat. *Scythica* etiam nominatur *radix*, quod in Scythia circa Mæotim paludem plurimum proveniat. Sunt etiam qui ἀδιφοῖ vocitant, quod sitim retenta in ore arceat. Officinis *Liquiritia* dicitur, fortè quia salivam liquidam servat. B. *Zoet-hout / Haliissi-hout* / quia Caleto huc adfertur. G. Suesz-holtz, Suesz-wurtzel. Gall. *Reglisse.* A. Liqueurish.

GLUTEN, Gr. κόλλα, est humor *Avicennæ* secundarius dictus; & dicitur, cum roridus ille humor partibus unitur & agglutinatur. Erant quatuor, *Humor innominatus, Ros, Gluten, & Cambium*, verum illa nomina nunc temporis evanuerunt. Liqueor glutinosus reperitur inter juncturas, qui & *Synovia* dicitur. B. *Upm-sap.* G. Leim. kleister, pappen. Gall. *Colle, Glu.* A. Glue, Paste, Lime.

GLUTÆI, sunt muscoli sex quibus nates moventur; in utroque latere tres, locati in cavitate ossis Ilii, concur-

fu suarum fibrarum quasi unum faciunt cum triplici cauda, quæ terminatur in & circa trochanterem majorem à γλῆτος nates. B. *De aars-spiereu*. G. Der Arschmausz. Gall. *Muscles de la Fesse, ou Fessiers*. A. The Buttocks Muscles.

GLUTIA, sunt prominentiæ duæ cerebri, nates dictæ, à γλῆτος nates.

GLUTOS, est natis, clunis. Item Trochanter sive rotator ossis femoris major, fortè quia natiū musculi ei inferuntur. B. *De bil*. Der arsch. Gall. *Les Fesses*. A. Buttock.

GNAPHALIUM, est planta, quæ habet plures caules ad altitudinem circiter pedis, satis crassos, lanugine albâ obductos, habentes folia multa, oblonga, versus extrema obrotunda, divulsa apparent flocculi lanuginosi: flores in summitate caulium nascuntur, superius stellæ ad instar divisi, calice squammoso & villoso comprehenduntur, flori succedunt parvi fructus albi, semen recurvum continentes, & speciem pilei acuti feminis caput obtegentis, habentes: radix lignosa, oblonga, crassâ, nigra, aliquantulum fibrosa, odoris aromatici, itæchadis æmula, & saporis subfalsi. Dicitur & κναφάλιον, à κνίπτω, seu γνάπτω carminō. Vocatur etiam *Centunculus*, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio: hinc *Centuncularis Herba* & *Cotonaria* à calore & mollitie. Gall. *Pied de Chat*.

GNIDIA GRANA, sunt Thymelææ vel Laureolæ baccæ rotundæ, pisi magnitudine, rubræ, sub tenui pellicula includentes nucleum cannabis semini similem, medulla candida plenum, saporis acerrimi & urentissimi: estque purgans vehementissimum.

GOMPHIASIS, vel potius *Agomphiafis*, est morbus dentium, præsertim molarium, quando nempè vacillant: Gomphiosi enim loculis ossium utriusque maxillæ inferuntur, à γομφίω clavum impingo. B. *Lossigheid der tanden*. G. Das wackeln der zæhnen. Gall. *Relachement de dents*. A. Wagging of the teeth.

GOMPHOMA, idem quod *Gomphosis*.

GOMPHOS, est, quando oculi pupilla, pelliculas uvæ excedens clavum refert. Item ossium conjunctio clavorum instar, à γομφίω clavum impingo.

GOMPHOSIS, five conclavatio est, quando os ossi infigitur instar clavi, uti dentes maxillæ à γομφόω clavum impingo. B. *Inboring* / *inschieting*. G. Zufammenfügung. Gall. *Gomphose*; *articulation immobile qui se fait en maniere de Clou ou de Cheville*. A. A Joyning one into another.

GONAGRA, est arthritis genua occupans, ex γόνυ genu & ἀγρεύω venor. B. *Knie-uebel*. G. Knie uebel, kniezipperlein. Gall. *Goute au genouil*. A. The gout in the knee.

GONGRONA, Gr. γονιζώνη, est omnis tumor nervosis partibus adveniēns, cum duritie & rotunditate. Sic & in specie *Bronchocle* nominatur.

GONGYLE seu STRONGYLE, dicitur rapæ radix, ob formam rotundam. Στρογγύλον enim, seu γογγύλον est rotundus.

GONORRHOEA, est fluor involuntarius liquidi purulenti & sordidi ex membri virilis urethra, cum dolore & ardore Urinæ, penis tentigine, ortus ab impuro coitu: fluidum quod exit, sæpè crassescit, flavescit, viridescit, & tum dicitur Virulenta gonorrhæa, ex γόνυ genitura, & ῥίω fluo. B. *Zaad-loop* / *een duivert*. G. Samenflus, das fließen des samens. Gall. *Chaudépisse*, *Gonorrhée*. A. Effusion of seed, Lusitan Scantamento.

GONORRHÆA CHORDATA, est, quando unà cum gonorrhæa, urethra arcūs instar tenditur, & ad inferiora cum dolore flectitur. B. *Spanning in de schagt*. G. Spannung des schwantz. Gall. *Gonorrhée Cordée*. A. Extending of the yard.

GOSSIPIUM, seu GOSSYPIUM, Gr. ἔύλον & γοσσίπιον. Ægyptij vocant *Gotne Msegia*, an ab Ægypto *Gotne*, *Gottipium* & deindè Gossipium dicta hæc planta sit? B. *Boommool* / *kattoen*. G. Baum-wollen, bomesin. Gall. *Cotton*. A. Cotton-tree. Bombace.

GRACILIS MUSCULUS, seu *Rectus inferior*, est Tibiæ musculus, oritur ex commissura ossis pubis, in tibiā inseritur, circa epiphyfin superiorem. B. *De smalle scheen-spier*. G. Der duenne scheinbein-mauzf. Gall. *Muscle grele*. A. The small. Muscle of the shin.

GRADUS, olim dicebatur de calore, frigore, siccitate & humiditate Medicamentorum; constituebant enim quatuor

tuor gradus, pro numero Elementorum Peripateticorum; illi gradus adhuc sua extrema habebant, ut in initio, vel fine tertii aut quarti gradus. Chymici alios constituunt gradus, nempe circa calorem & regimen ignis, inter destillandum, digerendum &c. Sunt & qui alios tradiderunt, sed nugamenta sunt. Gr. Τάξις. B. *Ein Grad*. G. Ein grad. Gall. *Degrez*. A. Degree.

GRAMEN, dicitur à gradiendo, quòd geniculatis internodiis mirifice serpat, vel à gignendi fecunditate, quòd crebro ab iis novas spargat radices. Gr. Πόα & Ἀγρῶσις, quia in ἀγρῶ nascitur. B. *Gras*. G. Gras. Gall. *Herbe*. A. Grass.

GRAMEN CANINUM, pertinet ad plantas flore apetalò, cujus pistillum abit in semen subrotundum, vel oblongum parum, admodum farinaceum, calice obvolutum: radix tenuis admodum, longa, geniculata, alba, saporis subdulcis cum aliquali in recessu acrimonia, odoris nullius. Caninum vocatur, quòd à canibus quæsità sedulò, ubi ægrotant, indè vomant & curentur. B. *Mont-gras*. Gall. *Dent de Chien*.

GRAMMA, idem quod *Scrupulus*.

GRANA PARADISI, vide *Cardamomum*.

GRANATUM, dicitur fortè ab Hispaniæ regione Granata, quod in ea copiosè proveniat, vel ex eo, quia plurima intus grana contineat, ergò à Granis ei nomen impositum. B. *Granaat* appell. G. Granat-apffel. Gall. *Grenade*. A. Pomè Granate.

GRANATUS, est gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignis instar, minique nativi vel factitii colorem ferè referens. Sunt diversa genera gemmarum quæ colorem ignis æmulantur, adeoque sub carbunculis (quæ nomine à carbonibus sumpto gemmas illas in genere vocant) comprehenduntur, uti *Granatus*, *Hyacinthus*, *Rubinus* &c. hinc sunt qui Granatum faciunt Rubinum obscuriore colore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius, quàm ipsemet Rubinus. Sunt Granati alii (vel aliæ) orientales, alii occidentales. Orientales, ut meliores ita & pretiosiores, proinde provinciam officinalem solis Occidentalibus relinquunt. Hi sunt tunc Hispani, tum Bohemici, tum Silesiaci, è quibus Bohemici reliquos antecellunt. B. *Granaat*. G. Granat. Gall. *Grenat*. A. Granate.

GRANDINOSUM Os, idem quod *Cuboides*.

GRANDO, vide *Chalasa*.

GRANULATIO, est Metallum ad ignem fusum, seu liquatum, in frigidam per scopas, vel aliud vas perforatum, pedetentim effundere, in qua tunc fit granorum adinstar, videlicet eum in finem, ut ad solvendum sit aptius; estque nihil aliud, quàm metalli alicujus fusi in grana reductio.

GRANUM, Gr. *Σιτάριον*, minimum pondus est quo utimur. Ejus loco sumuntur aliquando grana piperis albi, viginti scrupulum constituunt. In nativis semina sonat minutiora, sive rotunda ea sint, sive alius alicujus figuræ, uti hordei, tritici, piperis &c. B. *Een grain*. G. *Ein korn*, ein gran. Gall. *Un grain*, *graine*. A. A. *graine*.

GRAPHOIDES, est processus styloformis, circa cranii basin ad posteriora vergens, ex *γραφεις* stylus, & *ειδος* forma. *Graphoides* etiam dicitur ille musculus *Digastricus* dictus: Vide suo loco. Gall. *l'Apophyse styloïde*.

GRATIA DEI, Emplastri quædam species est, ex cera, resina, sevo, terebinthina, mastiche, olibano & aliquando ærugine. Sic sortè nominatur ob præstantissimas vires. B. *Gods gunste / groenwasch*. G. *Gruen wachs*. Gall. *Le beaume verd*. A. *Green wax*.

GRATIOLA, & GRATIA DEI, species est digitalis, vel planta, quæ habet plures caules unum circiter pedem altos folia sunt oblonga, angusta, instar ferè Hyssopi, in margine striata, sibi invicem opposita juxta caulium longitudinem: flos est monopetalus, anomalus, tubulatus, utrinque patens, & quasi bilabiatus, ex cujus calice surgit pistillum, posticæ floris parti, adinstar clavi infixum, quod deinde abit in fructum seu testam è rotundo acuminatam, bifariam dehiscentem, in duo loculamenta, divisam, & seminibus fætam ut plurimum exiguus: sortè sic vocatur, quod qui ejus plantæ succum sumunt, (vomitus enim concitat) sese quasi morti exponant. B. *Gods-genade*. G. *Wilder aurin*. Gall. *Gratiole, herbe à pauvre homme*. A. *Hedge Hyssop*.

GRAVEDO, idem quod *Coryza*.

GRILLUS, vide *Grilla*.

GROSSI, appellantur fici, quæ non maturescunt, privatim tamen in bifea fico eas intelligunt, quæ per menses

ses maturantur. Hos grossulos Græci vocant ὀλκιστοί.

GROSSULARIA, est frutex quinque vel sex pedes altus, valdè ramosus undique spinas fortes, & acutas habens : cortex est purpureus : lignum est pallidum : folia parva, obrotunda, aliquantùm incisa, viridia, villosa, saporis acidiusculi; flores rosacei, pulchri, parvi, quinque petalis in orbem positos constantes, in incisuris calicis monophylli & pelvi formis nascentibus : hujus autem potterior pars abit deinde in baccam vel fructum rotundum, carnosum, hirsutum, striatum, antè maturitatem viridem, succum acidum & austerum continentem, post maturitatem subflavum saporis dulcis & vinosi; seminibus factum exiguis : dicitur & *Uva Crispa*, uva spina, nomen hoc habet ab intortis & veluti crispis foliis, & acinis sive baccis quas producit & videtur diminutivum à grossus, ficus immatura, quia inter sese similitudinem quandam habent. B. *Stachelbesien / kruisdoorns : kroes-besien.* G. Kreuz-beer, Johannis-beer. Gall. *Groselier ou groseilles.* A. Goos-berrie.

GROSSUS, ficus immatura, Gr. ὀλκιστός, putant derivari à voce crassus; mutatâ enim priori syllabâ, mutatur in *Grossus*.

GRUMUS, est rei liquidæ in unam massam concretæ, & coagulatae frustum; vulgò dicitur de sanguinis vel lactis concreto: *Thrombus* quoque dicitur. Grumosa dicitur radix, quæ multis constat tuberculis vel nodis sibi invicem adhærescentibus, quæ varias sortiuntur formas. & magnitudines, ut in Chelidonio minori, ranunculo hortenli, aliisque plantis observare est.

GRUS, instrumentum Chirurgicum est, sive forceps, à figura rostri gruis sic dicta. B. *Œn krane-bek.* G. Ein kranichs-schnabel. Gall. *Bec de grue.* A. A Cranes bill.

GRYPHUS, species est forcipis apud Chirurgos. B. *Œn gierenbek.* G. Eingreifen-schnabel. Gall. *Bec de gryffon.* A. The gryppel bill.

GUAJACUM, sive *Lignum Sanctum*, arbor est exotica, in America crescens, procera, quæ ex India occidentali ad nos transportatur. Sunt & variæ species. Lignum est ponderosum, solidum, resinofum, nigricans, variegatum venulis; acris saporis : cortex est extûs cinereus, intûs pallidus. Lignum, cortex & resina in usu sunt, præ-

fertim in lue venerea : Sudorem enim prolicit. B. *Pok-hout*. G. Frantzosen-holtz, heilig-holtz. Gall. *Gaujac*, *Bois saint*. A. Holly-wood, Pock-wood.

GULA, idem quod *Pharynx*.

GUMMA GALLICUM, est ossis quædam exesio seu erosio, in lue venerea aliisque morbis.

GUMMI, liquor est concretus, ex arboribus aut herbis destillans, in aqua solubilis, non inflammabilis, alioquin est *resina*. B. *Gom*. G. Gummi. Gall. *Gomme*. A. Gum.

GURGULIO, idem quod *Cion*.

GUSTUS, est sensus quo ex motu nervi gustatorii linguae & palato inserti, anima sapores percipit. B. *De smiaak*. G. Der geschmack. Gall. *Le goust*. A. The sense of Tasting.

GUTTA GAMANDRA, idem quod *Gutta Gamba*, gummi est, quod antè annos quinquaginta primum cœpit ex China adferri, sed etiam ex Siamò venit. Est succus concretus sive gummi (ut mihi retulerunt) alicujus arboris excelsæ, sed cujus propriè tamen sit ignoramus : Adfertur nobis ex India orientali : Purgat *ἰσως καὶ κάτω*. Græcis & Arabibus incognitum fuit. Color est instar mali ferè auriaci, ex rubro flavescent, sed si lingua madida contrectetur, flavescit. Sæpè in cannis ad nos vehitur. Sapor ferè insipidus, qui postea acrimoniam relinquit. Vocatur & *Gutta Gamandra*, *Gummi Gotta*, *Gutta Germana*, *Gutta ganna*, vel *Gemu*, *Gummi Peruvianum* sive *de Peru*, *de Jemu*, *de Gamandra*; aliis *Succus Cambici* vel *Cambrici*. Gall. *Gomme gutte* ou *Gutte gomme*.

GUTTALIS CARTILAGO, idem quod *Arytanoides*.

GUTTA ROSACEA, est rubedo maculosa, seu potius rubor cum tuberculis, quibus malæ, nasus & facies defædatur, ac si guttis roseis conspersa esset : sumunt ista tubercula interdum incrementum, undè facies inæqualis & horrida evadit, & nasus valdè augetur. B. *Κοοζε-δρυπ/ωπν* *puiffen*. G. Wein-blattern, roth-tropf, ein roth fin- nicht und kupferigt angeficht, voller rothen bocken. Gall. *Pustule de Vin*. A. A redness of the face with pimples.

GUTTA SERENA, idem quod *Amaurosis*.

GUTTUR, idem quod *Larynx*.

GUTTURIS OS, idem quod *Hyoides Os*.

GUTTURNIFORMIS CARTILAGO, idem quod *Arytanoides*.

GYM-

GYMNASTICA seu EUECTICA MEDICINA, est pars Medicinæ, quæ tractat de conservanda sanitate, si-
ve ὑγιεινῆς, ubi agitur de exercitiis moticis, à γυμνάζω
exerceo.

GYNÆCIA, Gr. γυναικεία, in genere affectus mulie-
rum denotat, sed strictiùs apud Hippocratem sumitur pro
mulierum menstruis; item pro lochiis habentur puerperii
tempore. Dicuntur & Ἐμμηρία & Καταμήνια, si-
ve Men-
strua, à γυναικίζω feminam ago. Vide *Menstrua*.

GYNÆCOMASTUM, est mammarum nimium incre-
mentum, ex γύνη mulier, & μαστός mamma, à μασίω quæ-
ro, quia infantes lactis gratiâ mammas quærunt.

GYNÆCOMYSTAX, est Barbula pilosa in superiore
pudendi muliebris parte; ex hac quidam de temperamen-
to uteri & testiculorum iudicium ferunt, ex γύναξ femi-
na, & μύσας barba.

GYPΣUM, est lapis albi coloris, qui tritus, coctus-
que, cum aqua mistus statim concrescit in albam lapi-
deam substantiam, hinc in hæmorrhagiis validis est summi
usûs: effoditur in magna copia in Galliis, paratur tamen
ex aliis lapidibus, uti ex *Alabastro*, *spaa*, *glacie marie*
&c. B. *Plester*. Gall. *Du Plastre*.

H.

HABENA, Gr. τὴ λαμὴν, est vinculi Chirurgici spe-
cies, quo vulnerum labia contrahuntur & futuræ
vices sustinet. B. *En bind-tuig* / *tuigel-tuig*. G. *Zaum-
binde*. Gall. *Bride*. A. A Bridle.

HABITUS, idem quod *Hexis*.

HÆMALOPS, oculus est cruentus, ex casu, aut alias
excitatus, ex αἷμα sanguis, & ὤφ oculus. B. *En bloe-
dig oog*. G. *Ein blutig aug*. Gall. *L'Oeil Sanguinolent*. A.
Bloudy eye.

HÆMATITES, est lapidis quædam species obscure
rubescens: Fractus, instar ligni petrefacti fibras oblongas
habet, & in modum acium acutas. Reperitur nonnun-
quam inter ferri fodinas, rubricamque æmulatur, ex Bo-
hemia propè Uratislaviam adfertur; aliquando ex ostracite nascitur, uti propè Afcalingium, si-
ve Hildesum con-
tingit, ad ferri indolem accedit; durus est & æqualis,
absque

absque fordibus, aut venis intermediis, habetque cinnabari similem colorem, sed saturatiorem, si optimus fuerit; Loci natalis ratione, Hispanicus præstat. Pro sanguine sistendo, intus assumptus, Medicis in usu est. B. *Blodsteen*. G. Der blutstein. Gall. *Pierre sanguine*; *Pierre Hematite*, *Feret d'Espagne*. A. Blood-stone. Arab. Scedenigi.

HÆMATODES, est Geranii species, cujus radices rubicundi sunt coloris, ex αἷμα sanguis & ὄδον forma. B. *Blod-wortel* / *berg-opevaar* / *bloed-fruid*. G. Blutwurtz.

HÆMATOSIS, five SANGUIIFICATIO, est assumptorum masticatorum, in ventriculo & Intestinis concoctorum, per lactea, ductum Thoracicum vasis sanguineis infusorum in colorem rubrum, sanguineamque naturam mutatio: quæ fit motu sanguinis circulantis, & contractione ac compressione vasorum, quæ maxima in Corde & Pulmone, undè chyli partes in se invicem compressæ, ita ut sex in unam abeant, colorem rubrum induunt; ab αἱματώ sanguifico. B. *Blod-making*. G. Das blut-machen. Gall. *Sanguification*. A. Bloudmaking, Sanguification.

HÆMODERUM, est Genista tinctoria, à cute nempe tanquam cruore infecta, ex αἷμα sanguis, & δῖρα pellis.

HÆMODIA, vulgò dentium dolorificus torpor seu stupor, ea est in dentibus aut potiùs membranis, dentes investientibus, imò multis modis in cavernulis dentium interiùs inter se implexis seu nervorum per substantiam dentium disperforum ramulis, qui vellicantur, corrugantur & dolore afficiuntur. Stupor iste sæpè evenit, post acida ingesta aut vomitu ejecta, ab αἱμοδία obstupefco, ex αἷμα sanguis & ὄδον dens. Antiqui fortè sanguinem esse in causâ affirmarunt. Quidam per *Hæmodiam* omnem dentium dolorem intelligunt. B. *Boonigheid* vel *eggerigheid der tanden*. G. Herbe, oder unempfindlichkeit der zæhnen. Gall. *Agacement de dents*. A. Edgeneffè of the teeth.

HÆMOPHOBUS, est, qui sanguinis missionem timet, ex αἷμα sanguis, & φόβος timeo.

HÆMOPTOICA, sunt quæ sanguinis spuitioni medentur, ab αἷμα sanguis, & πτύον spuo.

HÆMORTYSIS, est sanguinis floridi per sputa è pulmonibus rejectio, fit hæc ruptura vasorum sanguineorum
Pul-

Pulmonalium, vel **Bronchialis arteriæ**, vel quod glandulæ Tracheæ per dilatata emissaria loco liquidi tenuioris sanguinem transmittant, ex αἷμα sanguis, & πτόω spuo. B. **Bloed-spouwen**. G. Das blut-speyen. Gall. *Crachement de sang*. A. Spitting of blood.

HÆMORRHAGIA, in genere significat omnem sanguinis effluxum, uti ex pudendo muliebri, dentibus, vulneribus, oculis &c. verum in specie de narium stillicidio sanguineo dicitur, ex αἷμα sanguis, & ῥινορροια rumpo. B. **Bloeding / neus-bloeding**. G. Nasen-bluten, blut-susfz. Gall. *Hemorrhagie*, *Perte de sang*, *Flux de sang*. A. A Flix of blood.

HÆMORRHOIS, dicitur sanguinis profluvium ex venis, quæ sunt in ano; sed non raro denotantur hoc vocabulo *Hemorrhoides Ceca*, sive tumores aut varices in ano absque sanguinis effluxu; nam si effundatur, *Hemorrhoides Apertæ* dicuntur. *Internæ*, si in ano lateant, appellantur, & *Externæ* si exterius conspiciantur: sæpè non sanguinem, sed & pus effundunt, ex αἷμα sanguis, πτω fluo, & ἰδιό forma. Illud malum. B. vocatur **Speenen / ambepen / daamen**. G. Feigwartzen. Gall. *Hemorrhoides*. A. Piles or Hemorrhoides in the Foundation. Item *Hemorrhoidis Vena*, est ramus venæ portæ ad intestinum rectum & anum porrectus, vehens sanguinem in hepatis portam. B. **Speen-ader / gulde-ader** / quia Veteres putavere ejus apertionem esse salutarem, & ex liene ejici. G. Die gold-ader, mast-korner, ruck ader, die span, der blut-susfz unter sich. Gall. *La veine Hemorrhoidale*. A. Hemorrhoides vel Piles.

HAGIOSPERMUM, dicitur semen sanctonici, idque ob vires eximias. Ex ἅγιον sanctum & σπέρμα semen.

HÆMOSTATICUM, est illud quod sanguinem sistit, ex αἷμα sanguis, & ἵσσω sisto. B. **Bloedstempsel**. G. Blut-stillende mittel. Gall. *Remede qui étanche le Sang*. A. A. blood stopping remedy.

HALICACABUM, sunt fructus alkekengi.

HALIMUS, idem quod *Halymus*.

HALO, est area rubra utrique papillæ in mammis circumfusa. *Halos* quoque dicitur. Gr. ἅλως. B. **Uring om de tepel**. Gall. *l'Areole*.

HALYPHÆOS, est arbor glandifera, sic ob corticem

cras-

crassum vocatur, ex ἄλης vel ἁλής crassus, densus, & φλοιός cortex. Alii arborem illam quasi salicorticem vocarunt, fumendo pro ἁλής illud ἁλς mare, sal, sed minùs rectè.

HALYMUS, potiùs scribendum *Halimus*, est Portulaca marina, sic dicta, quòd in æstuariis juxta maritima loca crescat; ideòque etiàm salis est saporis, & nomen sortitur ab ἁλς sal. Est & alia ejusdem nominis planta sativ. & famem extinguens, & tunc derivatur ab α priv. & λιμός fames.

HALMYCIS, est Brassicæ marinæ sylvestris species; sic à salis sapore vocatur, derivatur ab ἁλς sal, mare, unde ἁλμυρὸς salus.

ΑΨΑ, cum Medicamenti dosi unica vice propinatur.

HAMMA, idem quod *Anima*.

HAMUS & HAMULUS, Gr. Ἀγκυρεῖον, est Instrumentum Chirurgicum pro fœtu demortuo aut mola extrahenda accommodatum. Interdum & fasciæ nomen est. B. *En haak*. G. Ein angel, haken. Gall. *Crochet*, *Hameffon*, *Croc*. A. An Hooke, a crooke, a caltrope.

HAMUS, B. *Angel-band*. vide *Cuspis*.

HANDAL, HANDEL, vid. *Albandal* & *Colocynthis*.

HARMALA, est planta, quæ plures habet caules pedem altos, virides, nigricantes, ramosos arbusculam referentes: folia alterna, oblonga, incisa, crassa, carnosa, viridia, saporis viscosi & amari: flores in summitate ramorum crescentes, rosei; post florem sequitur fructus subrotundus, tricapsularis, semina inæqualia, angulosa, coloris obscuri: radix longa, digiti minimi crassitie, coloris subflavi pallidi: tota planta habet odorem penetrantem & ingratum: est nomen veniens ab arabica voce *Harmel*: sed vulgò appellatur Ruta sylvestris. B. *Wilde wyna ruit*. A. Wild Rue.

HARUNDO, idem quod *Arundo*.

HARMONIA, est in genere convenientia sive membrorum sive qualitatum, sive alicujus medicaminis mixturæ; sed in specie est ossium per simplicem lineam conjunctio, ut in ossibus nasi, & palati conspici licet, ubi exterius modò linea apparet, quamvis in ipsa conjunctioe multæ sint inæqualitates, ab ἁρμ congruo, adapto. B. *Over-eenhomst*. G. Zusammen stimmung. Gall. *Harmonie*. A. Harmonie.

HAU-

HAUSTUS, sive **POTIO**, est liquida medicamenti interni forma, in unicam dosin, ex variis ingredientibus cum idoneo liquore, decoctione, infusione, aut dissolutione, ad purgandum, alterandum, vel sudandum &c. composita. B. *Ein Drank*. G. Ein tranck, træncklein. Gall. *Breuvage*, *Potion*. A. *Potion*.

HEBENUM, idem quod *Ebenum*.

HEBISCUS, idem quod *Hibiscus*.

HECATONTAPHYLLUM, sic vocatur Rosa foliis plenissima, quasi diceret *Centumfolia*; ex εκατόν centum, & φύλλον folium.

HECTICA, est febris continua, lenta, ut vix observetur ab ægris, quæque singulis diebus exacerbatur; sed non nisi aliquot à pastu horis, ex ipso corporis, ut dicitur, habitu orta, & longo tempore introducta, quæ adeò radices egit, ut vel ægerrimè expelli possit, cui plerumque adest ulcus pulmonum, macies & tussis, ab hæc habitus, quia in habitu corporis adeo fixa est, ut omnes partes tententur & emacientur. B. *uitterende en uitdoo-gende koozts*. G. Die schwindfucht. Gall. *Fièvre éthique*. A. An hectick or pying, Consumption.

HERERA, est arbuscula, quæ habet cerros parasiticos radicanter in quocunque sustentaculum: cortex ejus est rugosus, cinereus; lignum ejus ut durum, album: folia ejus sunt magna, ampla, angulosa, dura, rigida, polita, semper virentia, splendentia, saporis adstringentis & acris: flos rosaceus, plerumque hexapetalus: ovarium in fundo floris sit bacca globosa, sæta seminibus ab una parte gibbis, ab altera planis. Gr. κισσός & ἐλξ, sic dicta quod vetustis parietibus adhæreat, vel potius quia edita petat, & altè divagetur: vel quia id, cui adhæserit, edat atque corrumpat. Athenienses Bacchum appellarunt *Citon*, quo nomine rigens hederæ, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata est *Cissos*: è diverso nunquam nisi repens humi Chamæcisus. Sic *Dionysia*, hoc est, *Bacchica*, nominata est à Baccho, qui primus ex Indis in Græciam Hederam asportavit: vel quòd in tutela ejus fuerit: nam ut ille juvenis semper, ita hæc viret. Nec secus omnia, sicut ille mentes hominum, alligat κισσός, fortè à κείω scindo, quia alias arbores scindit & perdit. B. *Ilm* / *Wiel*. G. Epheu, eppich. Gall. *Lierre*. A. Ivy, Ivie.

HE-

HEDERA TERRESTRIS, est species calamintinae, quæ habet caules parvos, semipedem circiter altos, humiles, repentes, tenues, quadratos, nodosos, interdum rubicundos: folia rotunda, dentata in margine, villosa, parum aspera, pedunculis longis adhærentia, per interval- la sibi invicem opposita: flores ex foliorum alis nascun- tur, superius labiati, coloris cærulei: flori succedunt qua- tuor semina oblonga sibi invicem conjuncta, & in capsu- la, quæ flori tanquam calyx inservit, inclusa: radix te- nuis, alba, tota planta habet odorem satis penetrantem, & saporem amarum: crescit in locis umbrosis. & **CORONA TERRÆ**, Gr. *Chamæcissus* & *ῥῆς σιδανῶ*. Sic dicta quod nunquam non repat humi, foliis Hederæ similibus. *Coro- na terra*, quod ramulos suos per terram spargens, folioso veluti ferto eandem coronare videatur. B *Gunderhave / aardbril / hondsdras*. G. Gunderman, erdepheu, er- denkrentzlein, gundelreben, gundelrab. Gall *Lierre ter- restre*, *Lierre trainant*. A. Ground-ivy.

HEDERA, vide *Eccope*.

HEDYCHROUM, est Medicamentum jucundi coloris, ab ἡδὺ jucundum & *χρῶμα* color.

HEDYOSMOS, vide *Mentha*, ex ἡδὺ suave & ὀσμὴ odor.

HEDYPNOIS, est planta Rhagadiolo similis, quia calix idem est, sed fert fructum meloni-formam, qui dissilit in duas seminum species, quæ sibi invicem sunt conjun- ctæ, semina exteriora plus sunt expansa, quam interiora. Vocatur Cichorei species: vel quod in cibo sumptum sua- viorem & jucundiorum faciat animam id est, suavem an- helitum præstet, vel, ut alii malunt, quod jucundum con- ciliet somnum, ex ἡδὺς suavis, & *πνέω* spiro, undè *πνοή* spiritus.

HEDYSARUM, est planta quæ habet caules tres pedes altos, satis crassos, repentes; folia satis referunt Glycyrrhizæ sed breviora, magis ampla, sine lanugine, nisi in margine, conjugata, in extremum impar desinentia, ter- na vel plura: flores in spicam vel capitulum congesti, ex alis foliorum erumpentes leguminosi, coloris rubicundi: flori succedit siliqua aspera, undulata, composita ex mul- tis quasi siliculis sibi mutuo ut plurimum adnatis, conti- nens setuina in singulis articulis, ut plurimum reniformia: hæc planta crescit in montibus, habetque odorem satis gratum

gratum ob suaveolentiam ita dicta, odorem enim emitit fœnugræco, Lupino ac Meliloto non dissimilem, ex ἡδὺ suave, & αἰσῶ haurio : sed alii ab Aron diducunt. A. Hon-
nev suckles.

HEDYSMA, est illud, quod suavem gratumque Medicamenti odorem conciliat, ab ἡδὺ suavis, jucundus. B. Een lieffselpke reuk. G. Ein lieblicher geruch. Gall. O-
deur agreable. A. Pleasing sent.

HEGEMONICÆ, sunt actiones principales in corpore humano, ut sunt actiones animales & vitales, ab ἡγεμονία imperium habeo.

HELCOMA, idem quod *Exulceratio*, dicitur & *Helcysma* & *Helcosis*.

HELCOs, idem quod *Ulcus*.

HELICYDRIA, sunt ulcuscula quædam parva, densa & rubra in capitis cute, apparentia papillis mamillarum similia, à quibus ichor defluit, ab ἐλκῶν ulcero.

HELCTYSTER, est uncus ferreus, qui inservit educendo fatum mortuum ex utero.

HELCTICA, ab ἔλκω traho, vide *Attrahentia*.

HELEAGNUS, putatur esse Myrtus Brabantica, *Ga-gel* dicta, an ab ἔλκω palus, & ἀγρὸς castus ? Nasceatur enim in locis paludosis.

HELENIUM, est planta, quæ habet folia, ex radice erumpentia magna, longiora & ampliora verbasci repentia, acuta, mollia, striata in margine, superius coloris viridis pallefcentis, inferius albescentia, pedunculis brevibus adhaerentia : ex his producuntur unus vel plures caules quatuor vel quinque pedes alti, recti, rubicundi, lanuginosi, intus cavi, ramos quosdam dimittentes folia sine pedunculis habentes : flores in summitate caulium & ramorum nascuntur, majori, ampli, orbiculares, radiati, flavi, parum odoriferi : embryonibus in semina papposa abeuntibus & thalamo affixis insidentes, & calice squam-moso comprehensi : radix oblonga, crassa, foris fusca, intus pallida, pinguis, saporis acris amaricantis, odoris fragrantis, hanc, patrem stomachi vocarunt, quia stomachi morbos optimè curat in debili ventriculo. Vulgò *Elenium*, *Enula Campana* & *Inula*, ex lachrymis Helenæ natum scribunt, hinc quæ in Rhodo nascitur ab Helena nomen hoc sumpsit ; nam ad eandem nascitur quercum,

ex qua se Helena strangulavit. Alii ab *Helena insula*, ubi longè optimum luxuriat. Hinc quoque descendit nomen *Enula*, & *Inula*, additur vulgò *Campana*, an ex Campania huc allata sit, credendum sortè. Hujus plantæ radix in usu est, estque celebre stomachium ob blandam amaritiam. B. *Alant-wortel* / *galant-wortel*. G. *Alant-wurtz*. Gall. *Annee*, *Enule*, *Campane*; *Herbe d'Elaume*. A. *Elecampain*.

HELIANTHE, & HELIANTHEMUM, vel **HELIANTHON, HELIANTHOS**: est planta, quæ habet caules exiguos, tenues, rotundos, villosos, repentes: folia oblonga, angusta, pedunculis brevibus adhærentia; juxta caules sibi invicem opposita, villosa, parùm latiora Hyssopi, in fine obtusa, inferiùs viridia, saporis glutinosi: flos rosaceus, ex cujus calice triphylo surgit pistillum, quod deindè abit in fructum satis magnum, ferè rotundum, qui per maturitatem in tres partes dehiscit, funditque semina subrotunda, tenuia, capillamentis seu placentæ affixis: radix lignosa, alba: hæc planta crescit in silvis & montibus, vocatur hæc planta etiam Chamæcistus illud nomen imponitur divertis floribus folis cursum aspicientibus, ex ἡλιου sol, & άνθος flos sed in genere. Gall. *Heliantheme*, *Herbe d'Or*, *Hyssope des Garignes*.

HELICE, est Salicis species ab urbe Ελίκη nomen sortè habuit.

HELIOCHRYSUM, est nomen, quo varii flores lutei vocantur, ex ἡλιου sol, & χρυσός aurum, quia flores non tantùm aurei, sed & splendentes esse debent.

HELIOSCOPIOS TITHYMALLUS, est Tithymalus solsequius, sic dictus, quòd ejus corona semper solem aspiciat, ex ἡλιου sol, & σκίπτομαι aspicio. B. *Zonne-wende* / *kroontjes-kruid* / *zonne-volgende wolfs-melk*. G. *Sonnenwendel*, *wolfs-milch*. Gall. *Reveille matin suivant le soleil*. A. *Wertgrasse*, *wertworte*.

HELIOSIS, est insolatio sive apricatio, ab ἡλιου sol.

HELIOTROPIMUM, duæ dantur hujus plantæ species, *Heliotropium majus* flore albo, est planta, quæ habet caulem pedem circiter altum, lanuginosum, albescentem, medullosum, ramosum: folia ocimi, oblonga, subrotunda, nervosa, albescencia, villosa: flos monopetalus, infundibuliformis, stellæ in modum corrugatus, & in decem

cum partes alternatim inæquales ad oram incisus, ex calice surgit pitillum, infimæ floris parti adinstar clavi infixum, & quatuor veluti stipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem semina, hinc angulata, inde gibba, quæ coloris cinericei: radix lignosa, fibrosa. Hoc nomine appellantur omnes plantæ sese soli obvertentes, ab ἡλιος sol, & γέρω verto. Gall. *Heliotrope*, *Herbe aux verruës*, *Tournefol*.

HELIX, est Hedera vel Convolvulus, sic dicitur, quia arboribus &c. circumvolvitur, ab εἰλέω circumvolvo.

HELIX, seu CAPREOLUS, est exterior auris crepido, seu Eminentiarum extima, quæ limbus est spiralis, à concha exsurgens, intortus, sensim magis complanatus, angustatus, minus intortus, auriculæ ambitum, aliquando tantum ejus partem, præcipuè versùs superiorem sedem, contorti aggeris in modum circumambiens; sic ob tortuosum flexum nuncupata, interior *Scapha* dicitur Ἑλὶξ *Ruso*, κοχλία *Poll.* at *Scapha* seu Ἀθίλιξ *Ruso*, Σκάδον *Polluci*; ab εἰλέω involvo. B. *De oor-rand*. G. Der ohr-rand. Gall. *Le bord de l'Oreille*. A. The ring, or brim of the ear.

HELLEBORINE, Planta est, quæ habet unum vel plures caules sesquipedem altos, rotundos, sine ramis, pulvisculum farinaceum habentes: folia veratri albi affinia, sed minora, sine caulibus, nervosa, saporis amari: flos est polypetalus, anomalus, sex petalis dissimilibus constans, quorum quinque in orbem posita sunt, inferius verò imbricatum: calix autem deinde abit in fructum seu utriculum tribus fenestris pervium, quibus adhærescunt valvæ feminibus sætæ minutissimis, ad instar scobis: radix fibrosa: hæc planta crescit in montibus vid. *Elleborine*. Gall. *Elleborine*.

HELLEBORUS, vide *Elleborus*.

HELLECEBRA, vide *Illecebra*.

HELMINTHAGOGA, sunt Medicamenta vermes intestinales occidentia & expellentia, ab ελμινθες vermis, & ἄγω duco. Idem quod *Helminthica*. B. *Worm-middelen*. G. Wurm-todtende-mittlen. Gall. *Mort aux Vers*. A. Worm-seed.

HELMINTHES, vide *Elminthes*.

HELMINTHICA, sunt Medicamenta vermes necantia,

tia, vide *Lumbrici*. B. *Worm-middelen*. G. Wurm-triebende mittlen. Gall. *Mort aux vers*. A. A vermisuge.

HELODES, vide *Elodes*.

HELOS, sive CLAVUS. pedis est tuberculum rotundum, album, callosum, clavorum caput referens, & pedis cuti præduræ radicibus infixum, ortum ab inæquali cutis pressione; ab ἥλωω clavum figo. Gr. ἥλω. Lat. Clavus. B. *Uph-doorn* / *erierooغن*. G. Eyerttenaug, ælfleraug, ein huener auge, liddorn. Gall. *Un cor ou cal au pied*. A. A Corn.

HELOSIS, est inversio palpebræ reflexa, & in utroque oculi musculo convulsio, ab ἑλίσσω volvo, verto. B. *Omkrulling des oog-scheels*. G. Das umkehren der auglieder. Gall. *Renversment des Paupieres*. A. Turning contrary wise of the Eylids.

HELXINE, est herba sic dicta, quod prætereuntium vestes attrahat; sic dicitur *Parietaria*, à femine aspero, ab ἑλκω traho. Vocatur quoque *Urceolus*, *Muralium* & *Muralis*, quia muris & parietibus accrescit. *Perdicium* verò, quod eâ perdices præcipuè vescantur. Vide *Parietaria*.

HELXINE CISSAMPELOS, sive CONVULVULUS, VOLUBILIS, & VITEALIS, dicitur *Cissampelos*, quod in vineis potissimum nascatur & folio Hederaceo. *Convulvulus* verò, quod crebra revolutione vicinos frutices & herbas implicet, ex χισσός hederà, & ἄμπελος vitis minor, est planta, quæ habet folia multò minora, quàm convolvuli majoris, minùs pinnata, magis tamen rugosa cum floribus ex albo purpurascens, aut etiam albis, turgentia lacte. B. *Swarte winde*. G. Schwartz winde. Gall. *Liféron*.

HEMERALOPS & HEMERALOPIA, est affectus oculorum, ubi æger de die magna luce benè videt, crescente lumine vix aliquid, oritur à nervo optico minùs sentiente, vel pupilla nimis arcta: ex ἡμέρα dies, & ἄψ oculus. B. *Op dag-ziende*. Gall. *Aveuglement de jour*.

HEMEROCALLIS, est Lilii species, sic dicta, quod die sereno bonum aspectum præbeat; noctu verò in sese quasi collabitur contrahiturque, ex ἡμέρα dies, & κάλλος pulchra, vel κάλλος pulchritudo.

HEMICERAUNIUS, Gr. ἡμικεράυνος, fasciæ nomen olim

olim fuit, dorſi & pectoris deligationi inferviens, ex ἡμί femi, & κεραυνός fulmen, fortè quia fascia fuit ſciſſa, uti & fulmen ſe ſcindit.

HEMICRANIA, eſt capitis dolor alterutram cerebri partem obſidens, ex ἡμί femis, & κρανίον calvaria. B. *Schrele hooft-zweer.* G. Hauptwehe an einer ſeiten des haupts. Gall. *Migraine.* A. The half head-ache, or Megrim.

HEMIDRACHMON, five SEMIDRACHMA, eſt pondus dimidiæ drachmæ. B. *Een half vierendce-loots.* G. Een halb quentlein. Gall. *Demi drachme.* A. Half a dram.

HEMIECTON, quaſi ſemiſextam meſuram ſignificat dimidiati ſextarii quatuor Chænicas capientem, eſtque pars duodecima Medimni Attici. Videtur quoque ſellam ſignificare pro ſuſſitu immittendo mulieri. Imò & ollam ſignificare poteſt, quatuor Chænicas capientem, cui velut ſellæ inſidere debet mulier ad capiendum ſuſſitum ductis cruribus.

HEMINA, Romana vox ex Græco quidem ἡμισυ, quòd dimidia ſextarii pars ſit, derivata, Gr. κοτόλη nominatur: capit uncias decem meſurales.

HEMIOBOLION, eſt duodecima pars drachmæ; drachma enim continet ſex obolos.

HEMIOLIUM, ſeu *Sesquiuncia*, *Sefcuncia*, Drachmarum duodecim pondus eſt.

HEMIONIUM, nomen huic non impoſitum à figura, nec à poteſtate ſimilive affectu, quam cum Hemiotide habet, ſed quòd exhibitum cum muli liene, ungula ac pelle, ſteriles reddat mulieres, uti ſunt muli, mulæque: vel nomen illud accepit, quòd muli hâc herbâ delectentur, ex ἡμί femis, & ὄνος aſinus, quia ſemi aſini fiunt.

HEMIONITIS, eſt Aſplenii ſpecies, dicta videtur, non quòd hanc muli vorent, nec quòd ſteriles reddat comedentes, ſed quòd ipſa ſterilis inſtar muli ſit, ex ἡμὸ femi, & ὄνος aſinus.

HEMIPAGIA, ex ἡμί femi & πάγι concretus, fixus, quia dolor eſt fixus, idem quod *Hemicrania*.

HEMIPLEGIA, eſt paralyſis unius lateris infra caput, proveniens ab obſtructione in alterutra medullæ ſpinalis parte, vel à plaga exterius immiſſa; undè nullus ſpirituum

animalium fluxioni aditus patefcit, ex ἡμὶ femi; & πλήσσω percutio. B. *Hamigheid aan ene zyde*. G. Der halbe ſchlag auf einer ſeiten. Gall. *Paraliſie d'un Coſté*. A. A Palſy of one ſide.

HEMIPLEXIA, ex ἡμὶ femi, & πλήσσω percutio, idem quod *Hemiplegia*.

HEMITRITÆUS, ſive FEBRIS SEMITERTIANA, eſt febris compoſita ex quotidiana & Tertianæ, altera Intermittente altera continua ex ἡμὶ femi, & τριταΐου tertius. B. *Halve anderendaagſe koortſ*.

HEMIJUNCION, denotat dimidiam uncix partem.

HEMYXESTON, idem quod *Hemina*.

HENOPHYLLUM, eſt unifolium, ex ἓν unum & φύλλον folium. B. *Gen-blad*. G. Ein blat. A. One blade. Gr. *Μονόφυλλον*.

HEPAR, JECUR, ἥπαρ *Nicand* eſt organum ſive viſcus in imo ventre, ſub diaphragmatis latere dextro ſitum, ejus craſſities & magnitudo in homine inſignis eſt; membranâ cingitur tenui, à peritonæo orta; connectitur per tria ligamenta valida. 1. Abdomini per venam umbilicalem. 2. Superiùs diaphragmati, per ligamentum latum membranofum & tenue, à parte dextra. 3. Superiùs etiam diaphragmati à ſiniſtra per ligamentum teres & validiſſimum; dividitur in partem ſimam, cui veſicula fellis, & ductus hepaticus adhæreſcit. Color ejus rubicundus eſt. Hepatis ſubſtantia ex plurimis membranis & acinis ſive glandulis conſtat. Quod ex frequentibus lotionibus compertum habeo. In eo ſanguis ex cunctis viſceribus abdominalibus aſſertur, qui in ſinu magno antequam Vena portarum fuit quinqueſariam diviſa, miſcetur, colligiturque, ex quo per totum hepar translato partes bilioſæ ab acinis glanduloſis ſegregantur, & per ductum hepaticum, & veſiculam felleam ad inteſtinum duodenum amandantur. In homine lobi nulli ſunt; aſt in brutis plures in partes dividitur, quos lobos, pinnas, Jecinoris fibras & ἑρμεις vocant, ab ἡπείω operor: credebant enim Antiqui in eo ſanguinem elaborari & confici, cum tamen ſanguis recrementa bilioſa ibi ſeparantur; undè ἡ αἷμα ſanguis, aut ver, quia viſcus temperamentum eſt, quidam ab ἡπανά inopia, alii ab ἡπτιον benignè, mitè. B. *Leber*. G. Die leber. Gall. *Le Foye*. A. The liver.

HE-

HEPAR UTERINUM, idem quod *Placenta Uteri*.

HEPATICA; medicamenta sunt, quæ olim specificè contra hepatis morbos applicabantur. Sed quia specifica talia non dantur, illa vox apud veriores Medicos planè evanuit. B. *Smiddelen tegens de lever-ziekten*. G. *Mitlen gegen die leber-sucht*. Gall. *Remedes Hepatiques*. A. *Remedie against the disease of the liver*.

HEPATICA, eo nomine & insigniuntur variæ plantæ, quibus medici Hepatis malis medentur. B. *Leber-kruid*. G. *Leber-kraut*. Gall. *Hepatique*. A. *Liver-wort*.

HEPATICA VENA, idem quod *Basilica*.

HEPATICUS FLUXUS, malè ita nominatus, quia Hepar non est in causa, sed vasa ad intestina excurrentia, aperta, & sanguinem fundentia. Vide *Fluxus Hepaticus*. B. *Leber-bleed*. G. *Leber-flusz*. Gall. *Flux Hepatique*. A. *The fluxe of the liver*.

HEPATITIS, est Inflammatio in Hepate, sedem suam habens vel in sinibus venæ Portarum, vel arteriæ hepaticæ; orta à quibuscunque causis sanguinem incrassantibus, & moventibus, vel vasa hæc comprimentibus; plerumque Icterus secum comitem habens, ut & dolorem, & tumorem in hypochondrio dextro cum febre continua &c. B. *Een ontsteking in de lever*. Gall. *Inflammation du foye*.

HEPATORIUM, idem quod *Eupatorium*.

HEPIALA, idem quod *Epiala*.

HEPTAPHYLLUM, seu septifolium, estque *Tormentilla*, sic vocatur, quod ferè semper septem folia ubique caulem ambiunt, ab ἑπτα septem, & φύλλον folium. B. *Zeibenblad*. G. *Birck-wurtz*. Gall. *Tormetille*. A. *Tormentil*.

HEPTAPSEURON, est *Plantago major*, septenis costis gaudens, ex ἑπτα septem, & πλυστρον costa. Vide *Plantago*.

HERALEA, illud nomen diversis inditur herbis; ab Hercule procul dubio accepit, sed qua de causa nescio.

HERACLEOTICUM, nempè *Origanum*, dictum ab *Heraclea Ponti*.

HERACLEUS MORBUS, idem quod *Epilepsia*.

HERBA, est planta frutice minor, cujus caulis singulis annis perit, novo deindè renascente, vel à radice foliato,

liato, vel nudo, floribus & semine donato. In praxi tamē, pro foliis solis ut plurimum usurpatur. Gr. βοτάνη, & νόα. B. *kruid*. G. Ein kraut. Gall. *Herbe*. A. Idem.

HERBA BENEDICTA, vide *Caryophyllata*.

HERBA SACRA, vide *Peristeron*.

HERBA STELLÆ, vide *Coronopus*.

HERCULEUS MORBUS, idem quod *Epilepsia*.

HEREDITARII MORBI, dicuntur quos & parentes habuerunt, & cum genitura jam filios invaserunt, ut sunt *Podagra*, *Phthisis*, *Nephritis*, &c. B. *Erf-ziekten*. G. Erb-krankheit, angebohrne gebrechlichkeit. Gall. *Maladie Hereditaire*. A. An Hereditarie Sickneſſe.

HERMAPHRODITUS, est homo utriusque sexûs, id est, vir & femina simul. Verum muliebribus instrumentis duntaxat utuntur, rarissimè viri sunt; conformatio istæc & abusus inde contingit, quod plus iusto clitoris propendeat, ex Ἑρμῆς *Mercurius*, sic dictus ab interpretando, & Ἀφροδίτῃ *Venus*. B. *Gen Man-Vrouw*. G. Mann und Weib zugleich. Gall. *Hermaphrodite*. A. Idem.

HERMETICA MEDICINA, quam *Ægyptii* falsò à *Mercurio*. Deducunt. Hæc morborum causas ad sal, Sulphur & Mercurium refert, & generosissima remedia, non modò ex vegetabilibus & animalibus, verum etiam ex mineralibus præparat. B. *Hermetische Medicyn*. G. Hermetische artzney. Gall. *Medecine Hermetique*. A. Medicine of Hermes.

HERMETICE SIGILLARE, scribitur sæpè duabus literis H. & S. est quando vitra ita ferruminantur, ut ne gry quidem possit exhalare, & sit sive vitri ipsius colliquatione, sive alterius indolis luto.

HERMODACTYLUS, est planta, quæ habet folia triquetra vel quadrangula: radix bulbosa vel tuberosa ex appositis tuberculis composita, est rotunda, avellanæ magnitudine, compressa, externè coloris rubicundi, internè valdè albi, substantia levis, fungosa, non fibrosa, valdè fragilis, hinc facilè in pulverem farinaceum reducit, dum recens, est saporis acerrimi, dum annosa subdulcis farinacei, paululùm viscosi, vel lenti, odoris nullius cujus sit plantæ radix, non audeo dicere, dicunt esse colchici speciem, quod vix credibile est, cum omnes ejusmodi bulbi ad interius usque corculum tunicas habent,

bent, quæ in Hermodactylis non reperiuntur : neque Iridis tuberosæ folio anguloso, flos enim Hermodactyli omnino ab ea differt, & refert volitantem vespertilionem, undè horticulis dicitur vespertilio. B. *Wiermuyt*. Solidiorem esse radicem crediderim, uti est aristolochia rotunda, quæ etiam tota in farinam faciliè tunditur, uti & Hermodactyli, figuram repræsentat corculi, intus alba est, adfertur ad nos ex Syria; saporem habet insipidum, & leniter purgat, undè nomen habeat nescio, nisi ab *ἡμεῖς* *Mercurius*, & *δάκτυλος* *Dactylus*, palmæ fructus vel potius Mercurii digitus, quia radix phalanges digitorum quodammodo refert. B. *Hermodactylis*. Gall. *Hermodacte*. A. Wild Saffron.

HERNIA RAMEX, G. *κῆλη*, propriè est intestinorum, omenti &c. in inguina, & scrotum prolapsus, ob peritonæi lamellam interiorem relaxatam, utpotè quæ ad processus vaginalis ortum in abdomine simplex, qualis annulum pro vasorum spermaticorum exitu tegit, faciliùs vi externæ cedit, undè hanc lamellam Intestina vi illata impellunt per annulum in tunicam vaginalem, sicquæ ea hærent in proprio sacco, & tumorem, ubicunque hæserint, excitant. Item quando umbilicus protuberat. Impropriè dicitur uteri prolapsus; *Bronchocele*; *Varices vasorum spermaticorum*, item distensiones à flatibus, humoribus aquosis, vel tumoribus &c. B. *Gen bruch / gescheurtheid*. G. Ein bruch, zerreißung. Gall. *Hernie*, *Rupture*, *Hargne*, *Romppeure*, *Descente*. A. A Chaf, a cleft, à bursting.

HERNIA GUTTALIS, idem quod *Bronchocele*.

HERNIA SCROTALIS, est, quando usque in scrotum Intestina deciderunt.

HERNIA VENERIS, idem quod *Testiculi Venerei*, est quando Testes, inflammatorio tumore ad vesiculas seminales orto, admodum dolent, & tument à materia seminali intus contenta nec effluere potente. B. *Venus-kloot / sand-kloot*. Vid. Testiculus.

HERNIA UTERI, raro est, & maxima ex parte tunice internæ vaginæ relaxatio & prolapsus. Vide in *Procidencia Uteri*. B. *Ipsmoeders-bruch*. G. Mutter bruch. Gall. *Hernie de la matrice*. A. A Falling of the womb.

HERNIARIA, est planta exigua, humilis, quæ habet

bet plures caules vel ramos nodosos, qui repent & circulariter se ubique extendunt per terram, sibi mutuo adhærentes & intermiscentes : folia sunt exigua, serpillum referentia, coloris viridis subflavescentis, saporis acris : flos apetalus, quinque staminibus vel pluribus instructus, ex calice multifido, quadrifido plerumque vel quinquifido, stellatim expanso, surgentibus : fructus in floris fundo ortus fit capsula rotunda, membranacea, striata, divisa in octo loculamenta, in singulis horum semen unum parvum, acuminatum, ovatum; radix fibrosa, parva : hæc planta crescit in locis arenosis. Herba Turca & Polygonum Minus, sic appellatur, quod dicitur herniis eâ mederi. B. *Quizent-koozn* / *duizent-grein*. G. Harn kraut, bruch-kraut, tausend-korher. Gall. *Turquette*, *Herniole*, *Boutonet*, *Renovée*, *Cornigiole*. A. Rupture wort, Buritwort, knotgrass.

HERPES, sive inflammatio serpiginosa, *Zona* Scribonio, *Serpens* Lucretio, Ἑρπης Dioscoridi, & Ἑρπιδὼν Nicandro, Ζωσθε Plinio, Ἑρπυσικὸν ἔλκος Polluci : quæ duplex est, *Miliaris* seu *Pustularis*. Gr. Κηχορία. Celsō *Ignis Sacer* Avicennæ *Formica Corrosiva*. B. *Hair-worm*. Quæ cum prurigne, cutim solummodo occupat. G. Zittermahl, die böse spitzige räude, haarwurm. Gall. *Galle*, *Gratelle*, seu *volage*, les *dartes*. A. A Ringworm, A. Hair-worm, Altera, *Exedens*, sive Ἑρπης ἐσθιδίμων, quæ non tantum cutim, sed & musculos subjectos obsidet. Causa est, quando glandulæ cutaneæ nimis ubertim particulis falsis suffunduntur, quæ ab aliis viscidis continentur ne effluant, pruritus & ulcuscula miliaria excitant, quæ aliquando, si materia peccans abundaverit, crustam excitant & subjectas partes exedunt, ab ἔρπω serpo, quia continuo serpit. B. *Dauworm* / *de wolf*. G. Der fressende wurm. Gall. *Gratelles Rongeante*. A. Deweworm.

HESPERIS, est Leucoii species quæ habet caules duos circiter pedes altos, rotundos, villosos, medullâ repletos : folia alternatim juxta caules disposita, erucam referentia, sed minus incisa, in margine dentata, acuta, villosa, coloris viridis nigricantis, saporis aliquantulum acris : flores quadrifidi, cruciformes, coloris aliquando albi, aliquando purpurei, vel varii, odoris suavis & grati : post florem sequitur siliqua oblonga, tenuis, cylindrica,

drica, angulosa, teres, bivalvis, cui plures inhaerent fo-
veolæ, in quibus reconduntur utrimque semina plerum-
que rotunda, vel cylindrica, rubicunda, acria: radix par-
va, alba, lignosa: hæc planta crescit in hortis. Sic dici-
tur quod vespertino tempore & noctu melius oleat quam
interdiu, ab ἑσπερον vesper. B. *Bloem van Camast.*
Gall. *Juliane, ou Juliene.* A. Dame Violets.

HETEROCRANIA, sive HEMICRANIA, est dolor
alterutram capitis partem obsidens, ab ἑτερον alterum, &
κρανιον calva. B. *Hoofst-ppn die een van beide zyde des*
hoofsts bezet. G. Hauptwehe an einer seiten des haupts.
Gall. *Migraine.* A. The halfe head-ache.

HETEROGENEUM, seu ANOMEOMERES, est
quando improporcionatum quid sanguini & spiritibus, ut
in febribus, vertigine, motibus convulsivis, & apoplexia,
accrescit, ex ἑτερον alterum, & γένος sexus, genus. B.
Merdaantig / verdaantig. G. Ungleich, manchfal-
tig. Gall. *Heterogene.* A. Idem.

HETERORHYTHMUS, est ætas alia, quam anni fe-
runt: Ex Gr. si juvenis senilem, & senex juvenilem æta-
tem degunt: Illa differentia etiam de pulsibus dicitur,
cum in morbis diversus modulus pulsandi tenetur, ab ἑτε-
ρον alter, & ῥυθμος modulus.

HEXAGIUM, pendet quatuor scrupulos, Latinis *Sex-*
tula est, alii drachmam unam cum dimidia esse dicunt.

HEXIS, est habitus seu habitudo corporis, ab ἔχω ha-
beo. B. *Gesteltheit des lighaams.* G. Die gestalt des
leibes. Gall. *Disposition du Corps.* A. An Habitude of body.

HIBISCUS, vide *Ibiscus*.

HIDROA, SUDAMINA, PAPULÆ SUDORALES
& SUDOSÆ, sunt quædam tubercula lata & humida,
pruriginosa granis milii similia, interdum sine pruritu, quæ
cutim ἐλαδως exasperant, fiunt hæc, quando sudor ob cu-
tis densitatem erumpere impeditur, adeo ut materiâ ibi
retentâ, & tenuiori parte puris per vasa lymphatica reve-
ctâ vel evaporatâ, cutis in tumorem elevetur. Affectus hic
familiaris est pueris & juvenibus, præsertim temperamen-
to calidioribus, qui æstatis tempore nimis moventur &
exercentur, in collo, scapulis, pectore, brachiis & femo-
ribus, frequentius tamen circa pudenda & anum acci-
dens. Arab. *Asef & Albafef.* Lat. *Sudamina.* Gr. ἐκζέματα,
ab

ab ἰδῶς aqua, vel ἰδρῶς fudo. B. *Sweet-puisjes*. G. *Schweisz blätter*, hitz blätterlein. Gall. *Vessie de sueur*. A. *Sweating pushe*.

HIDROCRITICA, sunt judicia, quæ à sudore desumuntur, ab ἰδρῶς sudor, & κριῶ judico. B. *Ordeel uit sweeten*. G. *Urtheilen aufz das schwitzen*. Gall. *Jugement qu'on forme de la maladie en consequence de la sueur*. A. *A judgment taken from sweating*.

HIDRONOSUS, est febris, in qua plurimis sudor prodit; quæ ab *Anglis Sudor Anglicus* nominatur, ex ἰδρῶς sudor, & νόσος morbus. Idem quod *Hydopyretos* vel *Sudor Anglicus*. B. *Sweet-koofts*. G. *Schweisz-fieber*. Gall. *Fievre suante*. A. *The Sweating Fever*.

HIDROPYRETOS, idem quod *Sudor Anglicus*, ex ἰδρῶς sudor, & πυρετός febris.

HIDROS, idem quod *Sudor*, ab ἰδρῶς fudo.

HIDROTICA seu SUDORIFERA, sunt, medicamenta, quæ sanguinem humoresque omnes validius per totum corpus movent, eos incidunt, & attenuant; simulque imminuunt resistantiam in vasis exhalantibus circumcutim, atque ita ipsa partim in sudorem erumpunt & partim in halitum convertunt liquida circulantia, & quæcumque obvia sunt secum deferunt, & in ambitum corporis propellunt, ubi illa in sensibilem sudoris liquorem collecta erumpunt, ab ἰδρῶς sudor. B. *Sweet-middelen*. G. *Schweisz treibende mittlen*. Gall. *Remede Sudorifique, ou diaphoretique*. A. *A Remedic producing sweat*.

HIERABOTANE, vide *Perisferon*.

HIERACIUM, est planta, quæ habet plures caules sesquipedem vel duos pedes altos, fortes, angulosos, coloris viridis fusci, cavos, in plures ramos divisos, & foliolis quibusdam instructos: folia inprimis ex radice erumpunt, repentia, longa instar Taraxici, in fine obtusa, incisa, viridia, supernè tenera, villosa, infernè densiore lanugini canescentia, maculis pulchris interdum notata, sapore amaro & nitroso: flores sunt semiflosculosi, plurimis scilicet semiflosculis constantes, Embryoni insidentibus, & calice majore, ampliore, & squammosiore quam in *Lactuca comprehensis*, calix per maturitatem non in conum, ut in *soncho* crescit, sed explicatur. Embryo autem abit deinde in semen teneriusculum, non fuscum, pap-

pappis instructum, in capitulum collectum : radix longa, crassa, carnosa, simplex, alba, succum lacteum amarum gerens, nomen accepit ab accipitre. Gr. *ισσαζή* quia creditur illam hujus succo oculos restituere, scalpendo enim illud, succoque oculos tingeno, obscuritatem cum sentire, discutunt, *Sonchites* etiam appellatur, quod soncho non admodum dissimilis sit, maximè quod ad ejus circumferentiam & extremam partem, in qua caules & flores sunt, attinet. Propter lacteum succum, *Lactuca sylvatica* vocatur, appellatur etiam *Accipitrina*. B. *Wabli-kruud*. G. Habicht-kraut. Gall. *Cichoree Faulne berbe de l'Eprevier*. A. Hawke wede.

HIERA PICRA, est Electuarium ex aloë, ligno, aloës, radicibus azari, spica indica, croco, mastiche & melle paratum, ex *ισγή* sancta, propter vires laudabiles, & *πικρά* amara. B. *heilig bitter*. G. Heilig bitter. A. The holy bitter.

HIEROGLIPHICÆ notæ, sunt plicæ rugæque in manibus, ex quibus vana curiositas multum prædicere conatur, ex *ισγή* sanctum, & *γλόφα* sculpo. B. *Hand-kyph-konst*. G. Wahrsagen auf den hænden. Gall. *Chiromantie*. A. Chiromancy.

HIPPOCAMPUS, non tantum pisciculus marinus est, sed & processus ventriculorum cerebri superiorum sive anteriorum, ex *ἵππος* equus, & *καμπύ* inflecto, quia illud animalculum inflexum est.

HIPPOCRATICA FACIES, *Facies Hippocratica*.

HIPPOCRATIS MANICA, vide *Manica Hippocratis*.

HIPPOGLOSSUM, vide *Hypoglossum*.

HIPPOLAPATHUM, est Rhabarbarum monachorum seu lapathum magnum, ita ob magnitudinem appellatum videtur, ex *ἵππος* equus & *Lapathum*. B. *Groote of waterpatig*. G. Wengel-wurtz, streis-wurtz, rot-ritter. Gall. *Rhabarbe des Moines, Rapontie des montagnes*. A. Patience, vel Monks-Rubarb.

HIPPOHAES, sive Rhammus catharticus oleæ folio; vox *ἀπὸ τοῦ ἵππου*, quod vis ejus purgatrix tam valida sit, ut ipsis equis alvum subducatur. B. *Purgier-doozn*. Gall. *Nerprum, ou Bourg-Epine*. A. Purging-Thorn.

HIPPOSELINUM, *Olus atrum* vocatur : sic à magnitudine dictum, ab *ἵππος* equus, & *selinum* : siquidem
Græci

Græci magnis & amplis rebus *Hippo.* præponere solent, adeò ut *Hipposelinum* Latinis nihil niu grande Apium sit. *Olus* autem *Atrum* vel pullum à foliis, vel seminibus, quæ atro colore nitent, appellatum esse videtur. B. *Grote cype* / *peterseli van Alexandrien.* G. Grosz epfich. Gall. *Maceron.* A. The Herb. Alexanders.

HIPPURIS, Lat. Equisetum seu cauda equina, eamque referens: ex *ἵππος* equus, & *ἔρᾱ* cauda, dicitur etiam *Salix* seu *Herba equinalis*, ut & *Asprella*. B. *Paardestaart.* G. Schafft hew, rosz-schwantz, schaffthau, ratzen wadel. Gall. *Queue de Cheval*, *Queue de Chat*, *Aprèlle.* A. Horsetail.

HIPPUS, est oculorum affectus in quo oculi tremuli continuò agitantur & subindè nictitant, ut in equitatione fit, ab *ἵππος* equus. B. *Bebende oog.* G. Bebende augen. Gall. *Maladie des yeux*, *par laquelle ils se meuvent continuellement de côté & d'autre*, & *ne peuvent demeurer dans une même situation; instabilité des yeux.* A. Quaking or trembling of the eyes.

HIRCI BARBA, Gr. *Τετραποῶγων*, planta nomen sibi adscivit, quòd è calicis summo, floribus evanescentibus, papposa prodeat cæsaries, seu comosa lanugo, cui cum hirci barba nonnulla similitudo. B. *Bor-vaard*, *Go-sepijs-bloemen* / *Morgenstar.* G. Bocks-bart. Gall. *Barbe de Bouc.* A. Goars Beard.

HIRCULUS, est Nardi species, sicque dicitur, quòd Hircum redoleat.

HIRCUS, **HIRCI** vel **HIRQUI**, oculorum anguli. *κανθός*, eorum qui ad nasum sunt, *ῥαντήρες* & *πηγαι* dicuntur, quod indè lachrymæ manant: atqui ad tempora, *πρωπια* Poll. Nicandr. B. *Oog-winkels*, *oog-hoekjes.* Vide *Canthus*. G. Die augen-winckel. Gall. *Les Angles de l'Oeil.* A. The Corner of the eye. *Alæ* etiam sub axillis *Hirci* appellantur. B. *Oet orel hair.* G. Das achsel-haar. Gall. *Le poil dessous l'aisselle.* A. The wing hairs. Item Auris eminentia. Vide *Tragus*.

HIRQUUS, idem quod *Canthus*.

HIRUDO, sive **SANGUISUGA**, insectum est palustre, apodum, oblongum, quod exugendo sanguini cæcarum hæmorroidum nonnunquam à quibusdam applicatur. B. *Bloed-zuiger.* Gr. *βδέλλα.* G. Ein blutigel. Gall. *Une Sangsue.* A. A Bloud Sucker.

Hi-

HIRUNDINARIA, est *Asclepias* seu *Vincetoxicum*, sic vocant à fructu, seu potius à filiquis quas producit, quæ dehiscences plumosum ostendunt semen, atque hirundinis figuram referunt. B. *Swaluwe wortel*. G. Schwalben wurtzel. Gall. *Domte-venin*. A. Swallow-wort.

HIRUNDINARIA, vide *Centum morbia*.

HIRUNDO, piscem & avem quidem denotat, sed apud Medicos est cavum illud in flexura brachii, sunt & qui volunt pudendum muliebrem ita vocari.

HISPANICUM OLUS, est *Spinachia*, fortasse quoddam ex Hispania primum duxerit originem, & deinde ad cæteras tandem nationes translata sit. B. *Spinagie*. G. Spinat. Gall. *Espinars*. A. Spynach.

HISPIDULA, est planta officinalis, pilosellæ species. B. *Katzel-boet*. G. Ratzen-fulz. Gall. *Pied de chat*. A. Cats-foot, a kind of small mous-ear.

HISTOS, Gr. ἵσος, est instrumentum chirurgicum ligneum, in cuius summo aliud lignum transversum imponitur, ex quo trochlea dependet, ad scalæ demissionem.

HOLCE, Gr. ὀλκῆ, idem quod *Drachma*.

HOLIPPÆ, sunt placentulæ ex infusione Medicamentali farinaque triticea, addito insuper saccharo, subactæ.

HOLOSTEUM, seu **HOLOSTIUM**, est herba sic per antiphrafin dicta, quali minimè ossæ, sed potius tenera & mollis, ac omni prorsus duritie carens, ex ὅλον totum & ὅστων os. B. *Spaansche weegbree*. A. Spanisch Plantain.

HOMÆOMERES, vide *Similares Partes*, ex ὁμοίων simile, & μέρος pars.

HOMOGENÆ PARTICULÆ, sunt, quæ puræ, integræ & immixtæ, sibi quæ per omnia similes sunt, ex ὁμοῖο simile, & μέρος genus. B. *Sendaanige deeltjes*. G. Gleiche, gleichförmige theile. Gall. *Homogene*. A. Idem.

HOMOPLATA, *Scapula*, *Spatula*, *Scoptula aperta* Celso. Gr. πλάται ὁμοπλάται, ἑποιώτιοι, sive os, quoddam humeri latitudinem constituat, triangulare, latum, & tenue præsertim in medio, sed in processibus crassum, utrimque unum, incumbens superioribus costis parte posticâ instar scuti, processus sunt tres *Acromium*, sive humeri mucro; *Coracoides*, sive *Anchoralis*, & αὐχὴ sive *Cervix*. Usus ad costarum robur, ad humeri & claviculæ articu-

cu-

culationem, & ad musculorum implantationem, ab ὤμος humerus, & πλάτος latus. B. Het schouderblat. G. Das schulterblat. Gall. *l'Os de l'Epaule*. A. The Shoulderblade.

HOMOTONOS, est morbus eundem ordinem servans, vel est febris continua, æquali dramate suos actus, scenasque peragens, ex ὁμὸν æquale, & τείνω teneo.

HOPLOCHRISMA, est amorum, ut gladii, cultri, pugionis, &c. deligatio, quâ creditur vulnera consolidari, quod tamen ridiculum, ex ὥπλα arma, & χεῖρα ungo. B. Wapen-verbinding.

HOPLOMOCHLION, est nomen instrumenti Chirurgici universalis, toti corpori humano adaptandi & applicandi.

HORA, est Hippocrati determinatum anni tempus, quod libet ex Aph. I. sect. 3. αἱ μεταβολαὶ τοῦ ὁρέων μάλιστα τίττυσι νοσήματα, καὶ ἐν τῇσιν ὁρῇσιν: Id est, mutationes temporum pariunt morbos ipsis anni temporibus &c. unde ὥρῃ annus, & ὥραιῃ tempestivus.

HORÆA, & ὄπωρα, sunt fructus tempestivi, seu æstivi, molles, & pulposi, ut poma, pyra, pruna &c. ab ὥρα tempus. B. Obstbructen / Obst. G. Allerley Obst. Gall. *Fruits d'Eté*. A. Summer fruits.

HORARII FRUCTUS, idem quod *Horæa*.

HORDEATUM, est Medicamentum liquidum internum, ex hordeo ad crepaturam cocto & tuso liquoribus convenientibus affusis & colatis, præparatum, quibus amygdalæ, sem. papaveris albi, sem. quatuor frig. maj. &c. non rarò accedunt. B. Een gerste melk. G. Gersten milch, gersten-wasser. Gall. *Orgeade*, *Lait d'Orge*. A. Barley milke.

HORDEOLUM seu CRITHE, vel HORDEUM, est tuberculum in summo palpebrarum, magnitudine hordei enascens, cujus altera species grando, tuberculum durum, mobile, pellucidum & rotundum, quæ verò tubercula majora hic eveniunt, ad Nodos, Melicerides, Steatomata & Cancros referuntur, omnes id habent, quod pondere suo, aliisque modis motui palpebrarum remoram injiciunt. Gr. κριθή, & ποσθία. B. Een frontjen / scheetjen op 't oog / een styge. G. Gersten gleicher, schwulst an den augen-gliedern, werren. Gall. *l'Orgeolet ou Orgueil*. A. A swelling in the eye browslike a Barley corn.

HOR-

HORDEUM, seu **ORDEUM**, est frumenti species quæ habet caulem secali minorem : folia latiora, spica crassior, calix, glumæ, Aristæ, flos, ut in tritico & secali; Aristæ verò asperæ : semen tumidius utriusque apice acutior, glumæ tam arctè adhærenti unitum, ut non nisi tritu-rando separetur. Gr. κριθή, dicitur ab horrore, quòd ejus Aristæ mordacior sit quàm tritici, vel ab oriendi celeritate, quod antè cætera frumenta pullulet, vel ab antiquo adjectivo, *Hordus*, quod significabat *Gravidum*. Vide *Cri-the*. B. *Gerst*. G. Gersten. Gall. *Orge*. A. Barly, Barley.

HORMINUM, seu **ORMINUM**, est planta salivam referens : Caules pedem circiter alti, rubicundi, quadrati, lanuginosi, ramosi : folia salviæ, sed minus sicca, nitidiora, valdè lanuginosa, sibi invicem opposita, non valdè odora, saporis amari, in summitate ramorum sunt multa folia conjuncta coloris violæ, flos monopetalus labiatus, cujus labium superius parvum & galeatum falcatum est, inferius verò in tres partes divisum, media cochlearis instar excavata : ex calice surgit pistillum floris parti posteriori instar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui abeunt in totidem semina, in capsula, quæ floris calix fuit, recondita : radix fibrosa, lignosa ; est Sclæræ species, & omnes hujus species horminum vocaverunt, verùm quibus galea falcata est, hæ sclæræ dicuntur, horminum verò habet Galeam brevior, & magis apertam. Dicitur ἀπὸ τοῦ ὀρμᾶν, quòd impetu cæco agat, & ciet in Venerem. Gall. *Orvalle*. Vide *Sclærea*.

HORRIFICA FEBRIS, vide *Pbricodes*.

HORROR, Gr. Φρίκη & Φρίξις à Φρίσσω, est levis convulsionis species, in exterioribus corporis partibus contingens, minor quàm *Tremor*, dum quasi corpus frigore invadit, & subindè tantùm observatur, sed Tremor aliquo successivo tempore adest : symptoma in febrium initio plerumque ; item cum aëre frigido afficimur ; vel adsumus rei horrendæ enarrationi. B. *En koude pzing*. G. Zittern oder schauten. Gall. *Frisson*. A. Dread, Terroure.

HUMECTANTIA, sunt medicamina, quæ particulas suas humidas corporis nostri poris possunt insinuare. Item sunt omnia fluida. Gr. ὑγραίνοντα vel ὑγραντικά. B. *Bere vogtigende middelen*. G. Anfeuchtende mittlen. Gall. *Remedes humectans*.

HUMERUS, illa pars corporis est, quæ apparet in ea articulatione, quâ superior humeri pars, quæ *Epomis & Superhumeralis* dicitur, ad collum vergit, & à posteriori parte ossi scapulæ; ab inferiori autem ei ossi, quod, dum totum brachium attollitur, manifestum fit & *Ala* nuncupatur. Alias *Humerus* quoque dicitur de parte prima brachii, quæ unico ossè constat, quæ aliis *Brachium* per excellentiam appellatur, illius *os* appellatur *os Humeri*, *os Brachii*, & *os Adjutorium*. Gr. ὤμῳ. B. *Schouder*. G. *Schulter*. Gall. *l'Épaule*. A. *Shoulder*.

HUMIDUM PRIMOGENEUM, est liquidum ex quo omnia in generatione fiunt, & rectè dicitur succus nervosus, qui prius ante omnia in generatione conspicitur. B. *Het eerste vogt*. G. *Die erste feuchtigkeit*. Gall. *l'Humide ou l'humeur radicale*. A. *The first liquor*.

HUMILIS MUSCULUS, est is, qui oculum deprimat, sic dictus, quia oculum deorsum versus malas trahit. B. *De nederige spier*. G. *Der niederdruckende augen mauß*. Gall. *Le Muscle Humble*, *Abaisseur*. A. *The pressing muscle*.

HUMILUS, idem quod *Lupulus*.

HUMORES SANGUINEI, à Veteribus in *Sanguine* constituuntur quatuor nempe *Biliosus*, *Pituitosus*, *Melancholicus & Sanguineus* propriè dictus, idque secundum quatuor Elementa Peripatetica; verum illa opinio, inventâ circulatione sanguinis, prorsus concidit. Tamen vitio ipsius sanguinis à crasi desciscantis, inveniuntur, sed sanguinis partem integram non constituunt: Sanguis enim est humor unicus; secus si esset, tartarus in vino, & sæx in cerevisia, forent partes vinum & cerevisiam constituentes. In sanguine venis emissio tres duntaxat diversæ corporum species ad oculum comparent; in superficie enim sanguinis coagulati crustam fibrosam, se per totam massam diffundentem, videbis; deinde, particulas quasdam rubras inter fibras conspicias, quæ circa fundum propter fibrarum paucitatem nigrescunt, ultimo massa hæc in fero suo expresso natat. Verum si quis accuratius procedere velit, sanguinem destillet & arte Chymicâ dissolvat, quinque corpora tantum pura inveniet: Spiritum nempe, Sulphur sive Oleum, Aquam, Salem & Terram. Sanguis & Chylus omnia totius corporis vasa majora perluunt, & exin-

exindè pro varia partium constitutione, speciales oriuntur succi; uti ex cerebro, Succus Cerebralis seu Nervosus: ex Hepate, Fel; ex renibus, Urina; ex mammis, Lac. &c. B. **Humeyren / bogten.** G. Die feuchten. Gall. *Humeurs.* A. The Humours.

HUMORES OCULARES, sunt tres. 1. *Aqueus*, qui antè intra corneam & uveam tunicam continetur. B. **Waterig oog-bogt.** G. Die wässrige feuchtigkeit. Gall. *Humeur Aqueuse.* A. The Watery humour. 2. *Crystallinus*, sive *Glacialis* humor, is in tunica uvea in medio, concluditur & cæteros soliditate superat. B. **Urpstalline bogt.** G. Die crystalline feuchtigkeit. Gall. *Humeur crystalline, ou le Crystallin.* A. Crystalline, vel, Ice Humour. 3. *Vitreus*, reliquis duobus copiosior, posteriorem oculi cavitatem occupat. B. **Glasagtig bogt d'oogen-bogten.** G. Die glæserne feuchtigkeit, augen feuchte. Gall. *L'Humeur vitrée, en general, les Humeurs de l'Oeil.* A. Glassy Humour, The Humours of the eye.

HUMOR IN SECUNDINIS, est succus nutritius, qui ex uteri vasculis undique per Chorion & Amnion penetrat usque in cavum amnii, estque fœtui alimentum per os diglutiendum; verùm reperitur & tertia membrana *Alantois* dicta, quæ per urachum fœtus pervium urinam in suo cavo recipit, à sola vesica fœtus non capiendam. B. **'t Water in de nageboorte.** G. Das wasser in der nachgeburt. Gall. *L'Eau ou l'humeur sereuse, qu'on trouve dans l'arriere faix.* A. Water in The secundine.

HYACINTHUS, duplex est, Orientalis radice bulbosa, Indicus radice tuberosa: prior habet caulem semipedem circiter altum, rotundum, politum, erectum, nudum, in spica florigerum Caryophylli aromatici figura, folia longa, angusta, viridia, splendentia, porri minora: flos est liliaceus, monopetalus, nudus, tubulatus, in sex segmenta, extrorsum flexa, divisus, caryophylli aromatici figura, arcuè complectens ovarium, coloris plerumque cærulei, aliquando albi, aliquando purpurei vel carnosii, odoris grati: flori succedit fructus subrotundus, fere trigonus, divisus in tria loculamenta, semina subrotunda, vel plana & nigra continentia: radix bulbosa, alba, tota planta habet succum viscosum, crescit in pratis juxta vias, cognoscitur ex radice bulbosa, quæ unica modo excipi-

cipitur, quæ dicitur Hyacinthus tuberosa, Gallis *tuberuse*; plures dantur Hyacinthi, qui & habent florem diversissimum, sed tamen omnes Hyacinthi dicuntur, sic Hyacinthus veterum habet florem caryophylli, hinc Gallis vocatur *Gerosfe* hinc illud nomen plurimis inditur floribus. Fabulæ dicunt nomen à puero Hyacintho accepisse. Porro narrant ex sanguine Ajacis provenisse, qui ad Trojam occisus est; idcirco autem huic flori inscriptum esse, αἰ, αἰ, initium nominis Ajacis, eaque causa eum florem scriptum Hyacinthum vocat Poëta, cum canit ἀ γ γ α π τὰ ὑάκινθου, literas enim habet inscriptas lugubres, videlicet αἰ, αἰ, quæ testes sunt eorum, quæ de Ajace fabulantur, cujus ex sanguine, natum Hyacinthum canunt. Sed fortè quia μετὰ τοῦ εἶναι κινεῖ αὐτὸν, florem emittit ubi Terra vernis imbribus permaduit. B. *Hyacinth*. *nagelbloem*. G. Wertzel-blummen. Gall. *Jacinte*. A. Hare bells. Ladies flour.

HYACYNTHUS, est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammam imitans. Sunt alii (vel aliæ) Orientales, alii Europæi. Hi inveniuntur ad Iseram fluvium, in confinibus Silesiæ & Bohemiæ, suntque Orientalibus ignobiliores. Quoad colorem, referunt alii colorem minii nativi, alii sanguinis admodum biliosi, & hi sunt præstantissimi: alii rubedine croci admodum flavescent; alii exactè ostendunt fuccini colorem, & hi viliores: alii albi, pellucidi, fuccini colorem referunt, & hi omnium vilissimi habentur. B. *Hyacinth*. G. Ein Hyacinth. Gall. *Hyacinthe*. A. Jacinçt, Hyacinth.

HYALOIDES, est humor oculi vitreus intra tunicam retinam & Crystallinum contentus, ex ὑαλῶ vitrum, & εἶδος forma. B. *Glasachtige vogt*. G. Die gläserne feuchtigkeit. Gall. *l'Humeur vitrée*. A. Vitrous humour.

HYBONA, est omnium vertebrarum incurvatio, ab ὑβάζω incurvo. Idem quod *Cyphosis*.

HYDATIDES, & HYDROÆ, sive AQUULÆ, sunt vesiculæ aquosæ in *Hepate*, *Liene*, aut quodam alio viscere, hydropicis familiares. Item circa palpebras pinguedinis incrementum, ab ὑδωρ aqua. B. *Waterblaasjes*. G. Wasser blätterlein, wasser blasen. Gall. *Hydatides*, *Vesies*, *aqueuses*. A. Watery bladders.

HYDATODES VINUM, est Vinum aquâ dilutum, ex

ex ὕδαρ aqua, ἰδῶ forma. B. Gewaterde wjn.

HYDATOIDES, est humor oculi aqueus, qui intra tunicam corneam & uveam comprehenditur, ab ὕδαρ aqua, & ἰδῶ forma. B. Waterige vogt. G. Die wasserige feuchtigkeit. Gall. l'Humeur aqueuse. A. The watery humour of the eye.

HYDERODES AFFECTUS, idem quod *Hydrops*.

HYDEROS, idem quod *Hydrops*.

HYDRAGOGIA, vide *Venæ lymphaticæ*, ex ὕδαρ aqua, & ἡγῶν ductus.

HYDRAGOGA, sunt Medicamenta, quæ attenuando fluida, & validè Intestina atque ventriculum stimulando, aquosos humores expurgant, ex ὕδαρ aqua, & ἡγῶν duco. B. Water af dypvende dingen. G. Wasser treibende mitlen. Gall. *Hydragoge*. A. Idem.

HYDRARGYROS, est Argentum vivum, five *Mercurius*, ex ὕδαρ aqua & ἄργυρῶν argentum. B. Quikzilver. G. Queckfilber. Gall. *Vif argent*, ou *Mercure*. A. Quicke silver.

HYDRARGYROSIS, est Inunctio Mercurialis, pro excitanda salivatione in lue venerea aut aliis morbis. Ex ὕδαρ aqua & ἄργυρῶν argentum.

HYDRELÆUM, est mixtura ex aqua & oleo, ex ὕδαρ aqua, & ἔλαιον oleum. B. Een mengfel van olie en water.

HYDRENTEROCELE, est intestinorum unâ cum aqua in scrotum prolapsus, ex ὕδαρ aqua, ἡντερον intestinum, & κήλη tumor. Vide *Hydrocele* & *Enteroccele*.

HYDROA, sunt quædam tubercula lata & humida, pruriginosa, granis milii similia, interdum sine pruritu, quæ cutim ἐκώδων exasperant; fiunt hæc cum aliquando sudor acris per sudorem ex cute expellitur; sed qui à cutis densitate impeditur, materia viscida & acris in ea retinetur, & in tumorem elevatur. Affectus hic admodum junioribus atque juvenibus familiaris est, præsertim temperamento calidioribus æstatis tempore sese nimium exercentibus, nempe in collo, scapulis, pectore, brachiis & femoribus, frequentius tamen circa pudenda & anum. Arab. *Asef* & *Albasef*. Lat. Sudamina. Gr. ἑκζήματα, deriv. ab ὕδαρ aqua, vel ἰδρῶν sudo.

HYDROCARDIA, est liquor in pericardio, ex vasculis

lis lymphaticis perpetuo stillans, & continuo absorbtus à vasculis Absorbentibus, adeò ut cor aquæ innatet, ex ὕδαρ aqua, & καρδία cor. Vide *Aqua Pericardii*.

HYDROCELE, est scroti tumor ab humore aquoso excitatus, in ejus membrana cellulosa collecto; vel in tunica Testium vaginali; vel si in ascitico simul fuerit Enterocèle, in sacculo peritonæi relaxatio ab aqua simul ingressa cum Intestino, fiet Hydrocele, ab ὕδαρ aqua, & κύλη tumor. B. *Water-kloot* / *water-bruch*. G. Wasserbruch. Gall. *Hernie Aqueuse*, *Hydrocele*. A. Watery rupture.

HYDROCEPHALUM, est capitis ex humore aquoso intumescencia, in Infantibus tantum observabilis, oriunda à colluvie inter tegumenta externa hærente; vel inter tegumenta & cranium, vel inter cranium & cerebri membranas, inter membranas ipsas, earumque duplicaturas, tum in ventriculis cerebri, sine morte tamen subita, ab ὕδαρ aqua, & κεφαλή caput. B. *Gen water-hoofst*. G. Die wasser-sucht des haupts. Gall. *Hydrocephale*. A. Watery tumor of the head.

HYDROCRITHE, est aqua hordei, ex ὕδαρ aqua, & κριθή hordeum, à κρίνω secerno, quod ejus grana à se invicem distent & secernantur. B. *Gerste-water*. G. Gersten-wasser. Gall. *l'Eau d'Orge*. A. Baaley Water.

HYDRODES FEBRIS, idem quod *Typhodes* vel *Flo-des*.

HYDROLÆUM, idem quod *Hydrelæum*.

HYDROLAPATHUM, idem quod *Hippolapathum*, ex ὕδαρ aqua & *Lapathum*.

HYDROMEL, est *Mulsum*, sive decoctio ex aqua & melle, ab ὕδαρ aqua, & μέλι mel. B. *Meede* / *honing-water*. G. Meth. Gall. *Hydromel*, *eau Miellée*. A. Mead.

HYDROMPHALUM, sive **HERNIA AQUOSA**, est protuberantia umbilici, ex humoribus aquosis in abdomine contentis, ex ὕδαρ aqua, & ὀμφαλός umbilicus. B. *Gen waternabel*. G. Wæszriger nabel bruch. Gall. *Hydromphale*. A. Watery rupture of the Navel.

HYDRONOSOS, idem quod *Sudor Anglicus*.

HYDROPEGE, est aqua fontana, ex ὕδαρ aqua, & πύγη fons, quia πηδᾶ ἐκ γῆς, quia aqua è terra salit.

HYDROPHOBIA, sive **AQUÆ METUS**, est affectus,

etus, cum furore, liquidorum & splendorum fuga, aliquando cum delirio, febris, aliisque symptomatis, summo cum vitæ discrimine invadens, ortus & propagatus ex morfu canis rabidi, eique analogo contagio, ex ὕδωρ aqua, & φοβέω timeo. B. **Water-vrees** / **dolhepd.** G. Wasser furcht. A. The Fear or Water.

HYDROPTHALMIA, est, quando oculus in stupendam excrescit molem, & magna ex parte extra orbitam prominet, ex ὕδωρ aqua & ὀφθαλμὸς oculus. B. **Water-oog.** G. Die Wasser-sucht im auge. Gall. *Hydrophthalmie.* A. Idem.

HYDROPTHALMION, est illa pars oculis subjacens, quæ in cachecticis & Hydropicis intumescere solet. B. **Wolligheid onder d'oogen.** G. Das aufschwellen unter den augen. Gall. *Enflure sous les yeux.* A. A swelling under The eyes.

HYDROPICA, sunt medicamenta hydropicis humores aquosos educuntia. B. **Water afdyvende dingen.** G. Wasser treibende artzeney. Gall. *Remedes qui poussent ou chassent les Eaux.* A. Idem.

HYDROPIPER, est Herba aquatica, Persicariæ non absimilis, sed linguam, piperis instar, urens, ex ὕδωρ aqua, & piper, quasi *Piper aquatile*; Gr. ὕδροπικερε, à loco & sapore nomen habet. B. **Water-peper.** G. Wasser pfeffer, muncken kraut. Gall. *Persicaire, plante aquatique qui a un gout de poivre.* A. Water-peper, Arselmart, Car-smirthe.

HYDROPS, est aquosi humoris in panniculo adiposo, vel membrana cellulosa corporis, vel in quadam cavitate alia stagnatio: estque *Generalis* ut Anasarca, Leucophlegmatia, & Ascites, quibus malè adjungunt Tympanitem; vel *Particularis*, ut Hydrocephalon, hydrops pectoris, manûs, pedis &c. de quibus specialiter suo loco, ex ὕδωρ aqua, & ὄπτωμαι video. B. **Water-zucht 't water.** G. Die Wasser sucht, das zwischen fell und fleisch gesamlete wasser. Gall. *Hydropisie.* A. Dropsie.

HYDROPS ad MATULAM, idem quod *Diabetes.*

HYDROPYRETOS, idem quod *Sudor Anglicus.*

HYDROSACCHARUM, est syrupus ex aqua & saccharo coctus, ex ὕδωρ aqua, & σάκχαρ saccharum: vel aqua saccharata. B. **Syroop van water.** G. Wasser-syrup.

rup. Gall. *Sirap fait avec de l'eau*. A. A Syrup made of Water and sugar.

HYDROSELINUM, est Apium, seu selinum palustre, ex ὕδαρ aqua, & selinum. B. **Water-cppe**. G. Wässer-eppich, frosch-eppich, wässer-merck. Gall. *Berle*; *Ache d'eau*. A. Water-parsley.

HYGIEA, *Sanitas*, est dispositio partium humani corporis, actionibus rectè perficiendis, apta, sive est ea conditio corporis, quâ homo actiones omnes homini proprias exercere valet commodè, jucundè, & cum aliqua constantia per aliquod tempus, ab ὑγιαίνω benè valeo. B. *Gezondheid*. G. Die gesundheid. Gall. *Santé*. A. Health, Sanity.

HYGIEINA, est pars Medicinæ, quæ sanitatem conservandi modum per quædam remedia, eorumque usum, tradit. Estque *Diateretica*, vel *Prophylactica*: ab aliquibus in tres partes divisa fuit in προφυλακτικὴν, morbos futuros & imminentes avertentem: σωτηρητικὴν, quæ præsentem sanitatem tuetur; & ἀναλεπτικὴν, à qua valetudinarii reficiuntur, ab ὑγιαίνω, benè valeo. B. *Bezwaringe der gezondheid*.

HYGROCIRSOCELE, est ramex varicosus, quem aliæ humiditates comitantur, quando circa Venas Testium oriuntur varices, & simul humor copiosus in scroto colligitur. Ex ὑγρὸς humidus, & κερὰς varix, & κήλη tumor. B. *Aderbruch met water*. G. Ein wässeriger aderbruch. Gall. *Hernie humorale*. A. A Watery varice.

HYGROCOLLYRIUM, est medicamentum liquidum, oculis sanandis destinatum, ex ὑγρὸν humidum, & κολλήειον, medicamentum oculare. B. *Oog-water*. G. Augewasser. Gall. *Collyre liquide*. A. An eye water, or medicine for the ey.

HYGROPHOBIA, idem quod *Hydrophobia*.

HYMEN, propriè membrana est; sumitur etiam pro membrana virginea, orificio vaginæ circumnata, ejusque orificium pro magna parte occludente; volunt *Alii* quòd sit quasi membrana, quæ oritur ex corrugatione inferioris partis vaginæ, quæ in prægnantibus, incrassante utero, evanescit, ab ὑμῆναιόω matrimonio jungo. B. *Maagdenblijes*. G. Magdleins hæutlein, oder jungfrauschaft, Gall. *L'Hymen*, ou le Cercle membraneux, qu'on prétend

mar-

marquer la Virginité, ou le Pucelage. A. Virginity, maiden head, properly a certain membrane which denotes it.

HYOIDES, five LAMBDROIDES, est os ad basin linguæ consistens à figura γ vel Δ appellatum, & ἡδῶ forma. B. *Tong-bein.* G. Das zungbein. Gall. *l'Os hyoide.* A. The bone at the root of the tounge.

HYOSCYAMUS, est planta, quæ plures habet caules sesquipedem altos, crassos, ramosos, valdè lanuginosos: folia sunt magna, ampla, incisa, mollia, lanuginosa, albescentia, alternatim & sine ordine caulibus adhærentia: flores monopetali, infundibuli-formes, expansi, & multifidi: vasculum feminale constat testa rotunda, cui natura operculum imposuit, quod per maturitatem dissilit, & cum testa in duas cellulas est divisa, hæ continent semina plurima, parva, rotunda, & nigra: radix est aspera, longa, crassa, interna coloris albi, externè fusci: tota planta habet odorem ingratum, & crescit juxta vias & in pratis. Corrupte *Jusquiamus*, Latine sonat, quasi *faba suilla*, aprinave, quod ut in Historia Ælianus tradit, pastu hujus herbæ convellantur fues aprive, præsentis mortis periculo, nisi copiosâ aquâ statim se foris & intus proluerint, adeuntque aquas, non ut proluant se tantum, verum etiam ut caneros venentur: iis enim nactis protinus sanitati restituuntur, ex ῥῆς porcus, & κράμῶ faba. *Apollinarem* verò Latini, ab Apolline Medicinæ inventore dixerunt: potius derivarem à Græco $\alpha\pi\acute{o}\lambda\lambda\upsilon\mu\iota$ perdo, deletere enim est planta. B. *Bilsen-kruud.* G. Bilsen-kraut, bilsamen, bilsen, doll-kraut, schlaff-kraut, sæw-bon, rindswur, ziegeuner-kraut, teuffels-agen. Gall. *Jusquame, Hannebanne, de l'Endormi, la Mort aux poules.* A. Henbame, Henebane, Henequal.

HYOTHYROIDES, sunt musculi duo laryngis, ab osse hyoidis in cartilaginem scutiformem deducti, rimulæque astrictioni destinati, ex littera γ , θύρεῶ scutum, & ἡδῶ forma. B. *De schiltachtige hrakebeens spieren.* G. Der schilt gleiche knorpels mauß. Gall. *Les muscles Thyro-Hyoidiens, ou Hyo-Thyroidiens.* A. The sheildlike muscles.

HYPALIPTRON, est instrumentum illitorium, five specillum illinitioni inserviens, vulgò *Spatha*, & *Specillum*, seu *Illinitorium*, ab $\gamma\pi\alpha\lambda\iota\phi\omega$ sublimo, indè $\gamma\pi\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\mu\alpha$ Sublinitio, Inunctio, Ff 5 IIx.

HYPERCOON, est planta, quæ plures habet caules pedem altos, in summitate in multos ramos divisos: folia tenera fumarie instar divisa: flos est exiguus, cruciformis, quatuor scilicet petalis constans, plerumque trifidis, subito evanescens, coloris lutei, pedunculo adhærens: floris pistillum abit in longum cornu articulatum, quod constat duabus valvulis per maturitatem dehiscentibus, quæ semina fundunt reniformia, & nigricantia: ovarium perfecte refert arietum cornu: radix longa, aliquando simplex, aliquando divisa, fibrosa, & rubicunda: hæc planta crescit in regionibus calidis, est planta siliquosa. Alii Alceam vesicariam vocant, quidam Cuminum Sylvestre corniculatum; nonnulli speciem papaveris corniculati, an ab ὑπακούω obedio, quod inter frumenta crescat, iisque obediat.

HYPERCATHARSIS, est *Superpurgatio*, sive purgatio modum excedens, ab ὑπερ supra modum & καθάρω purgo. B. *Overmatige buik-zuivering*. G. Eine all zu starke purgation. Gall. *Superpurgation*. A. Idem.

HYPERCRISIS, est excretio critica dicta, supra modum facta, ex ὑπερ super, & κρίνω secerno.

HYPEREPHIDROSIS, est nimia sudatio, ex ὑπερ super. & ἐφιδρώω insudo.

HYPERICUM, est planta, quæ habet caules sesquipedem altos, rotundos, firmos, duros, lignosos, non flexiles, rubicundos, ramosos: folia sunt oblonga, nervosa, centaurium minus referentia, gemina ex gemmulis caulium semper nascentia, obversa foli innumeris ferè poris acu quasi trajectis aciem tum nostram, tum solis radios transmittant: dicunt quidam non esse pervia illa folia, sed poros illos microscopia examinatos esse vesiculas lentis forma, pellucas, & liquore limido, parum oleoso plenas, folia sunt saporis insipidi: flores rosacei, pentapetali, in summitate caulium crescentes, coloris flavi; post florem sequitur capsula, in tres conos assurgens, instar grani hordei crassa, oblonga, succum rubicundum continens, in tria loculamenta divisa, facta seminibus exiguis, oblongis, ex fusco nigricantibus, saporis subamari, & resinosi, odoris picei: radix dura, lignosa, in multos ramos divisa, coloris subflavi: hæc planta crescit in silvis & locis incultis quibusdam dicitur, quod tota planta sit pul-

pulchra & perquam hilaris facie, & venusta, fortasse ex ὑπὲρ supra, & εἰκὼν imago, forma. Vocatur *Perforata*, vide suo loco. B. *Sint Jans-kruid*. G. Sanct Johannis-kraut. Gall. *Mille pertuis*. A. S. Johns-wort.

HYPEROON, sunt duo foramina, in superiore palati parte, quæ pituitosos humores à naribus excipiunt, & factâ excretionem per os rejiciunt, ex ὑπὲρ super, & ὤον pars superior.

HYPERSARCOSIS, seu **ECSARCOMA**, est excrementa carnosa in quavis corporis parte, ex ὑπὲρ super, & σὰρξ caro. B. *Spongicus vleis dat uitwaft*. G. Schwamm-micht fleisch. Gall. *Excroissance*. A. Spongie Flesh.

HYPNOTICA, sunt medicamenta quæ spiritus figendo, nervos cerebri claudendo & angustando, soporem inducunt, vel potius, quæ dolorem tollunt, somnum conciliando; quomodo id præstant, nondum liquido patet, ab ὕπνος somnus. B. *Slaap-middel*. G. Schlaf-mittel. Gall. *Hipnotique*. A. A. Medicine causing sleep.

HYPOCATHARSIS, est levis quædam purgatio, cui opponitur *Hypercartharsis*. B. *Een zachte purgatie*. G. Eine gelinde purgation. Gall. *Hypocatharse* A. Idem.

HYPOCAUSTUM, est locus in quo medicamenta liquidiuscula siccantur, ut tabellæ, condituræ &c. vel quæ facillè liquefcunt, sicca conserventur, ex ὑπὸ sub, & καίω uro. B. *Een stoof*. G. Eine stube. Gall. *Une Etuve*. A. Stove.

HYPOCHÆRIS, putant esse Sonchum lævem, fortasse dicitur, quod minus aspera quàm reliqua sunt cichoracea, & χοῖρε enim asperum, spinosum dici Botanicis videtur, ex ὑπὲρ super, & χοῖρε porcus & asper, quia porci fetis asperis obducti sunt.

HYPOCHONDRIACA AFFECTIO, vide *Hypochondriacus Affectus*.

HYPOCHONDRIACA MEDICAMENTA, sunt, quæ in morbis Hypochondriacis usurpantur.

HYPOCHONDRIUM, sive **SUBCARTILAGINEUM**, est superior pars abdominis, sub cartilaginibus thoracis, ex ὑπὸ sub & χόνδρε cartilago. B. *Zpde boven-buik / het weck aan de zoden*. G. Die weiche der seiten. Gall. *Les Hypochondres*. A. The lateral parts of the abdomen.

HYPOCHONDRIACUS AFFECTUS, seu **AFFECTIO**

CTIO HYPOCHONDRIACA, Vulgò est morbus hic in Viris, qui in Fæminis *Hysterica passio* audit. Est autem melancholia aliquousque progressa, cum viscerum abdominalium aliquali obstructione à sanguine crassiori, verùm qui diversis simul laborat acrimoniis, undè dolor, tensio hypochondriorum, & convulsiones in variis corporis partibus &c. ex ὑπὸ sub, & χόνδρ cartilago. B. **Miltzucht / buiks-zpde-ppn / boben-zpde buiks-gezwel**. G. Meilsz wehe, miltz sucht. Gall. *Maladie hypochondriaque*, *mal de rate*, *hypochondrie*. A. Disease of the milt, à Hypochondriack disease.

HYPOCHYMA, idem quod *Cataracta*, ab ὑποχόω suffundo.

HYPOCHYSIS, idem quod *Cataracta*.

HYPOCISTIS SUCCUS, Germen seu plantula est, è radice cisti fruticosi dum florescit, seu viscum ex quercu profiliens: dicitur & *Limodorum*, aliis *Robithron*. Ex hac itaque plantula, cum floribus succulenta sit, exprimitur succus, qui in sole exsiccatus Glycyrrhizæ succo non absimilis evadit, sed saporis acidi & austeri est, atque ad nos, sed rarò, asportatur, ex ὑπὸ sub, & cistus. Gall. *Hypociste*.

HYPOCLEPTICUM VITRUM, est infundibulum vitreum turbinatâ figurâ, seu Tritorium, separandis oleis ab aquis destinatum, ex ὑπὸ sub, & κλίπτω furor: nam aqua suffuratur quasi ab oleo. B. **Scheitregger**. G. Ein scheidtrichter. Gall. *Entonnoir de verre*. A. A glass tunnel or funnel.

HYPODERIS, & HYPODERMIS, est cuticula quæ obtegit clitoridem instar præputii.

HYPODESIS, sive **SUBLIGATIO**, est fascia, quæ ante injectas plagulas applicatur. B. **Onder-band / onder-zwagtel**. G. Unter-band. Gall. *Soubande*. A. Under-swathe.

HYPODESMIS, idem quod *Hypodesis*.

HYPOGASTRIUM, est exterior abdominis pars inter Hypochondrium & umbilici regionem, ex ὑπὸ sub, & γαστήρ venter. B. **Onder-buik**. G. Der unter bauch. Gall. *La Region Hypogastrique*. A. The Under part of belly.

HYPOGLOSSIS, sive **RANULA**, & **BATRACHION**, est inflammatio vel abscessus sub lingua, ex ὑπὸ sub, &

γλῶσσα

γλῶσσα lingua. B. Een kikbozsch gezwel. G. Ein geschwür auff der zungen. Gall. *Le Batracos, ou Ranuncule, ou Grenouillette*. A. Ranula. Item medicamentum laryngis alperitatem demens. Vid. Batrachus.

HYPOGLOSSUM, dicitur Laurus Alexandrina seu *Bis Lingua*, aliis *Hippoglossum*, sic dicitur quod sub folio aliud majus, linguæ figuram exprimens, habeat, ex ὑπὸ sub, & γλῶσσα lingua. B. *Tongen-blad*. G. Zäpfleinkraut, zungen-blad. Gall. *Laurier Alexandrin*. A. Horse tongue, Double tongue.

HYPOGLOTTIDES PILULÆ, sunt, quæ sub lingua, ad tussim demulcendam, collocantur, ex ὑπὸ sub, & γλῶττα lingua.

HYPOPEDIMUM, idem quod *Supplantale*.

HYPOPHAULUM, est diæta vulgaris inter exquisitam & simplicem media, ex ὑπὲ sub, & φαῦλον vile, humile. B. Een gemeene levens regel.

HYPOPHEON, est *Hypocoon*, an ab ὑποφαίνω subluceo, subostendo, quod ob humilitatem inter segetes sese vix ostendat.

HYPOPHORÆ, & Σύριγγα, sunt profunda & fistulosa ulcera in ulceribus aut sinubus dehiscencia, ab ὑποφέρω laboro, decido. B. *Fistuleuse ulceration*. G. Hehle geschwære, fisteln, röhrwunden. Gall. *Ulcères profonds, ou Fistuleux*. A. Fistulous ulcers.

HYPOPHYSIS, idem quod *Cataracta*.

HYPOPTHALMIA, est dolor oculi sub tunica cornea, ex ὑπο sub, ὀφθαλμός oculus, & ἄλγος dolor.

HYPOPYLON, est puris sub oculi tunica cornea collectio: ὑποφθαλμία *Ruso*, ex ὑπο sub, & πύον pus. B. Een Eiter-oog. G. Ein eiter-aug. Gall. *L'Oeil purulent*. A. Matter collection of cerum under the cornea.

HYPOSARCA, idem quod *Anasarca*.

HYPOSARCIDIUM, idem quod *Anasarca*.

HYPOSPATHISMUS, est incisio tribus divisionibus facta, supra frontem ad pericranium usque; nec tamen tribus illis lineis vel sectionibus frontem incidisse satis est, sed subjicienda etiam est spatha, undè & sectioni huic inditum nomen fuit, & per subditas partes transmittenda, totumque id spatium usque ad pericranium excoriandum, ex ὑπὸ sub, & spatha.

HY-

HYPOSPADIÆ, sunt, qui jam indè à generatione, urinæ inter inferiùs sub glandis vinculo habent, ab ὑποσπᾶω subtraho.

HYPOSPHAGMA, est sanguinis suffusio ab ictu in oculum, ex ὑπὸ sub, & σφάζω sanguinem effundo. B. **Blaauw-oog** / **Rotterdamische fop**. G. Ein blau-aug. Gall. *Oeil meurtri*. A. Blew eye.

HYPOSTASIS URINÆ, est illud crassum generale contentum, quod in urina versùs fundum descendit, in eaque subsidet, ab ὑπιστημι subsideo. B. **Grontfop** / **zetzel**. G. Das sich am grunde setzt. Gall. *Hypostase*. A. Idem.

HYPOTHENAR, est spatium à digito, qui dicitur Index, usque ad digitum minimum. Item unus ex musculis pollicem adducentibus, ex ὑπὸ sub & θένει vola. B. **Onderpalm** / **onderpalm-spier**. G. Der untere mauiz des daumens.

HYPOTHESIS, est rei suppositio, ab ὑποτίθημι suppono. B. **Onderstelling** / **een booz vast stelling**. G. Eine entwerffung. Gall. *Supposition*, *Hypothese*. A. Supposition.

HYPOZOMA, est membrana intersepiens, ut Mediafinum in thorace, ab ὑποζώνυμι succingo.

HYPSILOIDES, idem quod *Hyoïdes*.

HYSSOPUS, est planta, quæ plures habet caules pedem unum vel sesquipedem altos, duros, nodosos, ramosos, à parte superiore usque ad inferiorem folia angusta & oblonga habentes, saturejæ parùm latiora: flos monopetalus, labiatus, cujus labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum; inferius verò in tres partes divisum, media cochlearis instar excavata, bicuspide, & quodammodo alata: ex calice surgit pistillum posticæ floris parti adinstar clavi infixum, ac quatuor veluti stipatum embryonibus, qui abeunt in totidem semina oblonga in capsula, quæ floris calix fuit, recondita: radix digitum crassa, dura, lignosa, tota planta habet odorem penetrantem, gratum, & aromaticum, uti & saporem paulò acrem. Dicitur quasi ὑόμενον τοῦ ἐς τὴν χεῦόμενον ἐπὶ τὴν ὥπα, quod super oculos effundatur, ἀπὸ τοῦ ὕω ὕσω, quod significat perfundo, & ὦψ facies, aspectus, vultus. Hanc nominis si sequamur derivationem, Hyssopos scribemus per simplex S. Malunt alii Hyssopum dictam quasi ὑόμενον ἐπὶ τὴν ὥπην quod vocem raucam, pulmonesque unice juvet, alii deducunt.

ducunt à voce Hebraïca Ezob , quæ significat plantam boni odoris, vel sacram, vel destinatam ad repurganda loca sacra, ut in Psalmis dicitur, repurga me Hyssopo, sed quænam planta Hyssopus veterum fuit, ignoratur, id certum videtur, quòd planta valdè humilis esse debuit, cum dicitur, quod Salomon à Cedro ad Hyssopum plantas descripserit, quidquid sit ; hæc vox jam huic herbæ tribuitur. B. *Hyssop* / *psop*. G. *Isphen*, *isop*. Gall. *Hyssope*. A. Hyssop.

HYSTERA, idem quod *Uterus*.

HYSTERALGIA, est uteri dolor, ab inflammatione vel aliundè excitatus, ab *ἡστέρα* uterus, & *ἀλγίω* doleo. B. *Moeder-ppn*. G. Mutter-pein. Gall. *Douleur de la matrice*. A. Pain of the Womb.

HYSTERICA PASSIO, dicitur & *Suffocatio hypochondriaca*, *uterina*, *uteri ascensus* &c. est motus convulsivus, in quo respiratio valdè læsa & imminuta est, cum sensu ac si fauces nodo stringerentur, vel bolus ab inferioribus in eas insurgeret, hisce accedit Anxietas, & quasi animi deliquium, sæpè cum lapsu corporis in terram, absque tamen convulsivis motibus artuum, nisi Epilepsia quoque adfuerit, Jam viri perindè ac fæminæ hoc morbo, sed hæ frequenter, illi rarissimè laborant : hæ de murmure ventris, de globo ascendente & in latere subsistente, aut in fauces evolante conqueruntur. Porrò Paroxysmus gravior est vel levior, nonnunquam habet periodos suas; cum solvitur paroxysmus, lassitudo, pallor aut æstus in facie cum rubore genarum, capitis, artuumque dolor, languor virium, cordis palpitatio, pigritia, ructus, suspiria, anhelatio, ciborum fastidium, nausea &c. accidere solent. In paroxysmo sæpè vociferantur, aut, ranarum instar coaxant vel rident, vel lachrymantur. Denique paroxysmum antecedunt Oscitatio, Pandiculatio, Imbecillitas, Tristitia, Terror, Ira, Amor, Odor rerum suavium, à quibus momento citius sæpè excitatur hoc malum, uti à fætidis lenitur. Dulcia etiam ore recepta movent hanc passionem, sed in iis, quæ obnoxia sunt ei : At in Paroxysmo etiam exteriora pallent, & frigent rubentibus genis, ita ut fuerint, quæ per dies aliquot, quasi mortuæ, non habentes pulsum, non respirantes, non loquentes, non sentientes, jacuerint. Aliæ fuerunt sepultæ, & in se-

pulchris excitatæ tandem in latus, vel aliam partem ver-
sas fuisse compertum est; verum quæ sic mortuæ viden-
tur, genas tamen rubentes habere solent, sed, ut dixi-
mus, rubor imprimis conspicuus est, cum paroxysmus fi-
niri incipit, & suspiria audiri, quibus plerumque termi-
natur: tum verò per aliquot dies sæpè remanet sensus il-
le constrictionis in faucibus, quæ aliquando difficilem de-
glutitionem unà inducit, quæ autem per intervalla, &
frequenter laborant genas tumidas, rubras lividasque cum
varicibus habent. Gr. ὑστερικὴ πνιξ. B. **Opstgginge / de
moer / stikking des Uf-moeders.** G. Aufsteigen der
Mutter, mutter kranckheit. Gall. *Vapeurs, Suffocation de
la Matrice, affection hysterique.* A. The suffocation vel
the rising of the Mother.

HYSTERICA, sunt Medicamenta, uteri morbis ad-
versa, ab ὑστέρα uterus. B. **Wurden tegen de moer.** G.
Mutter kraut, artzney wider die mutter kranckheit. Gall.
Remede pour la Matrice. A. Medicines against the disea-
ses of the womb.

HYSTEROCELE, est uteri prolapsus, qui tamen ra-
rissimè fieri solet, ex ὑστέρα uterus, & κήλη tumor. B. **Baar-
moeders uitzinking.** Gall. *Descente de la Matrice.*

HYSTEROTOMOTOCIA, sive **SECTIO CÆSA-
REA**, est fœtus ex utero excilio, quæ hoc modo peragi-
tur; sub umbilico ad latera lineæ albæ sectio semilunaris
instituitur, cavitate suâ lineam albam respiciens, deindè
secundum fibrarum ductum, post sectionem extracto fœ-
tu, uteri vulnus à se ipso contrahitur, ita, ut sanguis vix
à majori copiâ, quàm in ordinario partu, effluat, verum si
mater mortua fuerit, locum tibi aptissimum eligito, ab
ὑστέρα uterus, τέμνω secō, & τίκτω pario. B. **Kepzerlphe
snee / Moeder snee.** G. Kayser schnitt, mutter-schnitt.
Gall. *Section ou Operation Cæsariene, ou, de la Matrice.*
A. The imperial cutting or Cæsarian birth.

HYSTEROTOMIA, est sectio uteri anatomica, ex
ὑστέρα uterus, & τέμνω secō. B. **Een konstige ontleding
van de Moeder.**

I.

JACEA, est planta, quæ habet caulem striatum, fractu difficilem, lanuginosum: prima, quæ prodeunt folia sunt laciniata, præ virore nigricantia lanugine cana respersa, sed quæ caulibus adhærent, sunt angusta, firma, aliquantùm dura, saporis non omninò ingrati, subdulcis cum adstrictione: flores flosculi, plurimis scilicet flosculis constantes multifidis, embryoni insidentibus, & calice squaminofo non aculeato comprehensis: Embryo autem abit dein in semen fuscum pappis instructum: radix satis crassa, lignosa, saporis adstringentis & insipidi: juxta sepimenta agrorum, locis herbofis, negligentius cultis, reperitur. Est nomen divertis plantis impositum, forè vox erit Italica, qui *Jaceam* & *Jacceam* appellant: minùs consonum videtur oriri ab *ιακκω* medeor. Gall. *Jac e.*

JACOBÆA, seu Herba S. Jacobi, sic vocatur, quòd sit D. Jacobo dicata. Est planta, quæ habet unum pluresve caules tres vel quatuor pedes altos, rotundos, rectos, duros, striatos, interdùm sine lanugine, aliquando parùm lanuginosos, interdùm rubros, vel coloris purpurascens, ramosos, multa folia habentes sine ordine, vel alternatim disposita, oblonga, profundè incisa, coloris viridis obscuri, saporis aliquantulùm adstringentis: flos radiatus, cujus discus ex plurimis scilicet flosculis, corona verò ex semiflosculis componitur, embryoni insidentibus, & calice tubiformi ac multiformi comprehensis: Embryones autem deindè abeunt in semina pappis instructa, thalamoque instructa: radix fibrosa, alba, terræ valdè infixæ & adhærens. B. *S. Jacobs kruid.* G. *S. Jacobs blum.* S. *Jacobs kraut.* Gall. *Jacobée, herbe ou Fleur de S. Jaques.* A. *Ragwort.*

JALAPPA, radix est crassa, oblonga, rotunda, resinosa, pinguis & carnea, sapore acuto, incidente, nauseoso, odore nullo, scissa in taleolos ad nos ex Indiis Occidentalibus adfertur, exterius subnigricans, interius rufescens cum circulis, si bona sit, nigris seu resinosis: radix integra longa est, & ab infima parte obtusa: Planta habet caulem quatuor vel quinque pedes altum: folia hederæ satis similia, sed minus crassa: flos monopetalus, in-

fundibuli formis, plerumque leviter incisus, qui gemino calice donatur, altero à quo involvi, altero verò cui insidere solet, is autem deindè abit in fructum subrotundum femine fætum ejusdem formæ est *Convolvulus Mexicanus*; vel mirabilis peruviana dicitur. Majoribus fuit incognita. Vocatur etiam *Gialappa*, *Chelopa*, *Celopa*, *Jalapium*, vel *Gelapo*. Item *Mechoacanna nigra*. Vocatur etiam mirabilis peruviana propter admirabilem florum in eadem stirpe varietatem, hinc Gallis dicitur *Merveille du Perou ou Belle de nuit*. B. *Nachtschoon* / quia vesperi se aperit flos. A. *Jalap*. Purgans est validissima. Venit ex India ad nos in taleolis.

JANITOR, idem quod *Pylorus*

JAPONICA TERRA, vide *Catechu*. Gall. *Cachou*, *Terre de Japon*.

JASMINUS, est arbuscula, quæ habet multos ramos valdè longos, tenues, nodosos, debiles, flexiles, virides, valdè extensos, medulla alba fungosa repletos: folia sunt oblonga, acuta, bina costæ adhiærentia in folium impar desinenti unaquaque costa ut plurimum septem foliis est instructa, aliquando quinque, pulchri viridis coloris: flos ex oblongo tubo in quinque lacinias totidem folia imitantes est expansus, coloris albi, odoris suavis, & valdè grati, huic flori succedit plerumque bacca obrotunda, viridis, mollis, semina habens obrotunda & compressa: radix fibrosa. Gelsenium Italis, Arab. *Jesemin*, *Sambach*, vel *Zambach*. Jasminum, quasi violaceum, à violis, quas ita vocant. Vel à Græca voce jasme, quæ significat odorem medicinale, quia hujus plantæ flos suavem odorem fundens in Medicina optimas habet vires; vel à voce Hebraica Samin, quæ Thus notat, quia hic flos in locis optimum relinquit odorem. B. *Jasmin* *Jesemin*. G. *Violreben*, *Jasmin-blumen*. Gall. *Jasmin*. A. *Jasmine*, *Shrub-trefoil*, *Jesemin*.

JASPER, est Lapis pretiosus, varii coloris, cærulei, viridis, gramatias, therebinthifusi, purpurei, crystallini, cadmiæ, qui creditur hæmorrhagias sistere amuleti instar appensus.

JATROCHYMICUS, est Medicus qui Operationibus & Medicationibus Chymicis operam dat, ex *ιατρο*. Medicus & *χημικός* Chymicus. B. *Gen Chymiste geneskhun-*
Der.

der. G. Ein Chymischer artz. Gall. *Medecin Chimiste*. A. A Chymical Physician.

IBERIS, est Nasturtii species, sic vocata quòd in Iberia luxuriosè succrescat. Vocatur etiam *Καρδαμαντική* & *Αγριοκάρδαμον*, item *Lepidium*, *Hiberis*, *Nasturtium Agreste*, *Cardamantice* & *Agriocardamon*, Græcis appellata, quòd radici odor insit nasturtii: vel quòd ejus folia partim nasturtio aquatico, quòd à Dioscoride *Sisymbrium* vocatur, *Cardamine* dicitur, partim etiam hortensi, quòd *Cardamon* Græcis nominatur, similia sint; vel quòd gustu nasturtium referant.

IBIGA, est Chamæpytis, idem quòd *Abiga*, vide *Iva*.

IBISCUS, & HIBISCUS, est Althæa, nomen videtur fictum ex Malva & Viscum, quasi diceret Malvæ viscum, undè barbaris pharmacopolis *Malvaviscum*, hinc fortè descendit *Ibiscus* & *Hibiscus*, velut aliis placet *Ebiscus*, alii derivant ab *Εως* quòd sit magna ejus vis, vide *Althæa*.

ICHOR, sæpè significat serum sanguinis, aliquando est humor acris oleosus & aquosus, ex ulceribus manans. B. *Waterig bloet*. G. Das wässerige gebluet. Gall. *Serofité*, *Sanie*. A. Watery blood.

ICHOROIDES, est humiditas saniem referens, ex *Ιχθὺς* sanies, & *ἰδω* forma. B. *Water-bloedig*. G. Wasser-blutig. Gall. *Sanieux*. A. Watery-blood.

ICHTYOCOLLA, est gluten alicujus piscis, qui dicitur esse sine ossibus, vocatur *Huso*, undè. B. *Huisen-blaas* / sive *Wiscapm*. G. Hausen-blafen. Piscis magnus est, longitudine viginti quatuor pedum, pondere nonnunquam ad libras quadringentas accedens. In Danubio maximè ex Ponto venit. Gluten illud album est, ex illius corio, intestinis, ventriculo, pinnis & cauda confectum. Arab. *Alcanna*. Gall. *Colle de Poisson*. A. Fisghlew, Icing-glaff. Vocatur etiam *Alzanaban* vel *Alchanach* sive *Alzanach*.

ICTERICA, sunt Medicamenta adversus icterum.

ICTERUS, est morbus, in quo cutis in flavedinem mutatur ab obstructione ductus choledochi, vel glandularum hepaticarum, jecoris inflammatione, vel adiposæ, calculosæve materiæ, huc ex omento motæ, vel in vesicula fellis &c. hærentis, obstructione, aut scirrho, undè in sanguine bilis retinetur, *ἀπὸ τῆς ἰκτιδῶς*, id est *Viverra*,

quæ est ex genere mustelarum, quo venatores utuntur, cujus oculi ejusmodi colore tincti cernuntur. Sive ab lctero ave, ejus coloris, quam Latini Galbulum vocant, quæ si spectetur, (inquit *Plinius*, Lib. xxx. cap. 11.) sanari id malum, tradunt, & avem mori. Latinis *Legius Morbus* nominatur, malim ego ab auro metallorum rege, denominationem statuere, sicut & *Aurigo*, ab auri colore: nominatur & *fellis suffusio*. *Celso* ita dictus, quod in aulis Regum molliter curetur, (ut *Sammonicus* ait) ludis, lasciviaque, per quæ mens exhilaretur. *Arcuatus* & *Arquatus morbus Celso*, à colore arcus cælestis æmulo. B. *De Geluw / geelzucht / het geelz.* G. Die gelbsucht. Gall. *La Jaunisse*. B. The Jaundice.

ICTERUS ALBUS, idem quod *Chlorosis*.

IDÆA, vide *Victorialis*.

IDEA MORBI, est proprietas & essentia morbi, ab *ιδέα* video. B. *Eigenschap der ziekte*. G. Eigenschaft der krankheit. Gall. *La Propriété, ou l'Essence, ou la nature de la Maladie*. A. The Propriety and Essence of a Disease.

IDIOPATHIA, est morbus primarius, qui ab alio morbo non dependet, nec originem ducit, ab *ιδιό* proprius, & *πάθος* affectus. B. *Eigen-lydig*. G. Eppenleitige krankheit. Gall. *Maladie qui provient du Temperament*. A. Idiopathie.

IDIOSYNCRASIS, est propria cuivis corpori temperies, ex *ιδιό* proprius, *συν* cum, & *κρίσις* temperamentum. B. *Eigen gematigheid*. G. Inwendige beschaffenheit. Gall. *Idiosyncrasie*. A. Idem.

JECORARIA VENA, idem quod *Basilica*.

JECUR, idem quod *Hepar*.

JECUR UTERINUM, vide *Placenta Uteri*.

JEJUNUM INTESTINUM, est secundum intestinorum tenuium, sic appellatur, quia frequenter vacuum est; in eo, papillæ glandulosæ chylum absorbent, venisque lacteis tradunt, vocatur à Varrone *Hilla*. Gr. *νήσις*. B. *De nuchtere darm*. G. Das leere gedærm. Gall. *L'Intestin jejunum*. A. The Empty gut, Hungry gut.

JESEMINUM, idem quod *Jasminus*.

IGNIS ACTUALIS, est, qui primo contactu adurit, ut sunt ignis ipse & cauteria ferrea, sic *Actuali* igne calcinan-

cinantur animalium partes, ut ossa, cornua &c. ad albedinem, seu ad particularum oleosarum & salinarum exhalationem: quod alias *Combustio* dicitur, sicque Saturnus in *Minium*, limatura ferri in *Crocum Astringentem*, ut nimirum flamma, undiquaque materiam lambat, calcinatur, quod & *Reverberare* dicitur. B. *Wadenph buur*. G. Brennendes feuer. Gall. *Le feu actuel*. A. Real, or actual fire.

IGNIS CIRCULATORIUS, est tepor, vel talis caloris gradus, quem digiti facile ferunt.

IGNIS POTENTIALIS, est Medicamentum, quod, postquam aliquandiu parti superimpositum fuerit, vires suas exerit, eundemque effectum ac ignis actualis præstat: ut raptorium cæteraque exedentia, sic potenciali igne solvuntur metalla, lapides &c. ope spiritus acidi nitri, vitrioli &c. B. *Vermogelph buur / een gatbrand*. G. Gelind feuer. Gall. *Le feu potentiel*. A. Potential fire.

IGNIS PERSICUS, idem quod *Gangrena*, sumitur etiam pro *Carbunculo*, seu *Anthraxe*.

IGNIS REVERBERII, *Rota*, est quando in fornace viva flamma in modum rotæ vas destillatorium ambit, estque maximus ignis gradus, dum undique à parietibus fornacis determinantibus reflexus in vas medium agit. B. *Reberbereer buur / wederom sinit buur*. G. Reverberuer fuer, sehr starck fuer. Gall. *Feu de Reverbere*. A. Reverbering fire.

IGNIS SACER, idem quod *Erysipelas*: quidam tamen pro *Herpete* sumunt.

IGNIS SILVESTRIS, idem quod *Phlyctæna*.

IGNIS SUPPRESSIONIS, est, quando retorta in arena collocata sit, & infra & supra arenam, ignis fortissimus, adhibeatur, uti fit in cinnabari antimonii &c. conficienda.

IGNITIO, est calcinatio per ignem facta. B. *Italkmaaking*. G. Kalkbrennung. Gall. *Calcination de chaux*. A. Calcination by fire.

ILE, est cavitas à thorace ad coxæ ossa; in animalibus omnibus, homine & ove excepto, intestina omnia *Ile* appellari annotat *Plinius*, ab *ἐλκω* circumvolvo. *Ingewandte hol*. G. Der hohle leib. Gall. *Cavité pour les boyaux*. A. Cavity for the guth.

ILEUM MORBUS, vide *Iliaca passio*.

ILEX, est arbor glandifera, quercui satis similis, porri vel pyri magnitudine, ejus cortex est fuscus, lignum est durum & compactum; rami lanugine alba repleti: folia sunt oblonga, in margine incisa, superius semper virentia, inferius albescentia & lanuginosa, saporis adstringentis, flos amentaceus, constans multis staminibus ortis ex calice infundibuliformi: fructus quercus: hæc arbor crescit in silvis, præsertim in regionibus calidis, quidam derivare volunt à voce Hebræica *Elon*, quercus quia species est quercus. Gr. *πεῖλον*, quia arbor ferra propter duritiem sit secanda, à *πεῖω* vel *περίζω* ferra seco. B. *Scharlakn-boom* / *karmospi-boom*. G. Scharlach, beerbaum, fleineiche. Gall. *Yeuşe*, *Eonse*, *Chêne vert*. A. The Scarlet oak.

ILIA, partes dicuntur laterales inanes & molles ipsius abdominis, inter costas breves & pubem: *Celfo* *Λαῖων*, *Κενῶν*, *Λαπαρη*. B. *De zyden* / 't week van de buik. G. Die weiche gegen dem bauch. Gall. *Les Flancs*. A. The Flank. Aliis sunt loca illa, quæ ossi ileo vicina sunt, initium sumentia à partibus mollibus, seque ad inguina extendentia.

ILIACA PASSIO, sive DOLOR ILIACUS, MISERERE MEI, VOLVULUS, TORMENTUM, & CHORDAPSUS, est dolor in intestino ileo cum pertinaci alvi suppressione & horrendo vomitu, quo primum humores, deinde alvi fæces sætentes excernuntur, cum insigni anxietate, & periculo mortis tanto, ut rarissimè ægri evadant. Solet hæc passio Herniæ non restitutæ sæpè supervenire. B. *De krenkel* / *darmking* / *drek-bzaken* / *ontfermt uw mpner* / *lank-cubel*. G. Darm-gicht, grimmen. Gall. *Le Miserere ou Passion Iliaque*. A. The Iliac pain in the guts.

ILIACA VASA, est bifurcatio illa truncorum descenduntum arteriæ magnæ, & venæ cavæ, in abdomine intra pelvis regionem. B. *Scheidinge der vaten des onderbuiks*. G. Die blutgefäße im unterbauch. Gall. *Vaisseaux Iliacques*. A. The Iliac Vessels.

ILIACUS MUSCULUS, est unus ex iis qui femur flectunt, inseritur tendine, qui Psoas musculi tendini conascitur, oritur à tota cavitate interna ossis ilii tenui car-

nosque initio. **Darmbeens spir.** G. Der darmbeins maulz. Gall. *Muscle Iliac.* A. The Iliack muscle.

ILINGUS, vide *Scotomia*, ab *ελεπτω* circumvolvo.

ILIUM, est intestinum tertium tenuium : oritur ubi jejunum desinit, & finem ad cæcum assequitur. Longitudine unam & viginti palmas æquat, ab *ελεω* circumvolvo. B. **De omgewonde darm.** G. Der lange darm. Gall. *Le long boyau, intestin Ileum.* A. The Winding, or turning gut. Iliack gut.

ILIUM Os, est pars ossis Innominati : sic dicitur quod intestinum ilium continet. Circumferentia ejus circularis est, pars superior latissima, connectitur ossi sacro. Superior pars spina, interior costa, & exterior dorium appellatur. Ampius est mulieribus, propter partum, quam viris. B. **Darmbeen heupbeen.** G. Das darmbein, huefft-bein. Gall. *l'Os des Iles.* A. The Iliack bone.

ILLECEBRA, *Hellecebra, Sempervivum minus acre*, per antiphrasin sic videtur appellari quod minimè propter acrimoniam illiciat. B. **Steuer-peper.** G. Mauer-pfeffer. Gall. *Pain d'Oiseau.* A. Stone krup, Stone-hore, Wall-pepper.

ILLINCTUS, vide *Eclegma*.

IMBECILLITAS, est illa conditio corporis humani, quâ ejus musculi laxi, ob sanguinis vel spirituum animalium deficientium influxum imminutum in illorum fibras carneas nervosâsque, ossa annexa non satis pro voluntate animæ movere possunt, vel citò detragantur; est hæc imbecillitas generalis; verum particularis est, quando quæcumque pars solida coherens ex variis particulis sibi appositis composita, eas tam parvâ cohesione annexas habet, ut minimâ vi ab actionibus in sanitate agendis requisitæ vel nimis cedant, vel in unione dissolvantur. B. **Swachheit.** G. Schwachheit. Gall. *Foiblesse, Debilité.* A. Weakness, Feebleness.

IMMERSIO, est, quando metalla, vel mineralia rei alicui corroderenti immerguntur, ut tandem in calicem redigantur. Item lotionis species est, quando simplicia aquæ immerguntur, ut corticem duriores vel inutilem, aut qualitatem nocivam deponant. Sic catx, cerussa, turia igne candida &c. aquæ injiciuntur, ut à nimia acrimonia liberentur. Estque sicca vel humida. B. **Induikelnge.** G.

Das einweichen. Gall. *Immerſion*. A. Ducking, Dipping.

IMMERSUS MUSCULUS, idem quod *Infracapularis*.

IMMUTANTIA medicamenta ſunt, quæ ipſas figuras particularum ſingularum fluidum conſtituentium, vel in fluido natantium, & figuris acutis lædentium, non per appoſitionem, ſed propriæ ſuperficiæ inmutationem, ita in natura ſua mutare valent, ut inertes vel obtuſiores ſiant.

IMPASTATIO, eſt quando materia ad paſtam excipienda cum excipiente quodam commiſcetur & pinſatur, ut fiat inſtar maſſæ.

IMPATIENS HERBA, ſive NOLI ME TANGERE, ſive Baſamina lutea ſic appellatur, quod non patitur attingi, quin ejus ſeminales folliculi crepaturam patiantur, hinc tangi nolit. Eadem crepatura obſervatur circa folliculos Baſaminæ ſceminæ, & cucumeris aſinini. B. *Strudje roert my njer*. G. Spring-kraut. Gall. *Eſpece de Baſamine*. A. Leaping Mercury.

IMPERATORIA, ſeu OSTRUTIUM, eſt planta, quæ habet folia magna, lobata, impari extremum claudente, dura, rigida, in tres partes diviſa, dentata, quædam leviter alia profundè inciſa, ex his naſcuntur caules, duos circiter pedes alti, in alas diviſi, & in ſummitate gerentes flores quinque folia habentes, & in umbellas creſcentes: calix florum abit in duo ſemina plana, ſerè ovata, leviter ſtriata & marginata, involucrum plerumque deponentia, candida & plana: radix oblonga geniculata, craſſa, extrinſecus fuſca, intùs albicans cum folliculis liquore flavo plenis, ſaporis acris, paulò amari, totum os calefacientis: fortè ab imperando dicitur, quòd cateris plantis imperat: hinc fortèſſe *Magiſtrantia* quoque appellatur. B. *Meiſter-wortel*. G. Meiſter wurzel, *Magiſtrantz*, *Oſfritz*. Gall. *Imperatoire, ou Auſtruche*, *Benjoin François*. A. Maſter-wort.

IMPERFECTA CRISIS, vide *Criſis*.

IMPERIALIS CORONA, eſt planta bulbofa, cujus flores coronæ in modum caulis ſummum cingunt. B. *Keyſers kron*. G. Kayſers-cron. Gall. *Couronne Imperiale*. A. The Imperial Crown.

IMPETIGO CELSI, idem quod *Lepra Græcorum*, quatuor ſpecies proponit *Ceſus*. Minimè mala eſt, inquit, quæ ſimilitudine ſcabiem repræſentat, nam & rubet & du-

durior est, & ulcerata & roditur. Distat autem ea, quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet: videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interpolito tempore squammulæ solvuntur, certioribusque hoc temporibus revertitur. Alterum genus pejus est, & simile papulæ, særè, sed asperius, rubicundiusque, figuras varias habens. Squanimulæ ex summa cute decidunt, rosio major est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam, quàm prior, temporibus & fit, & desinit, *Rubra* nominatur. Tertia, etiamnum deterior est: nam & crassior est & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squammosa, sed nigra est, proceditque, & latet & tardat: minùs verò errat in temporibus, quibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, *Nigra* cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omninò non recipit, distans colore: nam subalbidum est, & recenti cicatrice simile, squammulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes: quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui verò humor ejus albidus est, cutis dura atque fissà est, proceditque latius. Hæc verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus & manibus, atque ungues quoque infestant. Idem impetigo quibusdam sonat ac Lichen. B. Ring-worm. G. Zittermahl. Lusit. *Empige*. Gall. *Tigne*. A. Ring-worm or Fetter. Vide *Lepra Græcorum*.

IMPETIGO *Plinii*, idem quod *Lichen Græcorum*. Gall. *Dartre*.

IMPRÆGNATIO, est species imbibitionis, quando res aliis rebus implentur; verbì gratiâ, si tartarus viribus emeticis ab antimonio imprægnatur: vel quando sal alcali ab acido liquore saturatur: sed *Imprægnatio* propriè sumitur, pro conceptu post coitum.

INAPPETENTIA, est, quando cibus propter fermentum in ventriculo diminutum, vel motum respirationis debilem &c. non appetitur. B. *Slappe stens-lust*. G. Eckel zu essen. Gall. *Degout*. A. Loathing.

INAURATIO, est, quando Pilulæ auro foliato obducuntur. Cùm nempe Pilulæ in capsula clauduntur, & una cum foliis auri circumagitantur. B. *Bergulding*. G. Das vergulden. Gall. *Dorer*. A. To gild Pills.

IN.

INCARNANTIA, & INCARNATIVA, sunt medicamenta carnem generantia. Idem quod *Sarcotica*.

INCERATIO, est initio humoris cum re sicca, per combustionem lentam ad consistentiam ceræ remollitiæ. Gr. *Εγκέρωσις*.

INCIDENTIA, idem quod *Attenuantia*.

INCINERATIO, est ignitio, quâ corpora vegetabilium & animalium in cineres, igne violentiore rediguntur, nonnulla etiam in sole ope vitri ustorii ad albedinem cancinantur, sive incinerantur, ut antimonium, vitriolum, &c. B. *Aschmaking*. G. *Aschmachung*. Gall. *Incineration*. A. Idem.

INCISIO, fit vario modo, recta, crucialis, triangularis &c. Vide *Encope*.

INCISORES DENTES, idem quod *Primores dentes*.

INCISORII, idem quod *Primores*.

INCISORIUM, est scalpellum chirurgicum, quo aliquid præscinditur; nempe si vulnera sint dilatanda &c. B. *Gen supmes / incisi-mes*. G. *Ein schneidmesser*. Gall. *Bistouri*. A. *Cuting knife*.

INCLINATIO, ab *Inclinare*, est, quando liquor tenuis à crassa subsidentia sensim effunditur: ut succi per subsidentiam clari, aut aqua post edulcorationes.

INCORPORATIO, est committio, quâ statim humida cum siccis in unum corpus per formam massæ contemperantur, itaque hic non fit lenta nutritio, sed tantum humoris statim additur, quantum ad corporis mitti consistentiam requiritur, ut fiat veluti pasta, undè & *Impastatio* nominari potest, in nonnullis *Subactio*. Incorporatæ autem res in calore digestorio relinquuntur, ut mutuâ actione, & passione crasin communem nanciscantur. B. *Uyfmakinge*. G. *Zusammen backen, vermischen*. Gall. *Incorporation*. A. Idem.

INCRASSANTIA, sive *ECPUCTICA*, sunt medicamenta; quæ crassis ramosisque partibus prædita, se succis tenuioribus & liquidioribus nectendo, per vasa corporis fluentibus consistentiam crassiorem & stabiliorem ipsis conciliant. B. *Dickmachende medicamenten*. G. *Dickmachende mittlen*.

INCUBUS, INCUBO, & ASTHMA NOCTURNUM, Gr. *Εφιάλης* ab *Εφιάλλομαι* infilio, hoc affectu cor-

correpti in infomniis, cum supini decumbunt, falsò ubi imaginantur aliquem ventri aut pectori incumbere, ita ut compressi spirare, loqui vel clamare se non posse putent, quod si expergiscantur, anxii sunt, turbati, facie rubentes & calentes, & palpitationibus obnoxii. Porro in suspiria, in vigilias, & miras sæpè imaginationes de Diabolo, de hostibus, de spiritu ad coitum sollicitante, & cæteris incidunt: re autem benè perpensâ, apparet hoc malum leve esse; & quæ in somno contingunt, suffocationem Hypochondriacam æmulari, dum plerùmque à spasmus musculorum abdominalium originem trahit: his enim rigidis respiratio non nisi laboriosè & cum sensu ponderis incumbentis fieri potest, dicitur & *Suppressio nocturna*. B. *Nacht-merry / mare / nacht-drukking*. G. der alp, mare, das nachtmænlein, schrœtle. Gall. *Cochemare*; *Incube*. A. The Night-mare.

INCURVATIO, idem quod *Cyrtona*.

INCUS, est unum ex ossiculis in aure interna contentis. Molarem dentem refert & malleum instar incudis recipit: dividitur in tres partes, nempe in corpus, & in duo crura, quæ ab auctoribus etiam vocantur, rami, apophyses, processus: pars anterior & superior corporis latius, crassius, solidius, planius, mobilis, committitur parti posteriori & laterali capituli mallei, binis tuberculis unoque intermedio cavo præditæ, suis duabus cavitatibus cum protuberantia intermedia, articulatione ginglimi, firmata interventu parvorum accretorum necitentiumque ligamentulorum: corpus hoc ferè totum in eodem sulco, in parte superiori, anteriori, media, timpani excavato, una cum mallei capite collocatur; processuum unus, scilicet brevior, latior, crassior, ad ostium sinûs mastoidei, ibidem in parte superiori timpani ope ligamenti suspensorii tenuis & brevis versùs posteriora liberè suspenditur, & firmatur, servatâ interim mobilitate, & puncto connexionis pro hypomochlio inserviente; alter verò processus longior tenuior ad finem introrsum incurvus, sic rostrum quali formans, extremum apicem, ut examinanti accuratè constat, paulò convexum habens, parallelo sed altiori situ cum mallei manubrio membranæ timpani applicato perpendiculariter deorsum in timpani cavum descendens, ad inferiora excurrit, interim timpani membranam non tan-

tangit, sed ab eadem, notabili intermedio relicto, interstitio, satis remotus, parte sua extremâ, convexâ, incurvâ, introrsum versus posteriora spectat, cui denique docente primo *Fr. de le Boe Silvio* accrescit latere suo anteriori parumper concavo, ossiculum orbiculare exiguum admodum, dimidiatum gradum milii vix æquans, hinc omnium auditus ossiculorum minimum, ossiculi stapedis ligamento innexum, hinc minimè observabile, à *Fontano* squammosum, à *Lindano* cochleare, vulgò orbiculare, & quartum ossiculum *Silvii* appellatum, ab inventore, si situs spectatur, re verâ est in ordine tertium, cæterum vix ullam habet crassitiem, figuram ovalem, depressam, latus posterius paulò convexum; à *Perrault* perperam pro diffracto apophysios longioris incudis convexo apice habitum; hujusque ossiculi ope articulatur incus cum stapede. *B. Het aambreest-been.* G. Das amboşz gleiche beinlein. Gall. *l'Enclume.* A. Anvile.

INDEX, Indicator, Salutaris & Demonstratorius digitus. G. sæpè dicitur *Λευχάνος* à lingendo, est digitus pollicis proximus, sic dictus, quia hoc digito aliquid demonstratur, ideòque *Δεκτικὸς* à *δείκνυμι* Gr. appellatus. Olim de diebus futuram crisin pronuntiantibus velut indicantibus dicebatur *Δάκτυλος*. *B. De wys-vinger / booyste vinger.* G. Der zeiger. Gall. *Le second Doigt, le Doigt Indice.* A. The Fore-finger.

INDICANS, nihil aliud est, quàm quoddam in corpore secundum aut contra sanitatem observatum & designatum, cujus gratiâ aliquid fieri dicitur, quod ei conferre debeat. *B. Het aanwyzende van 't gene moet gedaan werden.* G. Anzeigung. Gall. *Indication.* A. Idem.

INDICANTES DIES, sunt, qui crisin certis diebus futuram indicant; qui propterea indicantes & contemplabiles dicuntur, & sunt cujusque septenarii medii quaterni, ut dies quartus, undecimus, decimus septimus, vigesimus quartus. Sed illa enumeratio apud nostrates non tanti usûs est, dum vel medicamentis morbus à suo naturali cursu deflectitur, & clymatum varietas magna est ab iis, quæ in Græcia: à nonnullis, quamvis temerè, jam ex facultate medica explosa. *B. Aanwys-dagen.* G. Tage die was anzeigen. Gall. *Jours indicants.* A. Days indicant.

INDICATIO, Gr. *Ἐνδείξις.* *B. Inzicht.* Gall. *Indication.*

id est, quod demonstrat quid in morbis sit faciendum: est-
que triplex *Præservatoria*, *Verhoedende* / quæ sanitatem
à morbis præservat. *Curativa*, *Genezende* / quæ morbum
jam inductum expellit. Et *Vitalis*, *Versterkende* / quæ
vires & victus rationem respicit. Scopi à quibus indica-
tiones sumuntur, trito hoc disticho comprehendi solent :

*Ars, Ætas, Regio, Complexio, Virtus,
Mos, & Symptoma, Repletio, Tempus & Usus.*

INDICATOR, est unus ex musculis, digitum indicem
extendentibus. Qui ortus à facie exteriori & media Ra-
dii, implantatur secundo articulo digiti. B. *De gebieder.*
Gall. *Le Muscle extenseur propre de l'Index.*

INDICATUM, est illud ipsum juvans, sive id quod
indicanti congruit, aut consequens agendum, sanitatis re-
staurandæ gratiâ.

INDICES DIES, vide *Critici Dies*.

INDIGNATORIUS MUSCULUS, est musculus ocu-
lum abducens, unus ex quatuor rectis, oculo insertus ad
latus circa parvum angulum. B. *De verontwaardiger
spier.* G. Der abführende augen maulz. Gall. *Muscle
Abducteur ou Droit externe.* A. The discontent brawn.

INDURANTIA, vide *Sclerotica*.

INDUSIUM, idem quod *Amnios*.

INEDIA, est abstinencia à cibis, vel totalis, vel par-
tialis, sic ut minus solito comedamus. B. *Ontrekhinge
van sppe.* G. Enthaltung von speisen. Gall. *Abstinence
de manger, Diète.* A. Abstaining from meat.

INFIMUS VENTER, vide *Abdomen*.

INFLAMMATIO, vide *Pblegmone*.

INFLATIO, est partis alicujus, à flatibus distensio
Gr. *Εμφύσησις* & *Ευπνεύμασις*. B. *Opblazinge.* G. Auf-
blasung. Gall. *Enflure, Boursoûflure.* A. A puffing upp.

INFRASCAPULARIS MUSCULUS, sive SUBSCA-
PULARIS & IMMERSUS dicitur, à scapulæ inferiore
latere, carnosus latusque defertur, atque in ligamento
tertio humeri finem suum assequitur, sed tendine cæteris
latiore. B. *Onderschouderblads spier.* G. Der unter-
schulterbeins maulz. Gall. *Muscle sous scapulaire.*

INFRASPINATUS MUSCULUS, sive SUPRACA-
PULARIS SECUNDUS, sub spina scapulæ ex tota su-
per-

perficie externa profectus , cum suprascapulari secundo carnosus & crassus , brevi latoque tendine in humeri ligamentum , quod numero quartum constituunt , excurret. B. *Ondergraatspier / bobenschouderblads pier.* G. Der uberschulterbeins mausz. Gall. *Muscle sous-Epineux.* A. Idem.

INFUNDIBULUM, seu ENCHYTA, vulgò *Tritorium*, est vas transmittens in summitate latum, quod paulatim in fistulam cuspidatam definit : ex metallo fabricatur vel ex vitro. Gr. *χοανή.* B. *En tregeter / tremelle.* G. Ein trichter. Gall. *Un Entonnoir.* A. A Tunnel, Funnel.

INFUNDIBULUM CEREBRI, *Πόηλας, Ληρός Hero-philo.* Idem quod *Choana.*

INFUNDIBULUM RENUM, est pelvis, quâ ex renibus, ad ureteres & vesicam urina transit. B. *Becken.* G. Nieren becken. Gall. *Bassin.* A. Basin.

INFUSIO, est extractio virium ex ipsis Medicamentis, per liquorem convenientem facta : cum vel absque igne, quæ si purgans fuerit, unicâ vice absorberi potest, cui propriè nomen competit. Sumitur etiam pro cunctis medicamentis, quæ per certum tempus infunduntur, quæque foris applicantur. Gr. *Ἀποδέγμα.* Dicitur & *Maceratio* vel *Dilutum.* B. *En afweiksel.* Das einweichen, ein tranck. Gall. *Infusion.* A. Idem.

INFUSUM, idem quod *Infusio.*

INGREDIENTIA, dicuntur varia simplicia, quæ unicum compositum constituunt.

INGUEN, Gr. *βασαν*, dicitur ille locus à flexu femoris ad pubem. B. *De hessen / heupen / eigenisse.* G. Das untertheil des leibes wo die heiddruesen seyn, der schmerbauch, die scham am leib. Gall. *l'Aine.* A. The groine.

INGUINALIS, vide *Aster.*

INJECTIO, in genere notat liquidi medicamenti ope siphonis in vulnus, vel ulcus, vel aperturam quamcunque, infusionem. B. *En inspueting.* Gall. *Injection.*

INJECTIO INTESTINALIS, idem quod *Clyster.*

INIUM, est initium medullæ oblongatæ, quod juxta aliquos est sensorium commune, quali sensationes five species ab organis externis exceptæ, ibi per nervos deferuntur, ab α fibra, eo quod fibræ nervosæ ibi loci tanquam in camera, & loco communi terminantur. B. *Net*
be

begin ban 't lange merg G. Der anfang des marcks im rueckgrad. Gall. *Le Commencement de la Mouelle du dos.*
 A. The beginning of the oblongate marrouw.

INNOMINATA OSSICULA, vide *Cuneiformia*.

INNOMINATA GLANDULA OCULI, vide *Caruncula Oculi*.

INNOMINATA TUNICA OCULI, est tendinum à musculis, oculos moventibus, subtilis quædam expansio, ad corneæ membranæ circumferentiam usque producta, vide *Adnata Tunica*. B. **De ongenomde oog-rok.**
 G. Das ungenannte augen häutlein. Gall. *Tunique tendineuse ou Albuginée de l'Oeil.* A. Tunicle Innominate of the eye.

INNOMINATUM OS, aliis *Os Coxæ*, vel *Ilium*, ad latera ossis sacri est, constans ex tribus ossibus, *Ilio*, osse *Pubis & Ischio*, per cartilagines junctis, usque ad septimum annum, ex triplici linea distinctum apparent, sed adultis in unum os coalescunt. B. **Det ongenomde been.**
 G. Das ungenannte bein. Gall. *l'Os innominé.* A. The innominate bone.

INNOMINATUS HUMOR, sive insitus, est humor secundarius à Veteribus dictus, ex quo corpus nutrirı putabant. Erant enim isti humores nutritii quatuor: *Innomınatus*, *Ros*, *Gluten*, *Cambium*. B. **De ongenomde vöcht.** G. Die ungenannte feuchte. Gall. *Humeur innominée.* A. The Innominate liquor.

INOSCUŁATIO vide **ANASTOMOSIS**.

INQUIETUDO, est ea conditio corporis humani, quâ sese hinc inde movent ægri de latere in latus, brachia attollentes, pedes & femora ad nates trahentes, modo in ventrem, modo supini decumbentes, jam sedentes in lecto, jam surgentes ob teneritudinem, inflammationis initium, dolorem in musculis lumborum, cervicis, & artuum orta. Hæc verò Inquietudo evenit vel initio februm, vel etiam toto tempore, quo febris urget; est quoque ordinarium in ea febre symptoma, quam malignam sive pestem vocant. Dolores etiam graves ad se trahunt Inquietudinem: imprimis verò Cardialgia, Colica & Nephritis. Porro cum delirio sæpè est inquietudo, sed nusquam magis, quàm ubi Mors in propatulo est, atque ægri sensim moriuntur, viribus adhucdum aliquando super-

perstitibus. Gr. *ταραχή* B. *Doelentheid*. G. *Unruhe*. Gall. *Inquietude*. A. *Unquietnes*.

INSANIA sive AMENTIA, est imaginationis & iudicii depravatio, sumitur etiam pro *Mania*, vide suo loco. Gr. *παρεφρεσων*. B. *Geekheid / dolheid onzinnigheid*. G. *Unfinnigkeit, tollheit, taubsucht*. Gall. *Folie, phrenesie*.

INSERTIO, in Anatomicis denotat Tendinis Musculi loco alicui infixionem, in quo finem habet. B. *Inplanting*. Gall. *Insertion*.

INSESSUS, seu ENCATHISMA, est balneum ventri, inferioribusque partibus dicatum, cui æger ad umbilicum usque insidet. Habentque tales infessus usus varios, qui nonnunquam ad dolorem sedandum, interdum ad emolliendum, vel flatus discutiendos, & non raro ad menses ciendos, parantur. Vide *Balanæum*. B. *En bad Daar men in zit*. G. *Ein bad*. Gall. *Bain*. A. *A Bath*.

INSOLATIO, est, quando res fermentandæ aut macevandæ solis calori exponuntur.

INSPIRATIO, Gr. *Εισπνοή*, & *Εμπνεύματος*, est inductio aëris in pulmonem per os, nares, & asperam arteriam: quæ fit ob dilatationem Thoracis per musculos intercostales costas fursùm in medio arcûs sui trahentes, dein per diaphragma in abdomen impulsus, & ex convexo planius redditus, undè Thorace capaciore factò, Aer suâ gravitate ingressus Pulmonem, illum implet, undique extendit, vesiculas explicat, sphæricas reddit, & sanguinis circulationem per vasa pulmonalia liberam facit certis temporibus, &c. B. *Inademing*. G. *Das athem ziehen, athem holen*. Gall. *Inspiration*. A. *Idem*.

INSPISSATIO, est, quando liquida materia evaporando in massam tractabilem & consistentem redigitur. Gr. *Πύκνωσις*. B. *Verdikkinge*. G. *Dickmachen*. Gall. *Épaississement*. A. *Idem*.

INSUCCATIO, est quando aloë &c. in succo violarum, rosarum &c. inspissatur.

INSULTUS, est primum paroxysmi tempus, quo morbus in ægrum subito quasi insilit. B. *Oet aanval der ziekte*.

INTEGUMENTUM, ab Anatomicis vocatur quodcunque externum alicujus partis operimentum est; sic corporis

corporis integumenta universalia sunt cuticula, Nervorum papilliforme reticulum, cutis, panniculus adiposus. Particularia sunt, uti membrana quævis, quæ musculum investit &c.

INTELLECTUS, Gr. νῆς & Σάβις, est ipsa mens humana, vel in illa aliquis habitus, quo omnia objecta, circa quæ se exercet, percipit. B. *Verstand*. G. *Der verstand*. Gall. *Entendement*. A. *The understanding*.

INTEMPERIES seu DYSCRASIA, & ACRASIA, est morbus, qui in qualitatibus corporis inconvenientia consistit, eaque vel Manifesta est vel Simplex, vel Composita; Simplex est quando una qualitas peccat; ut intemperies calida, aspera, rara, dura, acida, falsa &c. Composita est, ubi plures qualitates in vitio sunt: ut intemperies calida & falsa, frigida & acida &c. Intemperies occulta est quæ oritur à qualitatibus venenatis, ut ex aëre, animalibus venenatis &c. ex aëre provenit, quando nempe nitrum aëreum, ab aquis stagnantibus putridis, diurnis siccitatibus, terræ motibus &c. contagiosum evadit; undè febres malignæ, pestilenciales & pestes ipsæ nascuntur: Sublatis quippe vaporibus, id quod reliquum est (propter elementum sulphureum & salinum) foetorem contrahit, undè & aër ejusque nitrum à temperie & *ἡδύς* optima desciscit & degenerat: idque similiter ex terris siccis fieri censeo: particulis enim aqueis in altum evectis accrescunt sulphureæ & tandem salinæ particulæ, quæ nitrum aëreum ita aculeatum reddunt, instar veneni arsenicalis, Mercurii sublimati, aut aquæ stygiæ, quæ inspirata sanguinis massam coagulant, erodunt, spiritusque avolare faciunt: undè angina, pleuritides, bubones &c. producuntur. B. *Ongematigheit* / *ongetempertheit*. G. *Unmäßigkeit*, ein böser zustand. Gall. *Intemperie*. A. *Unseasonableness*, *Untemperantness*.

INTENTIO, idem quod *Indicatio*.

INTERCALARES DIES, sive intercidentes, & ab aliis provocatorii dicti, sunt, in quibus vel ob vehementiam paroxysmi, vel ob causam externam, corpus & succi irritantur ad intempestivam expulsionem præstandam: Tales sunt dies tertius, quintus, nonus, decimus tertius decimus nonus. Sed illa enumeratio apud saniores Medicos evanuit. B. *Tussen beyden komende dagen*.

INTERCIDENTES DIES, idem quod *Intercalares*.

INTERCOLUMNE, idem quod *Diapegma*.

INTERCOSTALES MUSCULI, in utroque latere viginti duo sunt, undecim externi & totidem interni: Omnes costis intertextuntur. Fibras habent obliquas, & invicem instar X sese interfecantes. Externi oriuntur à superiorum costarum inferioribus partibus, & oblique versus posteriora descendentes inferuntur in inferiorum partes superiores. Interni è contra. B. *Tusschen-ribbige spieren*. Die mæuslein zwischen den rippen. Gall. *Muscles Intercostaux*.

INTERCOSTALIS NERVUS, est nervus pari vago à medulla spinali accessorius, qui & in abdomine per omnia viscera spargitur, & cum carotide interna cerebrum ingreditur, conjunctusque cum pari tertio & quinto oculos petit. Hinc ipso in cervice læso, visus animali perit, uti demonstravit *Petit in l'Hist. de l'Acad. Roy. An. 1727*. B. *De tusschenribbige zenuw*. G. Die nerven zwischen den rippen. Gall. *Nerv Intercostal*. A. The Intercostal nerve.

INTERCURRENS, vocatur Febris continuæ quædam species, quæ certis annis variat, & modo diversa est à febribus isto anno grassantibus, sive fuerit mitis vel sæva, undè inter febres istius anni stationarias modo huc & illuc intercurrit.

INTERCUS, vide *Anasarca*.

INTERFÆMINEUM, idem quod *Perinæum*.

INTERMISSIO FEBRIUM, vide *Apyrexia*.

INTERMITTENS FEBRIS, dicitur, quando per unum vel plures dies febris planè intermittit, quæ postea redit; eaque tunc est *Quotidiana*, *Tertiana*, quibus nonnulli *Quintanam* addunt. B. *Afsgaande koozts*. G. Fieber das da ablasset, und eine zeitlang inne hælt. Gall. *Fievre Intermittente*. A. An Intermittent Fever.

INTERMITTENS MORBUS, est, qui quibusdam semporis periodis affligit & remittit. B. *Tusschen lating / gaande en wederkomende ziekte*. G. Ein zeitlang blasfender kranckheit. Gall. *Maladie Intermittente*. A. A intermittent disease.

INTERNODIUM, est digitorum ossium mutua colligatio, articulatio & ordine successio. B. *De tusschenknopingen*. G. Das bißlein so zwischen zweyen gelencken

ken ist. Gall. *l'Espace qu'on trouve dans les jointures des doigts*. A. Internodation.

INTERNODIUM, inter Vegetabilia est, quod inter artus vel genicula medium intercedit. Gall. *l'Espace entre deux nœuds dans les cannes, dans le Tuyau de Blé &c.*

INTERNUNCII DIES, vide *Critici Dies*.

INTEROSSEI MUSCULI, sive ABDUCTORES, sunt sex in spatiis metacarpi, tres exteriores & tres interiores, qui cum vermicularibus coeunt, per latera exteriora & interiora digitorum incedunt, tendinesque suos ad tria internodia extendunt, extensioni aliquantulum inserviunt. Externi palmarum incumbunt, interni volae inter metacarpi ossa. Ita in pede decem habentur *Abductores interossei*, à pedis ossibus nati, & spacia Metacarpi replentes. Externi vel interni sunt, illi tendine lato ad primum digitorum internodium per latera assurgunt; hi ad secundum internodium: nonus verò ad pollicis, ad minimi digiti adductionem decimus inservit. B. *Tusschenbeenige spieren*. G. Die Mäufzlein zwischen der beinen. Gall. *Muscles Interosseux*. A. Brawn's between the bones.

INTERPASSATIO, dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemque est quod *Interfuere*, ne materia inclusa conglomeretur, cujus rei gratiâ quoque Gossypio pulveres suscipi solent. B. *Tusschen-naeping*. G. *Zwischennath*.

INTERSCAPULARIA, sunt cavitates inter scapulam & vertebrae.

INTERSCAPULIUM, est processus scapulae in gibba scapulae parte, qui vulgo dicitur spina.

INTERTRIGO, vel ATTRITUS, Gr. *Ἐντερτρα*, est partium ano vicinarum seu partium inter femora sitarum, excoarctatio, vel pelliculae abrasio à motu vehementiori, praecipue equitatione orta. Frequenter id evenit infantibus, ut cuticula in coxis à vera cutè separetur & quasi abradatur, atque dolor eo loci excitetur, qui infantes infomnes atque inquietos reddit. Gr. *Δάρις* à *Δέρω* excoarctio. B. *Ontbelling / smertsel / blisk aars*. G. *Abgeschabete haut*. Gall. *Ecorchure* A. A Gallin in the Skin.

INTESTINA, vide *Enteron*.

INTUBUS & INTUBUM, est Endivia, Gr. *Σίλις*. *Intubum* Latini vocarunt à cavo tubae specie caule, vocatur etiam *Seris* & *Seriola*. Vide *Endivia*.

INTUMESCENTIA, idem quod *Tumor*.

INULA CAMPANA, vide *Helenium*.

INVERTENTIA, medicamenta sunt, quæ aciem stimuli infringunt, ita ut abeat in aliam naturam, figuramque; sic acerrimum acidum invertit acerrimum alcali in naturam mixtam, non acrem.

INVOLUCRUM CORDIS, vide *Pericardium*.

JONTHUS, sive VARUS, vocatur etiam *Α'νθ'*, quoniam hujusmodi tubercula potissimum in ætatis vigore oriuntur. Estque tuberculum parvum, durum, & callosum, in faciei cute excitatum, ab *ἄνθος* fimus, quia, faciem deturpat & fædat. Alii ab *ἄνθος* flos, eo quod circa ætatis vigorem efflorescit, deducunt. B. *Gen werte / blest*. G. Venus bluemlein, schwartze flecken. Gall. *Bouton*, le Tac. A. A Spot.

JOVIS BARBA, Sedum majus appellatur, quod scilicet nonnullis locis plebis animos jampridem invaserit opinio, non feriri fulmine domum, in cujus tegulis vireat: hinc nostris. B. *Wunder-baard* / quoniam Jupiter Rex fulminum est. Vide *Barba Jovis*.

JOVIS FLOS, vocatur Crocus, propter splendorem, fulgoremque.

IPECACUANHA, Brasiliënsium, est radix officinalis longa, tenuis, flexuosa, nodosa, multis exiguis porulis aspera, extus ruffa, intus pallida, saporis amari, nauseosii: est validum purgans & adstringens, vel potius emeticum mitissimum & tutissimum; & in dysenteria probatum specificum & famosum, uti & in reliquis hæmorrhagiis: non adeò certè specificum in illis casibus, quin summa cum cautela & prius benè cognita causa mali exhiberi debeat: vocatur quoque Hipocacuanha. Gall. *Mine d'Or*, *Beconguille*. *Lusit. Cypo de Cameras*. A. Brazilian Root.

IRIO seu IRION, Gr. *Ἰρίδιον*, Viri docti *Trionum* legendum esse censent. Latini ab irruendo derivant, quod igneâ vi & fervido sapore irruat in gustum: nonnulli à voce *Iris* deducunt, quia summitates in modum iris incurvantur. B. *Herik / wilde mostaart*. G. Weg-senff, hederich, wilder-senff. Gall. *Tortille*, *Tortelle*, *Velar*. A. Hedge-mustard, Bank-kresses.

IRIS, duplex est Nostras & Illyrica, prior habet folia pedem unum vel sesquipedem longa, duos digitos, lata, rigi-

rigida, friata, acuta : intra hæc oritur caulis duos circiter pedes altus, rectus, rotundus, pulvisculo farinaceo obductus, in tres vel quatuor ramos divisus : flos liliaceus monopetalus, ad exortum veluti infundibuliformis, & in sex partes ampliatus, quarum tres partes sursum, tres vero deorsum spectant : pistillum è fundo floris surgit, tribus petalis instructum fornicatis, & partibus florum deorsum inflexis, ita incumbentibus, ut palati cujusdam speciem præ se ferant. Ovarium ex fine pedunculi natum fit fructus oblongus, trigonus, fætus seminibus obrotundis: radix oblonga, crassa, flexilis, carnosa, repens, tuberosa, digitum crassa, paululum compressa, externè coloris rubicundi, flavescentis aut grisei, internè albi, saporis amaricantis, acris, subpinguis, odoris fragrantis & violacei : crescit hæc planta in pratis & arvis : Iris florentina parum ab hac differt ; habet enim hæc folia angustiora, & flores albos, sed viribus valdè differt Iris nostras ab Illyrica. Planta ab arcûs cælestis similitudine, quâ florum folia incurvantur, nomen sortitur, quam flores ejus repræsentant. In quibusdam codicibus habetur *isps*, & vertitur ideò *Consecratrix*, quod in sacrificiis, purificationibusque suis Antiquitas Iride sit usa. Aliis *εγνια* cælestis, quod cælestis arcus specie & modo floreat. Aliis *Θαυμασις* admirabilis, eâdem ratione quâ à Poëtis illi cælestis arcus Thaumantias dicitur, genus, originemque illi ex admiratione novæ rei, rudi adhuc sæculo, ut primus Plato indicavit, assignantibus antiquis. B. *Lisch*. G. Gilgen, violwurtz, Himmel-schwertel. Gall. *Iris*, *Glayeul*, *Flambe*, *Fleur de lis*. A. Flower de Luce.

IRIS, in oculo vocatur circulus ille variè coloratus, in medio perforatus, qui antè in oculo, ubi cornea pellucida est, conspicitur. Est hæc autem productio piæ matris nervum opticum involventis, quæ expansa pro capacitæ bulbi oculi, antè ubi cornea pellucida est, ab illa introrsum reflectitur, & ob arterias, venas, vasa lymphatica in cavum corneæ hiantia, tam emittentia quàm absorbentia, infinitosque nervos suos, quasi radiis totidem centrum petit, quæ in limbum orbicularem musculorum pariter desinunt, quibus utrisque amplitudo & figura pupillæ definitur, dùm se contrahunt vel relaxant. Vocatur pariter *uvea*. B. *De regenboog / het kroontjen*.

Iris, est etiam circulus niger, qui papillam ambit. B. *De Boog*. G. Das krogenlein um den augapffel. Gall. *L'Iris*. A. Thebowe of the eyewith divers colours.

ISATIS, est planta, quæ habet caules tres pedes altos, minoris digiti crassitie, rotundos, rigidos, politos, rubicundos, in summitate in multos ramos divisos, habentes multa folia sine ordine disposita, oblonga, lata, ad cynoglossum accedentia, polita, succulentissima: flores sunt exigui, quadrifidi, flavi, in crucem dispositi, pedunculis exiguis adhærentes: post florem, sequitur siliqua compressa, oblonga, linguam exprimens, coloris nigricantis, quæ intus recondit duo semina plerumque oblonga: radix longa, alba, lignosa, in inferiori parte minor, quàm in superiori, saporis amari & adstringentis: hæc planta magnâ curâ colitur in regionibus calidis, quâ lintea, lana, &c. cæruleo colore sufficiuntur, fortè ab *ισάξω* æquo, complano, quòd vim habeat tumores æquandi; quidam *Glastum* olim fuisse putant, nunc *Guadum*. Hinc nostris Belgico idiomate *Glas* / sive vitrum. Barbari depravatâ voce *Osatim* appellant. B. *Werd*. G. Weyd. Gall. *Guesde*, *Pastel*. A. The plant woad.

ISATODES, est bilis cærulea, quæ glastum sive isatidem colore refert, ex *ισάτις* glastum, herbæ nomen, & *ιδω* forma. B. *Blaauwe gal* / *weed-koleurige gal*. G. Blaue gall. Gall. *Bile verte*. A. Blew bile.

ICHÆMA, sunt medicamenta sanguinem sistentia, quæ emplastica, astrictoria, refrigeratoria, vel exsiccatoria sunt, vel meatus vasorum apertorum claudunt, vel sanguinis fluiditatem & motum vehementiorem imminuunt, vel sistunt. Ab *ιχω* valeo, cohibeo, & *αἷμα* sanguis. B. *Bloed-stoppende middelen*. G. Blut-stopfende mittel. Gall. *Remedes, qui étanchent ou arretent le Sang*. A. Blood-stopping medicines.

ISCHÆMON, est graminis species, à Thracibus primum inventa, quâ ferunt sanguinem sisti; alii per antiphrasin contrarium scribunt, quod ejus spica naribus indita sanguinem potius proluciat, ab *ιχω* sisto, contineo, & *αἷμα* sanguis.

ISCHAS, est ficus siccatus; dicitur quasi *ιχας*, ab *ιχνασθαι* arefactum, siccatum esse, ita vocatur etiam *Apios*, quod ejus radix exsiccata ficum referat. Vide *Apios*.

ISCHIAS,

ISCHIAS, est arthritis coxendicis, sedem suam circa articulum ossis femoris cum Coxendice in ligamentosis partibus habens, ab ἰχίς lumbus, ὀσφύς *Hesychio*. B. *Heupen-pe-gicht*. G. Huefftwehe. Gall. *Sciatique*, *Goute Sciatique*. A. A The Sciathica or Hyp-Gout.

ISCHIUM, est coxa, five coxendix, ab ἰχίω sustineo, contineo; sedentes enim sustinet. B. *Heupen-bein*. G. Das huefftbein. Gall. *l'Ischium*, *l'Os de la Hanche*. A. The hip, Huckle bone.

ISCHOPHONUS, est vox gracilis, ex ἰχρὸς gracilis, & φωνή vox. B. *Kleine stem*. G. Kleine stim. Gall. *Qui à la voix gresle*. A. A Smal voice.

ISCHURETICA, sunt medicamenta quæ urinam suppressam emingi curant, ab ἰχρὸς validus & ῥέω fluo. B. *Dis-ontstoppende dingen*. G. Harn treibende mittel. Gall. *Remedes contre la suppression d'Urine*.

ISCHURIA, est duplex *Vera* vel *Notha*. *Vera* est, quando urina in vesica hærens emingi nequit, quamvis æger perpetuo mingendi desiderio laboret, hic circa pubem tumor dolorque circumscriptus oritur, verum cathetere immisso prodit urina. *Notha* est, quando vitio renum vel ureterum nulla urina ad vesicam mittitur, nec dolor, tumor, nec conatus mingendi adest, sed vel urina non secernatur in renibus, vel secreta, ob impeditum exitum, readmisceatur sanguini. Quod in vesicæ aut renum calculo, in obstructione arteriarum renalium vel ureterum, vel urethræ à pituita aut concreto sanguine, aut hærentibus lapillis, contingit. Etiam in sudoribus, vomitu, vel alvi fluxu copiosis: imò in imbecillitate, paralyfi vesicæ aut penis, delirio, apoplexia, lethargo &c. locum habet, ab ἰχῶ cohibeo, & ἔρεο urina. B. *Dis-opstopping/opshozing der pis*. G. Verhaltung und hinter bleibung des harns. Gall. *Suppression d'urine* A. A stoppage of the urine.

ISOPYRUM, non dicitur, quòd ἴσος sit τῷ πυρῶ, quòd triticum æmuletur, aut tritico simile sit, sed ἀπὸ τοῦ πυρὸς, quòd florem edat flammæ similem, ob flammeum rutilantemque colorem, nec non formam, sic vocatur aquilegia, flos constantinopolitanus &c.

ISTHMUS, est ea pars, quæ inter os & gulam seu guttur in modum isthmi interjacet. B. *En engte*. Item, in-

tersepimentum vel Discrimen narium : Interfinium *Isido.*
ro. Imbrex narium *Arnobio* scitè dicitur. Item ἰσθμῖον ,
 Στολίς, Κίαν, Διάφραγμα, &c. B. *Middelschot der neus-*
gaten. G. Wand der nasen loecher. Gall. *l'Isthme ou la*
cloison du Nez, ou du Palais. A. The ridge or meddle part
 of the nostrils.

ITHMOIDEA OSSA, vide *Ethmoides.*

ITINERARIUM, est instrumentum Chirurgicum, li-
 thotomis in usu, quod urethræ intrusum, crenatum est,
 ut cum certitudine incisio in eo fiat. Vide *Catheter.* B.
Een tintel-pfer / pzoet / hol-kele. G. Ein harn sucher,
 Wundeisen. Gall. *Conducteur ou sonde Cannelée.* A. A probe.

IVA ARTHETICA seu MOSCHATA, est Chamæ-
 pytis, *Ajuga*, sive *Abiga*, Latinis dicitur. Invenitur &
Ibiga vocari, quod nomen ferè servant Illyrici, hinc ab-
 jectis duabus literis *i* & *g* fit *Iba*, & ab *Ajuga* abjectione
 literarum *a* & *g*, *Iva* manavit in vulgi nomenclationem.
 Vide *Abiga.*

JUBA, est arundinacea coma effusa, qualis est in milio.

JUDAICUM BITUMEN, vide *Asphaltum.*

JUDAICUS LAPIS, olivæ specie oblongè rotundus,
 tener, striis secundum longitudinem discurrentibus & æ-
 quidistantibus arte, ac si (torno sc.) factæ essent; colo-
 re est subcinereo, duritie filici vix cedente, fractus, in-
 tus glaber est & politus, reperitur in Judæa, undè & no-
 men accepisse videtur, imò & ex Silesia huc adfertur.
 Alii putant medullam seu cor esse lapidis dunensis, sive
 arenacei. Majores vocant masculos, minores verò fœmi-
 nas. In Nephritide sæpè præscribitur. B. *Joden-steen.*
 G. Juden stein. Gall. *Pierre Judaique.* A. The Judaicksto-
 ne. Dicitur *Aëtio* lapis Syriacus, aliis phrenicites, Teco-
 lithos. Arab. Hager alieudi, & Agiar Aliheud.

JUGALE Os, idem quod *Zygoma.*

JUGLANS, est arbor nucifera, sic appellatur quasi
Jovis Glans, ob nucis præstantiam & excellentiam voca-
 tur : Gr. Διὸς Βάλαν, Κάρυον βασιλικόν. Porro Regia aut
 & *Persica.* B. *Wal-noot / oeker-noot.* G. Welsche-nusz,
 wall-nusz. Gall. *un Noyer.* A. Wal nut tree.

JUGULARIS VENA, est illa quæ juxta jugulum cra-
 nium petit, tam interna, quàm externa. B. *De krop-*
ader. G. Die Hals-ader. Gall. *Veine jugulaire.* A. The
 Throate Veine,

JUGULUM, idem quod *Furcula*.

JUJUBÆ, est prunorum species, extus rubræ sunt, dulcem habentes saporem; arbor prunum vix superat, folia habet parva, & ferrata, ex Italia fructus nobis adferuntur, qui in pectoris morbis usui sunt. B. *Jujuben / bozst-pruimen*. G. Brust-beerlein. Gall. *Jujubes*. A. The jujube-Tree. Dicuntur & *Zizipha*.

JULAP, vide *Julepus*.

JULAPIUM, idem quod *Julepus*.

JULEP & JULEB, vide *Julepus*.

JULEPUS, est medicamentum liquidum internum sapore gratum & perspicuum, ex liquore idoneo cum syrupo vel saccharo ex tempore sine coctione mixtum, in tres quatuorve doses ad alterandum vel refrigerandum compositum. Constat communiter ex libra una & semisse aquæ hordei, vel ex aquis destillatis, rarissime vino, ex syrupo refrigerante ribesiorum, berberorum, violarum &c. frequenter aliquot guttæ spir. sulph. vitrioli, salis &c. ad gratum saporem admiscuntur. *Juleb*, undè *Julepus*, nomen Persicum est, idemque sonat quod potio dulcis *Arabibus*, vox julebi à syrupis non distinguitur. B. *Een hoel-drank*. G. Ein kuehl-tranck. Gall. *Julep*. A. Idem.

JULUS, **JULI**, sunt folia primum erumpentia. B. *De eerste uitbrykende bladeren*. G. Die erste anschießende blätter. Gall. *Chaton*. A. Leafs first breaking out. Strictè *Julus* tam Gr. quam Lat. est quod in corylo compactili callo racematim cohæret, & veluti prælongus vermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit. B. *Bloepsels voor de vrucht*. G. Die blust an hasel stauden. Gall. *Chaton de noyer*. A. Long Flowers called catkins.

JUNCTURA, idem quod *Diarthrosis*.

JUNCUS, Est planta, quæ crescit in paludibus, aut juxta aquas, habetque plures caules vel tubos duos pedes altos, satis crassos, rigidos, acutos, cortice denso obductos, & medulla satis dura & fungosa plenos: & à radice tunicis foliosis rubris, ad pedis altitudinem instructos; flos rosaceus est, ex cujus meditullio surgit pistillum, quod deindè abit in fructum seu capsulam plerumque trigonam, trifariam dehiscentem, seminibusque sætam ut plurimum subrotundis. Gr. *Σκοινον*, à jungendo, quod viminum in modum jungat, vinciatque. B. *Biese / mat-*

ten. G. Bintzen, binse. Gall. *Jonc agu*. A. Rushe.

JUNIPERUS, Est arbuscula, cujus truncus tenuis & cortice aspero obductus: lignum est compactum, durum, albescens & subindè rutilans, saporis nullius, nec manifesti odoris, nisi fricetur durius, aut accendatur: valdè ramosa est, habetque folia parvâ, angusta, acuta, dura, spinosa, semper virentia: flos amentaceus pluribus nempe foliolis apicibus donatis constans: fructus autem seu baccæ rotundæ per maturitatem nigricantes, includentes sub tenui pellicula pulpam, in qua tria ossicula dura, ab una parte convexa, ab altera plana reperiuntur: sunt saporis subdulcis, subacris adstringentis, & resinosi, odoris fragrantis. Gr. *Ἰουνις*, & *Ἰερεθ*, est Arbor baccas ferens, dici putant, quod juniores & novellos fructus pariat; sola enim ferè arborem fætus in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem, novis supervenientibus. Vide *Arceuthos*. B. *Jeneber-boom*. G. Kramet-baum, wacholder-baum, wacholder-stande. Gall. *Genevrier ou Genevre*. A. Juniper-tree.

JUNONIS ROSA, est Lilium, veteres Græcorum Poëtæ fingunt è Junonis lacte resperfa terra natum lilium. Namque cùm Hercules puer, quem ex Alcmene sustulerat Jupiter, Junonis dormientis uberibus admotus esset, & lacte replèssset, post suctum digressus mamma lacte copiosè profluxit. Quod in cælo à puero vago & incerto suctu perfusum est, lacteam effecit viam: quod humi sparsum est *Lilium* Lacteo flore nitens creavit; undè *Rosa Junonis* dictum.

JUPITER, per Jovem Chymici significant *Stannum*, putant quoque ex planeta Jove influentias fieri in certa sublunaria corpora; sed hæc potiùs mera figmenta quàm verisimilitudines sunt. B. *Tin*. G. Zinn. Gall. *Etain*. A. Pewter, Tinn.

JUSQUIAMUS, idem quod *Hyoscyamus*.

JUVANS, AUXILIUM, seu **REMEDIUM**, idem quod *Indicatum*.

JUXTANGINA, est Anginæ species, quæ dicitur *Cynanche*, vide suo loco.

IXIA, idem quod *Cirsos*, sive *Varix*.

IXIA & IXINE, est Cardui species Chamæleontis nomine: dicitur quoque quibusdam in locis *ixis*, hoc est, viscum,

viscum, hoc enim ad ejus reperitur radices, quo pro mastiche utuntur mulieres.

K.

KALI, Est planta quæ ad altitudinem trium circiter pedum crescit, si benè colatur, multum se extendens, habetque ramos longos, rectos, satis crassos, rubicundos: folia sunt longa, angusta, crassa, carnosa, acuminata, succulenta, flos rosaceus polypetalus Tournefortio, aliis apetalus, fructus globosus, membranaceus, fætus semine unico in cochleæ formam intorto, in centro calicis: tota planta habet saporem salis, crescit in regionibus calidis, præsertim circà mare rubrum. Est herba marina, vocatur & *Alkali*, & interdum *Salicornia*, ex cujus cineribus sal elicitur, ex quo vitrum, sapo, &c. componitur. Kali & Alkali nomina sunt Arabica. B. *Krabbé quaat*. G. *Glas-kraut*. Gall. *Soude ou la Marie*.

KEIRI vel **CHEIRI** & **CEIRIM**, est vox Mauritana idem quod *Leucoion*.

KERMES, *Chermes*, *Coccus Insectoria*, *Granum & Coccus Baphica*, *Granum Tinctorum*, *Scarlatum*. Fructus est famolissimi fruticis; qui inscribitur Ilex in quo *Coccus Baphica*, nascitur in Creta, uti & in multis Hispaniæ locis, in Narbonensi etiam Gallia & Provincia, &c. B. *Scharlaken beßen*. G. *Scharlach beer*, kermes-koerner. Gall. *Du Vermillon*, *Graine d'Ecarlatte*, *Scherley*. A. *Chermes berries*. Vide *Chermes*.

KINA KINÆ, vide *Cina Cina*.

KIRATH, seu filiqua, est pondus Veterum, pendens grana quatuor.

L.

LABELLA LEPORINA, vide *Labia Leporina*.

LABDANUM, idem quod *Ladanum*.

LABES, est is cui labia prominent, Gr. *χαλὼν* & *χελων*.

LABES, est macula, Gr. *σπίλον*.

LABIA LEPORINA, dicuntur ea, quæ ob vitiosam conformationem solutionem continui habent: quandoque solum labium superius fissum est sub naso, nonnunquam ipsa ossa palati simul dehiscunt, quæ nonnullis Rostra leporina sunt. B. *Cen hazemont*. G. *Hafen scharten*, *hassenslippen*. Gall. *Bec de Lièvre*. A. *Mare lip*. LA.

LABIA PUDENDI MULIEBRIS, pudendum propriè est, inter quæ rima est externa constituta, extuberantias habet, quæ monticuli veneris dicuntur, pilis decorati. Sunt corpora oblonga, mollia atque substantiam habentia, qualis nulla est in toto corpore, partim ex cutè & carne, partim & spongiosa, cui pinguedo subjacet duriuscula. Interna labiorum commissura, in virginibus tensa est, constricta ac veluti ligamentosa, in corruptis laxa, ut & in his quæ pepererunt. B. *De lippen van de vrouwe*. G. Die lippen der weiblichen Schaam. Gall. *Levres des parties honteuses d'une femme*. A. The Lips of the privitie of a womam.

LABIS, est *Volsella*, sive *Forceps*, quâ aliquid extrahendi causa apprehenditur, Gr. *Λαβίς*.

LABIUM & LABRUM, est illa pars colore suo rutilo ob cutis hujus teneritudinem conspicua, carnea, quæ os nostrum undique ambiens, illud quoque à parte superiore claudit; sive oris margo. Sic & *Labia* dicuntur, quibus interiora muliebris pudendi clauduntur. Ita & vulnerum extremitates *Labia* appellantur. Sic & ossium processus Labiorum nomine veniunt. B. *Lippen*. G. *Lefzen*, *Lippen*. Gall. *Levres*. A. A Lip.

LABOR, idem quod exercitium. *Laboratores Chymici* vulgo. B. *En laborant*. G. Ein laborant. Gall. *Artiste*.

LABORATORIUM, est ille locus, in quo Chymici suas operationes magna cum instrumentorum & fornacum pompa peragunt; mihi omnia illa simplicissima sunt, & unicâ fornace ex tribus aut quatuor instrumentis omne quicquid volo perago. Sic & omnis officina pharmaceutica, laboratorium est. B. *En stook-plaats*. G. Ein distillier-platz. Gall. *Un Laboratoire, un lieu pour distiller*. A. A place of the distilling.

LABROSULCIUM, vide *Cheilocace*.

LABRUM VENERIS, est *Dipsacus*: nomen habet à carinato foliorum positu, nam Labrum repræsentare videntur, in quo semper aqua lymphida reperiri solet. Vide *Dipsacus*.

LABRUSCA, est *Bryonia*, sic dicta, quod in agrorum labris, hoc est, marginibus & sepibus nascatur. Vide *Bryonia*.

LABURNUM, est *Anagyridis* species, deducunt à Labor,

bor, quia fortè ex ipsius ligno arcus, pectines, aliaque elaborantur. B. *Ebben-hout / groote boom-blaver*. G. Baum-bonen. Gall. *Arbre de Trèfle*. A. Beantrefoil.

LABRUM, est vas in quod *Balneum* instituitur. Idem quoque significat quod *Labium*.

LABYRINTHUS, propriè est corpus gyris & circumrotationibus inflexum: hinc nomen hoc translatum ad ossis petrosi partem, quæ spectat occiput; est hæc enim ossæ fungosa, non tam dura ac os petrosum, sed quasi infinitis foraminibus pertusa, licèt in superiori superficie glabra sit, in hac hærent tres canales semicirculares; magnitudine varii, & mire intorti, & tantummodo quinque orificiis hiantes in cavitate vestibuli, sicque verum labyrinthum æmulantes. B. *Woolhof des oors*. G. Der irrgang im ohr. Gall. *Labyrinth*.

LAC, Gr. γάλα, est liquor albus ex mammis, vel uberibus emulctus; fit sequestratione chyli à sanguine arterioso, per glandulas mamillares. Lactis generatio incipit plerumque post fœtus gestationem vel paulò ante partum, desinit verò in vetulis, gravidis & menstruatis. Ipse quoque chylus, lactis denominationem meretur. Sic & albi succi ex taraxaco, papavere, lithymallo, esula &c. emanantes, lac vocantur. B. *Melk*. G. Milch. Gall. *De Lait*. A. Milke.

LAC LUNÆ, est substantia alba, fungosa, friabilis, levissima, in fornicibus speluncarum aut saxorum commissuris Helvetiæ & Norvegiæ reperiunda, saporis subdulcis, leviter adstringentis, convenitque in usu cum oculis cancerum: vocatur quoque *Fungus petreus*, *Agaricus mineralis*, *stenomarga*, *Lapis morochtus*. A. White Stonemarle.

LACCA, in Pegu & Siam vastâ invenitur arbor, foliis quodammodo pruni, in cujus furculis & minutioribus ramulis magnæ alatæ & puniceæ coloris (non alatæ enim non laborant) formicæ, in terræ visceribus aliisque locis enatæ, hanc laccam elaborantes inveniuntur: hæ super flores, frutices, arbores ac herbas circumvolitant, ex quibus non secus ac apes, laccæ conficiendæ materiam colligunt, ac in communes operas conferunt. Atque hoc modo ramulli laccæ materia circumvolvitur, uti ad nos deferuntur. Eodem fortè modo & in aliis regionibus colli-

ligi-

igitur, uti in Summatra infula, Bengala, Martaba, Malavar &c. Lacca colorem habet rubrum, & diaphanum; fumum igni injecta gratum emittit: Triplex in officinis prostat species. 1. Lacca in ramulis. B. *Booni-lac.* Gall. *Lacque ou Gomme Lacque, Lacque en bâton* A. Stick-lac. 2. Lacca in granis. B. *Zaad-lac.* Gall. *Lacque en grain.* A. Seed-lac. 3. Lacca in massis, quæ est purissima ex granulis liquatis confecta. B. *Schel-lac.* Gall. *Gomme Lacque plate.* Gr. *κάπκαμον*, Arab. *Lach & Sach*, undè nostrum *Lacca* appellari videtur.

LACERTUS, vide *Brachium*.

LACHANUM, est olus, à *λαγαίνω* fodio, deducunt à *λα & λαίω*, quia terram fodere, est facere ut ea hiët, ut femina eo melius terræ mandentur.

LACHRYMA CHRISTI seu LACHRYMA JOBI, est Lithospermum majus; sic appellatur, quòd ejus semen lachrymas referat.

LACHRYMALE PUNCTUM, vide *Collicia*.

LACHRYMÆ, sunt humiditates, quæ à glandulis oculi ad oculos humectandos, pellucidos tenendos, & fordes eluendas secernuntur, quæ si nimix fuerint, ita ut à punctis lachrymalibus non recipiantur, extra oculos in genas decidunt, & lachrymarum nomine veniunt. B. *Trannen.* G. Die zæhren, træhnen. Gall. *Les Larmes.* A. Tears. Item *Lachryma*, est quoque humor è vegetabilibus tum spontè effluens (sive is concreascit in oleum, resinam, gummi, sive non) tum factâ incisione, uti lachryma Thuris, opii, sanguinis draconis, &c.

LACHRYMALIS DUCTUS, vide *Ductus Lachrymalis*.

LACINIÆ, vegetabilium partes sunt extremæ particulatim decoris gratiâ concisæ orarumque summarum cæsuræ, indè folia membranatim per flexuras digesta, vel nativis segminibus discreta, laciniata vocitatur, sunt tamen qui laciniosum pro sinuoso usurpent.

LACONICUM, sive CALDARIUM & ASSA, sive BALNEUM AEREUM, cella olim erat nullam aquam intra se continens, ad provocandum sudorem potissimum instituta, & ob id à nonnullis *Calida sudatio* sicuti à *Cicerone & Celso Assa* nuncupata fuit, in hac vapor calidus, seu calor siccus inclusus sudorem provocabat. B. *Gen*

Droog-

Droog-bad. G. Ein Trocken-bad. Gall. *Un bain sec, bain de vapeur.* A. A Dry bath.

LACRYMOSUS, vide *Dacryodes*.

LACTATIO, est lactis pro infantis nutritione ex mammis exsuctio. B. **Milking.** G. Milch-saugung. Gall. *l'Action d'allaiter.* A. Milking or suckling.

LACTEA FEBRIS, est illa, quæ primis puerperii diebus puerperis supervenit, quâ cessante lac in mammis colligitur. B. **Ein Milch-koorts.** G. Das Milch fieber. Gall. *Fievre de lait.* A. The Milke Fever.

LACTEA VASA, vide *Vasa Lactea*.

LACTES, quidam pro Pancreate, vel Mesenterio, alii pro lacteis vasis sumunt; pro intestinis tamen non ineptè sumeretur, *Plauti* enim verba sunt in Curcul. Act. 11. Sc. 111.

Ita cibi vacivitate venio laxis lactibus.

Hoc est, laxis & inanibus intestinis. *Lactes* etiam sunt piscium materia seminalis, quâ ova fecundantur. B. **De Hom.** G. Die Milch in den Fischen. Gall. *Les menus boyaux ou se porte le Chyle. Lait aux Poissons; c'est ce qu'on appelle aussi Ris de veau.*

LACTUCA, planta culinaris, sic dicta, quòd abundantia lactis exuberet, vel quòd lactis copiam mulieribus augeat. B. **Salade / Watouw.** G. Lattich, salat. Gall. *Laitue.* A. Lettes, Lettice.

LACTUCA SYLVATICA, idem quod *Hieracium*.

LACTUCELLA, est Sonchus, seu *Lactero*, quòd scilicet caulis ejus dissectus copioso diffuat lacte. A. Sow-thistle.

LACTUCIMINA, idem quod *Aphtha*.

LACTUMIA, idem quod *Achores*.

LACUNÆ, sunt poruli sive foveæ, seu rugæ in uteri vagina, nullibi majores quàm in inferiore parte meatûs urinarii, ex ductibus illis materia quædam seroso-pituitosa emanat, pro semine habita, quæ vaginam lubricat, & in Veneris quidem actu magnâ copiâ foras prorumpit. B. **Sloutjes / buiskens.** Gall. *Lacunes. Lacuna.* Lactantio *Philtrum*, cavum in Labro superiore sub naribus. Gr. *φιτρον.* B. **Het boozken in d'opperste lippe.**

LADANUM, seu **LABDANUM**, est liquor pinguis ex Cisti

Cisti Ledon foliis exsudans, qui canicularibus diebus in Cypro, Candia, Lybia, Arabia &c. instrumentis quibusdam colligitur, & postea Soli, ut induretur, exponitur. Quod ad nos fertur, durum est, friabile, colore opacum, cinereum aut subnigrum, inflammabile, cujus fumus grati est odoris, idèoque in suffitibus & odoramentis, utilitissimum. *Ladanum*, derivatur à Ladon seu Ledum, vide *Ledum*.

LÆVIGATIO, est exactissima trituration; quâ Medicamentum aliquod marmore, porphyrite, vel alio lapide polito, affuso liquore conveniente, vel etiam vino, molari lapide lapideo, manu versatili, tam diu versatur, ut in pollinis pulverisque penè impalpabilis formam redigatur, eo modo, quo pictores suos colores preparare solent, Chymicis dicitur Alcool. B. *Gen ontastbaar Poedermaking*.

LAGOCHILUS, dicitur is, qui leporina seu fissa labia habet, ex λαγὼς vel λαγὼς lepus apud Hesiod. & χεῖλος labium. B. *Gen Hazemont*. Vide *Labia Leporina*. G. Hasen scharthen, hasen lippen. Gall. *Bec de Lièvre*. A. Hare Lip.

LAGOPHTHALMUS, sive **OCULUS LEPORINUS**, est, cum superior palpebra oculum non planè obtegit, manente nonnihil aperto oculo, cum somnum capiunt; ejusque sunt quatuor casus, à nativitate, vel cum à perversa consuetudine vel retro spectandi efficitur: vel cum convulsione tonica affligitur; vel cum cicatrix dura remanet à vulnere vel ulcere curato, ex λαγὼς lepus, & ὀφθαλμὸς oculus. B. *Haze-oogen*. G. Hasen-agen. Gall. *Oeil de Lièvre*. A. Eyes like a Hares.

LAGOPUS, est Trifolii species, cujus summitates pedem leporinum referunt. Ex λαγὼς lepus, & πῆς pes. B. *Haze-poot / Hazen-boet*. G. Hasen-klee, ratzen klee, Hasen-fusz. Gall. *Pied de Lièvre*. A. Rong-klaver, Hares-foote.

LAMBDOIDES, est sutura cranii posterior, os occipitis ab ossibus bregmatis & temporum dividens, à similitudine Λ dicta. Item os Hyoides, ex λάμβδα & εἶδος forma. B. *Gen Winkel-naat*. G. Die dreyeckige fuge des Hirnschedels. Gall. *La Suture Lambdoide*. A. The Lambdoides future.

LAMINA SPIRALIS, vid. *Cochlea*.

LAMIUM, est *Urticæ* mortuæ species quæ habet plures caules longos, quadratos, excavatos, ramosos : folia urticam referunt, sed minora, breviora, lanuginosa, non pungentia, mollia, in margine incisa, caulibus satis longis adhaerentia : flores in summitate caulium verticillati, parvi, purpurei, labiati; cujus labium superius *Cochlearis* instar est excavatum, inferius verò bifidum, cordiforme, desinuntque ambo in fauces marginatas : ex calice autem tubulato ac quinque partito surgit pistillum, posticæ floris parti adinstar clavi infixum, ac quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina, in capsula, quæ floris calix fuit, recondita, & sunt satis crassa, triangularia, rubicunda, splendentia, per maturitatem decidientia : radix est tenuis, fibrosa; tota planta habet odorem fatidum : à *Lamius*, monte *Joniæ* : quidam deducunt à Gr. *γλήμμα*, *Gramiæ* seu *Lippientes oculi* : quia oculis medetur : alii à *Lamia* pisce, quia hujus piscis horrendum vultum refert, ubi se in raptum componit; vel à nonnullis *Galeopsis* dicitur quia ejus flos felis vultum refert, dum mordere vult : hujus plantæ variæ dantur species. B. *Werkeerde netelen / doode netelen*. G. *Taube nessel, tod-nessel*. Gall. *Ortie Morte*. A. *Dead-nettle*.

LAMPSANA, Est planta, quæ habet caulem tres circiter pedes altum, rotundum, striatum, rubicundum, excavatum, ramosum : folia inferiora magnitudine & figura accedunt ad sonchum lævem, alternatim disposita, parum mollia, villosa, superiora sunt oblonga, angusta, acuta, sine caulibus : flos semisflosculosus, plurimis scilicet petalis constans, embryoni infidentibus, & calice comprehensis monophyllo, & multifido, qui deinde abit in capsulam striatam, seminibusque factam ut plurimum tenuibus & acutis : an nomen ab urbe *Lampsacum*? Vel an ab *λαπίζω* evacuo, quia hæc planta comesta alvum laxat : dicitur etiam papillaris herba, quia in fissuris mammarum vel papillarum optimè conducit. Gall. *Lampfane*. A. *Nipple-wort*, *Corn-sallet*.

LANARIA, est *Saponaria* seu *Struthion*, sic dicta, quod ad candorem & mollitiem lanarum ea usa fuerit antiquitas, vide *Struthium*.

LANCETTA, est cultellus chirurgicus, rectus, acuminatus.

minatus, utrimque anceps; in venæ sectionibus, fistulis incidendis, vel ano, pene & utero clauso aperiendis, idoneus. B. *Ein lancet / laatzet / steck-mesje*. G. Ein lancet, schrepfleifen, laszeifen. Gall. *Lancette*. A. *Launcet or lancet*.

LANUGO, in Phytologia, sunt filamenta tenella, plantarum cuticulæ extimæ instar pilorum seu lanæ adnascens, uti in Verbasco, Gnaphalio &c. B. *Wolligkeit der bladeren*. G. Das wöllichte an kräutern. Gall. *Laineux, Cotonneux*. A. *Woolie*.

LANUGO, est barbæ in pubescentibus primum rudimentum, lanæ instar prorumpens. B. *Waffen-baard / voddè-hair*. G. Die ersten bart haar, milchhaar. Gall. *Le poil folet*. A. *Soft Young haire, downe*.

LAPATHUM, five **RUMEX**, ejus sunt varix species: Est planta, quæ habet caulem striatum, rubicundum, in summitate in multos ramos divisum: folia magna, ampla, longa, acuta, mollia, coloris viridis obscuri caulibus longis & rubicundis adhærentia: flores juxta ramos dispositi, multis staminibus constantes: finis pedunculi intra calicem dat placentulam, cui innascitur ovarium triquetrum tribus tubis, apice eleganter fimbriato, quæ lateraliter eminent extra segmenta capsulæ: semina triangula, splendentia, in capsula membranosa inclusa: radix magna, externè fusca, internè flava, aut crocea, multas fibras habens, saporis amari, adstringentis: derivatur à *λαπάζειν*, ab inaniendo, quod ejus decoctum alvum moveat, exinaniatque: dicitur & patientia quia ejus est lenta vis; Rhabarbarum Monachorum, quia à Monachis Rhabarbari loco adhibetur. B. *Patich / paardig / patientie*. G. Mengel-wurtz, grind-wurtz, streiff-wurtz, buben-kraut, wilder-mangolt, lenden-kraut. Gall. *Patience*. A. *Dock*.

LAPIDES, in singulis tribus mundi regnis locum sibi vendicant: inter vegetabilia, cortices duriores nucleum includentes, dicuntur lapides. In animalium habentur, uti calculi ex corpore humano, Lapis porcinus, Bezoar, &c. Inter mineralia sunt lapides pretiosi & minus pretiosi. Ita autem vocantur Fossilia dura, non ductilia, sed fragilia, in igne fixa, neque facilè fundenda ullo igne, in aqua haud solvenda. Nomen nonnullis quoque imponitur medica-

dicamentis, quæ ad duritiem lapideam vel terrestrem excocta sunt, ut Lapis prunellæ, infernalis &c.

LAPIDILLUM, est instrumentum chirurgicum, cochlearis formâ, in extrahendis vesicæ calculis accommodatum. B. *Œen steen-lepel / lapidil.* G. Ein Stein-keffel. Gall. *Une Curette ou Tenette.* A. Lapidille.

LAPPA seu **BARDANA**, Est planta, quæ crescit ad altitudinem trium vel quatuor pedum : caules habet rectos, angulosos, lanuginosos, rubicundos : folia magna, ampla, in superiore parte virido fusca, in inferiore albescentia, lanuginosa : constat flore flosculofo; semine pappi instructo brevibus, calice squammoso hamato, ac vestibus hærente comprehenditis : semina sunt oblonga, crassiuscula, fusca, striata, saporis subamari, subacris, odoris nullius : radix crassa, oblonga, intus alba, foris nigricans, saporis subdulcis, acris, & amaricantis, odoris ferè nullius. Crescit hæc Planta ubique circa vias in duas distincta species, majorem & minorem, quæ tamen inter se conveniunt viribus, neque magnitudine adeò differunt. Gr. Ἀρκείον, Προσώπιον, & προσώπις. Derivari putant nonnulli ab Hebraica voce *Lapath* apprehendit : quia ejus summitates vestes prætereuntium apprehendunt : an verò ab urbe Crete *Lappa* dicta ? Dicitur & Personata, quia pueri ex foliis conficiunt id quod vocant Larvas, Masques. B. *klissen / kladden / dokke-bladen.* G. Kletten. Gall. *Bardane, Gletteron.* A. Burre, Baur-docks, Butter-karr.

LAPPAGO, videtur diminutivum à Lappa, & sic vocatur *Aparine* ; nam ejus semina vestibus similiter adhærent. Vide *Apparine*.

LAQUEUS, est vinculum ita nexum, ut attractum vel pondere pressum, claudatur : utriusque usus est ad fracta luxataque ossa extendenda, & repozita suo loco retinenda, tum ad partes constringendas & arctè vinciendas, Differentiæ laqueorum sunt variæ, nomina sortitæ vel ab inventoribus, vel ab usu, vel alicujus rei similitudine & figura, vel necendi modo vel effectû, quæ cum sine delineatione sint, vix ex sola descriptione percipientur. B. *Œen strik.* G. Ein strick. Gall. *Lacs.* A. A Snare.

LARIX, est arbor conifera, ex qua etiam Terebinthi-næ gummi extillat. Instar abietis alta, truncus rectus, cortice denso, aspero, fissô, fusco obductus : rami sunt

longi, flexiles, tenues, incurvati : folia Pini tenuiora ; plura simul ex uno communi tuberculo instar penicilli nata : flos mas amentaceus, pluribus apiculis constans in uno loco plantæ : fructus in eadem arbore, loco à flore remoto, conicus, squammosus, recondens sub suis squammis semen foliatum : hæc arbor crescit in regionibus calidis circa montes. Larix est Gallo græca vox, à Gallo-græcis huic arbori imposita, vox est ergo barbarica, fortè nomen traxit ἀπὸ τοῦ λαρινῆ, quod pingue significat. Larix ergo à resinæ copia, quâ turget, alii à λαρεῖς dulcis, jucundus derivant, quòd odore & aspectu jucundus sit. B. **Horhen-boom.** G. Lerchen-baum, lerchen dannen. Gall. *Larice, Epinardes, Melese, Meleze, Melaize.* A. Larch-tree, Pine-tree.

LARYNGOTOMIA, idem quod *Bronchotomia.*

LARYNX, GUTTUR, Gr. Λάρυγξ Βρόγχος, Τραχεία Ἀρτηρία. *Galeno* tamen Λάρυγξ, propriè est caput & ostium asperæ arteriæ, sive cartilaginosaë arteriæ, constat ex quinque cartilaginibus. *Primum* par θυροειδὲς sive scutiforme dicitur, protuberantiam illam in collo, vulgò pommum Adami, constituens : *Secundum* par, Κεικοειδὲς sive Annularis, qui instar annuli turcici rotunda est : *Tertia* & *Quarta* cartilago aliis unica, sed si membrana exiit, apparet gemina, dicitur Ἀρυταινοειδὲς Guttalis & Glottis. *Quinta* Ἐπιγλωττὶς appellatur, quæ rimam tegit & claudit. Intervit voci & respirationi, à γαργγγίζω clamo. B. **Stratzen-hoofst / gorgel / de onrechte keel / strot-appel.** G. Die Gurgel, Kehle. Gall. *Le Sifflet, le nœud de la Gorge, le Larynx, le Morceau d'Adam.* A. Head of the Wind Pipe.

LASER, & LASAR, Gr. Σίλφιον, undè habeat originem me latet : videtur esse vox Cyrenaica & Barbarica, undè olim solebat advehi.

LASERPITIUM, Gr. Σίλφιον, cujus caulis ferulaceus μάστιγον appellatur, folia sunt Apio similia, ampla, magna, dentata : flos rosaceus, umbellatus, plurimis scilicet petalis constans cordiformibus, in orbem positis, & calici insidentibus : semen verò latum, membranofum, oblongum, albescens, odoris & saporis Angelicæ : radix longa, crassa, internè nigricans, odoris satis grati : ex cujus caulibus & radice incisus ὄπλον, id est, succus colligitur :

tur : quibusdam caulis Σίλφιον, radix Μαγύδαρις, & folium Μόσπιτα, dicuntur : succum *Lafer* vocant : Avicennæ planta *Laferifera Altiht & Hiltit* dicitur ; Interpretum aliqui *Afam* reddunt, fortè voce ex *Lafer* corrupta, quidam putant derivari à Lac & Silphion : crescit in regionibus calidis in montibus. Vide *Silphium*.

LASSITUDO, est major defatigatio, & cum dolore aliquo, atque velut tensione motarum partium, quàm non modo sentiunt, dum sese movent, sed etiam quieti sedentes, decumbentes, habetque rursus quinque gradus. 1. In tota cute carnibusque sentiunt ac si aciculis pungerentur, maximè si moveant se, aut lassia membra contingant : dicitur *Lassitudo Ulcerosa*. 2. Cum in membris lassius præter alia ardorem percipiunt, dicitur *Lassitudo Phlegmonodes*, quæ in febribus ipsis citra laborem, aut si velis ab inquietudine evenit. Hinc illud *Hippocratis* spontanea lassitudo morbum denuntiat, id est febrem futuram, quæ jam levis aliqua invasit. 3. Cum in profundo circa articulos, id est, in ligamentis & tendinibus, tensio urget, appellatur *Lassitudo Tensiva* sive *Tenodes*. 4. Cum adhuc profundius in ipsis quasi ossibus, id est, in osseum & Epiphygium & Apophysium periosteum, contusionis sensum habent, dicitur *Lassitudo contundens*, sive ο'σσοπόν. 5. Lassitudo, quæ emaciatis, gracilibus Hæcticis aut pueris aut senibus facilis est, Gr. κόπ, Κάματ, B. *Dermoept*, Heid. G. Muedigkeit. Gall. *Lassitude* ; *Fatigue*. A. *Wearyness*.

LATERALIS MORBUS, idem quod *Pleuritis*.

LATHYRIS, est Esulæ, Cataputiæ aut Tithymalli species, ex λὰ valdè & θίγω calefacio, vel potius θυγίς ostiolum : nam dicitur quòd folia duo, quæ caulis partem summam amplectuntur, cavitatem satis magnam ostendant : etenim inter duo folia, quæ umbellam ambiunt, semen quasi inter duas januas sive bivalvas continetur ; vel à contrario, quòd semen pluribus contineatur tunicis, nempe tribus. B. *Spring-kruud* / *spurgie*. G. *Springkraut*, *spring-kœrner*, *treib-kœrner*. Gall. *Epurge*. A. *Spurge*.

LATHYRUS, est Cicercula, Leguminis species, habet caules flexiles, repentes, in multos ramos divisos, compressos, costa elata margine foliato, folia bina tantum conjugata ad nervum in claviculas abeuntem, oblonga, acu-

ta, angusta : flores sunt leguminosi , albi : Ovarium vagina membranacea tectum fit siliqua teres, compressa, alba, facta semine modo Cylindraceo, modo anguloso, internè coloris flavi : radix exigua & fibrosa, hæc planta inservit ornamentis hortorum. Fortè à *λαθῆναι* latere, quòd in folliculis lateat. B. *Platte erwtēn*. G. *Platte erbsen*. Gall. *Gesse*. A. Cicheling.

LATISSIMUS DORSI MUSCULUS, vide *Ani scalptor*.

LAVAMENTUM, idem quod *Fotus*.

LAVATIO, potissimum dicitur de resinosis, terreis, mineralibus & metallis, cum aqua vel alio liquore, ab eorum immunditie purgatis, posteaquam demum exsiccatis, ut in Aloë lota, lapidibus &c.

LAUDANUM, dicitur de solo medicamento ex opio confecto, idque *Laudanum Opiatum* vocitant, ob vires nempe quas præstat laudabiles. Nonnulli dictum esse putant ab articulo barbarico & anodyna vi, quasi dicas *L'Anodyna*, alii quòd Ladanum cyprium simuletur. Occurrunt variæ apud Authores descriptiones, Dolores intolerabiles pellit, & fluxus quoscunque sistit.

LAVENDULA, seu LAVANDULA, & PSEUDONARDUS, Est planta, quæ habet caules duos vel tres pedes altos, duros, lignosos, quadratos, folia sunt oblonga, albescentia : flores parvi, summis caulibus & ramis verticillatim innati, in spicam oblongam tritici æmulam congesti, coloris cærulei : semina post flores parva, oblonga, capsulæ inclusa, quæ flori tanquam calix inservit : radix lignosa : tota planta habet odorem penetrantem, aromaticum, gratum, saporem amarum, planta hæc officinalis sic appellatur, eo quòd balneis & hominum lavacris expetatur, elotaque omnia, si permisceatur odoris commendet suavitate, ergo à Lavando nomen fortitur : spica quoque dicitur, quia sola spicas gerit inter omnes verticillatas plantas; Nardus plurimis etiam vocatur : num sit Nardus veterum, id aliis inquirendum relinquimus. B. *Lavendel* spplk. G. *Lavendel*. Gall. *Grand Lavande ou Aspic*, ou *Nard*. A. *Lavender*.

LAVER, sive SION, seu BECABUNGA AQUATICA, nomen haud dubiè à lavando contraxit, quòd sonantibus aquis enatum semper elui gaudeat. Vide *Becabunga*.

LAU-

LAUREOLA, seu **DAPHNOIDES**, arbuscula est semper virens, flore luteo, cujus baccae validissime purgant, est diminutivum à voce *Laurus*: nam à lauri forma & specie, quam in foliis & fructu refert, dicta est. B. *Berg-peper*. G. Zeilant, kellers-hals. Gall. *Laureole*. A. Laurel, Garland.

LAUROCERASUS, est Frutex pulcher & visui gratus, foliis laurinis, sed majoribus, magis viridibus, & glabris; caulem habet rectum, ramosum; ejus cortex est virido fuscus; lignum est album, calix cavus, infundibuli formis, ora plana, quinquifida: flos rosaceus, pentapetalus, staminibus multis facundus: Ovarium in fundo calicis instructum tuba longa fit fructus ceraso similiis, undè nomen impositum; fetus ille fructus est putamine obrotundo, tenui, fragili, continente semen oblongum, saporis amari; Hæc arbuscula colitur in hortis. B. *Laurier-herg*. G. Lorbeer-kirschen, Lorbeer stand. Gall. *Laurier Cerise*. A. Laurel cherry.

LAURUS, est arbor in regionibus calidis ad satis magnam altitudinem crescens; truncus politus, non nodosus: lignum porrosum & satis debile: rami longi: folia longa, duos vel tres digitos lata, acuta, dura, semper virentia, parum succulenta, nervosa, polita, odoratissima, saporis acris, amari, & adstringentis, brevibus caulibus adherentia: flores sunt monopetali, pelvi-formes, multifidi, & plerumque nudi, staminibus quasi ramosis & bracteatibus constantes: sub cortice exteriori tegumentum corneum seu durum habet; antiquitas in laudis honorem solebat ex hujus arboris ramis coronas flectere: hinc à *Laride* sibi nomen adscivit, Gr. *Δάφνη*, quæ Poëtis fabulandi occasionem videtur præbuisse, Daphnen puellam ab Apolline adamatam, cum vim ejus effugere non posset, Deorum miseratione in laurum fuisse mutatam. B. *Laurier-boom*. G. Lorbeer-baum. Gall. *Laurier*. A. Laurel-tree.

LAURUS ALEXANDRINA, Gr. *Δάφνη*. *Ἀλεξανδρεία*, vel *Ἰδαία*. Officinis *Uvularia*, nonnullis *Bonifacia*, Theophrastus appellat *Ἐπιφύλλοκαρπον*, quod fructum super foliis ferat. *Alexandrinam* autem *Laurum* dictam putamus, quod Alexander Victor ea usus fuerit, hinc quoque *Victoriola* appellatur, quod nimirum Victores ea pro Lauro

in triumphī & victoriæ signum uterentur. *Idea* verò appellatur ab *Ida* monte, quo in loco speciosior nascatur. Vide *Hypoglossum*. Gall. *Laurier Alexandrin*.

LAXANTIA, sunt medicamenta, quæ benignis stimulis hærentia in ventriculo & intestinis, solvendo, lubricando, ex alvo evacuant. B. *Zagte uiddypbende middelen*. G. *Laxirende mittel*. Gall. *Remedes laxatifs*. A. *Laxative remedy*. Hoc autem nomine à nonnullis donantur Medicamenta, quæ valent liquiditate suâ intrare vasa corporis minima, illorum parietes suâ gravitate remove-re; infarctumque expellere, apta fluori interponere, ita ut solida antè rigefacta, iterum horum ope reddantur apta flexioni absque solutione continui. B. *Ueenigmakende middelen*.

LAZULI LAPIS, est lapis intensè cæruleus, non pel-lucidus, aureis punctulis, aut venulis exornatus, Armenio durior. Exindè præparatur color *ultramarinus* vulgò dictus. Alius est fixus, ex Oriente ferè allatus, qui colo-rem in igne non mutat, & alius est non fixus, cujus co-lor in igne disparet, & is in Germaniæ locis reperitur. Pro deponenda alvo adhibetur intus. B. *Lazuur-steen*. G. *Lazur-stein*. Gall. *Pierre d'Azur*. A. *Lazur-stone*.

LEBES, vide *Cacabus*.

LELYTHUS, vide *Pisum*.

LEDUM, est Cisti species, dicitur quod folia ejus ne-que lævia, neque nitida sunt, sed scabra & pannosa. Λή-δος enim vestis ex panno raro ac detricto est, vel ἀπὸ τοῦ λήζεσθαι, quòd capræ ac hirci pinguedinem ejus depræ- dentur ac diripant; nisi placeat ab Arabibus nomen *Ladi* impositum, undè & *Ladanum* dici videtur. B. *Berg-roos / alp-roos*. G. *Bähren-blust*, *alpros*, *huner-laub*. Gall. *Ourels*. A. *Hillrose*.

LEGUMEN, quid sit omnibus notum : nominatur à *legendo*, quod manu legatur. Gr. φακή, κεδρωψ, ὀπριον.

LEMNIA TERRA, est terra alba, tenax, ita tamen ut linguæ adhæreat sine mordacitate, lubrica ob pingue- dinem, in insula Lemno effossa; usus ejusdem ac Terræ sigillatæ, vocaturque *Terra sigillata Turcica*. Gall. *Terre Sigillée ou Scellée*.

LENIENTIA, idem quod *Laxantia*.

LENO, & **LINON**, seu *Torcular Herophili*, est ille
lo-

locus in cerebro, ubi sinus tertius meningis primo, secundo & quarto jungitur. B. *Der pers.* G. Der kelter im gehirn. Gall. *Le Pressoir d'Herophile.*

LENS, & LENTICULA, est legumen minus. Habetque caules pedem circiter altos, satis crassos, angulosos, villosos, ramosos, flexiles, in terram cadentes, nisi sustineantur: folia oblonga, conjugata uni costæ adnata, desinenti in viticulam: flores ex alis foliorum erumpentes, leguminosi, albi: flori succedit siliqua brevis, parva, compressa, facta seminibus orbiculatis utrimque convexis, compressis, duris, politis, coloris albi, aut flavescentis, rubicundi aut nigricantis: radix exigua, alba, fibrosa: hæc planta crescit in locis aridis. Gr. *Φακὶς*, & *Φακὶς*, an à *Lentico*, quia lentum & sanguinem tardigradum efficiant? Vel lentam alvum procurent, quoniam nimiam laxam constipent? Vel à lenitate, quia lenis est ejus superficies, quia lævis & planta: vide *Phace. A.* *Linse.* G. Linse. Gall. *Lentille.* Est & alia lentis species, quæ dicitur *aquatica*, foliola sunt viridia, lentis magnitudinem habentia, & aquis innatantia. B. *Water-linsen / cenden-groen / kroost.* G. Meer-linsen. Gall. *Petite Lentille des Marais; ou Lentille d'Eau.* A. Water fitch, Water-lentils.

LENTA FEBRIS, est, quâ homo lentè & emarcescendo consumitur, quæque ob parvitatem vix observatur cum adest, huic adsunt quoque viscerum quorundam obstructions. B. *Tape en trage kooz.* G. Ein langsame fieber. Gall. *Fievre Lente.* A. Lingring Fever.

LENTICULARE INSTRUMENTUM, pertinet ad operationes Chirurgicas, quo ossa minus glabra poliuntur. B. *Wikkops-tuig / polst-tuig / schaaumes.* G. Ein polier messer. Gall. *Instrument Lenticulaire, Instrument pour polir les os.* A. Instrument for the polishing or smoothing of bones.

LENTIGINES, five **EPHELIDES**, sunt maculæ lentæ colore referentes, quibus, in sæminis præcipuè, facies imprimis, interdum Manus, Brachia, & thoracis pars superior aëri exposita, nunc densius, nunc rarius, quasi guttatim, conspersa est, sine omni dolore & molestia, in quibusdam ætatis solum tempore apparentes, hyeme verò evanescentes, in quibusdam verò perennantes. Gr. *Φακὶς.* B. *Zomer-sproeten.* G. Sonnen-flecken, sommer-

mer-flecken. Gall. *Taches de rousseur*. A. Freckles.

LENTISCUS, est arbuscula mattichen exsudans, valdè ramosa: rami ejus sunt crassi, flexiles, cortice cinereo obducti: folia Myrtim referunt, per paria ad unam costam disposita, non in unum folium desinentem, semper viridia, tenera, odoris sortis non ingrati, saporis adstringentis, acidiusculi, flores ex foliorum alis nascuntur instar racemorum dispositi, rubri, vel coloris herbacei pallidi, ad purpureum accedentis: fructus sunt baccæ rotundæ, nigræ, saporis acidi, habentes nucleum oblongum, nigrum, durum, continentem medullam albam vel viridem: ex hisce baccis in Italia oleum conficitur: crescit hæc planta præcipuè in Insula Chio. Dici videtur à *Lenteo* verbo, sic propter ejus virgultorum lentitudinem deducunt, sed malunt alii à foliorum pinguedine lentoreque, quem habent, cum manu tractantur. Gr. *χῆσις* quasi *χῆσις* filialis; quod faciliè & frequentur in dentiscalpia findatur. B. *Mastix-boom*. G. Mastix-baum. Gall. *Lentisque*. A. Mastic-tree.

LEONTIASIS, idem quod *Elephantiasis*.

LEONTOPETALON, est planta, quæ habet folia ampla, ferè rotunda, instar soldanellæ, hæc integra, illa laciniata, venosâ, coloris cærulescentis, longis caulibus adhærentia: ex his nascitur caulis pedem circiter altus, lineis purpureo pallidis notatus, in multos ramos divisus, habens folia minora, & minùs incisa quàm sunt inferiora: flores in summitate ramorum nascuntur, foliis oblongis intermixti, & in spicam congesti, magni instar ranunculi, quinque petalis constantes, oblongis, flavis, vel rubicundis in stellam dispositi: flori succedit capsula, habens in se semina magna, nigra: radix crassâ, rotunda, inæqualis, gibbosa, externè coloris cinerei, externè viridis subflavi, saporis amari: hæc planta crescit in locis calidis folium Leoninum sonat, ex *λ'ων* leo, & *πέταλον* folium. Ejus radix iëtibis serpentum mederi dicitur. B. *Leuwen-blad*. G. Læwen-blät. Gall. *Feuille de Lion*. A. Lyons blade, Black-Turnep.

LEONTOPODIUM, sive **PES LEONIS**, est Gnaphalii species: sic dicitur propter villosam foliorum & florum effigiem crus pedi annexum aliquantùm referentem, *λ'ων* leo, & *πῆς* pes. B. *Leuwen-boet*. G. Læwen-fusz. Gall. *Pied de Lion*. A. Lyons Foot.

LE-

LEPIDIUM, vulgò *Piperitis* : est planta, quæ plures habet caules duos vel tres pedes altos, rotundos, politos, medulla repletos, ramosos : folia longa & ampla, instar mali citreæ, acuta, pinguia, ex viridi in luteum vergentia, in margine incisa, alternatim disposita ; folia partis inferioris caulibus longis adhærent : flores in summitate ramorum crescentes, exigui, albi, quadrifidi, cruciformes : post florem sequitur fructus, vel siliqua plana, utcunque in cuspidem desinens, referensque ferrum vel cuspidem hastæ militaris & dehiscens in duo loculamenta, semina exigua, & oblonga continentia : radix longa, repens, alba, digiti crassitie, saporis acris : hæc planta crescit in umbra : appellatur, quòd λεπίδας, hoc est squammas & maculas in facie debeat, & repurget, vel ἀπὸ τοῦ λεπίζειν, id est, ἐκδειρεῖν dictum, quòd suâ acrimoniâ urenti ulceret, excoriet, eâque facultate, vel ferro notas frontis fervorum inustas debeat. Vide *Piperitis*. B. *Peper-kruid*. G. *Pfer-kraut*. Gall. *Passerage*. A. *Dittander*, *Dittammer*, *Peper-wort*.

LEPIDOIDES, est futura cranii *Mendosa*, sive *Squamosa*, à relatione appellata. Vide *Mendosa*, ex λεπίς *Squama*, à λίπω decortico, & εἶδος forma. B. *De schub naad*. G. *Schup-nath*. Gall. *Suture fausse ou ecailleuse*. A. *The Scaly Suture*.

LEPORINA LABIA, idem quod *Lagochilus*.

LEPORINUS OCVLUS, vide *Lagophthalmus*.

LEPRA, est scabies sicca, quâ cutis in squamulas, piscium instar mutatur : Dissert à *Leuce & Alphe*, eo quòd lepra aspera est ad contactum & pruritum inducit ; quandoquidem cutis sola affecta est, ideòque excoriatâ cute subjecta caro sana apparet, à λεπρώω scabrum reddo. B. *Älker-zichte / lazerie*. G. *Die maltzey*, *auffatz*, *feldsucht*. Gall. *Lepre*, *Ladrerie*. A. *Leprosie*.

LEPRA ARABUM, idem quod *Elephantiasis Græcorum*.

LEPRA GRÆCORUM, sive IMPETIGO CELSI, Gr. ἀπὸ τοῦ λεπίδων squammis denominata. Summus quidam *Psoia* seu scabiei gradus est, mox autem in principio, ne quis authorum lectione turbetur, observandum, nos hic de *Græcorum Lepra*, non de *Arabum* loqui. Quem autem Arabes *Lepram* nominant, ille *Græcorum* est *Elephantiasis*.

phantiasis ; qui nihil aliud est , quàm universalis totius corporis *Cancer* , dum inquit. *Lepra* est morbus ortum habens ex bile atra per totum corpus sparsa , undè intemperies partium , forma & figura , & tandem etiam ipsa continuïtas corrumpitur , & est cancer communis corpori toti. *Græcorum* verò *Lepram* nominant *Arabes Albaram nigram*. *Albaras nigra* , idem est quod *Impetigo* excoriativa , & est scabiolitas accedens cuti , aspera , vehemens , & facit squammas piscium cum pruritu. Major in *Lepra* est humorum corruptio & intemperies , quàm in *Scabie* , & in *scabie* solùm quædam corpora furfuracea decidunt , in *Lepra* autem velut squammæ piscium ; ita ut à pruritu per scabiem ad *Lepram* fiat transitus. Nam pruritus est levis quædam cutis asperitas , in qua , nisi fortè violentiùs scalpatur , nihil ex cutè decedit : in *scabie* postea jam humor evidentior est , & scalpentibus furfuracea quædam corpuscula , sed squammosa , seu scalpentibus , seu non scalpentibus decidunt : etenim in *scabie* materia est tenuior , summam saltem cutim depopulatur : deindè in *Lepra* materia crassior est , non solùm summam superficiem , sed etiam profundiora cutis depascitur. *Græcorum* hanc *Lepram* procul dubio sub *impetiginis* nomine proposuit *Celsus*. Non verò *Lichenem Græcorum* , quæ aliis *impetigo* dicitur , intellexit. B. *De griekse lazcrie*. G. Der Griechische Ausfatz. Gall. *Lepre des Grecs*. A. Leprosie of the Greekes.

LEPTOPITYRON , est Furfur macer , ex λεπτὸς tenuis , gracilis , macer , & πίτορον furfur.

LEPTUNTICA , idem quod *Attenuantia* , à λεπταίνω attenuo.

LETHARGUS , est sopor in morbis profundior quàm in comate vigili , sed minor quàm in comate somnolento & caro : tum quoque delirium & febris adsunt. Tumet facies , reliquum corpus marcescit , manûs tremunt , sudant , & aliquando sudorem frigidum , oblivione tenentur , ut matulam fortè manu tenentes , mox ejus obliviscantur , Urina turbata est , & febris cum lenta , tum accessiones imprimis circa vesperam habens , ex ληθῆ oblivio. B. *Slaap-kooz*s. G. Die schlaf fucht , schlaf-fieber. Gall. *Lethargie*. A. Dead-sleep.

LEVATOR MUSCULUS , est unus ex scapulæ musculis.

culis, ita per excellentiam nuncupatus, à transverso secundæ, tertiæ & quartæ, nonnunquam quintæ colli vertebræ processu, vario fibroso fasciculorum cætu emergens, circa medium ipsi intricatissimè connectitur, quæque etiam carnea alterius classis fibram nervosam sive tendineam recipit. Validus ex parte carneus, ex parte tendineus, elatiori atque inferiori scapulæ angulo infigitur, atque hic scapulam elevat. Dicitur & *Patientiæ Musculus*. B. *Opfligtende spier*. G. Der auf hebende maulz. Gall. *Muscle Releveur*. A. The Uplifting muscle.

LEUCACANTHA, est spina alba, carlina, chameleon, &c. ex λευκή alba, & ἀκανθα spina. B. *Witte weg-distel*. G. Weiss weg distel. Gall. *Chardon Argentin*. A. White Thistle, Cotton Thistle.

LEUCANTHEMUM, Habet omnia, quæ in Chrysanthemo notata sunt, nisi quod folia florem coronantia sunt alba: radix est fibrosa repens, saporis acris, quasi albus flos, sic chrysanthemum flore albo vocatur: ex λευκὸν album, & ἀνθή flos, cùmque flos Helenii sit instar, dicitur flos solis albus. Gall. *Marguerite*.

LEUCANTHOM, in genere planta est, flores producens candidos, ex λευκὸν album & ἀνθή flos.

LEUCE, seu VITILIGO ALBA, est mutatio, in qua pili cutis & nonnunquam subjectæ carnes in album colorem mutantur; caro ac puncta non sentit, nec sanguinem emittit sed humorem lacteum. Dicta est λευκή à populo alba: quoniam, ut in illa arbore, sunt veluti quædam lanugines, sic in istoc affectu apparet albedo in ipsa cute; differt ab *Alpho* quod *Leuce* altius penetret & cutim mutet, ita ut etiam pili immutentur, à λευκὸν album reddo. Arab. *Albaras alba*. B. *De witte lazerp*. G. Die Weisser Aufsatz. Gall. *Lepre blanche*. A. Whitte leprosie.

LEUCELECTRUM, est succinum album, ex λευκὸν album, & ἤλεκτρον succinum.

LEUCOENUS, est vinum album, ex λευκὸν album, & εἶν & vinum, ab ὄνω juvo.

LEUCOION, est planta, quæ habet caulem plûs quàm duos pedes altum, rotundum, lignosum, in multos ramos divisum, lanugine albâ instructos, & in arbusculæ formam dispositos: folia sunt longa & ampla fere instar salicis, alba, mollia, lanuginosa: flores in summitate ramo.

morum crescentes, quadrifidi, oblongi, cruciformes, coloris rubicundi aut purpurei, aut violacei, aut albi, odoris suavis : flori succedit filiqua oblonga, angusta, compressa, septo medio distincta, cui adhærescunt semina orbiculata, plana, ad margines foliata, coloris rubicundi, saporis acris: radix exigua, sed lignosa & fortis : hæc planta colitur in hortis ; variæ hujus plantæ dantur species ; flore albo vocatur flos keyri hortulanis, violettes ; vel est Narcisso Leucojum sive Leucojum bulbosum hexaphyllum, vel Leucojum bulbosum triphyllum, quasi planta ad Leucoium & Narcissum accedens. B. **Muur-violetten / muur-bloemen.** Gall. *Giroflier*, ou *Violier*. ex λευκὸν album & ἴον viola. à λευκὸν dealbo, propriè vocatur viola alba.

LEUCOLACHANUM, est olus album, sive Valeriana campestris, ex λευκὸν album & λάχανον olus.

LEUCOMA, est cicatrix vel macula opaca, alba in cornæ oculi tunica, ex incrassatis vasis per lamellas hujus tunicæ currentibus oriunda, à λευκὸν albus. B. **En wit lid-teiken op 't oog.** G. Ein maal, oder weisser fleck am auge. Gall. *Cicatrice blanche sur l'Oeil*. A. White scar in the horny micle of the eye.

LEUCOPHAGUM, fit ex amygdalis in aqua rosarum maceratis, & carne caponis vel perdicis elixa, tusa & per setaceum trajecta : usus est in phthisi. Ex λευκὸν album, & φάγω edo. B. **En wit toebereidsel.** G. Weiße huener bruehe. Gall. *Blanc manger*.

LEUCOPHLEGMATIA, est Anasarca pituitosa, sive hydrops per totius corporis ambitum, ex λευκὸν album, & φλέγμα pituita. B. **De witte zugt / sym-zugt / onge-daantheid.** G. Weitz-sucht, wasser-sucht. Gall. *Leucophlegmatie, Hydropisie*. A. Pituitous dropesie.

LEUCOPIPER, vide in *Piper*.

LEUCORRHOEA, vide *Fluor albus*.

LEVISTICUM, est planta, quæ habet caulem valdè altum, crassum, striatum, nodosum, excavatum, ramosum : folia Apii, sed majora, & ampliora, coloris virido fusci, splendentis, odoris penetrantis, non ingrati : flos est rosaceus, umbellatus, plurimis scilicet petalis constans, in orbem positus, & calici insidentibus : Is autem abit in fructum ex duobus seminibus compositum oblongis,

gis, crassiusculis, Apii semine majoribus, hinc gibbis & striatis inde verò planis, saporis acris, aromatici subdulcis, odoris fragrantis : radix oblonga, pollicari crassitie, in fibras crassiores divisa, foris fusca, intus pallida, saporis acris aromatici subdulcis, odoris jucundi & fragrantis, nonnullis gravis & molesti : quibusdam *Smyrnion* & *Ligusticum* vel *Laserpitium germanicum* : crescit in ea Apennini præcipuè parte, quæ Liguriæ imminet undè ei nomen : vel à levando, quòd à flatibus, levet. Gr. *Λιγυστικόν*, & *Λιβωστικόν*. B. *Λάβας*. G. Lieb stöckel, badkraut. Gall. *Livesche*, *Leveche*, *Ache de Montagne*. A. Louage, Alifander.

LEXIPYRETON. Vox apud Plinium & alios deinceps posita, denotat medicinam quæ febres fugat, à *λήγω* delino, *πυρετός*, febris.

LIBANOS & LIBANOTOS, undè *Olibanum*, sive *Thus*; sic dicitur à monte Syriæ, à *λίβω* vel *λείβω* stillo, quia ex arbore *Thurifera* lachrymæ stillant. Vide *Thus*.

LIBANOTIS, alii *Roremmarinum* vocant, nonnulli aliam herbam ex ferulaceis unam : dicitur, quòd *Radix Thus* : seu *olibanum* oleat. Vide *Libanos*, & *Rosmarinum*. Arab. *Elkialgebar*. A. Candy All heal.

LIBER, est vegetabilium pars corticis interior, quæ ligno pressius adhæret. Iis quibus scribimus fibris nomen dedit.

LIBRA, apud Medicos uncias duodecim pendet, apud mercatores sexdecim. Sumitur quandoque pro *Mina*. B. *Έρν* pond. G. Ein pfund. Gall. *Une Livre*. A. A Pound.

LIBURNUM, est *Liburnum*, sic fortè dictum à *Liburniæ* regione.

LICHEN, est musci viridis species : quæ in *Quercuum* truncis crescit, aliquando in lapidibus muscosis, hepaticam fontanam refert, sed est multo major : folia ejus sunt aspera, sicca, dura, coloris cinerei, punctis notata, lanuginosa in parte inferiori, quâ arbori adhærescunt, alba, fractu difficilia : sic appellatur, quod contra lichenes quo nomine vocantur omnes morbi cutanei, omnibus remediis antepōnatur, vel quoniam saxa, quibus adhæret, linguæ modo lambat, à *λήγω* lambo. *Hepaticam* quoque recentiores vocarunt, quod jecinorum fibris similis conspiciatur. B. *Heberkrupd* van de steenen of fonteynen.

G.

G. Leber-kraut, stein flechten. Gall. *Hepatique des bois ou herbes aux Pouxmons*. A. Liverwort, Stony or of the Fountain.

LICHEN, Barbaris *Serpigo* sive *Zerna*, *Haliabbas* vocat *Petiginem*, & *Sarpedinem*, vulgus appellat *Volaticam*. *Lichenes* sunt asperitates quædam cutis, & veluti tumores cum pruritu multo, ex quibus materia emanat. Gr. & Arab. duo fecerunt Lichenum genera, alterum benignum & mitem: alterum ferum. Atque secundum *Avicennam* alia humida, ex qua confricata manat ros; alia verò heca: atque humidam magis salvam esse; siccam verò fieri à pituita falsa conversa in humorem melancholicum. Et rursus scribit, aliam etiam Impetiginem excoriari ob vehementem siccitatem, & multitudinem profundationis; aliam verò non excoriari; & aliam esse ambulativam & malignam, aliam verò stantem. Alia etiam est antiqua, alia recens. Hinc liquet, Scabiem ipsius *Corn. Celsi* nihil aliud esse, quàm Lichenes ipsos Græcorum, & Impetiginem Arabum. Fit in toto corpore, sed præsertim in facie & mento, ut habet *Galenus*, est enim Lichen, *Inquit*, menti injucundissima affectio, quoniam pruriginem multam inducit, facit partium affectarum circumtensionem: periculosa est non parùm, proserpit per totam faciem, oculosque interdum contingit, & tandem etiam extremam foeditatem parit, *Lichen Græcorum* est *Impetigo Plinii*, sive inæqualitas cutis, cum insigni pruritu & pustulis siccis, ad vicina serpens & extendens. B. *De Hair-worm / Dzoog-kraussel*. G. Flechten, schwinden, zitter-maal. Gall. *Dartre*. A. Tetter, ringworme, wild fire. *Lichen* etiam callus in equorum pedibus dicitur.

LIEN, idem quod *Splen*.

LIENTERIA, est alvi fluxus, seu lævitas intestinorum, quâ alimenta cruda mutata parùm, vel separata, vel permixtis fæcibus excernuntur, ita tamen ut ab his ista dignoveris. Itaque alimenta non subsistunt in ventriculo, sed mox in alvum propelluntur, cum murmure aliquo, distensione, dolore & nausea. Hic verò fluxus diu perseverans, vires admodum frangit. Ex *λεῖον* leve, *έντερον* intestinum & *ρίον* fluo. B. *Spyg-loop / afgang van onverteerde spyg*. G. Der bauch-flusz. Gall. *Flux de Ventre*, *Lienterie*. A. The Flixe, laxæ, vel looseness of the belly.

LIGAMENTUM, Gr. *σάβδεσμος*, est pars solida, & admodum fibrosa, simili ferè cum cartilagine duritie, ex multis membranis sibi mutuo impositis & concretis ortum ducens, magnitudine, numero, situ, varia, lata vel rotunda, prout ad cartilaginis aut membranæ constitutionem accedit, sicciior aut humidior, durior aut mollior, minus, magisque lenta & flexilis, colligendis partibus, maximè ossibus, ad faciliorem motum destinatur. **B. Een band / been-band / geelhair.** G. Ein band, spannadern, sehnen. Gall. *Ligament.* A. Idem.

LIGAMENTUM CILIARE, oritur ex circumferentia uveæ tunicæ, ubi duplicata membrana ejus posterior se reflectit ad crystallinum, & constituit ligamentum illud seu *interstitium ciliare* dictum; quæ sunt tenuia quædam filamenta musculosa ex uvea producta, referentia lineas nigras, palpebrarum pilis similes, & vitreum humorem anteriùs protuberantem coercerent, crystallinum connectunt; quamvis autem hæc filamenta radiata & libera videantur, cum atrum ex oculo ablutum sit; tamen naturaliter adest membrana, quæ fibras has radiantes connectit inter se invicem; radii verò hi ex uvea, uti ex circumferentia emissi, coeùntes versùs crystallinum humorem, centrum quasi peterent; infinitis gaudent vasculis, tum per propriam substantiam currentibus, tum in spatiis intermediis luxuriantibus, & cum invicem communicantibus, quæ artificiosa anatomicorum injectio hoc tempore cum aliis claris inventis, in oculis balænarum, aliorum animalium, & dein in hominibus detexit: usum verò habere videntur, dum sphericè anteriùs protuberent, & posticè premantur extrorsum ab humore vitreo, ut dum se contrahant musculorum instar & quidem instar diaphragmatis, fiant filamenta hæc radiata planiora, adeoque comprimant Vitreum versùs posteriora, sed ille resistantiam multò majorem passus ob inflexiles ferè tunicas oculi ambientes. Scleroticam & Adnatam &c. fertur iterum versùs anteriora in Crystallinum, ubi minima est resistantia, adeoque Crystallini protuberantiam antrorsum conciliant. **B. Oog-hair gelphe band.** G. Der augen haarband. Gall. *Ligament Ciliaire.* A. The ciliar ligament.

LIGAMENTA UTERI, improprie dicta. Duo dicuntur rotunda sive teretia, instar lumbricorum. Oriuntur à

lateribus fundi uteri & in ossa pubis desinunt. Alterum par latum est & membranosum, vocanturque *Vespertilionum Ale.* Hæc habentur ad latera fundi. B. *De Moeder-banden.* G. Bänder der bärmutter. Gall. *Ligamens de la matrice.* A. The ligaments of the Womb.

LIGULA, quarta pars cyathi dicitur, hoc est, semiuncia, demptis sc. duobus scriptulis. Item *Clavicula.*

LIGUSTICUM, vide *Levisticum.*

LIGUSTRUM, est magna arbuscula, habens multos ramos longos, flexiles, cortice obductos cinereo, lignum est durum, & album: folia ex adverso per intervalla nascuntur, oblonga, angusta, falicem referentia, sed breviora & crassiora, atro virentia, splendentia, saporis acris, amaricantis, & parum adstringentis: flores monopetali, infundibuliformes, tetrapetaloidei, & pentapetaloidei, calici exiguo innitentes: ovarium in imo calicis fit fructus globosus, mollis, succo plenus, seminibusque fætus ut plurimum quaternis hinc gibbis, inde verò planis: Lignum hujus arboris est adstringens, hinc ejus decoctum in morbis oris, scorbuto, diarrhœa convenit: folia & flores similiter usurpantur in affectibus ubi adstringendum, ut in affectibus quibusdam uvulæ & oris; herniis infantum &c. derivant à lego, quasi *Legustrum*, vel an à ligando, quod sepius alligetur? B. *Liguster / mond-hout / keel-kruid / rhyndwylge / witte vilt-kruid.* G. Hartriegel, bein-holtz, rein-weiden, mund-holtz. Gall. *Troefne, Frefillon.* A. Privet, peyvét, privat, prim print.

LILIAGO, est Phalangium, quia flosculosos habet lilii in modum; est diminutivum à Liliū.

LILIASPHODELUS, est Hemerocallis; componitur vox ex Liliū & Asphodelus, vide suo loco.

LILIUM, est planta, quæ habet caulem duos vel tres pedes altum, rotundum, rectum: folia sunt longa, satis ampla, sine caule caulibus adhærentia, polita, splendentia, tenera, succum viscosum habentia: flos veluti campaniformis ex petalis sex compositus, nunc magis nunc minus repandis: pistillum abit in fructum oblongum, ut plurimum trigonum, in tria loculamenta divisum, seminibusque fætum quasi marginatis, gemina serie sibi incumbentibus: radix bulbosa, carnosis squammis constans, extrinsecus in orbem quasi sibi invicem appositis, intus alba,

alba, extùs parùm fusca, saporis mucilaginosi & lenti, odoris nullius : Gr. *κρίνον*, & *Λείριον*, unde fortè descendit *Lilium*, vel ab æqualitate & lævitate quasi *λείον εἶναι* pleonastico τοῦ λείρου *Lilium* dicitur, *κρίνον* à *κρίνειν*, quidam dici putant à pulchritudine & Majestate; quod cæteris floribus certet, judicium petat ac ferat. *Iridis* speciebus nomen illud *κρίνον* imponitur. Vide *Rosa Junonis*. B. *Æli*. G. *Lilie*, *gilgen*, *lilgen*. Gall. *Lys*. A. *Lilly*.

LILIUM CONVALLIUM, vide *Ephemerum*. Est planta, quæ habet folia *Lilii* vel *Plantaginis*, oblonga, fatiſ ampla, viridia, polita : Caulis est parvus, semipedem circiter altus, tenuis, angulosus, nudus; finis pedunculi fit flos monopetalus, campaniformis, exiguus, obrotundus, in quinque vel sex segmenta fissus, pendulus, spicatus, albus, odoris grati, saporis amari; ex apice pedunculi intra florem ovarium nascitur, quæ fit bacca mollis, subrotunda, rubicunda, continens semina dense congesta, rotundula, dura, amara : radix longa, parva, repens, alba : hæc planta crescit in sylvis & vallibus; hinc *Lilium* vocatur à similitudine foliorum & convallium, quia in vallibus crescit. B. *Wassbloemen / lelijes van den dale*. G. *Meyen-bluemlein*. Gall. *Muget*. A. *Lilly-convally*, *may-lilly*, *Conval-Lilly*.

LILIUM INTER SPINAS, est **CAPRIFOLIUM**, seu **MATRISYLVÆ**, sic dictum, quod inter virgulta *Sylvestria*, & *Spinas*, odore *Lilii albi*, crescat. B. *Geiten-blad / memmekens-fruid*. G. *Waldwinde*, *speck-lilien*. Gall. *Chevre-feuille*. A. *Wood-bind*, *Wood-bine*, *Wordt-binde*. I. *Vinci bosco*.

LIMATIO, est corporum duriorum mediante lima, tornove, in pulverem grossum redactio; locum quoque habet circa dentes acutos & ossa carie vel excreſcentiis infecta.

LIMODORUM, quasi famem causans, à *λίμὸς* fames, & *δῶρον* donum. Vide *Orobanche*.

LIMONIA MALUS, & **LIMONIUM**, folia flos, fructus ut citrei, sed caro tenuior longè quàm citrei, ipse fructus minor; cortex tenuior, pulpa copiosior, succus acidior; est citrei coloris fructus. Nomen videtur *Indicum*, ubi in utraque India à Lusitanis *Limmes*, & *Limmetics*. B. *Limoen*. G. *Limonien*. Gall. *Limonier*. A. *Lemons*, *Limons*.

LIMONADA, est species julepi, in quem limonum succus, cum saccharo ingreditur. B. *Limoen-dzant*.

LIMONIUM, est planta, quæ habet folia Lapathi minoræ, læviora, politioraque, minus atra, sed hilari virore tinctæ, ex radice erumpentia, caules ex his assurgunt pedem alti, nudi, tenues, in plures ramos extensi: flores sunt vel cariophyllæi, vel monopetali: calix sit vasculum feminale, quod unicum complectitur semen arctissimè, cum quo cadit: radix crassa, rubra, saporis adstringentis; in multis capitibus divisa: crescit hæc planta in locis aquosis & paludibus circa mare: herba Limonii adstringit, dicitur & Pyrola, seu Tintinnabulum, sed & nonnullis aliis herbis imponitur illud nomen, quod videtur, habere à *λεμών* pratum, palus, quasi à *λείω*, quia rigatur, vel à *λείπω*, quod in eo uligo ab alluente aqua relinquitur.

LINAMENTUM, idem quod *Motos*.

LINARIA, URINALIS, Gr. *ὀσυρίς* est herba quæ linum repræsentat, habet plures caules sesquipedem circiter altos, rotundos, tenues, quibus innascuntur plurima folia oblonga, angusta, nullo ordine posita, saporis amaricantis: flos est monopetalus, anomalus, personatus, & quidem ita ut posteriori parte longam gerat caudam, anteriori verò bilabiatus, & superior pars bifida, inferior trifida: calix flori ambiguo situ affigitur, quinquefidus: Pistillum floris abit in vasculum rotundum acuminatum, quod per maturitatem in duas cavitates dehiscit, in quibus semina sunt compressa, nigricantia, & rotunda: radix longa, dura, alba, repens, exigua, lignosa: Linaria à Lino quia ejus folia Linum referunt; quæ & Tithymalum Cyparissiam adeo mentiuntur, ut nisi lac deesset, difficile foret distinguere, antequam floreat planta. B. *Blas-kruud / wild-blas*. G. *Lein-kraut*, *harn-kraut*, *unser Frauenen flachs*, *wald-flachs*, *krotten-flachs*. Gall. *Linai-re*, *lin Sauvage*. A. *Wild-flax*, *Toad flax*, *linnet*.

LINCTUS, idem quod *Eclegma*.

LINEA ALBA, est tendinum quatuor muscutorum abdominis concursus exceptis rectorum tendinibus. Nam tendines obliquorum uniuntur, & ita coeunt ab utraque parte, ut quasi tunicam abdomini obductam forment, ac si unicus esset tendo. Alba est & carnis expers, procedens

dens à mucronata cartilagine ad os pubis, estque infra umbilicum angustior, quàm suprà. B. *De witte linie*. G. Die weisse linie. Gall. *La Ligne Blanche*. A. The White linie.

LINEÆ FATALES, sunt quædam rugæ in cute frontis, ex quibus multa quædam prædicunt inepti. B. *Doordzeggende spier*. G. Die linien im hande daraufz man wahr saget. Gall. *Lignes Fatales*. A. Fatall lin's.

LINGUA, est membrum in ore contentum, à lingen-
do dictum, oblongum, latum, crassum, & ad radicem
quidem crassius, in extremitate tenuius & acutius; magni-
tudo mediocris est, ut moveri expedite possit. In exteriori
linguæ parte, superiori sc. regione, copiosissima quæ-
dam corpora, serie quâdam disposita, ab extrema linguæ
superficie foras erumpunt, & modicè incurvata unanimi-
ter, versùs posteriorem linguæ partem inclinationem, po-
sitionemque habent, ita ut æmulentur pectinem carmina-
torium: hæc corpora cartilaginosa in bove præcipuè vi-
dentur eam referre figuram, quam in aprino dente; in par-
te inferiori concavitatem quandam exhibent; componun-
tur ex densa & tenaci materia, fibrosa, quæ quasi virgu-
larum aggeries videtur: circa linguæ latera gracilescunt,
ut ferè oblitterentur & in basi eorum loco membranosa
quædam corpora collocantur, quæ conum, mox obtusio-
rem papillam æmulantur: singula exposita cornua exte-
riori linguæ membrana investiuntur; firmiter implantan-
tur in tenaciori quadam linguæ tunica, & subjecta muco-
sa, seu nervosa substantia, iis præcipuè in locis, ubi in-
signes foveæ pari ordine expositæ observantur, ita ut in
parte interiori non exigua eorum portio emineat, quæ in
mucoso quodam corpore tenaciter implantantur. Membra-
na hæc totam investiens linguam in superiori ejusdem
area inserta, & convoluta habet exarata cornua, & qui-
bus in locis papillæ foras protuberant, attenuantur & gra-
cilescunt, & in minimæ cucurbitulæ figuram excavantur:
minimi in hoc tubere observantur poruli. Hæc detractâ
sefe offert glutinosa quædam substantia, & alba est ubi
nectitur. Membrana subnigra autem, ubi partem interio-
rem tangit, conspicua foramina singulis exaratis cornibus
respondentia habet; inter quæ innumeri & exigui meatus
ad extimam linguæ superficiem hiant. Deindè in conspe-

Etum sese offert nervosum & papillare corpus subflavum, quod membranæ instar excurrit, papillas etiam nerveas insignes miro ordine dispositas promit. Succedunt alterius ordinis papillæ copiosiores enarratis; quot enim cornuæ exterius linguam tegunt, tot etiam hujus generis nerveæ papillæ intus reperiuntur; hæ exortæ à communi papillari corpore, in mediocrem altitudinem elewantur, & ab extremo capite nerveas propagines ulterius emittunt, circa hæc conspiciuntur innumeræ papillæ idem exordium fortitæ & ad eandem altitudinem elevatæ, graciliores tamen, quæ coni figuram referentes, proprios sinus in jam exarata mucosa substantia excitatos subintrantes, tandem desinunt versùs extimam membranam. Porro linguæ substantia musculosa est. Centrum autem linguæ ex multiplici fibrarum genere constat, longis, transversis & obliquis, quæ identidem invicem per superequitationem intextæ colliguntur, ita ut fiat veluti tegmen: musculis peculiari-bus movetur, quibus retrahitur. Musculorum paria sunt *Styloglossum*, *Basioglossum*, *Genioglossum*, *Ceratoglossum* & *Myloglossum*. Gr. *Γλωσσα* & *Γλωττα*. B. *De tonge*. G. Die zunge. Gall. *La Langue*. A. A tonge.

LINGUA CANIS, vel CANINA, vide *Cynoglossa*.

LINIMENTUM, à LINIRE, est Medicamentum exter-num, consistentia inter oleum & unguentum media. B. *Smeering* / *strijking*. G. *Beschmierung*, *bestreichung*. Gall. *Liniment*, *Oignement*. A. Anointing.

LINUM, est planta, quæ habet caulem duos circiter pedes altum, exiguum, rotundum excavatum, in sum-mitate ramosum: folia sunt oblonga, angusta, ferè alter-na, acuta: calix oblongus & tubiformis: flos caryophyl-læus, cæruleus: flori succedit fructus pisi magnitudine, subrotundus, & acuminatus, continens in multis capsu-lis membranaceis multa semina oblonga, rotunda, com-pressa, in una parte magis acuta, lubrica, lucida, in me-dio tumida, medullam oleosam & mucilaginosam habentia, ex fusco cærulea: radix exigua. Gr. *Λινον*, dictum est propter corticis, & libri stammina, in recta filamenta di-velli scindique solita, quæ lina etiam vocantur; undè li-neæ & Libella, quæ directiones & parietum structuræ li-berantur. Vel deducunt à cymbrica voce *Ee* & *Lee* per conversionem nostram alterum alteri opponuntur: à *Lee*:

quo

quo molestum omne & displicens notatur, fit *Lin* longum, id est, patior, & *Lien*, pati, in modo infinito; hinc *Lin*, à quo *Linum*. B. *Linne-kruid* / *blas-kruid*. G. Flachs-kraut, flachs-lein. Gall. *Du Lin*. A. Flax.

LIPODERMUS, est vitium cuticulæ, glandem colis investientis, adeò ut non possit retrahi. Item præputii absentia, ex *λείπω* deficio, & *δέρμα* cutis.

LIPOPSYCHIA, est leve animi deliquium, sive virium prostratio, ex *λείπω* deficio, & *ψυχή* anima. B. *Gen flauwte*. G. Hertzangst. Gall. *Defaillance*. A. Feebleness.

LIPOTHYMIA, *Defectus animi*, *Defectio animæ*, *Deliquium animi*, *Λειποθυμία* Philoteo, *Λειποψυχία* Hippocr. sive insignis vivificationis læsio, quæ est magna virium omnium prostratio, ex sufficientis copię spirituum & caloris in cor aliasque partes, impulsorum defectu. Hæc si magna fuerit *Syncope* vocatur. Vide *Deliquium animi*. Ex *λείπω* deficio, & *θυμός* animus. B. *Gen qualikte* / *zwimeligheid*. G. Ohnmacht. Gall. *Pamoison*, *Defaillance*. A. Feebleness, Weakeness.

LIPPITUDO, est ophthalmiæ species, seu asperitas quædam intra oculos, ac si arena esset dispersa. B. *Ueepoogig*. G. Die entzündung der augen, das augentrieffen, augenflusz. Gall. *Chassie*, *mal des yeux quand ils pleurent & sont chassieux*. A. Blearedness.

LIPYRIA, est febris continua, in qua simul externa frigent & interna uruntur: sæpe contingit in inflammationibus ventriculi, hepatis, lienis, aliorumque viscerum, ex *λείπομαι* deficio, & *πῦρ* ignis. B. *Gen heete koude koofts*. G. Heitz kalte fieber. Gall. *Lipyrie*. A. Idem.

LIQUATIO, idem quod *Liquefactio*.

LIQUEFACTIO, est, quando oleosa, resinosa, ut pinguedines, cera, resina &c. super ignem lentè & integrè solvuntur, dicitur quoque de salibus, quæ, ut liquefiant, cellis committuntur.

LIQUID-AMBRA, sive **LIQUIDA AMBRA**, ob odoris suavitatem sic dicta. Resina est oleaginosa suavissimi ac gratissimi odoris, effluens ex arbore quadam procerâ ac venusta, foliis hederæ, *Ococol* dicta. Estque partim ficior, quod sedimentum forte est, quæ seorsim conservatur; partim tenuior ficiori supernatans. Alia quoque exprimitur, sed vilioris conditionis est: nascitur ista arbor in Hispania nova,

LIQUIRITIA, dicitur Glycyrrhiza ; sed potius dicere rem esse ejus succum expressum & inspissatum, quoniam à *liquore* derivari videtur. Vide *Glycyrrhiza*.

LIQUOR, quamvis de quolibet humore dici possit, in specie tamen denotat per deliquium paratum, quem oleum alias, nonnunquam Balsamum dicere solent. Sæpè & pro destillato liquore haberi potest.

LIQUOR AMNII, est qui in Amnio continetur, ibi perpetuò renovatur, nonnihil mucosus, seu oleosus, ferro-lactis haud absimilis, ad ignem tamen concreescens, ut albumen ovi, colliquamentum Harvæo dictum, cui factus quasi innatat, ipsi recens nato adhæret toto corpore, atque ab Obstetrice aqua tepida, paucò vino, similibusve abstergetur. Cæterum ab urinoso liquore, copia, sapore, odore, benè distinguendus, nec cum eo confundendus est, ille enim excrementitius est, hic verò fætui nutritium esse, verisimiliter conjicitur : 1º, quia tale liquidum in ore, Æsophago, ventriculo fætus reperitur, quale est in Amnio, 2º, quia illud liquidum copiosum in initio, paulatim minuitur, nec aliâ ratione consumi videtur, quàm à fætu.

LIRION, vide *Lilium*.

LITHANTRAX, sive Carbo fossilis, est bitumen pingue, glebis petrosis, aut & fortè metallorum scoriis mistum, durum, assulatum, lamellatum, nigrum, scissile, inflammabile. B. *Steenkoolen*. A. Ceale.

LITHARGYRIUM, officinis spumofum excrementum est, è purificatione argenti, quæ per plumbum fit, residuum. Duo ejus genera communiter statuuntur, videlicet *Argenteum*, quod coloris minus saturi, & *Aureum*, quod saturioris coloris, magis ad rubedinem vergentis, existit. Verùm tamen non nisi coctione differunt, *aureumque* magis coctum est, quàm *argenteum*. Sed propriè nihil aliud est quàm plumbum. B. *Glit / goud en zilberglit*. G. Gold glette. Gall. *Litharge*. A. Idem.

LITHIASIS, est calculi in renibus, vesica, aliisque in partibus generatio, à λίθιάω calculos patior, calculis laboro. B. *We sten*. G. Der stein. Gall. *Pierre*. A. The Stone.

LITHOIDES, est os petrosum, sic ob duritiem lapideam : appellatum, ex λίθος lapis, & ἰδος forma. B.

Het steen-bren. G. Das steinbein. Gall. *l'Os Petreux*. A. Thestony bone.

LITHONTRIPTICA, sunt medicamenta saxifraga, si-
ve quæ calculum Vesicæ urinariæ, vel renum frangunt,
conterunt, & ex corpore expellunt, ex $\lambda\theta\theta$ lapis, &
 $\pi\epsilon\iota\sigma\omega$. B. **Steen-breckende dingen.** G. Steinbrechende
mittel. Gall. *Remedes Lithontriptiques ou contre la Pier-*
re. Idem ferè A.

LITHOSPERMUM, est planta, quæ habet plures cau-
les duos pedes altos, quosdam rectos, alios incurvos,
villosos, tenues, rotundos, duos, asperos, in ramos di-
visos: folia vel alternatim disposita, vel sibi invicem op-
posita, longa, angusta, acuta, sine caule adhærentia, vil-
losa, saporis herbacei: flos monopetalus, infundibulifor-
mis: ex cujus calice quinquesido ad basin usque secto
furgit pistillum quod abit in quatuor semina, stridula,
dura, polita, minima, alba, splendentia, obrotunda, vel
ovalia: radix lignosa, fibrosa, digiti crassitie: crescit hæc
planta in locis incultis à $\lambda\theta\theta$ lapis & $\sigma\pi\epsilon\iota\sigma\omega$ semen, &
dicitur conducere in calculo renum: semina adeo benè
Margaritas referunt, ut, qui has vendunt, illa intermi-
sceant Margaritis Occidentalibus, quæ non tam elegantes
quàm Orientales, & sic eas divendunt pro puris Mar-
garitis Occidentalibus, sed fraus facilè detegitur ex macula
fulva his seminibus inhærens: sic vocatur ob semine du-
ritiem: Latinis *Milium Solis*, quòd semen ejus candore
solis & lucis splendore fulgeat. B. **Daardel-zaad / steen-**
zaad. G. Meer-hirfche, stein-saamen. Gall. *Gremil, Her-*
be aux Perles. A. Gromell, gromwel, graymil.

LITHOTOMIA, est chirurgica calculorum è vesica
sectio; quæ hoc modo procedit. Imponit Lithotomus
ægotantem alicujus robusti sinui, pulvinari molli infra-
to, postquam ter, quaterve ex loco altiori in inferiorem
profiliit; mox manum utrinque validè plantæ pedis alli-
gat, genua verò utrinque adstantes duo ministri detinent,
ita ut quam maximè à se invicem distent. Deindè pri-
mum sinistræ manus digitum solum, aut si necessitas exe-
gerit, duos priores oleo liliorum alborum madefacit, eos-
que in anum immittit, dextra verò pubis superiora leviter
comprimit, ut hoc modo ab ossè pubis ad perinæum trans-
feratur calculus, quem quum digitis dictis eo adegerit fi-

nistro lateri inter testiculos & anum, proximè ad futuram perinæ, cultro utrinque acuminato vulnus pro calculi magnitudine infligit, calculo tenus cultrum deducendo : & vulnere si suâ sponte, aut digitorum insertorum propulsione, exire detrectet calculus, forcipe, aut quod præstat cochleari sive lapidillo eum foras trahit. Extracto calculo, vinculis omnibus solutis, vulnus obligat modo debito, sanguinem sistentibus adhibitis mediis, brevique tempore, ut consolidetur curam adhibet, ne urinæ per locum vulneratum stillicidio laboret æger. Hic modus, *Apparatus minor* vocatur, & in pueris imprimis locum habet, licet sæpè in adultis hisce in regionibus instituitur. In *Apparatu majore* verò, æger eodem modo ut supra, benè ligatus mensæ imponitur, & in ea detinetur, mox *Itinerarium* per urethram in vesicam intromittit chirurgus usque ad calculum, factoque foramine, ut supra, in sulcum itinerarii per vulnus *Conductorem* immittit, deinde itinerario ex urethra ablato, per vulnus inflictum *Forcipem*, lapidillum, aut instrumentum aliud, detrahendo calculo accommodatum, immittit, quo sic & apprehendere calculum & foras educere queat. Hoc factò, deligatio vulneris & consolidatio instituitur ut in pueris; adhibita, si nimis magnum fuerit, futura, impositaque ad dies duos aut tres cannula argentea, evacuationi sanguinis concreti, pituitæ, urinæque arenosæ apta. Occurrit adhuc alius calculos extrahendi modus, nempe foramine in abdomine factò, calculus ex fundo vesicæ excinditur, & hoc modo nunquam stillicidium est expectandum, ex λίθου lapis, & τέμνω incido. B. *Steen-snyden*. G. Das stein-schneiden. Gall. *Lithotomie*, *Taille*, *Extraction de la pierre*. A. Cutting up of the stone or for the stone.

LITHOTOMUS, est chirurgus secandis calculis peritus, ex λίθου lapis, & τέμνω seco. B. *Een steen-snyder*. G. Ein steinschneider. Gall. *Lithotomiste*. A. A Stone Cutter.

LITUS, idem quod *Linimentum*.

LIVIDUS MUSCULUS, unâ cum aliis musculis femur movens, dicitur & *Pectineus*, qui ab ossis pubis superiore ad commissuram parte, oblique decurrens, usque in femoris exporrigitur latus externum. B. *De loodverwige spier*. G. Der bleyfarbige mause. Gall. *Muscle Pectiné*. A. Leaden Coloured muscle.

LIXIVIUM, est sal aquâ solutum : præparatur vulgò ex cineribus , ex quibus mediante aquâ sal, quod continent , elixiviatur. B. *Hoog*. G. Lauge. Gall. *Lessive*. A. Lee, Lie.

LIXIVUM SAL, est Alkali fixum, quod mediante aquâ ex cineribus , solutum , exsiccatum summas ignis torturas patitur , ut sal tartari , absinthii , &c. B. *Hoog-sout*. G. Laugen saltz. Gall. *Sel Lixiviel*. A. Lie.

LOBULI ADIPOSI, vide *Sacculi Adiposi*.

LOBULI PULMONUM, sunt fistulæ pulmonalis extremitates, quæ in Lobulos uniformes desinunt, constant-que iterum ex plurimis vesiculis & omnis generis vasis. B. *Longedzuiven*. Gall. *Lobules*.

LOBUS, est Phascolus : venit à *λόβω* seu *λαμβάνω* prehendo, quia fabæ in siliquisprehenduntur.

LOBUS AURIS, est appendicula quædam mollis, flexilis, blanda tactu, auriculæ appensa , nullo unquam foraminulo naturaliter pertusa , sed à fæminis artificialiter perforatur pro ornamentorum commissione , posita est directè infra antitragum , undè fæminarum ornamenta ellobia dicta. B. *Het selletjen van 't Oor / oorlapjen*. G. Das æusserste am ohr, ohr-læplein. Gall. *Le Lobe de l'Oreille*. A. The lobe or lap of the ear.

LOBUS HEPATIS, aut **PULMONIS**, sunt eorum viscerum magnæ divisiones, & distinctiones. B. *Quabbe*. Gall. *Les Lobes du Foye*.

LOCALIA MEDICAMENTA, sunt quæ externè applicantur, ut emplastra, linimenta, unguenta &c. Gr. *τοπικά*. B. *Plaats-middelen*. G. Aeusserlich gebræuliche mittlen. Gall. *Remedes Topiques*. A. Topical Remedies.

LOCH, & **LOCHOC**, idem quod *Eclegma*.

LOCH SANUM, & **EXPERTUM**, est Eclegmatis species, quæ in morbis pectoralibus utilis censebatur , & experta.

LOCHIA, sunt puerperarum expurgamenta , post fœtûs & secundinarum exclusionem, prodeuntia , à *λέχομαι* cubo ; undè *λέχθω* lectus , & *Λιψωίδες ὥραι* tempora partûs. B. *De kraam / kraamzuivering / reiniging*. G. Der blutflusz, blutreinigung. Gall. *Vuidanges*. A. Womans Evacuation in Child-bed.

LOCHOC, idem quod *Eclegma*.

Lo-

LOCI CHYMICI, dicuntur vasa & fornaces apud Chymicos usitata.

LOCI MULIEBRES, idem quod *Uterus*.

LOCULAMENTA, sunt in plantis seminum involu-
cra, quæ veluti parvæ capsulæ, ea occludunt.

LOCUSTÆ, THECÆ, idem ac oculi aut gemmæ,
uti in avena & graminum quibusdam speciebus, in qui-
bus semen includitur. Sed & insecta quædam denotat.

LOIMOGRAPHIA, est descriptio morborum conta-
gioforum. Ex λοιμός venenum pestiferum, & γράφω scri-
bo. B. *Gen beschryving van besmettelijke ziekten*.

LOIMOS, est venenum pestilentielle, quod oritur ex
aëre particulis heterogeneis exhalationum nostro corpori
non ferendarum inquinato & aculeato, qui, inspirando
sanguinem & spiritus animales &c. inficit, & corrumpit,
& movendo reliqua tenerrima solida destruit. Gr. λοιμός
παρὰ τὸ λείπειν, id est à deficiendo, quia hominum defe-
ctum inducit: seu ut aliis placet παρὰ τοῦ λιμῆ, à fame.
Undè proverbium Græcum, μετὰ λιμὲ λοιμός pestis post
fame. B. *Gen besmettelijke ziekte*. G. Eine anstecken-
de seuche. Gall. *Maladie contagieuse*. A. Pestilent poyson.

LOMENTUM, fabarum farina est.

LONGHITIS, est plantæ genus foliis filicis foliorum
æmulis, à quibus tamen differt pinnulis ad exortum auri-
tis: nullos habet flores: folia ad dorsum sunt instructa
seminibus rubicundis, tam parvis, ut sine microscopio
distingui non possint: in montibus altis, asperisque oc-
currit: dictam volunt ab hastæ, ceu lanceæ forma, quam
tamen in hac planta observare nequeo; nisi placeat singu-
laria lanceæ similia esse quod τρίγωνα triangula appareant,
λόγχι enim est lancea seu hasta. Dioscorides Etymologiam
quærit à semine triangulo, quod lanceæ cuspidi simile sit:
alii quod sit lonchitis altera & lienem absumat, foliaque
similia habeat, alii quod ejus folia instar lanceæ in acutum
desinant. Gall. *Lonkite*. A. Rough spleen-wort.

LONGANON, sive intestinum ultimum, item Ἀπεν-
θυσμένον, Δακτύλιος, Ἀρχὸς Hippocrati, vide *Rectum in-*
testinum.

LONGISSIMUS DORSI MUSCULUS, producitur
à margine ossi sacri, atque à lumborum vertebriis oriun-
dus fibrarum fasciculis coagmentatus, cum serrato postico

co inferiore ascendit, quem circa dorſi vertebram inferiorem deferens, ſingulis lumborum ac dorſi tranſverſis proceſſibus alligatus, primam thoracis petit vertebram; Thoracem, lumbos eorumque vertebraſ extendit. B. *De langſte rug-ſpier.* G. Der lange ruck mauſz. Gall. *Le Long Dorſal.* A. The Long muſcle of the back.

LOPIDOIDES, idem quod *Lepidoides*.

LORDOSIS, eſt ſpinæ dorſi in anteriora curvatio, à *λρδός* in anteriora curvo. Latini vocant *Repanum*, *Recurvationem*. B. *Bultagtig na vooren toe.* G. Krummhælicht, vorgebogen. Gall. *Boſſe en devant.* A. Bending of the backbone forward.

LORICATIO, eſt actio chemica, quando retorta igni nudo exponenda luto, argilla, aut alia materia, ut à nimia ignis tortura defendatur, obducitur. B. *En behar naſſing.* G. Das kleben und tuenchen der retorten. Gall. *Lutter les vaiſſeaux ou les Retortes lors qu'on veut diſtiller.* A. Lorication.

LORIPES, eſt qui alterum vel ambos pedes habet contortos & incurvatos, dicitur quoque *Varus*. B. *Scheef-been / ſlim-boet / krom-been.* G. Krum fuſz, krum-bein. Gall. *Qui a la jambe tortue.* A. Crooked legged.

LOTIO, eſt quodammodo Balneum particulare quo caput, axillæ, manus pedes & genitalia abluuntur, idque decoctis medicamentofis. Lavantur etiam nonnulla medicamenta, idque propter eorum falſedinem & acrimoniam, ut in calce, tutia, aliisque lapidibus contingit, vel quando herbæ, radices fordibus argillaceis & arenofis aquâ purâ, aut vermes vino lavantur. B. *Waſſinge.* G. Das waſchen. Gall. *Lotion, Bain.* A. A Waſhing.

LOTIUM, vide *Uron*.

LOTUS, eſt vel arbor, vel herba, nomen accepit à voluptate, ab antiquo verbo *λω*, quod ſignificat *θελω, ἐπιθυμῶ βλέπω*, volo, expeto, deſidero, video. Illud nomen etiam habet *Trifolium Odoratum*, ut & *Melilotus*, aliæque plantæ.

LOZANGIÆ, ſunt idem quod *Morſuli*.

LUES MORAVICA, ſeu **PANNONICA**, vide *Febriſ Ungarica*.

LUES, VENEREA, *Morbus Gallicus, Italicus, Hiſpanicus, Siphylis Fracaſtor.* παρὰ τὸ σiveν τὰ φῦλα. Hic mor-

morbus ex India occidentali oriundus, in Europam transfusus, post annum 1463. innotescere incepit; est hic autem contagiosus, ita ut ab infectis parentibus inquinati nascantur infantes; Lactatione contaminentur, contrectatione, salivæ per oscula communicatæ deglutitione, sudore, & coitu impurorum quilibet inficiatur: quæ autem pars primo fuit infecta, primò se manifestat inflammatione, ulcere erodente, dein per totum corpus efflorescunt pustulæ; labia, gingivæ, palatum, nares eroduntur, dolores nocturni circa medios artus fiunt ingentes, & articularum rigiditas, capillorum totius corporis defluvium, & vox rauca cum aliis multis symptomatibus hunc morbum declarant. B. *De spaanse pokken.* G. Frantzosen, Spanische kranckheit. Gall. *Véroles* A. Pockes, the French pockes. Dolores circa ossa vocant Hispan. & Brasilian. *Bubas.*

L U J U L A, est acetosellæ species, in officinis asservata, cujus vires refrigerantes insignes. B. *Schaapszuuring.* G. Buchampffer. Gall. *Pain à Concou*; *Alleluia.* A. Woodforrel.

L U M B A G O, est dolor in musculis lumborum à lue scorbutica obsessis, ita ut æger sese movere absque dolore magno nequeuns, se recto situ tenere cogatur. B. *Lende-pijn / 't spit / lende-git.* G. Lendenwehe, Lendenpein. Gall. *Sciaticque.* A. The paine of the loines.

L U M B R I C A L E S M U S C U L I, sive **V E R M I C U L A R E S**, sunt quatuor in singulis manibus, totidemque in pedibus, sic ob exilitatem & figuram dicuntur. B. *De wormgelyken spieren.* G. Der wurmgleyche mause. Gall. *Muscles Lumbricaux.* A. Worm like muscles.

L U M B R I C I, sive **V E R M E S**, sunt animalcula ex ovulis insectorum deglutitis cum cibis, in corpore nostro aliquandiu morantibus, producta. B. *Wormen.* G. Wuermer. Gall. *Vers.* A. Wormes. Alii sunt *Rotundi.* B. *Ronde wormen.* G. Spuhlwuermer, kinder wuermer. Gall. *Vers Ronds.* Alii, Cucurbitæ seminis formâ, Cucurbitini dicti. Alii *Ascarides.* B. *Maepen.* G. Wurmlein. Alii *Dracunculi*, &c. Gall. *Ascarides, vers Cucurbitins.*

L U M B U S & **L U M B I**, Gr. *ὄσφυς, ὀσφύς, ἰζύς.* Propriè dicitur pars totius spinæ infra dorsum quinque vertebri omnium crassissimis, maximisque compacta, inter dorsum &

& os sacrum mediis; estque ea regio corporis, quâ homines cinguntur. B. *De lenden*. G. Die lenden. Gall. *Les Lombes, les Reins*. A. The loine, the Reine.

LUNA, Chymicis denotat *Argentum*. B. *Zilber*. G. Silber. Gall. *Argent*. A. Silver.

LUNARIA, live viola latifolia, vulgò *Bulbonac*: est planta, quæ habet caulem duos vel tres pedes altum, minimi digiti crassitie, ramosum, villosum, coloris cærulei vel rubicundi; folia urticæ interdum duplo vel triplo majora, villosa, dentata: flores in summitate ramorum crescentes, quadrifidi, in crucem dispositi, purpurei, odoris non penetrantis: flori succedit siliqua oblonga, compressa, obrotunda, quæ continet semina ampla, reniformia, coloris rubicundi, saporis acris cum quadam amaritudine: radix glandulosa: sic dicta est quod seminum folliculi lunarem colorem & figuram habent. B. *Pennig-bloemen/maan-kruud/ paas-bloemen*. G. Mond-kraut, pfennig-kraut. Gall. *Lunaire, ou Bulbonac*.

LUNATICI, dicuntur Epileptici, Σεληνιακός, quia mutato lunæ cursu, Epilepticis paroxysmus exacerbatur. B. *Maanziekte*. G. Monfuechtig. Gall. *Lunatiques*. A. Lunatikes.

LUPARIA, vide *Lycostonon*.

LUPIA, est tumor sive protuberantia, fabæ turcicæ magnitudine, durus, glandulosus in cute; quidam pro *Meliceride* accipiunt, alii pro *Ganglione*.

LUPINASTER, est novum Plantæ genus, à Buxbaum inventum, crescit ad ripas Wolgæ propè Astrakan: habet folia instar Lupini digitata, flores papilionaceos, semina reniformia: describitur in commentariis petropolit. vol. 2.

LUPINUS, Est planta, quæ habet caulem duos pedes altum, mediocriter crassum, rotundum, rectum, villosum, ramosum, coloris viridis subflavescentis, medulla repletum: folia sunt in septem vel octo partes divisa, oblonga, angusta, manum apertam repræsentantia, superius coloris cærulei, albescentia & lanuginosa inferius, saporis leguminosi, amarescentis: flores in summitate ramorum crescentes, in spicas congesti, leguminosi, albi, pedunculis brevibus adhærentes: flori succedit siliqua compressa, villosa, turgidula, fæta seminibus planis, compressis in complanatam figuram sphaericam, fossulam ca-

vam utrinque habentibus, extùs albis, intùs medulla flavâ aurei coloris repletis; hujus sâpor est amarus, ingratus: ex hac medulla confecere olim aurum comicum, & de homine qui omnium rerum expertus erat, proverbialiter dicebatur; nescit quam distent æra Lupinis: est leguminum species, dicitur, quod sicut lupus terram appetit & in eâ me terrâ vescitur, ita Lupinus; adeò tellurem amat, ne quamvis fructuoso solo conjectum, inter folia, vepresque, ad terram tamen radice perveniat. Vel dicitur, quasi lupis relictus & expositus: quod impunè præterea jacet, vel derelictus etiam, si non protinus sicut obruant imbres, ab omnibus animalibus amaritudine suâ tutus. Gr. *ὀλκιστος*. B. *Bohs-boon* *vyg-boonen*. G. Feig-bohnen, wolffs-bohnen Gall. *Lupin*. A. Lupines.

LUPINUS, Gr. *ὀλκιστος*, dimidiæ drachmæ æquatur. *Danich* Arabibus: quod tamen *Fernelio* solum. Gr. VI. *Agricolæ* & *Mercurialis* VIII. sive tertiam scrupuli partem pendet. *Drachma* pendet lupinos novem: *Siliqua* dimidium; lupini tres scrupulum pendent. B. *En half vierrendeel lootg*. G. Ein halb quintlein. Gall. *Demi drachme*. A. Half dram.

LUPULUS, Est planta, cujus caules sunt exigui, sarmentosi, flexiles, villosi, scandentes, asperi, volubiles: folia ampla, angulosâ, dentata, scabra, conjugata, caulibus satis longis & rubicundis adhærentia: flosculi apertali, albi pallidi, aut herbacei, staminibus præditi, calice quinque partito, stellatim expanso, excepti, racemosi in una planta: ovaria bicornia, in racemos squamosos ex multis foliolis axi adnatis compositos, congesta; singulis foliolis recondentibus singula semina ferè rotunda; nigricantia, tegmine membranaceo occultata; radix tenuis, convoluta: Gr. *Βρύων*; dicitur à Bryoniæ similitudine, quam folia quodammodo habent. Appellatur quoque *Humulus*. Aliquot Italiæ rura, ob græcam appellationem alludentes, *Bruscandulam*, quasi Bryon Scandile nominant. *Lupus* verò *Salicarius*, quia subit scanditque salices, & arbuta omnia, circumvolvendo se, circumplectitur, appellatus est. Hinc quoque *Lupus Receptitius* nonnullis nominatur. B. *Hop*. G. Hopfen. Gall. *Houblon*. A. Hops.

LUPUS, est species cancri, crura & tibias occupans. B. *De wolf*. G. Der wolff. Gall. *Le loup, ou le chancre aux jambes*. A. The wolfe.

LUPUS

LUPUS RECEPTITIUS, vide *Lupulus*.

LUPUS SALICTARIUS, vide *Lupulus*.

LUTATIO, est vasorum chymicorum lutatio sive ob-
signatio. B. *Œen toelpluing / een verzegeling*. G. Verlu-
tierung. Gall. *Luter*. A. Idem.

LUTEOLA, est planta, quæ habet folia ex radice
erumpentia, oblonga, angusta, mollia, caules ex his erum-
punt tres pedes alti, duri, virides, ramosi, folia superius mi-
nora habentes, quàm sunt inferiora: flores polypetali, ano-
mali, exigui, coloris flavi, post florem sequitur capsula
obrotunda, triangularis, continens semina exigua, obro-
tunda, & nigricantia: radix ut plurimum digiti minimi
crassitie, & interdum pollicis, lignosa, alba, saporis acris:
tota hæc planta per siccitatem fit flava herba, sic dicta,
quod eâ panni & telæ linteæ, candidæ quidem, colore
luteo, virente verò, quum ante cæruleo tinctæ erant, in-
ficiantur. Gall. *Gaude; ou Herbe jaune*.

LUTUM, Herba est, quo lintea, lanæ &c. luteo infi-
ciuntur colore: vel ut alii, quodd à luto veniat luteus co-
lor. Aliorum opinio est vocem Lutum à Gr. *Λευκόν* venire
Leutum, Lutum. B. *Woume*. G. Streich-kraut. A. Dyers
Woad.

LUTUM, est materia quædam glutinosa, aquâ subactâ,
ut Farina triticea, fæcalicea, lini seminis, amyllum, ovi
albumen & similia, quâ vasa destillatoria sibi imposita, ne
quid expiret per rimas, probè obsignantur. B. *Leim*. G.
Leim. Gall. *Lut, Glu*. A. A Lute.

LUXATIO, seu DISLOCATIO, & ELUXATIO, est
recessus ossis è proprio sinu & loco, in alienam sedem,
motum arbitrarium impediens. B. *Ontwichting / uitle-
ding*. G. Aufz dem gliedern, oder gelencke gegangen,
verrenckung. Gall. *Luxation, Dislocation*. A. A Disjoin-
ting.

LUZ, an sit os vertebrarum, an verò sesamoideum in
pede dubitatur.

LYCANCHE, est angina, quæ lupos strangulat, vide
Angina.

LYCANTHROPIA, est *Rabies Hydrophobica*, à rabi-
do lupo excitata, in qua homines luporum ululatus imi-
tantur, ex *λύκος* lupo, & *άνθρωπος* homo. Vide *Hydro-
phobia*. B. *Wolfs-beet*. G. Wolffs-bisz. Gall. *Marjure de
Loup*. A. Biting of a mad Wolfe. L. l L. y.

LYCHNIS, est planta, quæ plures habet caules sesquipedem vel duos pedes altos, rectos, rotundos, ramosos, lanuginosos: folia sunt tres vel quatuor digitos longa, sesquidigitum lata, salvia majora, acuta, lanuginosa, alba, conjugata bina simul, mollia: calicem habet tubulosum magnum, latum, longum, multifidum, magis bulbosum quam in Alfinis, squamosum: flos cariophyllæus; floris pistillum sit fructus, ut plurimum in conum desinens, qui per maturitatem apice dehiscens fundit semina exigua, subrotunda, vel angulata, interdum reniformia; radix fibrosa, simplex: colitur hæc planta in hortis: nomen accepisse contendunt *παρὰ τὸ λύνει νύχτον*, ἢ γινε σκοτεινόν, quod *Tenebras* solvat: vel, quod tomentosis earum foliis Veteres ad lucernarum usum, pro elychniis uterentur, unde *Lucernula* dicta, ejus nominis sunt variae species. B. *Christus oogen*. G. Frauen-rœslein. Gall. *Oeillets de Dieu; Passe fleur, Passeroses*. A. Rose Campion.

LYCIUM, est arbuscula spinosa, sic dicta, quod in Lycia, Asiæ regione, crescat. B. *Βόξ-δοξιν*. A. Box-Thorn.

LYCIUM, est succus extractus & coquendo inspissatus ex ramis ac caudice arboris pyxyacanthæ sive Lycii, sed cujus sit succus varii dubitant. Provenit in variis locis, uti in India, Hispania, Creta, Capadocia, Lycia, unde nomen, &c. Est medicamentum astringens.

LYCOCTONUM ACONITUM, ACONITUM PONTICUM, LUPARIA, LUPICIDA, vel **CÆNICIDA**, quoniam ab iis devoratum, eos confestim interficit, ex *λύκος* lupus & *κτείνω* occido. B. *Wolfs-wortel*. G. Wolffswurtz, wolfs-kraut, giffit-kraut. Gall. *Aconit, tue loup, tue loup jaulne*. A. Wolfes Baine.

LYCOIDES, est infania luporum instar, à femine retento, excitata, ex *λύκος* lupus, & *ἰδέω* forma. B. *Wolfs-gebeer*. G. Wolffs-geberden. Gall. *Geste de Loup*. A. Gesture of the Wolfe.

LYCOPODIUM, est musci species, Latinis à similitudine *Pes Lupi* dicitur, ex *λύκος* lupus & *πῆς* pes. B. *Wolfs-klauw*. G. Gurtel-kraut, teussel-klaui, bærlapp. Gall. *Pied de Loup, Mouffe terrestre*. A. Wolf-claw.

LYCOPSIS, seu **ANCHUSA**, vocari volunt ob radicis fuscum ex purpureo colorem: vel quasi *κυκνώφως* vocatur

tur à lupo, cujus color cinereus est, nigrorem præferens, sed non intensiorem. Sonat enim *Λύκεψις* lupi faciem, aspectumve, vel nomen accepit, ab hispida caulis, florum, foliorum, impexaque hirsutie, pedem lupinum imitata, sed *λυκοπύς* tunc dicendum foret, ex *λύκος* Lupus & *ψις* visus. Illud nomen Anchusæ, & Buglossæ imponitur. A. Wall-Bugloss.

LYGMUS, idem quod *Lynx* & *Singultus*.

LYMPHA, est humor lymphidus leviter falsus, igne avolans, fluens in vasis arteriosis minoribus, ortis lateraliter ab arteriis majoribus sanguineis vel serosis, quæque vasa tandem desinunt in Venas Lymphaticas valvulosas, exonerantes sese, quæ ab inferioribus partibus veniunt, in ductum chyli ferum, quæ à superioribus in venam subclaviam: differt à sero sanguinis, quod est minus pellucidum, flavius, & igne concrefcit ut ovi albumen. B. Water. G. Wasser. Gall. *La Lympe*. A. Water. Sumitur aliquando pro aqua illa, quæ ex puncturis nervorum aliisque vulneribus effluit. B. *Zenuw-water* / *Lee-water*. G. Glied-wasser. Gall. *Synovie*. A. The Lympha.

LYMPHATICA VASA, vide *Vena Lymphaticæ*.

LYNX, idem quod *Singultus*.

LYNCIS LAPIS, sive BELEMNITES, ἀπὸ τοῦ βέλους à sagitta, cujus effigiem refert, seu *Dactylus Idaeus*, à figura Dactyli, & Ida monte cretæ Insulæ, ubi invenitur. Teres est & pyramidalis, sub variis coloribus repertus. Inveniuntur albi, nigri, cinerei, pellucidi, vini salerni instar. Et hinc forsan est, quem Veteres *Lyncurium* appellarunt, quem & succini speciem fecerunt, ob colorem, quo succinum refert, quemque ex urina lyncis, simul ac ea excernitur, coagulari, nonnulli fabulantur. Vetus hic lapis grave olet, & ne ustus quidem odorem deponit. Reperiuntur multis in locis Germaniæ, in Borussia, Pomeria, Episcopatu Hildesensi, Helvetia, Ducatu Wurtembergensi, Goppingæ. In affectibus nephriticis præscribitur. B. *Wunder-steen* / *lynx-steen*. G. Albschoßz, schoßstein, luchs stein, tappen stein. (si niger sit.) Gall. *La Pierre de Lynx*. A. Lyncian stone.

LYNGODES FEBRIS, est, quæ singultum habet comitem, à *λύζω* singultio.

LYSIMACHIA, seu LYSIMACHIUM, & SALICARIA,

RIA, est planta, quæ habet plures caules duos vel tres pedes altos, rectos, villosos, nodosos; ex singulis nodis erumpunt tria vel quatuor folia oblonga, acuta, falicis latifoliæ similia, supernè atro virentia, infernè albicantia, & lanuginosa saporis adstringentis, flos monopetalus, rosaceus, in quinque lacinias divisus: post singulos flores pistillum fit fructus seu testa globosa quæ per maturitatem apice dehiscit, semen excutit: semina sunt Coriandri saporis adstringentis: radix est repens, rubicunda: crescit hæc planta in paludibus, & locis aquosis: flos convenit cum Blattaria, sed fructus in hac est bicapsularis, cum in *Lysimachia* sit tantum unicapsularis: appellata, ut ferunt, ab ejus inventore *Lysimacho*: vel *παρὰ τὸ λύειν τὴν μάχην*, quod pugnam & animalium certamen verberando solvat, dirimatque. *Salicaria* vocatur, quod inter folia falicis, aut inter salices nascatur. Hujus sunt variæ species. *B. Wedzeich / vederik / joden-kruud*. *G. Weyderich*. *Gall. Soucy d'Eau, Perce-bosse, Corneille, Lysmachie, Chasse-bosse*. *A. Loofse strife*.

LYTERIA, est signum solutionis magni morbi, ἀλύειν solvo.

M.

M Simplex in præscribendis formulis positum immediate post alicujus herbæ nomen, denotat *Manipulum*, scribitur sæpè tribus literis ut *Man*. In fine formularum significat *Misce*.

MACERATIO, est species infusionis, quando dura quædam corpora in aqua, aliove liquore, mediante frigore aut calore infunduntur per magnum temporis spatium, ut partes emolliantur, & ab aqua penetrentur; cum illa misceantur, vel aptæ evadant miscelæ si decoquantur; omnia enim hoc modo magis aperiuntur. *B. Weisking*. *G. Das einwæßlern*. *Gall. Maceration*. *A. Idem*.

MACHINA, est in medicina instrumentum aliquod grande, cujus ope magnus motus in resistens parvâ vi potentiae applicatæ potest excitari, uti scamnum, scala, Ambæ, &c. quibus membra luxata restitui solent, dum enim luxatio plerumque plurium hominum vi & operâ indigeat in restitutione, ope artificiosarum machinarum, in hos usus accommodatarum, chirurgus solus omnium aliorum

viri-

viribus satisfacit. Gr. *Μηχανή*, *Μηχάνημα*. B. *Werktuig*. G. Eine ruestung, werckzeug. Gall. *Machine*, *Instrument*. A. An Engine.

MACIS, quid sit, vide *Moschata Nux*. B. *Joelp / bloem van notemoscaat*. G. Muschatblum. Gall. *Le Macis*, *Ecorce ou ce qu'on appelle improprement Fleur de Muscade*. A. Mace. *Macer Veterum*, est ligni cujusdam cortex lignosus, crassius, rubescens ex Barbaria afferri solitus, gustu valdè amarus & astringens, adeòque differt à maci, quamquàm interdum à modernis confundantur. Est & genus maceris Insularum orientalium, quod forsan idem cum Veterum maci.

MACROCEPHALOS, sive **CAPITO**, est is, qui magnum habet caput, ex *μακρὴ* magna, & *κεφαλὴ* caput. B. *Grootkops*. G. Ein grofzkopff. Gall. *Qui à une grosse tête*. A. Great headed.

MACROCOSMUS, denotat mundum universum, sicuti homo *Microcosmus*, sive minor mundus in comparatione, ex *μακρὸς* magnus, & *κόσμος* mundus. B. *De groote waereld*. G. Die grofse welt. Gall. *l'Univers*. A. The great world.

MACROPIPER, est piper longum, vide *Piper*.

MACULA EPATICA, est macula fusci coloris, vel ex flavo nigricantis, latâ palmi magnitudine, inguina imprimis & pecten ac dorsum occupans, imò totum pectus interdum obtegens, cum cutis quadam levi asperitate, quæ squammas aut furfures quasi emittit, quæ tamen non uno loco hærent, sed hinc indè disseminantur, & modò evanescunt, modò rursum emergunt. B. *Leber-blekken*. G. Leber-flecken. Gall. *Taches du Foye*. A. The Liver spots.

MACULA MATRICALIS, *Nævus Cic*. Gr. *κηλὶς*, *Στίλβωμα*, *Στίλβω*, est macula, quæ cum foetu nascitur, obfusci coloris, constanter locum suum occupans; quæ tamen indifferenter per totam cutim spargitur, uti est in facie, manibus, dorso &c. aliquando rei alicujus imaginem exprimens, ut muris, mori, suberis &c. B. *Mutter-maal / blekke*. G. Mutter-maal, mutter-flecken. Gall. *Tache qu'on apporte en naissant*. A. The mother spot.

MACULA VOLATICA, est macula rubra, vel purpurea in cute hinc indè serpens, quæ si orificium aliquod, os puta, nares, oculos, aures, nates attingit, & eousque

penetret, malum lethale fit, infantibus infestum. B. *Kooz de-vlek*. G. Rothe flecken. Gall. *Tache Volante*. A. Fyling spot.

MADAROSIS, est capitis glabrities, five capillorum desluvium, à *μαδάω* lævis & depilis sum. B. *uitruzen des hairg* / *het uitvallen des hairg*. G. Das ausfallen des haars. Gall. *La Pelade*. A. A Baldness of the head.

MAGDALEONES, sunt cylindraceæ emplastrorum vel aliarum rerum massæ, à *μάδω* pinso. B. *Een rolle zalf*. G. Ein stuecke pflaster. Gall. *Une Rouë d'Emplastre*. A. Masses of plaister made up inform of a cylinder.

MAGISTERIUM, pulverem designat propriè solutione ac præparatione paratum, impropriè resinofam materiam simili modo productam, utpotè quæ verius Extracti nomine donatur. Magisteria ut varia sunt, ita & variè parantur, semper materiæ siccæ, si fieri potest pulverisatæ, aut si necessarium, calcinatæ, affuditur liquor solvens, qui pro diversitate ejus diversus est, acetum simplex aut destillatum, tum per se, tum acuatum per spiritum nitri, vitrioli, falis &c. Imò hæc sola in mineralibus & animalibus; lixivium ex sale tartari, & aqua paratum in vegetabilibus, spiritus vini in his sulphureis, hoc est, oleosâ parte præditis, hæc tamen magis ad extracta spectant. Solutio affunditur liquor præcipationem efficere valens, ex specialibus cognoscendus, ferè ol. tart. per deliquium, urina, aqua falsa, spir. vitrioli, nitri &c. In mineralibus & animalibus, aqua communis, aut aluminosa in vegetabilibus & secedet ad fundum vitri Coagulum exsiccandum, & si necessitas urgeat primùm edulcorandum, postea igniendum. B. *Meester-poeder*. G. Meister pulver. Gall. *Magistere*. A. A Magistery.

MAGISTRALIA MEDICAMENTA, sunt, quæ à Medicis ad varios scopos & usus in officinis præscribi solent, *Usualia* vulgò appellantur, quia eorum usus frequens esse debet, semel sc. in septimana, vel bis in mense. B. *Meester-stukken*. G. Sehr gebräuchliche mittlen. Gall. *Remedes magistraux*. A. Magistrals remedies.

MAGMA, spissum unguentum est; sed dicuntur quoque fæces post succorum expressionem, aut decoctionem, relictæ, à *μάδω* pinso, subigo. B. *De vuilgheid*. G. Unflat, dicke so sich auff den grund setzt. Gall. *Le Marc*. A. Dregs.

MAGNA

MAGNA ARTERIA, idem quod *Aorta*.

MAGNES, est lapis, polos mundi ostendens, ferrum, chalybemque, arenam Italicam & Indicam, aliaque corpora, attrahens, præsertim ferreo circulo armatus. Plerumque duobus locis polaribus maximarum virium gaudens. Reperitur circa ferri fodinas in diversis Germaniæ, Norvegiæ, Sueciæ, & Italiæ locis. Vegetior plerumque cæteris esse solet, qui ferri colorem rufescentem habet. Ingreditur quibusdam emplastris, ut ferrum ex vulneribus attrahatur, sed frustra, cum magnes pulverisatus, & præsertim ustus, vires suas magnâ parte amittat, saltem non ostendit. Sanguinem quoque sistit. Gr. *Λιθὸν Μαγνήτις* & *Ηράκλειος*, dicitur & Sideritis. B. *Magneet-steen* / *Zeil-steen* / quia nautæ acu versatili, super eo ducto, utuntur. G. *Magnet-stein*. Gall. *Aimant*. A. *Load-stone*.

MAJORANA, est planta, quæ habet plures parvos caules pedem circiter altos, lignosos, ramosos, tenues, parum villosos, & rubicundos : folia sibi invicem apposita, obrotunda, minima, origanum vulgare referentia, sed multò minora, mollia, albescentia, odoris aromatici penetrantis & grati, saporis parum acris & amari : flores in summitate caulium crescentes, congesti in spicas, aut capitula rotunda, densa, breviora origano, conflata ex quaternis foliorum squammatim sibi mutuo incumbentium ordine, galea erecta, bifida : flori succedunt semina obrotunda, odorata, minima, amara, coloris rufi : radix minima. *Σάμψυχον* vel *Ἀμάρακον* Gr. dictam volunt, quod majori curâ, diligentiaque, quàm cæteræ colatur : malunt alii eandem Majoranam Marum, & Maro nomen inditum contendunt, fortè Majorana diminutivum à Maro erit ; cum dicitur & Amaracus, volunt illam derivari ex à privatus & *μαραίνω*, quia hæc planta non facîle marcescit. B. *Majolein*. G. *Majoran*, *maſeran*, *waſoran*, *weyeran*. Gall. *Marjolaine*. A. *Majoram*.

MALA, seu **GENA**, est illa pars faciei, quæ est infra oculos & supra maxillam inferiorem, sic dicta ob protuberantiam, quando os aëre vel alio liquido impletur. B. *De mange* / *de hoon*. G. *Wangen*, *backen*. Gall. *La joue*. A. *A cheek*.

MALABATRUM, ab *Acosta* delineatum, cinamomi ramus cum baccis & foliis mihi esse videtur, convenit enim

cum folio, quod servo, & fortè eadem res erit. Scriptores tamen non conveniunt. *Dioscorides* folia hæc in aquis crescere locis aquisque innatare scribit, ut lens palustris. *Garcias ab Orto* ut & alii scriptores esse folia arboris ajunt, inveniri que copiosè in India ac maximè in Cambaja, procul ab aquis. Utrum ergò *Malabathrum* hodiernum cum Veterum idem sit, id est de quo ambigitur, consultius est credere nomen hisce foliis inditum à regione *Malabra*. Fortè ob folium quod habet magnum, per excellentiam quoque *Folium* dictum. *Indicum* nomen illud conflatum videtur ex Indorum *Betre*, ut indè constat Indorum *Betre*, esse *Malabathrum* Arriani & Plinii, ex *Betre*, factum *Bathron*, & indè *Malabathron*. Indi *Tamalapatra* appellant, Arab. *Cadegi Indi*. G. Indianisch blat. Gall. *Feuille Indienne*. A. Indian Leaves.

MALA INSANA, Neapolitanis *Melanzana*, ab aliis *Amoris Poma*, dicta sunt, non quòd Lethalia sint, sed quòd difficulter concoquantur. *Amoris* autem *Poma* quòd propter elegantiam & pulchritudinem digna sint, quæ amentur. B. **Gulden appel**. G. Gold-apfel. Gall. *Pomme d'Amour*, *Pomme dorée*. A. Gold-apfel. Est & alia *Malæ insanæ* species. B. **Dol-appel**. G. Doll-apfel. Gall. *Mayenne*, *pomme d'amour*. A. Madd-apple.

MALACHE, est medicamentum alvum molliens, & tumores duros, à μαλδσω mollio.

MALACHITES, est lapis, jaspidis species, non transluens, malvæ virescentis colore, vocatur quoque *Molochites*, in febribus calidis olim laudatus.

MALACIA, est fames depravata, quâ ab usu humano aliena appetuntur: item corporis mollities, à μαλδσω mollio. B. **En verdozven hunger / maagde hunger**. G. Lust zu unnuetzen sachen, falich hunger. Gall. *Faim corrompue*, *depravée*. A. Depraved appetite.

MALACTICA, sive **EMOLLIENTIA**, sunt, quæ mediocri suâ calefaciendi & humectandi facultate, partes inter se firmius cohærentes, dissolvendo, & nonnulla dissipando, molles reddunt. *Malagma* idem majoribus sonat quod *Cataplasmata*, à μαλδσω emollio. B. **Der zagtende middelen**. G. Lindernde artzney, erweichende mittel. Gall. *Remedes emolliens*. A. Softning remedie.

MALAGMA, idem quod *Malaesticum*.

MALAXATIO, est, quando massæ quædam pilularum, in massam cum aliis rebus subiguntur, sive id manu fiat, sive pilâ, vel simili instrumento. B. *Vineding*. G. *Knæten*. Gall. *Pétrissage*. A. A *Kneading*.

MALICORIUM, quasi corium mali, est mali punici putamen.

MALIGNUS MORBUS, est qui sævit vehementius, aut perseverat diutius, quàm indoles ejus præ se ferre primâ fronte videtur, & medicinæ non auscultans, mortem sæpè inducit, ut febris pestilens, ulcus cacoëthes &c. B. *Stwaatwillige ziekten*. G. *Bæse*, gefährliche krankheit. Gall. *Maladie maligne*. A. A malignant disease.

MALINATHALLA, est Cyperi planta, crescit in terra, cujus nomen *Malinathalla*, ex ἀνὰ & θάλλω vel θάλλω conflatum videtur, quod Latinis regermino significat; vel ex μὲν & ἄνὰ θάλλω regermino. Sata enim unica radix innumeras alias producit.

MALLEUS, est ex ossiculis illis quatuor in aure contentis unum à figura, non verò ab usu ita dictum, quòd crassius sit alterâ sui extremitate, quæ caput dicitur, & tenuius alterâ, quæ manubrium appellatur; hoc ossiculum membranæ tympani à parte posteriori, tympani cavum spectante, versùs interiora applicatur, habet caput superficiem ex una parte hemisphæricam, ex altera parte inæqualem duabus protuberantibus eminentiis cum cavitate intermedia donatam pro articulatione cum incude, quod locatur in foveola quadam, in parte anteriori, superiori, & media, tympani exsculpta, absque ulla tamen cum eadem connexionè, quo efficitur, ut penitus liberum & mobile sit hoc capitulum: manubrio suo longiori, tenuiori, incurvò, secundùm membranæ tympani interiora protenditur, ultra ejus medium vel centrum recta descendit, ei interim firmiter accrescit, præsertim extremâ manubrii parte, ubi illud paulò planius est, sic dictam membranam introrsùm trahit, atque efficit, ut tensa admodùm, interim intùs versus tympanum conice gibbâ, extus verò versùs meatum auditorium concava sit: habet præterea Manubrium duas apophyses, quarum una possidet processum breviorè, crassiorè, acuminatùm, tympani membranæ parti superiori anteriori quodammodò infixum, eamque versùs meatum auditorium aliquantùm ele-

vantem : alter verò processus longissimus , gracilissimus ,
tenerrimus, incurvus, flexilis, elasticus, fragilis, à plurimis
neglectus & prætervisus, à Cæcilio Folio primum inven-
tus, & postea à *Th. Bartholino*, & *J. J. Rau* animadversus,
locatur in sulco quodam ad finem meatûs auditorii ossi
in hunc finem excavato. B. *Het hamertjen*. G. *Der Ham-*
mer. Gall. *Le Marteau*. A. *Hammer*, Beetle.

MALLEUS PEDIS, vide *Malleolus*.

MALLEOLUS, sive MALLEUS, Gr. Σφυρά, Σφύρον,
Πῆξ Polluci, est duplex, *Externus* qui est inferior in pe-
de ossis fibulæ processus. Vel *Internus* estque processus
inferior ossis tibiæ. B. *De enkele*. G. *Die knorren*, gelen-
ke im fusze. Gall. *Malleole*, *la Cheville*. A. *The Anckle*.

MALLEOLUS, in vegetabilibus est novellus palmis
innatus prioris anni flagello, cognominatus à similitudine
rei, quod ex ea parte quâ deciditur ex vetere sarmento,
prominens utrinque malleoli speciem præbet, vel, quod
capillatus utrinque & furculatus solebat feri.

MALTHACODE, est medicamentum cera emollitum,
à μαλάσσω emollio, μάλθη est cera emollita.

MALUM MORTUUM, est scabiei genus, dictum
quod corpus nigrum & quasi mortificatum appareat; quod
est scabies cum livore & nigredine, ac pustulis crustosis,
nigris & sædis, sine sanie & sensu ac dolore, in coxis &
tibiis præsertim sæviens.

MALOGRANATUM, & MALUM PUNICUM, seu
GRANATUM, est cartilago *Xiphoides*; sic ab Arabibus
nominata, aliàs Fructum denotat.

MALVA, est planta, quæ plures habet caules longos,
fatis crassos rotundos, medullosos, villosos, ramosos, ali-
quando rubicundos, repentes: folia sunt rotunda; aliquan-
tùm incisa, villosa, mollia, coloris virido fusci, in margi-
ne dentata, caulibus adhærentia: flos est monopetalus,
campaniformis, patens & multifidus, ex cujus fundo
emergit tubus pyramidatus, staminibus plerùmque onu-
stus: ex calice verò exsurgit pistillum, infimæ floris par-
ti adinstar clavi infixum, quod deindè abit in fructum pla-
num orbiculatum quandoque acuminatum, calice ut plu-
rimùm involutum, è plurimis capsulis constantem axi ita
circumhærentibus, ut singulæ ejus striæ capsulam suam
quasi articulatione quâdam excipiant, semine sætam, non
raro

rarò reniformi : radix simplex, longa, exigua, alba, saporis dulcis & viscosi : Gr. Μαλαχῆ, ab emollienda alvo nomen traxit : μαλακτεῖν enim mollire significat. Quin etiam sic Latinis, Varro *Malvam* quasi *Molvam*, quòd alvum molliat, dictam esse contendit. B. *kaasjre-bla-den / maluwe*. G. Pappeln, kæsz-pappeln, hafen-pappeln. Gall. *Marve*. A. Mallow.

MALVAVISCUM, vide *Althæa*.

MALUS, Arbor est, cujus truncus habet externè corticem cinereum, asperum, internè flavescentem & politum; lignum durum, album, aut albescens : folia sunt oblonga, obrotunda, quædam acuta, altera obtusa leviter in margine crenata, ubi tenera in parte inferiori aliquantulum lanuginosa : finis pedunculi fit ovarium, cujus margo superior explicatur in coronam, instar calicis monophylli explicatam in quinque magna segmenta expansa : flos est rosaceus, pentapetalus, ovario intra coronam innatus, habet petala nata ex interstitiis segmentorum, & stamina multa orta ex calicis interno ambitu : ovario aucto, petalis excussis, elapsis staminibus marcescunt quinque tubæ longæ ovarii, centro emissæ; contrahitur calix fitque fructus pomum umbilicatum, quinque loculare, carnosum : fortè à verbo *Malo*, desidero, exspecto, propter insignem usum alimentarium, cibariumque : vel à Gr. μήλον. B. *Äppel-boom*. Gall. *Pommier*.

MAMMÆ, MAMMILLA, UBER, Grammaticorum senatus curiosior *Ubera*, interiora; *Mammæ* ipsas eminentias dici voluit, μαζας, μασας, τιτθες, τιθθιον, μήλον *Suida*, ob mali in rotunditate similitudinem, ἡρῆας *Hom. Ὑπέρρον Suida*, uter propriè pro ubere animalium sumitur. Est corpus globosum, album & molle, utrinque musculo pectorali antè in pectore incumbens, intus ex glandulis conglomeratis constructum, quo mediante lac à sanguine arterioso segregatur, in ductus aliquos majores colligitur, & ex his & per tubulos minimos papillam transeuntes, foras in usum foetus convehitur. B. *De bozst / miammien*. G. Die brust, duetlein. Gall. *La Mammelle*. A. A dug, teat, pappe.

MAMMIFORMES PROCESSUS, sunt duæ ossium temporalium apophyses. B. *Mamwyrze uitsteckels*. G. Brustgleicher aufz wachs. Gall. *Apophyse Mastoide*, *Apophyse*

physe Mammiforme. A. Teatlike Proceſſ. Vide *Maſtoides*.
 MAMMILLA, idem quod *Mamma*.

MANDIBULA, MAXILLA, Gr. Γαμφήλη, Σιαγών, Γίγυς, Γένειον, Γνάθος. Eſtque ſuperior vel inferior, *Superior*, è tredecim componitur oſſibus, utrimque ſex, cum uno impari. 1. Ad angulum oculi externum, & cum proceſſu oſſis temporum anteriore conjunctum, apophyſi ſuâ os jugale producit. 2. Oculi canthum internum conſtituit, meatu præditum amplo, per quem ad nares redundans oculorum humiditas deſcendit. 3. Intra oculi orbitam, reliquis duobus interpoſitum. 4. Maximum omnium, genarum, & palati potiſſimam, abſolvit partem, dentiumque cavernis elaboratum. 5. Juxta cum pari ſuo naſum conſtituit. 6. Extrema palati cum oſſe ſocio terminat, atque hæc omnia harmoniis potiùs, quàm futuris combinantur. 7. Eſt impar, quod vomer dicitur, narium ſepimentum. *Inferior* verò vigente ætate in os unicum coaleſcit, duritie, craſſitudine, adeòque robore inſigne, habet proceſſus duos, acutum unum qui *Corone*: tum retuſum alterum, qui in capituli formam collectus *Condylus* appellatur. Foramina interna poſſidet duo, totidemque externa nervis egreſſum concedentia; inferioris dentes cavernulis excipit, & oſſi petroſo coarticulatur. B. *Kinnebacken*. G. Der kinbacken. Gall. *Mafchoire*. A. A The jawbone.

MANDIBULARES MUSCULI, idem quod *Maſſeteres*.

MANDRAGORA, planta eſt, quæ habet folia immediate ex radice erumpentia, longa, in medio ampla, in fine anguſta, polita, coloris viridis, ſubſuſci, odoris ingrati: flores ſunt monopetali multifidi, campaniformes: poſt florem ſequitur fructus mollis, globofus, carnoſus, continens ſemina compreſſa, ut plurimum reniformia: radix eſt longa, craſſa, bifida, externa cinerea, ferruginea, internè pallida, odore ingrato, & viroſo; caput feriente & narcotico: radix ferè hominem refert, internè duo crura habet, & ſi ſupernè leviter vulneretur ab utroque latere, tum excreſcunt quaſi brachia, & tum ſupernè facile in caput formari poteſt, undè dicunt autores eſſe hominem ſubterraneum, ob quam cauſam vocarunt quidam *Anthropomorphon*, Ἀνθρωπον homo, & μορφή figura, quaſi figura hominis; vel ut aliis placet. Quaſi τῆς μὲν
 δρας

δρας τὰ γέρας, speluncarum, stabulorumque honos, quòd ad mandras pecorum, aliasque speluncas proveniat : *Μάδρα* enim est spelunca, pecorum stabulum. Alii derivant à Belgico sermone, quasi à *Mai* & *Dragen*, ac si diceres virigeram, hominigeram: idque ob radicis formam, quam arte viri instar fingere norunt. Alii iterùm nomen inditum putant, quòd fœcundas reddat fœminas steriles. Gr. *Κίρκαια* Pythagoræ *Ἀνθρωπομορφον*, Latinis *Canina* aut *Terrestres Malus*. Qui *Circæam* vocarunt, nomen illi à Circe fecerunt, quoniam creditur radix ejus ad amatoria conducere. Pythagoras haud dubiè ab humana forma, quam radix ejus referre videtur, *Anthropomorphon* appellavit. Hinc sumptâ occasione, Agyrtæ & impostores illi circumforanei radices humanâ effigie insignitas circumferunt, quas Mandragoras esse testantur, eum tamen constet eas esse fictitias, & manu factas ex cannarum radicibus humanâ specie sculptis, postea plantatis. Nascuntur autem subindè radiculæ parvæ, quæ repræsentant capillos, barbam, pectinis pilos, & ex terra eum acquirunt colorem, ut radices esse appareant. *Terrestrem Malum* Romani dixerunt Mas vocatur *Μάριον*, & candida est. Fœmina nigra, Gr. *Θεϊδωξιας* à similitudine foliorum appellata. Nonnulli *Dudaim* appellant. B. *Mandragers-kruid*. G. Alraun. Gall. *Mandragore*. A. Mandrake, Mandrage.

MANDUCATORII MUSCULI, idem quod *Masse-res*.

MANIA, est imaginationis & judicii depravatio, cum excandescencia sine febris & timore: itaque nihil aliud est quàm majoris ac inordinati spirituum animalium impetus, qui ab anima refrænari non possunt, quod non absurdè liquet ex fortitudine, quam furiosi habent, quæ equidem, deficientibus spiritibus, fieri nequit, à *μαίνομαι* furo, insanio; dicitur & *Rabies*, *Furor*. Gr. *Μανία*, *Μανική ἔκστασις*, *Ἀδύσσημα* B. *Dolligheid* / *razentheid*. G. *Tobsucht*, *wuetende unsinnigkeiten*. Gall. *Fureur*. A. *Madnesse*.

MANICA HIPPOCRATIS, est sacculus laneus, figurâ pyramidali, quo vina aromatica & medicamentosa, aliique liquores percolantur, ex ὑπὸ sub, & *περάννυμι* misceo. B. *En hipocras zak* / *hippocrates mouw*. G. Spitziger beutel. Gall. *Chausse d'Hippocrate*. A. Hippocrates his sleeve astringer, with à narrow end. MA-

MANIODES, est delirium Maniæ simile, à *μανία* furor, & *ἰδέο* forma.

MANIPULUS, est mensura sicca Medicis in præscribendis formulis familiaris; est enim determinata quantitas, quantum sc. unicâ manu comprehendi potest; hoc pondere plerumque herbæ metiuntur. *Manipulus Celsi*, quod *Scribonio Largo* fasciculus, *Simpleri* indicio in nomencl. Rei Nummar. fol. 89. Quo sensu *Esthio* cap. 1. §. 1. de remed. formal. definitur fasciculus, qui manu comprehendi potest *Rondeletio* cap. 2. Meth. cur. p. 17. cæterisque omnibus à Manipulo differt fasciculus, nisi fortè cum *Agriicola* lib. 2. de extern. pond. *δισμίδιον χειροπλῆθὺς* intelligendum. *Heurnius* lib. 1. Meth. Prax. utriusque discrimen explicatius tradidit, cui fasciculus, quantum plicatis brachiis capi potest. *Ovidius* de Medic. faciei, manipulum scitè circumscripsit: quantum manus una prehendat. Notatur vulgò signo M. vel Man. B. *Ein hand*. vol. G. Eine hand voll. Gall. *Une poignée*. A. An hand full.

MANNA, dicitur esse ros pinguis arboribus adhærens; sed *Th. Bartholinus* Calabriam peragrans, narrat se legisse ex fraxino Mannam. Dicit incolas alternis ictibus truncum arboris fraxini vel omni vulnerare, undè liquor destillat, qui à folis calore exsiccat. Porro narratur tota examina insectorum (cicadarum, ut *Bartholinus*, vel apicularum, culicum instar, ut *Christ. à Vega*) ex arboribus istis succum dulcem exugere, quem uti apes depouunt, undè manna foliis, lapidibus, aliisque herbis sæpè communicatur, iisque adhærescit. Tempore laboris nullas habent alas, Teste *Herm. N. Grimm.* sed postea cum pluvia decedit, & manna eluitur, mutantur quasi in viscum quendam, qui instar clematis circa arborum ramos circumvolvitur; eo tempore, si tangas, resiliunt, virides crassasque alas obtinuerunt, quibus totum corpus contingitur. Error fortè inde venit, quia in sacris dicitur Manna roris in modum decidisse, sed si quis diversitatem spectet, facile judicabit non esse eandem Mannam. Manna hodierna est succus luxurians & concretus ex foliis quarundam arborum, ut fraxini productus; observat *Don. Anton.* ab Altomari, quod meridie tantum, ac calidissimis diei horis manna exfudet ex foliis; majori enim caloris gradu opus est; ut succus ad folia perveniat, & extra va-

sa sua deferatur ; cælo enim sicco & mense Julio in regno Neapolitano & Sicilia spontè fluit liquoris limpidi instar & sensim concrefcit ; postridie cultri ope eam colligunt, ne à pluviis & cælo udo liquefcant , & in vasis vitreis condunt , ac deindè soli exponunt in chartis nitidis donec manibus non adhæreat , aliter enim liquefceret & candorem amitteret. Manna spontanea à die 21 Julii ad finem usque Julii effluit, nisi adveniant pluviæ. Julio desinente Rustici corticem fraxinorum incidunt ad materiam usque , tunc à meridie ad sextam fluit idem liquor , & in grumos crassiores cogitur , calor paulò intensioris ope : Manna alia Granata dicitur , quòd minoribus constet granis, alia Mastichina , quæ Mastiches propè granis est æqualis. Venit ex Calabria, imò ex India Orientali , Syria, Persia, Goa, ex Ormuz, Ceilon &c. Cùm carduis adhæret vel cùm liquida sit *Tereniabin* strictè appellatur : sed si fuerit durior, *Mastichina* dicitur vel *Granata*, quia in granis est. Item *Mel Aëreum*, seu *Aëromeli* ; *Men Sracost*, *Terniabin*, *Thereniabin*, *Trungibin*, *Terengibil*, *Drosomeli* &c. Leviter alvum morantem incitat , sapor est dulcis instar mellis ; color debet esse albus , non fuscus aut rufus. Mannam quidem Veterum fuisse saccharum suspicantur. Gr. *Ἀερομέλι* & *Λερομέλι*. B. *Manna / Honingdauw*. G. Wiltgaw, Himmelbrot, Manne, Himmel-honing. Gall. *Manne*. A. Heavenly Food, Manna.

MANNA CHYMICORUM, ut Mercurii, est destillatum quoddam ex præcipitato albo , nive albissimum ; vocatur & *Aquila Cælestis*.

MANNA THURIS, vide *Thus*.

MANSORII MUSCULI, idem quod *Masseferes*.

MANUS, in genere sumitur pro ea parte à summo humero ad digitorum extremitates. Sed strictè dividitur in *Brachiale* vel *Carpum*, in *postbrachiale* & *digitos*. Interna post brachialis pars *vola* seu *palma*, verum exterior dicitur *dorsum*. Gr. *χὴρ*. B. *De hand*. G. Eine hand. Gall. *La Main*. A. The hand.

MANUS CHRISTI, est saccharum perlatum , sic dicitur quod cardiacis ingreditur, quo utuntur morte proximi, fortè sic dicitur, quia Christi manus tunc necessaria est, sive in vita futura sive in morte. B. *Parrel-suiher*. G. Perlen-zucker. Gall. *Sucre de Perles*. A. *Pearle Sugar*.
MA.

MARASMODES, est febris, quæ lento gradu tabem accersit, ex *μαρασμός*; tabes, & *ἰδὼ* forma. B. *Een uitdrogende koofts*. G. Duerre, wen man am leibe abnimmt, versællet, welck wird. Gall. *Fievre lente, ethique, ou de longueur*.

MARASMUS, est summus Tabis seu Atrophie gradus; oculi ægrorum hoc malo laborantium sunt concavi, collapsa tempora, nares acutæ, prominentia mala, costæ protuberantes, scapulæ instar alarum & claviculæ instar arcûs eminent: exerit se spina dorfi, collabitur venter, clunes pendent, aut consumuntur, manûs aridæ sunt incurvatis unguibus, cadunt pili, atque tota cutis evadit flaccida, arida, fusca, & in rugas contrahitur, venis interdum conspicuis & eminentibus, corpusque universum aliquando pellucidum & transparens conspicitur. Urget plerumque inexplibilis sitis, fames perit, respiratio existit summè difficilis, tandem alvi fluor, & tandem mors insequitur, hoc morbo senes non rarò obnoxii sunt, à *μαρᾶν* marcesco. B. *uisterende ziekte*. G. Verfallen, mager werden, schwinden. Gall. *Consumption, Phthise, Langueur*. A. Consuming fever.

MARATHRUM, est Fœniculum; Antiqui vocarunt ἀπὸ τοῦ μαίρειν, τὸ εἶναι λάμπειν, καὶ ἀθρεῖν, quod est videre, lucere, quia visus aciem excitat. Recentiores vocarunt, quod foliis teneris, mollibusque sit, vel quod molliendi vim habeat. Nonnulli tamen deducunt ἀπὸ τοῦ μαρᾶνισθαι à *Marcescendo*, cum ejus usus multus cum inaruerit & marcidum fuerit, ad condienda plurima. Vide *Feniculum*.

MARCASITA, sive **BISMUTHUM**, est substantia, colore plumbi & stanni intermedia, utroque durior, itibio similis, fragilis & scissilis, fractum splendens & strias latas habens, antè ignitionem liquefscens, tinniens, manus inficiens, reperitur in propriis, vel in argenti fodinis; & albo nitore argentum æmulatur, sulphuris præsentis notas gerit, acidique actione bituminosâ dimittit, metalla volatilia, atque friabilia admistu suo reddit. Est autem sui generis metallum, & veteribus ignotum, quia in Misnia solum reperitur: est autem alia ejus species, flavedinis alijus particeps, quæ marcasita aurea dicitur. Gold-kiefz. prima autem vocatur. B. *Marcasite / bismuth*. G. Wisz-muth,

muth, marcasit. Gall. *Marcasite*, *Bismuth*. A. Bismuth, Marcasite.

MARCHASITA, materia metallica impura varii generis, *Græcis*, *Latinisque* pyrites, *Arabibus* Markhasjitia, ut ex *A. vicennæ can. Med. l. 2. tract. 2.* constat. Cùmque vox hæc Latina jam civitate donata sit, necesse est penultimam Latino more, ob positionem in Arabico extantem produci. Hæc Borrichius

MARCOR, idem quod *Marasmus*.

MARGA, est pinguis quædam materia, & quasi medullosa, in nonnullis saxis contenta, variorum colorum, ideòque *Medulla Saxorum* vocatur; viribus cum terrestribus reliquis convenit. B. *Merg in de steenen*. G. Steinmarck. Gall. *La Moëlle de Pierre*, *Agaric mineral*, *Lait de Lune*. A. Marle, vel Marrow of Stones.

MARGARITÆ, *Perlæ* dictæ & *Uniones* si magnæ sint. Sunt lapides rotundi, in conchis nonnullis ex perittoniate eodem quo testæ generantur, producti: imò & in ipsis animalculis, quæ conchis inhabitant, uti in Ostreis Anglicis; & Musculis nostratibus, sæpè inveni. Duplices censentur, *Orientales* nempe & *Occidentales*. Illæ splendidiore sunt, adeòque cæteris præferuntur & præsertim Perticæ. Hæ lactescunt, minusque sunt splendidæ. Inveniuntur etiam in multis Europæ locis, uti in Scotia, Silesia, Bohemia, Frisia, locisque maritimis aliis, sed vilioris sunt notæ. Majores itidem & quæ perforatæ sunt, censentur minoribus & non perforatis maturiores & præstantiores. In medicina dicuntur cor roborare: sed præcipuè margaritarum vires consistunt in temperando acido. Gr. *μαργαρίτης*. B. *Paerel*. G. Perlen. Gall. *Perles*. A. Pearle. Arab. *Lulu*.

MARIS, est mensura decem choarum Atticarum, vel librarum octoginta trium cum unciis quatuor.

MARISCA, idem quod *Ficus*.

MARMARYGÆ, sunt oculorum fulgores & corruscationes, à *μαργαίρω* resplendo. B. *Het vuur dat uit de oogen springt*. G. Feuer das aus den augen springt. Gall. *Lors que les yeux étincellent*. A. The glisterins and corruscations of the eyes.

MARMELATA, & MARMELADA, est succus cydoneorum in gelatinam crassiusculam cum saccharo con-

densatus : eaque tum simplex est, tum aromatizzata, idque pro usu medico aut domestico. Venit à voce Lusitanica & Hispanica : *Marmelos* enim & *Marmellos*, illis malum cydonium est. B. *Marmelade* / *quee-bleys*. G. Quittenapffel-fleisch, quitten lattwerg, marmelat. Gall. *Marmelade*, *Cotignac*. A. Marmelade.

MARMOR, lapis est, insigniter durus ac ad splendorem accipiendum, si poliatur, ita aptus, ut statuæ vel columnæ egregiè nitentes indè sculpi possint. Genera multa sunt, cum nec certa illis figura, nec color certus sit. Alia sunt *Alba*, uti *Alabastrites*; Alia *Rubra*; Alia *Nigra*, ut *Lydius lapis*; Alia *Variis coloribus*, uti *Porphyrites*, *Ophtes* &c. Gr. *μάγμα* à splendore. B. *Marmersteen*. G. Marmel-stein. Gall. *Du Marbre*. A. Marblestone.

MARMORARIA, sed corruptè *Mamolaria*, est Acanthus seu Branca ursina, sic olim Romanis dicta, quod ejus folia columnarum maximè corinthiarum capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quàm vertex marmore splendebant.

MARMORATA AURIUM est liquor tenax, pinguis, flavus, amari saporis, collectus in meatu auditorio, secretus ex glandulis meatum illum ambientibus, & hunc liquorem per tenues ductus evehentibus; inservit liquor inunctionibus membranæ intimæ meatus auditorii, ut servetur mollis, æqualis, polita, ab aëre defendatur, inviscetque omnia animalia & sordes cunctas, quæ alioquin ad Tympanum usque reperent, vel hanc membranam læderent. Gr. *κυψηλις* & indè *κυψελόζουσα* nuncupantur. Item *ᾠτων ῥυπὸν*, aurium sordes. Vide *Cerumina*. B. *Oozsmart*. Gall. *La Cire ou l'espece de glu, qui se trouve dans la partie anterieure & cartilagineuse de l'Oreille*.

MARRUBIUM, sive Prassium est planta, quæ habet caulem lanuginosum, quadratum, ramosum, excavatum: folia obrotunda, sibi invicem opposita, rugosa, crassa, nervosa, in margine incisa, lanuginosa, villosa, albescencia, odorantia, saporis acris & amari: flores sunt minimi, albi, in verticillis densis distincti, circa caules nudi, labio superiori elato, & velut in cornua fisso, inferiori tripartito, mediâ portione plerumque bifida: semina oblonga: radix fibrosa, nigra, odoris aromatici, penetrantis, & grati: crescit hæc planta in locis incultis: vocatur
ita,

ita, quòd marcescentibus & tabescentibus proffit; vel quòd ejus folia marcida & squalentia videantur, quasi à rubigine exesa forent. B. *Andorn / malrou*. G. Weisser andorn. Gall. *Marrube blanc*. A. Hore hound.

MARRUBIUM NIGRUM, vide *Ballote*.

MARS, Belli Deus, sed à Chymicis sumitur pro ferro aut Chalybe. Undè *Martialia* dicuntur Medicamenta, quæ ex Marte parantur. B. *Ûzer / staal*. G. Eisen, stahl. Gall. *Fer, Acier*. A. Iron, steel.

MARSUPIALIS MUSCULUS, sive BURSALIS & OBTURATOR INTERNUS, habet foramen, uti & externus, inter pubis & ischium os, dictorum ossium circuitui extremo lateri affixus, transversim atque exterius, majori insigitur femoris processui. Interim carnosum veluti marsupium constituit, *nonus* est ordine secundum *nostram Anatomiam*, quo femur movetur. B. *De innerlyke stopspier / beurspierr*. G. Der taschen gleiche maulsz. Gall. *l'Obturateur interne*. A. The Bursal muscle.

MARTAGON, est Lilium purpureo croceum: est & vox Chymica, obscuræ significationis. *Martagon*, est origine Gallicâ, & fortè ex Turcia translata.

MARTIALIS, vide *Mars*.

MARTIATUM UNGUENTUM, est duplex *Majus* vel *Minus*. Sed minus majori præstat, ex variis herbis aromaticis, oleis, cera, adipibus, gummis &c. componitur adversus nervorum & tendinum mala, nomen à Martiato Medico invenit. B. *Sennsalb*. G. Sennsalb.

MARTIUS PANIS, vel PASTA REGIA, fit ex Amygdalis excorticatis, instar pulmenti crassioris cum aqua rosarum confusis, & Saccharo ana, vel amygdalarum partibus duabus, Sacchari parte una, tum supra ignem in aleno diligenter agitata, usque dum superflua humiditas evaporaverit, depersequè simul in massam manui non adhærentem, ex qua deinde lautia præparantur.

MARUM, planta est exotica, Majoranæ figuræ & viribus similis; adeò ut pro una eademque Herba à nonnullis habeatur. Vidi speciem Mari Thymni foliis, altitudine ejusdem crescentem, & odore gravem. Ex Syria ad nos deferitur. Dici volunt à Rege quodam Thraciæ, cui nomen *Maro* fuit: sed verisimiliùs ab Amaraco, per apocopen, nomen impositum, videtur esse origani species.

MAS, quid sit, omnibus notum; sed in republica Medica instrumentum oblongum est, & acuminatum, quod modiolus sive trepano inditur, ut trepanum in initio firmiter staret, vide *Modiolus*. B. *Det mannetjes panboor*. G. Der borer, trepan. Gall. *La Piramide du Trepan*. A. A borer or trepan.

MASLACH, compositio Turcis est ex opio præparata, cujus dosis est drachma, unò ad tres quandoque innoxie devorant, præsertim si Veneris aut Martis prælium sint inituri. Vocatur & *Anfion* vel *Amphion*.

MASSA, nominatur sæpè omnis sanguis, in toto corpore simul sumptus. Sic & *Massa* dicitur omnis compositio ex pulveribus aliisque rebus siccis cum fluidis in unam substantiam reductis, uti sunt massæ pilularum, massæ emplastrorum &c. Sic & pro *massa* habetur carnis quædam excrescentia. B. *En deeg / masse*. G. Ein teig. Gall. *Paste, masse*. A. Past, Masse.

MASSETERES, MANSORII, seu MANDUCATORII & MANDIBULARES, sunt musculi maxillæ inferioris, à maxillæ superioris osse primo & osse jugali producti, maxillæ inferioris margini inferiori, exteriori per spatium quatuor ferè digitorum inferuntur; maxillam inferiorem fortiter adducunt ad superiorem, atque eam dextrorsum, lævorsum & antrorsum ob fibrarum diversitatem, commovere possunt, à *μασσωμαι* manduco. B. *Kauw-spieren*. G. Kæuw-maußz, die mæueße der kinbacken. Gall. *Les Masseters*. A. The Muscles of the lower jaw.

MASTICATIO, & MANDUCATIO, est actio, quæ maxillam inferiorem versùs superiorem adducendo, variè declinando, interceptos cibos dentibus comminuit, & salivæ in ore admiscet. B. *Kauwinge*. G. Das kæuen. Gall. *l'Action de mâcher*. A. Knawing.

MASTICATORIUM, est Medicamentum quod ore detentum, sæpius mastigatum, salivam prolicit ex *Pyrethro*, *sale*, *mastiche* &c. præparatum. B. *Kauw-middel*. G. Eine artzney die man kauet. Gall. *Masticatoire*. A. Mastigatory.

MASTICHINA, aqua vitæ, & oleum *mastichinum Officinarum*, penult. corrip. ut cætera omnia adjectiva ininus à rebus inanimatis derivata: Vide *Amaracinus*, seq.
De

De oleo illo ita *Dioscorides l. i. c. 51.* Τὸ δὲ μασίχινον ἐκ τῆς μασίχνης λίπας σκινύζεται.

MASTIX, seu **MASTICHE**, est gummi, Refina aut lachryma ex lentisco arbore exsudans, venit ex Chio, Syria, Candia, Provencia, Hispania, &c. ex albo citrina est, pellucida, granulata, benè odorata, friabilis &c. à *μασίζω* flagello, nam è caudice lentisci cæso exsudat. Vel fortè à masticando, quia masticatu plurimum salivæ elutriatur. B. *Μαστίκη*. G. Mastix. Gall. *Du Mastic*. A. Mastick.

MASTOIDEI, & **MASTOIDES**, sunt processus mammiformes, qui à latiore basi in obtusum verticem protenduntur, & vaccinum uber figuræ similitudine expriment, ossibus temporum accreti, siti ad latus & infra meatum auditorium: Item sic vocantur *Musculi capitis flexorii*, qui à sterno & clavicula orti, in mammiformem processum terminantur, ex *μασις* mamma, & *ἰδω* forma. Vide *Mammiformes processus*.

MASTOIDES, idem quod *Mastoidei*.

MASTOS, idem quod *Mamma*.

MATER, idem quod *Matrix* seu *Uterus*.

MATER, idem quod *Uterus*. Præter hoc significat foeminam, quæ peperit.

MATER DURA, est membrana, quæ cranio intùs in quibusdam locis firmiter adhæret, cerebrumque & cerebellum mediatè obducit; quatuor habet sinus, qui vicem venarum sustinent, & inter cerebrum & cerebellum simul conveniunt, quæ conjunctio ab *Herophilo*, *Torcular* vocatur. B. *Deet dikke hersen-blies*. G. Das dicke hirn-häutlein, vel hirn-fell. Gall. *La Dure Mere*. A. The Thick. membrane of the brain.

MATER PERLARUM, **MACRA PERLARUM** seu **MARGARITARUM**, sunt conchæ & testæ, quæ intùs splendore margaritarum nitent, ubi præsertim sunt ex genere nautilium, undè & nomen diductum. B. *Patrel-moer*. G. Perlen-mutter. Gall. *Nacre de Perles*. A. Mother of pearls.

MATERSYLVA, est Caprifolium, fortè ita vocatur, quod in sylvis, quasi mater, priores partes habet. Vide *Caprifolium*.

MATER TENUIS, est membrana quæ cerebrum & cerebellum immediatè investit sub dura matre, omnetque

gyros & anfractus illius intrat, vasculis sanguineis quam uberrimè perfusa; nervis ex cranio egredientibus tunicam concedens. B. *Det dunne hersen-blies*. G. Das dinne hirn-häutlein, vel dinne hirn-fell. Gall. *La Pie Mere*. A. The Thin and inner membrane of the brain.

MATRACIUM, nihil aliud est, quàm sacculus cui inest tartarum calcinatum, vel simile quid, etiam crucis in modum interpungitur, ut salia contenta indè in cella humida in liquoris formam, resolvantur: porrò dicitur & vitrum tenue & purum, urinis inspiciendis accommodatum, quod etiam *Matula* dicitur, habetque formam ferè rotundam, cum collo satis spatioso. B. *Matras / piglas / urinaal*. G. Ein harn glas. Gall. *Urinal, matras*. A. Idem.

MATRICALIA, sunt, quæ matricis morbis destinantur medicamenta.

MATRICARIA, planta officinalis, chamomillæ species, habens plures caules, satis crassos, rigidos, firmos, cannulatos, medullâ albâ, fungosâ, repletos, in plures ramos divisos, folia sunt satis lata, in segmenta divisa, ad unam costam conjugatim posita: flores habent calicem squamosum, subrotundum, suntque in umbellam congesti; sed plerumque laxiores: semina oblonga, saporis ingrati, amari, & odoris fortis. Gr. *μαρθίνιον*: ita dicitur, quòd matrici profit. B. *Moeder-krupd*. Gall. *Matricaire*. A. Feverfew.

MATRIX, seu UTERUS. Inter Vegetabilia tamen denotat Medullam sive cor alicujus plantæ.

MATRONALIS FLOS, seu VIOLA, *Viola Damascena*, dicitur quòd odoris gratiâ à Matronis atque virginibus colì soleat, iisque in deliciis sit. B. *Damaft-bloemen / Damasten / Maft-bloemen*. G. *Damaft-blum*. Gall. *Damas-violette, Violette de Dames*. A. Dame violets.

MAZA, est species panis apud Veteres, quæ tempore *Hippocratis* & *Galen*i coquebatur: constabat maxima ex parte ex farina hordei tosta, oleo & melle; sed posterioribus temporibus, compositio ex amygdalis & saccharo, facta fuit, & *Mazæ* seu *Mazæ panis* & *Gallis Macrons* & *Macarons* dicitur. Apollodorus apud Athen. à *μασῶσθαι* manducare, comedere, derivari scribit: ipse verò Athenæus à *μάζω* pinso derivat, quem & Eustachius sequitur.

MA-

MATURANTIA, sunt medicamenta, quæ partes suppurandas suâ actione sic solvunt, ut omnes suppuratæ coeant in unum locum nullis distinctum cellulis, & ex quo apertura facta omne suppuratum unâ vice expelli possit. *B. Ippmakende middelen. G. Zeitigende mittel.*

MATURATIO, Gr. *πέπαισις*, chirurgica vox est, & dicitur de tumoribus in pus vergentibus, item de Variolis. Chymicis quædam exaltatio est rerum crudarum in maturiorem & gratiorem statum; estque *Digestio, Circulatio, Fermentatio & Projectio. B. Ippwerdinge. G. Die Reifung. Gall. Maturité. A. Ripeness.*

MAXILLA, vide *Mandibula*.

MEATUS, Gr. *μέγας*, est vas, ut vena, arteria, vasa lymphatica, ductus chyliiferi &c. per quod aliquid transit; alii sunt recti, alii ramosi, alii tortuosi &c. *B. Een doorgang/ weg. G. Ein gang. Gall. Passage. A. Idem.*

MEATUS AUDITORIUS, Canalis est, Conchæ continuatus, ab ejus cartilagine continuata, angustata, originem ducens, sic externo sui extremo ab Auricula principium sumens, porro temporalis ossis parti petrosæ insculptus, sic dictum os perforans, obliquè ad anteriora versùs faciem excurrens, longus, angustus, non rotundus, sed quodammodò depressus, in initio paululùm ascendens, mox incurvatus iterùm circulari sectione, descendens deorsùm iterùm ascendens, demùm ultimo, maximè parte suâ inferiori, ad extremam tympani membranam, quâ terminatur, descendens, à qua obliqua sectione clauditur sic, ut faciat cum hac obtusum angulum parte superiori, & posteriori; acutum verò anteriori & inferiori; sic serpentino incessu progreditur, in toto tamen suo decursu plus descendit, quàm ascendit, hinc deorsùm paululùm declinat, & figuram habet tubulosam, Cylindro-ellipticam, tortuosam; sed ut hujus cavitatis configuratio clarè percipiatur, ad quam dilucidè explicandam verba minùs sufficiunt, nullus aptior modus est, quàm si cerâ, vel alio liquato corpore eadem repleatur; ita enim ablatis postea partibus illam circumscribentibus remanet in concreta materia cavitatis distincta figura; canalis istius longitudo, in ipsius quidem medio desumpta, novem lineas, altitudo quatuor, latitudo verò tres æquat; quæ tamen latitudo in ipsius principio major est, constat hic

meatus partim cartilagine conchæ elasticâ, continuatâ, partim ossè petroso, protuberantiis quibusdam cartilagineis excipientibus, ut & ligamento validissimo ab extremitate conchæ proveniente, iisque variis, hic ductus vere soniferus est, dum sonum versùs interiora deferat; dum radios sonoros, ab auricula receptos, natos, impulsos, recipiat, retineat, redire & iterùm ad exteriora egredi, impediât; reflectat, & quidem creberrimè, & efficiat, ut omnes in medium sui finis currant, hoc est in membranæ tympani centrum, uniti, illibati, illæsî incurrant, dum interim hujus canalîs obliquitas & tortuositas ejus longitudinem, superficiemque augeant; loca reflectionum, ipsasque reflexiones multiplicent, & simul impediât corpusculorum heterogeneorum facilem ingressum, & transitum ad interiora. **B. Het gehoorgat.** G. Der gang des ohrs. Gall. *Le Conduit auditif*. A. The auditory passage.

MEATUS URINARIUS, vide *Urethra*.

MECHOACANNA, est Radix purgans alba, Brioniæ instar, ex India Occidentali in taleolis ad nos mittitur, præsertim ex Hispania Nova. Duplex habetur ratione loci: Prima ex Mechoaca insula (undè nomen) affertur, altera verò ex continente circa Nicaragua nata, quæ priorè longè præstantior est. Inter Convolvuli species numeratur. Folia habet magna obscurè virentia & lata, & in acutum desinentia. Vocatur & Mechocanna Peruviana, Rhabarbarum album. **B. Witte mechoacanna / rhabarber van mechoaca.** G. Weisse rhabarber. Gall. *Mechoacan*. A. White Mechoacan.

MECON, Latin. *Papaver*, Gr. *μήκων* à *μη* *κονεῖν* hoc est ministrando, quòd suis fungi muniis vrescentes non patiantur, nam sensibus papavereo sopore vinctis, membra nequicquam agere possunt.

MECONIUM, est opium sive condensatus papaveris succus. *Item* excrementa fœtus, post partum intestinis adhuc inhærentia, à papaveris succi nigredine sic dicta, à *μήκων* papaver. Gall. *La colle*, vel *la poix*, sive *la larme du pavot le Meconium*. A. Juice of poppies.

MECONOLOGIA, est opii descriptio, ex *μήκων* papaver, & *λίγα* dico.

MEDELA, idem quod *Curatio*.

MEDIANA VENA, est illa sita in cubiti flexura inter
Ce-

Cephalicam & Basilicam media : eâ tumefactâ à perito Chirurgo tuto fatis pertunditur, sed imperito non sine periculo læsuræ tendinis subjacentis, undè convulsiones, gangrænæ &c. procurantur. B. *De mediaan ader / middel ader.* G. Die median-ader. Gall. *La veine Mediane.* A. The median veine.

MEDIASTINUM, est sepimentum membranofum, Thoracem & pulmones bifariam dividens, eisque ipsum duplex, dum pleura cingens Thoracem ab utraque parte in medio affurgit, hocque sepimentum constituit, hinc antè sternum attingit, posterius dorfi vertebra. B. *De middelschor.* G. Das brust fell, mittel fell. Gall. *Le mediastin.* A. The Mediastin.

MEDICA, est Trifolii species, sic dicta quòd in Media plurimùm crescat, undè nobis primum advecta : quæ & unicâ semente durat annos decem : cum Milium annuam postulet curam. B. *Wlaberr-rupsen.* G. Schnecken- klee, heil-futter, vieklee. Gall. *Luferne, herbe au limas- son, St. Foin.* A. Trefoil bardned, hedge-hog-tre foil.

MEDICAMENTUM, est auxilium conveniens, quo cum alteratione morbi impugnantur, eo fine, ut sanitas in integrum restituatur manente vitâ : vel quicquid corporis affectum depellit. Estque vel *Actuale* quod primo contactu corpus nostrum ea, quâ præditum est, qualitate, afficit : ut ferrum candens, aqua frigida. Vel *Potentiale*, cujus vis non primo contactu, sed tum demùm sese exerit, cum illa ex aliqua in corpore mora, in medicamento excitatur, ut Piper, Raphanus, salia acria &c. deindè medicamentum dicitur vel primis vel secundis, vel tertiis facultatibus esse præditum. Eæque omnes à temperamento & varia particularum in corpore nostro actione innotescunt. *Medicamentum* est triplex *Chirurgia, Pharmacia & Viçtûs Ratio.* Vocatur etiam medicamen, ἰαμα, Φάρμακον, Κυτήριον, Ἀλξίον, Remedium, juvans, & indicatum. B. *Gen genes-middel.* G. Mittel, genesz mittel, artzney. Gall. *Medecine, Medicament, Remede.* A. A Medicine, Remedy.

MEDICINA, est ars medendi, five quâ per convenientia remedia, quantum possibile est, introducatur sanitas amissa, conservatur præsens in corpore humano, à Galeno definitur à fine, quòd sit *Ars præsentis sanitatis*

conservatrix, & labefactata instauratrix, & libro introductorio, *scientia sanitatis protectrix, & morborum expultrix*, ab Herophilo autem ex subjectis, *scientia salubrium, insalubrium & neutrorum. Medendi Methodus*. à Clarissimo Sylvio de le Boe, sic definitur, *Ars inveniendi & ritè usurpandi Remedia reparandæ ac restituendæ valetudini amissæ maximè convenientia*. Medicina à Sennerto aliisque rectè in quinque partes dividitur; in *Physiologiam* nempe, in qua agitur de constitutione humana quatenus sana; ad hanc etiam pertinet *Anatomia*. 2. *Pathologiam*, in qua agitur de morbosâ corporis nostri constitutione. 3. *Semeioticam*, de signis sanitatis & morborum. 4. *Hygienam*, illa de regimine sanitatis conservandæ leges pronunciat. 5. Et *Therapeuticam*, quæ docet *Diatam*, *Chirurgiam*, & *Pharmaciam*. Prima & generalis Medicinæ divisio bimembris tantum est, & unâ medicinæ partem *Theoricam* constituit, altera verò *Practicam*. Medicinæ subjectum est corpus humanum quatenus sanabile: ejusque scopus seu *Finis* est *Sanitas*. *Hippocrates* vocat eam *Artem Longam* cum dicit, Gr. ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, è contra *Paracelsus* eam ponit *Brevem*; quidam Arabes eam μικροτέχνην appellarunt, artem parvam, reverâ tamen ars magna & longa est, ita ut exclamare cogamur, *Quantum est quod nescimus*. Gr. ab ἴαομαι, medeor. B. **Genes-*konst.*** G. Artzeney-kunst. Gall. *Medecine*. A. *Medecine*; the art of Physick.

MEDICINALIS, vide *Critici dies*.

MEDICUS, est vir artis Medicæ summè gnarus, eamque apud Clinicos exercens: si autem rationem experientiæ observatisque aliorum adjungit, dogmaticus vocatur, si solam consulit experientiam & à similitudine concludit, dicitur Empiricus. Gr. ἰατρὸς, ab ἴαομαι medeor. Vulgò vocatur *Doctor* ob promotionem suam, quâ potestatem alios docendi accepit. B. **Gen genes-*heer* / een geleer-*de*** in de genes-*konst.* G. Ein artzt. Gall. *Un Medecin*. A. A Physician.

MEDIMNUS, est Mensura aridorum, Attica continet chænicas quadraginta & octo, five centum & octo libras mensurales, seu modios sex, non medicos, sed georgicos, ejus nota fuit μ & in summitate ε.

MEDITULLIUM, est spongiosum illud inter duas

CRA-

cranii laminas, vide *Diploe*. B. *Tafelscheidel*. Gall. *Diploe*.
MEDIUM, est *Viola Mariana*, quæ à Media regione
 nomen habere putatur.

MEDIUS VENTER, idem quod *Thorax*.

MEDULLA, inter mineralia partem molliusculam denotat, quæ in faxis nonnunquam reperitur. B. *Merg der steenen*. G. Steinmarck. Gall. *Moëlle*. A. The Marrow, vel softer part in stones. Inter vegetabilia, est media cuiuslibet caulis, seminis, fructus pars mollior ac præstantior, quam & cor & matricem appellant. Quoad animalia, medulla est pars mollior, & pinguior, quæ in ossium cavitatibus continetur, sive oleum blandissimum, suavissimum, & subtilissimum, quod in toto sanguine est. B. *Merg*. G. Das marck in beinen. Gall. *Moëlle*. A. The Marrow.

MEDULLA CEREBRI, est substantia alba & mollis, ex infinitis nervorum filamentis, singulis ab invicem separatis composita, exterius corticali substantiâ obducitur, quæ magis cinerea est, intus corpus callosum constituit: in ea fit spirituum animalium distributio, & imaginatio. *Malpighius* eam ex innumeris filamentis constare affirmat, nam nervi exinde oriuntur. B. *Het herffen-merg*. G. Das marck im hirn. Gall. *Le Cerveau*. A. The Marrow-like part of the Braine.

MEDULLA LACTIS, sive **LACTIS FLOS**, est quodvis butyrum.

MEDULLA OBLONGATA, est initium spinalis medullæ, à qua nervi intra cranium originem sumunt, quæ per foramen occipitis & vertebrarum usque ad os sacrum descendit, ex suis lateribus decem nervorum paria ad thoracem, abdomen & artus emittit, etiam sensorium commune *πρωτον αισθητήριον* appellatur, quia ubi nervorum origo, ibi est sensuum externorum receptio communis. B. *Het lange merg*. G. Das lange marck. Gall. *La Moëlle Allongée*. A. The long Marrow.

MEDULLA OSSIUM, est substantia pinguis, in ossium cavitatibus, porositatibusve ab arteriis deposita: Medulla hæc membranulis & cellulis continetur, & omni prorsus sensu caret; in fistulis maioribus rubicunda est, in minoribus alba, in ossibus spongiosis mollis & succulenta: etiam conjicere licet, duntaxat exudationes ossium esse,

esse, ex eo quod ossa plus materiæ sulphuræ & pinguis accipiunt, quàm in nutrimentum vertere possunt, quæ deindè per ductus adiposos ejusque sacculos, ad ossium interiora fluit, postea à venis recipitur & in sinum sanguinis deponitur. Gr. *Μυελος*. B. *Been-merg*. G. Das marck in beinen. Gall. *Moëlle de l'os*. A. Marouw of the bones.

MEDULLA SPINALIS sive DORSALIS, est cauda cerebri. Gr. *Μυελος*, *ἰαχίτης*, *Νωτιαῖον*, *Διαυχνιον*, *Ψωιτης* Galeno, est illa pars quæ per annulos vertebrales descendit & in os sacrum terminatur, habet etiam substantiam eandem & usum cum cerebro; nervorum coagmentatio est, quorum etiam usum possidet; superius bifida conspicitur; hinc si alterutra obstruatur, *Hemiplegia* sive paralytis unius lateris oritur, utrimque triginta nervorum paria ad artus, ventres, cæterasque corporis partes emittit, si convenienti liquore diligenter lavetur, in plurimas fibrillas discescit. B. *Het rugge-merg*. G. Das marck im ruck-grad. Gall. *La Moëlle de l'épine*. A. The Marrow of the back bone.

MEGANSPHLANGHNUS, qui viscera magna & tumida habet, à *μέγα* magnum & *σπλάνγον* viscus. B. *Die grote ingewanden heeft*.

MEL, Gr. *Μελ*, quid vulgò sit, notum. Est substantia liquida crassiuscula ex albo flavescens, nata in variis vegetabilium floribus, & ab apibus in iisdem collecta. Mel differt tum ratione temporis, & loci tum ratione plantarum ex quibus colligunt illud apes; sic veteres locuti sunt de melle venenato, ubi in vicinia erant multa Rhododendra. Pharmacopæis denotat aliquando succum simplicem ad mellis consistentiam inspissatum, melque sapore æmulantem, sic convenit cum sapa sive Rob; uti mel passulatum, juniperinum. Non rarò refert Syrupum cum melle paratum, ut mel rosarum, diamorum &c. B. *Honig*. G. Honig. Gall. *Miel*. A. Honie.

MELA, Gr. *Μέλη*, est instrumentum Chirurgicum, *Specillum* dictum. Imperitum vulgus à tentando *Tentam* vocat. Conficitur ut plurimum ex argento, vel ebore, idque ad exploranda ulcera, vel calculum urethræ infixum, extrahendum &c. aptum pro vario usu, varias habet formas. Gr. à *μελίζω* trunco. B. *Een tentpzer / een tintel-pzer / pzoet. pzoef pzer*. G. Probier-eisen, wund-eisen. Gall. *Sonde; speculum*. A. A Probe. ME-

MELAMPODIUM, appellatur sic *Helleborus niger* (quoniam *Melampus* caprarum pastor, furens in sepre-ti, filias hoc primum purgasse & sanasse, fertur) foliis platani.

MELAMPYRUM, est planta, cujus caulis quadratus, lanuginosus, purpureus, ramosus: folia sibi invicem opposita per intervalla, quædam angusta instar *Linariæ*, alia ampla, & profundè incisa, aspera, coloris virido fusci, in summitate plantæ adsunt folia breviora, satis lata, coloris purpurei: flores ex alis foliorum erumpentes in foliaceas spicas congeruntur; post florem sequitur fructus aut testa subrotunda, ab inferiori parte ad superiorem in duas partes dehiscens; quæ singulæ in duo loculamenta sunt divisæ, continentia semina oblonga, nigra instar tritici: radix parva lignosa, fibrosa: hæc planta crescit in locis humidis & in Pratis, quasi triticum nigrum, vocatur etiam *Triticum Bovinum* & *Vaccinum*, ex μέλας niger, & πύρεθρον frumentum. B. **Paerds-bloem.** G. Fleisch-blumen, schwarzter weizen. Gall. *Blé noir*, *blé de vache*, *blé de bœuf*, *Rouge herbe*. A. Horle Flower, cowe-wheate.

MELANAGOGA, sunt medicamenta atram bilem (Veteribus putatitiam) evacuantia, ex μέλας niger & ἄγρω educo. B. **Genees-middelen tegen de zwarte gal / ofte zwaarmoedigheid.**

MELANCHOLIA, est delirium diuturnum & pertinax circa unum objectum absque febre, quo ægri sine causa manifesta admodum tristantur & metuunt; horrenda, nonnunquam etiam ridicula, imaginantur & sibi persuadent; color cutis externus est pallidus, flavus, vel fuscus, solitudinem amant, ut suæ indulgere possint meditationi, anxietatem, repletionemque ab assumptis in hypochondriis sentiunt, ructibus, flatibus, & spasmodicis frequenter sunt obnoxii &c. illa spectant vel ad corpus, vel ad animam: nam si corporis illis imaginatio fit, putant se nullum habere caput, nates, nasum &c. vel mortuos esse; sed quoad animam, de vita æterna desperant, & sibi persuadent à diabolo tentari, & cum eo sermones miscere &c. quoad reliqua videntur sani, imo sæpè sanissimi. B. **Woesgeestig / zwaarmoedig.** G. *Melancholey.* Gall. *Melancholie.* A. Idem. Veteribus vocabatur hic morbus *Aira bilis*, quum illa sanguinis & humorum crassities ac

ma-

malignitas acris aderat, undè hic morbus producebatur, five tum à causis corporeis, five à mente hæc dispositio inducta fuerit. Videbant enim vere quod in hoc morbo ægri sæpè evomebant materiam aterrimam instar picis, quæ omnium malorum causa fuerat, ex μέλαινα nigra & χολή bilis. B. *Swarte gal.* G. Bœsz, schwarz gebluet. Gall. *Melancholie, la Bile noire.*

MELANOPIPER, vide *Piper*.

MELANOSMEGMA, est sapo niger, ex μέλαν nigrum & σμήγμα sapo, à σμάω abstergo.

MELANTHIUM, est Nigella, ut & alia florum species: sic appellatur à nigro feminis colore, à μέλα niger & ἄνθος flos. B. *Hardus-zaad.* G. Schwartzter kuemel, schwartzter coriander. Gall. *Nielle.* A. Fennel Flower.

MELAS, vide *Alphus*.

MELE, vide *Mela*.

MELEAGRIS, est *Fritillaria*: sic dicitur ab ave Meleagride, seu perdice Barbariæ, cujus plumas dicunt referre. Vide *Fritillaria*.

MELIA, est Fraxinus, dicitur & Milia, à & μερίζω fortassè, *Trunco*, quodd homines eâ truncarentur: Hastæ enim ex ea fiebant.

MELICERIS, est tumor tunica propria conclusus, hærens vel in folliculis glandulosis quacunque in corporis parte, vel ubi membrana cellulosa vulgò adipem colligendo dicata reperitur, ex materia mellea ortus, indolens, rotundus, digitis facillè cedens, sed ilicò rediens, ex particulis lymphaticis non ritè circulantibus originem fumere videtur, quæ, evaporato humido, massam melleam relinquunt; eodem modo in Steatmate & Atheromate contingit, ex μέλι mel, & κηρίον favus. B. *Ein Honig-gezwel.* G. Ein honig geschwulst. Gall. *Meliceris.* A. Honey tumour.

MELICRATUM, est hydromel, five mulsum, quod componitur ex una parte mellis & octo partibus aquæ pluvialis, ex μέλι mel, & κεράγνυμι misceo. B. *Honig-wasser / meede.* G. Meth. Gall. *Eau miellée, Hydromél.* A. Metheglin.

MELIGEION, est vox vix usitata, denominatio fumitur à μέλι mel; estque chirurgis humor ex ulceribus manans oleosus & ferè mellis consistentia, sæpè cum ossis

carie, cum fætoze ferè in modum eboris recens raspati.

MELILOTUS, est species Trifolii odorati, habetque unum pluresve caules rotundos, striatos, excavatos, flexiles: folia terna, Fænum Græcum referentia, sed magis alba, in margine crenata: flores sunt exigui, leguminosi, in spicam longam dispositi, coloris flavi, aliquando albi, odoris grati: flori succedit capsula nigricans, nuda, non recondita in calice ut in trifolio, fæta uno vel altero semine rotundo, exiguo, pallido: radix longa, exigua, alba, flexilis, fibras multas habens: crescit hæc planta in locis arenosis & ficcis. Dicitur propter melleum saporem, qui ex caule ejus & radice deprehenditur, dum comeduntur, ex *μέλι* mel, & lotus, nam inter Loti species etiam recensetur. Vocatur etiam *Sertula Campana*, quòd flos ejus coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronæ & sarta factitata sint. *Corona* etiam *Regia* appellatur, quoniam luteis floribus supernè coronatur, atque superbit. B. *Meloten / Malloten / welrickende klaveren / geel-steen-breck*. G. Stein-klee. Gall. *Melilot*. A. Melilot.

MELIPHYLLUM, est Melissa, ex *μέλι* mel, & *φύλλον* folium: quia apes Melissam amant, & ex ea mel colligunt.

MELISSA, ceu *Citrage*, vel *Apiastrum*: est planta, quæ habet caules quadratos, duros, ramosos: folia oblonga, acuta, satis ampla, aspera, lanuginosa, aliquantulum in margine incisa, coloris viridis, subfusci, splendentis, odoris citri, grati, saporis aliquantulum acris: flores in foliorum alis nati, annulos quasi formant, qui tamen non sunt integri circa caulem, neque omninò verticillati; galea erecta, subrotunda, bifida, barba tripartita; calix tubulosus est, quinquifidus, longus, tribus segmentis majoribus & binis inferioribus sic unitis, ut bilabiatus appareat: floribus decidentibus succedunt quatuor semina obrotunda, oblonga, sibi invicem adjuncta, in calice florum inclusa: radix fibrosa, longa, divisa, rotunda: sic vocatur vel à melle, quòd apes ejus foliis gaudeant: vel ab apibus quæ Gr. *Μέλισσαι* & *μέλιτται* vocantur, vel dicitur quasi *μήλον* *Malum*, nempe citreum, & *ἔω* federe facio, quia citreus odor huic herbæ insideat, seu inhæreat, vel à *μέλι* mel. B. *Melisse / citroen-kruid / limoen-kruid / consielle de grein / byen-kruid*. G. Melisse,

liffè, iven-blad, bien-fang. Gall. *Meliffe*, ou herbe de Citron. A. Balm, Bawn, Bauwme.

MELISSOPHYLLUM, five MELIPHYLLUM, Lat. *Apiastrum* & *Citrigo*, est Meliffa, vel planta ei analoga, ex *Μέλισσα* Meliffa, & *φύλλον* folium, nihil aliud, quam *Apum Folium* fignificat, quia apes ejus folio magnoperè delectentur: vel mellis folium indicat. Sic itaque nominari cœpit quòd hinc apes mellis materiam colligant. Pari ratione Latini *Apiastrum* haud dubiè dixerunt, quòd eâ herbâ apes plurimùm lætentur, adeò ut fi ea alvearia confrientur perunganturve, detentum in eis examen non fugiat. *Citriginem* autem vocarunt ab odore Citri: nares enim fi confulantur, citrum malum olebit.

MELITEMA, est Trageæ fpecies ex melle & Medicamentis fubaéta. B. *Medicinale honigkuchjes*. G. Honig-kuechlein, lebkuchen.

MELLAGO, est medicamentum quodlibet ad confiftentiam mellis reductum.

MELO, est cucurbitæ fpecies: quæ habet caules longos, farmentofos, repentes, afperos: folia cucumeris, fed minora, rotundiora, minùs anguloſa: flores funt parvi, flavi; poſt florem fequitur fructus, in initio aliquantulum villoſus, figuræ & magnitudinis diverſæ, eſt vel glaber, rotundus vel rugoſus, magnus vel parvus, habens corticem durum, craſſum, coloris viridis & cinerei; caro eſt tenera, medulloſa, humida, glutinoſa, flava aut rubicunda, odoris & ſaporis dulcis, & valdè grati, in terna loculamenta biſariam ſecta diviſus, continens ſemina oblonga, plana, ex flavo albeſcentia, habentia corticem durum, fætum amygdala albiffima, dulci, & oleoſa; loculamenta, in quibus reconduntur ſemina, continent medullam liquidam rubicundam, boni ſaporis: dici volunt à numeroſo ſemine, five millenis feminibus, vel fortasſe à *μήλον* pomum, quòd figura pomum ſeu malum referat. B. *Meloen*. G. Melaun, pfeben, melonen. Gall. *Melon*. A. Melon.

MELON, Gr. *μήλον*, fructus arboris mali, fortè à *μήλω*, quod idem atque *φροντίζω* *Curo*, *Sollicitus ſum*: quod Prifci, ut nunc, de malis admodùm eſſent ſolliciti, eaſque omni cum diligentia & ſtudio colerent.

MELOCACTUS, idem quod *Melocarduus*, ex melo & *κακτῶ* carduus. ME.

MELOCARDUUS, **MELOCACTOS**, **POMUM SPINOSUM**, **OPONTIATUM**, **ECHINOMELOCACTOS**, sunt synonyma, est planta exotica, Meloni majori similis, in cujus superficie spinæ erumpunt, ex Melo & Carduus nominatur. Caules ejus sunt crassi, striati, lanuginosi, spinosi, ejus habitus est singularis, succulentus, echinatus, polygonus: flores monopetali, campaniformes, tubulati, nudi, multifidi, ovario insidentes, intus gerentes multa stamina: ovarium est carnosum, molle, fungosum, pulposum, factum multis seminibus parvis, oblongis: fructus hujus plantæ sunt edules, hæc planta crescit in faxis durissimis, quæ nullas habent rimas. B. *Meloen-distel / indiaanse doorn-appel*.

MELOCARPUS, est Aristolochiæ fructus, ob melonis minoris similitudinem, dictus ex Melo, & καρπός fructus.

MELOPEPON, est cucurbitæ species, inter melonem & peponem media, ex Melo, & Pepo. Fructum habet carnosum, subrotundum, striatum, angulosum in quinque partes sectum, continentem semina compressa, plantæ spongiosæ affixa. Gall. *Potiron*.

MELOSIS, est exploratio chirurgica, specillo facta, a μελῶν specillis exploro. B. *Een onderzoeking / tentetring*.

MELOTIS, Gr. Μηλωτὶς & Μηλωτρὶς, idem quidem quod *Mela*, sed minori formâ, ut est specillum auriculare, ex μέλη specillum, & ἑς auris. B. *Een klein probeet / een klein oortent*.

MEMBRANA, est substantia nervosa, fibrosa, ex fibris vario modo vel intertextis vel accretis composita, lata, plana, alba, & dilatabilis, viscera, ventres, musculos &c. investiens, convolutione vasa constituens, exquisito sensu prædita. Gr. ὕμην. B. *Een vlieg*. G. Häutlein, eine duenne zarte haut. Gall. *Membrane*, *Tunique* A. A. Membrane.

MEMBRANA ADIPOSITA, sic propriè nominata est, quæ renes cingit, multo adipe referta, verum nulla est musculosa pars corporis, quantilla quoque sit, quæ non involvatur membrana cellulis multis constante, in quibus colligitur pinguedo, pro illinienda parte, ne motu atteratur vel arescat, & hæc membrana adiposa pariter appella-

tur. B. *Het vel vlieg*. G. Das fett häutlein. Gall. *Membrane Adipeuse*. A. The fat or Adipous membrane.

MEMBRANA CARNOsa, idem quod *Panniculus Carnosus*.

MEMBRANOSUS MUSCULUS, sive FASCIALIS LATUS & FASCIA LATA, tibiam movet, qui supèr- nè illi spinæ, infèr nè femori ossis extremitati latissima, in- star cæterorum ferè hujus partis musculorum involucris, tendineaque alligatur expansione. B. *De vlieg-spier / bærde windel-spier*. G. Der pergamentgleiche mausz. Gall. *Muscle Aponeurotique ou Muscle du Fascia lata*. A. The membranous muscle.

MEMBRUM, Gr. κῶλον & μέλος, est corpus organi- cum ex variis similibus partibus compositum, actioni- bus voluntariis perficiendis, destinatum. B. *Gen lid*. G. Ein glied. Gall. *Membre*. A. Member or part.

MENDOSA SUTURA, sive SQAMMEA, Gr. λι- πιδοειδής & Λεπιδοειδὸν Προσκόλλημα, est connexio ossium squammosa, ut in osse temporum cum bregmate apparet. Vide *Lepidoides Sutura*.

MENINGOPHYLAX, est meningis sive membranæ cerebri custos, ut laminæ aureæ & argenteæ, quæ aper- turis cranii accommodantur. Ex μήνιγξ membrana cere- bri, & φυλάσσω custodio. B. *Hersen-beschermer*. G. Hirn beschirmer. Gall. *Meningophilax*. A. Preserver of the me- ninges.

MENINX, vide *Mater dura & Tenuis*.

MENSA, est dentium molarium, pars latior, quæ ci- bum comminuit, *Τράπεζα Russo*, at pars quæ gingivam contingit, *Μωρίςκον* dens molaris *Poll.* sic & machinæ quædam Chirurgis & Anatomicis dicuntur *Mensa*. B. *Gen tafel / de kroon*. G. Ein tisch, eine tafel. Gall. *La Couronne de la Dent, ou une Table*. A. Idem.

MENSES, sunt sanguinis excretiones, quæ singulis mensibus proveniunt in mulieribus generationi aptis, id- que ex ipso utero, ex collo, aut vagina. Incipiunt, cum juvenulæ pubescunt anno scilicet duodecimo vel deci- mo quarto, & plus sanguinis conficiunt, quam pro nu- triendo suo corpore requiritur, undè oritur plethora, quæ maximè in vasis uteri collecta ob minorem ejus, quam aliarum partium, compressionem, per oscula vasorum
huc

huc hiantium dilatata exit : desinunt verò in gravidis, lactantibus & effœtis, etiam vocatur *Menstruum*, *Profluvium mulierum*, *Lunare virus Ovidio*, *Profluvium genitale Plin.* Gr. Μῆνις, Καθάρσεις Ε'μμηνοί, Ε'μμηνα, Γαυαικία. Theop. Καταμῆνια. B. *De stonden, stonde-bloed, maand-stonden / roode bloemen.* Menstruis laborare, dicitur niet wel te pas zyn / het goed hebben. G. Blumen, die monatliche reinigung, monat zeit, frauen zeit. Gall. *Les menstrues, les Mois, les Ordinaires.* A. Womens cour-fes.

MENSIS CHYMICUS, seu **PHILOSOPHICUS**, constat ex quadraginta diebus.

MENSTRUUA ALBA, vide *Fluor Albus*.

MENSTRUUM MULIERUM, vide *Menses*.

MENSTRUUM, est id, quod in vase destillatorio est & destillationi exponitur; vel liquor quo metalla corroduntur, & lapides solvuntur, ut acetum, aqua fortis, &c. vini &c. fumi potest pro capite mortuo à destillatione relicto, vel vocatur corpus, quod lege artis applicatum alteri, illud dividit in minutas quidem partes ita, ut particulæ solventes inter partes divisas soluti, sint penitus intermixtæ; distinguuntur, licet satis improprie, in menstrua dura vel solida, & in fluida, nam quamdiu corpora talia sub forma dura consistunt, tamdiu neutiquam agent ut menstrua. Gr. à μέω maneo, vel à mense, quod res dissolvendæ quadraginta dierum spatio, sive per mensem Philosophicum agitantur, & dissolvuntur. B. *En schei-bocht.* G. Ein scheid-feucht, scheid-wasser. Gall. *Menstrue.* A. Idem.

MENSURA, est tam aridorum quàm liquidorum quædam determinata quantitas. Gr. μέτρον. B. *En maat.* G. Maß. Gall. *Mesure.* A. Measure.

MENTAGRA, est species Lichenis feræ, quæ tempore *Claudij* adhuc incognita erat, morbus dictus à mento, à quo incipit & faciem, pectus, manusque sædo quodam surfure occupat. Gr. Λειχήν. B. *Geblekte of schubagtige lazerie in 't aangezigt.* G. Eine krätze ums kin, schwinde, flechte, zittermal. Gall. *Dartre.* A. A tetter, vel ring-worme.

MENTHA, est planta, quæ caules habet quadratos, rubicundos, ramosos : folia sunt oblonga, satis angustâ,

acuta, in margine incisa, aliquantulum lanuginosa, coloris virido fusci: flores in spicas congesti in ramorum summitatibus, parvi, bilabiati, coloris albi, punctis quibusdam rubris notati: singulis floribus succedunt quatuor semina oblonga, tenuia, floris calice comprehensa: radix longa, fibrosa, & repens: nomen accepisse putatur à *Mintba* Plutonis pellice, in hanc plantam conversa. Alii dicunt nomen accepisse, quòd odore suo mentem excitet, aut quod grato odore mentes percurrat. Nonnulli derivant à *Mentula*, qui ad coitum excitat, hominesque enervat. Gr. *Μίνθη*, & propter suavem odorem *ἡδύσμη*. B. **Munt.** G. Muentz. Gall. *Mente*. A. Mint.

MENTHASTRUM, est *Menthæ* species: undè & ei nomen devolvitur.

MENTULA, idem quod *Penis* aut *Clitoris*.

MENTULAGRA, est morbus membri genitalis virilis in quo muscoli illud erigentes vel convulsi, vel contracti sunt, qualis *Spadonibus* sæpè accidit.

MENTUM, est inferior pars faciei sub inferiori labio. Gr. *Γένιον*. B. **De kin.** G. Das kinn. Gall. *Le menton*. A. The chin.

MERCURIUS, est argentum vivum, & *Hermes*, sive *Ερμης* dictus; est metallum, post aurum ponderosissimum, simplicissimum, parvo igne sed paulum majori quam ebullientis aquæ totum volatile, candidi coloris, gravitatis specificæ, respectu aquæ, ut 1. ad 14. minimè ductile sub malleo, sed parvâ vi divisibile in partes minimas, nullo frigore noto constringendum in solidam massam, auro omnium facillimè adhærescit, dein plumbo, Argento, Stanno, difficilius Cupro, vix Ferro. Videtur esse basis metallorum, atque illud fluidum, quod partes solidas terrestres instar glutinis conjungit. Chymicis sic dicitur omnis liquor, qui non inflammatur, sive sit spirituosus, acidus vel aquosus. Alii sumunt pro spiritu è plantis vel animalibus educto, vel pro liquore quovis acido arte chymicâ parato, dicitur triplex, mineralis, cælestis & chymicus, appellatur sic ab ethnico Deo Mercurio, qui ob agilitatem negotiatoribus præsidere existimetur. B. **Quiksilver.** G. Quecksilber. Gall. *Du Mercure*, *Vifargent*. A. Quicke silver.

MERCURIALIA, dicuntur omnia, quæ ex Mercurio præ-

præparantur. B. *Quikberridfels*. G. Artzney von queck-
silber. Gall. *Mercuriaux*. A. Medicine mercuriale.

MERCURIALIS, est planta, quæ habet caules ro-
tundos, politos, in parvos ramos divisos: folia sunt oblon-
ga, satis ampla, acuta, polita, viridia, in caule bina op-
posita, in margine crenata: calix florum monophyllus,
expansus in tria segmenta, tam in mare quàm in fœmina:
flos in mare apetalus, stamineus, habens stamina octo vel
duodecim in spicas congesta; ovarium calici triphyllis in-
sistit gemellum, rotundum, instructum tuba limbratâ;
semina ovalia vel rotunda includuntur in capsula obrotun-
da; radix fibrosa est. Gr. *Λιόζωσις* & *Ερμη βοτανιον*, Plan-
ta sic dicta quòd ut ferunt à Mercurio sit inventa. B. *Um-
gel-kraut*. G. Bingel-kraut, bengel-kraut. Gall. *Mercuria-
le*. A. Mercury.

MEROBALINEUM, est species semicupii, in quo uni-
cum membrum vel plura immergunt, à *μέρος* pars & Ba-
lineum seu Balneum. B. *Ern lid-bad*. G. Ein glied-bad,
Gall. *Bain pour un membre, ou une partie*. A. A Bath for
a particular membre, or more.

MESARÆUM, idem quod *Mesenterium*, ex *μίσρον* me-
dium, & *ἄραιον* tenue, ob vasorum tenuitatem, quibus
abundè intertextitur: undè hæc vasa *Mesenterica* & *Me-
saraica* appellantur, vide *Mesenterium*.

MESARAICA VASA, vide in *Mesaræum*. B. *Scheil-
baten*.

MESENTERICA VASA, vide *Mesaræum*.

MESENTERIUM, est peritonæi membrana duplica-
ta, glandulis, nervis, arteriis, venis, vasis chyli-
feris & lymphaticis dotata, medium abdominis occupat, & in-
testina ordine quodam miro continet: in medio glandulam
magnam habet *Pancreas Asellii* nominatam, cui aliæ mi-
nores glandulæ circumfusæ sunt, ad eas lactea primi or-
dinis vasa ex intestinis tendunt & ab hepate aliisque par-
tibus vasa lymphatica, descendunt; ab hisce iterum lactea
secundi ordinis vasa ad sacculum chyli-ferum ascendunt
& in ejus sinum sese exonerant, ex *μίσρον* medium, & *ἕν-
τερον* intestinum. Item *Mesaræum*. Gr. *Ἐπιχορδὶς Aretæo*.
Μισαρχον, *Μισαρχιον*, *Μισόκωλον*. *Hippocr.* *Ἀνωχεύς τοῦ ἐντί-
ερων Ruso*, *Ἐπιχορδὶς* apud Veteres teste *Aretæo*. B. *Darm-
scheid*. G. Das gekroese. Gall. *Mesentere*. A. The
midst of the guts, vel mesentery. Nn 3 ME-

MESERÆUM, vide *Mesaræum* & *Mefenterium*.

MESOCOLON, est pars mesenterii, quæ crassis intestinis continuatur, ex μέσον medium, & κῶλον intestinum colon. B. *Uet kleine schreil*. G. Das kleine gekroese. Gall. *Le Mesocolon*. A. The little mesentery.

MESOGLOSSUM, idem quod *Genioglossum*.

MESONUCTION, est media noctis pars. Ex μέση media, & νύξ nox. B. *Middernagt*. G. mitternacht. Gall. *La minuit*. A. Midnight.

MESOPLEURII, sunt costarum spatia intermedia, ut & muscoli intercostales, in utroque latere viginti duo, undecim externi & totidem interni sunt, ex μέση media, & πλευρά latus. Vide *Intercostales Musculi*.

MESPILUS, Est arbuscula mediocriter alta, cujus truncus tortuosus, rami duri & non flexiles: folia Lauri, sed lanuginosa, & in parte inferiori alba: flores sunt magni, rosacei, coloris albi aut rubri: post florem sequitur fructus rotundus post maturitatem rubicundus, carnosus, qui vocatur Mespilum, ejus cutis est tenera, caro dura, alba, saporis austeri, sed post maturitatem dulcis, vinosi, & grati, quatuor vel quinque ossicula dura, oblonga, inæqualia, & rubicunda habet, in singulis ossiculis hæret semen oblongum: Mespilum in arbore rarò fit maturum, sed postquam ad suam magnitudinem naturalem pervenit, carpitur, & supra stramen deponitur, donec mature scat. Gr. μεσπίλη arbor Mespili est, μέσπιλον fructus, pro quo recentiores dixerunt μέσπλον. Undè nomen, me fugit. Fortassis nomen imposuerunt Scythæ, qui lunam μέσπλην vocarunt. Hesychius μέσπλη ἢ σελήνη παρὰ Σκύθαις. Verisimilius nomen accepit quod fructus mollior & è sui idoneus, pulpa constat fordida & aspectu ingrata, μέσπιλον ergo quasi μεσδπιλον. Nugari si liceat, à Belgis nomen impositum: His *Mispel* dicitur; & *Mispel* idem est, quod deficit spodium, sive frustra in pomario quæras, quod expiles, Mespila enim quando matura sunt, tempus est, quo nihil in arboribus restat spoliandum. B. *Mispel-boom*. G. Ein mispel baum. Gall. *Neslier*. A. Medlar-tree, melder, medeler.

METABASIS, est transitus ab una indicatione in aliam, ab uno remedio in aliud, qui cum prudentia & non temerè fieri debet, à μεταβαίνω transgredior. B. *Gen overtreding*.

ding, G. Ubertretung, veränderung. Gall. *Transfition*, *changement d'indication*. A. A Transgressing from one thing wanother.

METABOLE, est temporis, æris, vel morborum mutatio, à μεταβάλλω muto. B. **Veränderung der zaken**.

METACARPUS, & **METACARPIUM**, est manûs pars posterior, constituitur ex ossiculis quatuor oblongis, volam manûs expandentibus, quæ dicuntur *Postbrachialia*, ex μετά post, & καρπὸς manus junctura. Vocatur item *Torus Manus*, *Tubercula*, μετακαρπιον. B. **De agter hand / nahand**. G. Der berg in der hand. Gall. *Metacarpe*. A. The wrist, the back of the hand.

METACONDYLI, sunt postremi digitorum articuli unguibus proximi; quemadmodum medii condyli & primi Metacarpio proximi *Procondyli* dicuntur, ex μετά post & κόνδυλος digitus. B. **De vooſſte vinger leden**. G. Die knœbel, oder forderſte gelencke der finger. Gall. *Metacondyle*. A. The utmoſt bones of the fingers.

METALEPTICUS MOTUS, est musculorum translatus, five transumptivus motus, & dicitur de motu quodam, quem muscoli habent, & similis est motui, five tensionis speciei illi, quæ à superiori laqueo glossocomii perficitur, à μεταλαμβάνω transumo. B. **Een overboe, rende beweging**.

METALLUM, Gr. μέταλλον, est substantia admodum ponderosa, solida & rigida, malleabilis, igne fusilis, frigore concreſcens, quæ in montibus & cryptis subterraneis invenitur: sunt Aurum, Ferrum, Argentum, Cuprum, Plumbum, Stannum, Argentum vivum, omnia illa hoc versiculo continentur, ut.

Sol, Mars, Luna, Venus, Saturnus, Jupiter, Hermes. Inter metalla aurum solidissimum est, cujus tinctura magnis laudibus à Chymicis effertur, ex μετά post, & ἄλλος alter, quia una inventa vena, altera invenitur. *Hermes* five *Mercurius* numeratur quidem inter metalla, sed quia Metallum malleabile quid est, ideòque Metallis accenſeri non poteſt, & potiùs inter imperfecta, five mineralia annumerandus erit. B. **Metaal**. G. Metall. Gall. *Metal*. A. Metall.

METALLURGIA, est illa operatio, quâ metalla ex fodinis eruuntur, ideòque operariorum unusquisque vocatur.

METALLURGUS, seu **METALLICUS**, qui in terræ visceribus metalla scrutatur, ut chymici solent, ex μέταλλον metallum, & ἔργον opus. B. *Œu metaal-werker / mpm-werker*. G. Ein ertzgräber, berg-knapp, bergmeister. Gall. *Metallurgiste*, *Maistres de mines*, *Tireurs de Mines*. A. Diggers of Metall.

METAPEDIUM, Gr. μεταπιδιον idem quod *Metatarsus*.

METAPHRENUM, Gr. μετάφρενον, est pars dorsi post septum transversum, ex μετά post, & φρεν præcordium. B. *Der rug*. G. Der rücken. Gall. *Le Dos*. A. The back.

METAPTOSIS, est morbi in alium morbum degeneratio : ut febris quartana in tertianam & vice versa : apoplexia in paralyfin &c. à μεταπίπτω recido, relabor, degenero, transeo. B. *Verandering van ziekte*. G. Veränderung der krankheiten.

METASTASIS, est morbi demigratio ab una parte in aliam : quod apoplecticis contingit, cum materia, quæ cerebrum eclipsin patitur, ab eo in nervosum genus excutitur, undè paralyfis, à μετίσθημι transstatuo. Vide *Apostema*. B. *Verplaatsing van ziekte*. Gall. *Metastase*.

METASYNCRISIS, est medicamenti foris applicati operatio, quæ ex intimis recessibus humores evocentur. Vide *Oribasium* lib. i. cap. 34. ex μετά trans, & συνκρίνω coagmento.

METATARSUS, sunt quinque officula, tarfi ossibus connexa, quæ plantam pedis constituunt, ex μετά post, & τάρσος crates, tarsus. B. *Agter-boet*. G. Der riesz auf dem fusz. Gall. *Metatarse*, *le dessous du pié*. A. The instep.

METHODICA MEDICINA, est, cujus Author fuit *Themison Laodiceus*, excultor *Thessalus Trallianus*, qui artem sex mensium spatio addici posse clamitabat. Hi signis & causis neglectis ad laxum & strictum in omni morbo respiciebant, ex μετά cum & ὁδὸς via.

METHODICI, sunt, qui compendium artis methodo quæsierunt, scil. *laxi*, *stricti* & *medii* cancellis omnia comprehendentes.

METHODUS, est pars Medicinæ, quæ per indicationes ratiocinando ex datis principiis auxilia inveniuntur, ut deperdita hominis sanitas restituatur, ex μετά cum, & ὁδὸς via. B. *Beleid van geneezinge*. G. Manier zu curiren. Gall. *Methode*. A. Method.

METOPIMUM, vide *Galbanum*.

METOPUM, est frons, five pars faciei supra oculos, ex *μετω* post, & *ὤψ* oculus.

METRECHYTA, est instrumentum Chirurgicum, seu sypho, quo liquores vaginæ & utero immittuntur, ex *μήτρα* matrix, uterus, & *χύω* fundo. B. *Een moeder trechter*. G. Ein mutter-trichter. Gall. *Metrenchyte*. A. Mother-funnell.

METRETES, est mensura maxima apud Atticos, capiens choas duodecim five libras centum & octo. Aliis centum & viginti libras continet, & olei circa centum & quinque.

MEUM seu MEU, Gr. *μειον* & *μῆον*, Arabibus *Mu*, unde fortè nomen, ejus Herbæ folia sunt instar anethi aut fæniculi, ideòque *Faniculum Porcinum* vocatur, ejus radix in usu est, ingrediturque Theriacæ & Mithridatio, aromatica est, est satis crassa, utcunque obtusa, undè radix urfina vocatur in officinis, est etiam oblonga, digiti crassitie, foris ferruginosa, intùs pallida, aliquantulum resinosa, saporis & odoris ad Angelicam & Ligusticum accedentis, ob nimiam fragrantiam nonnullis molesta & odiosa; crescit copiosè in sylva Hercinia, aliisque locis montanis, & in montibus campestribus & apricis: apud nos non nisi in hortis cultum inveni. Floret Junio ac Julio. B. *Beer-wortel*. G. Beerwurtz, bærwurtzel, wilder-dill, bærndill, bærnsenchel, mutterwurtz, hertzwurtz. A. Spiguel, meu, wild dil.

MEZERÆUM, seu Chamælæa, est frutex, & Laureolæ species. Estque vox origine barbarica. B. *Berg-peper / zeel-bast / miseric-boom / kemels-hals / aard-leeuw*. G. Zeilant, keller-hals, zeidel-bast, leusz-kraut, seel-bast. Gall. *Mezereum*. A. Pepper of the monut, douch-mezereon, spurge olive, widdow-wail.

MIASMA, est inquinamentum contagiosum, quod spiribus & sanguini (ut in peste & scorbuto) accrescit, à *μιασμα* inquino. B. *Besmettel*. G. Alles was anstecket. Gall. *Maladie contagieuse*. A. A Contagious infection.

MICLETA, dicitur medicamentum sanguinem sistens.

MICROCOSMUS, sic homo dicitur quasi parvus mundus & compendium totius, à *μικρος* parvus, & *κοσμος* mundus. B. *De kleine wereld*. G. Die kleine welt. Gall. *Microcosme*. A. The little world, Nn 5 Mi-

MICROPTHALMUS, est, qui à nativitate parvos & fissos oculos habet, ex μικρός parvus, & ὀφθαλμός oculus. B. *Gen bjaad varken-oog / klein-oog.* G. Kleine augen. Gall. *Petit œil, œil de Cochon.* A. Little eyed.

MIGMA, ex mixtio diversorum simplicium, à μίγμα misceo.

MIGRANA, idem quod *Hemicrania*, sive capitis morbus, qui modo dextram, modo sinistram ejus partem occupat, & ad futuram usque protenditur, quæ doloris interstitium est. *Migrana* compositum videtur ex ἡμι semi & πῶρα caput. Vide *Hemicrania*.

MILIARIS HERPES, vide *Herpes*.

MILIOLUM, est tuberculum exterioris palpebræ, magnitudine & duritie granulum parvum Milii referens, ortum ab humore incrassato hærente in folliculo adiposo.

MILITARIS, seu STRATIOTES, est herba aquis innascens, sic dicitur quod milites vulnerati, eâ sanguinem effluentem sistunt: idem nomen quoque *Millefolium* obtinuit, vocatur etiam *Aloe palustris*, *Sedum aquatile* & *Aizoon pallustre*. B. *Kuiterg-kruid / krabben-klaauw.* G. Wasser donderbar, wasser bitter. Gall. *Jourbarbe aquatique.* A. Water House-leek.

MILIUM, Planta est, quæ habet caulem mediocriter crassum: folia sunt ampla & instar arundinis: flos apetalus per fasciculos in paniculam laxam dispositus; singuli flosculi constant plurimis staminibus ex calice plerumque bifolio surgentibus: semina ferè rotunda sunt aut ovalia, flava, aut alba, dura, splendentia, in cortice exiguo, tenero, inclusa: radix fibrosa, albescens: hæc planta crescit in locis arenosis & humidis. Gr. κέχρεον, sic vocatur à minutis ficuum granis, sive gygartis numerosissimis, quas κέχρεαμίδας appellant. Fortè nomen illud inditum à κέχρεϊδι avicula, quæ in altis urbium turribus nidificat. Milium itaque derivari volunt à μέλιν vel μέδιν, sed probabilius est dici à seminum copia, quasi millesimum ferat granum. B. *Geers / hirs.* G. Hirz, hirschen. Gall. *Mil, ou Millet.* A. Millet, Hirse.

MILIUM SOLIS, vide *Lithospermon*.

MILLEFOLIUM, est planta, quæ plures habet caules, rigidos, angulosos, villosos, rubicundos, in summitate ramosos: folia tenuissimè & innumerabilibus ferè segmen-

mentis divisa & subdivisa, juxta unam longissimam costam, disposita cui folia adnascuntur instar avium plumæ, odoris satis grati, saporis aliquantulum acris: flos est congestus in umbellam candidissimam, estque discoideus, radiatus: calix subrotundus, squamosus: semina valde parva: radix est lignosa, fibrosa, coloris fusci; crescit in locis incultis & arenosis: dicitur, quod ejus folia in plurima segmenta sunt conscissa & divisa. Gr. *Μυελοφυλλον*. Vocatur & Achillea, narrat enim Plinius Achillem à Chirone edoctum fuisse medicinam, & artem curandi vulnera, & Telephum proprio telo vulneratum hanc plantam curasse: *Stratiotes* sive *Militaris* etiam appellatur quod vulnera ferro facta sanet: atque adeo in militia & castris multus ejus usus sit. B. *Wijzend-blad / geruwe*. G. Garbe, tausend-blatt, garben-kraut, schaaf-garbe, schaaf-ripp, jungfern-auge, branen. Gall. *Mille feuille*. A. Nose-bleed, milfoil, yarrow.

MILPHÆ, est defluvium pilorum è palpebris, item medicamenta quæ huic morbo medendo sunt dicata.

MINA, sive **MNA**, patet ex Dioscoride pondus fuisse unciarum sedecim, sive drachmarum centum viginti octo. Verum *Attica* levior erat Romana, & pendebat drachmas centum, sive duodecim uncias & semissem. *Romana* pendebat nonaginta & sex drachmas, sive uncias duodecim. *Alexandrina* videtur uncias viginti continere, sive drachmas centum & sexaginta, fortè illa differentia oritur à regionibus, in quibus drachmæ differebant. *Mina* sive *Mna* videtur significare mille. B. *Ten minne wigt / een pond*.

MINERA, est terra sive materia, ex qua mineralia, & maximè metallica ignitionibus & liquefactionibus extrahuntur: uti sunt minere auri, argenti, cupri, stanni &c. B. *Mineraal*. G. Mineral. Gall. *Mine*. A. Idem.

MINERALIA, sunt corpora, quæ vel in Telluris superficie, vel in ejus gremio nascuntur, quorum fabrica est adeo simplex, ut nulla hæcenus perspicientia, ne quidem per microscopia acutissima detexerit in his varietatem inter vasa & ea, quæ his continentur, sed simillimam omnibus partibus affinitatem toti, licet in plurimis horum fluidarum & consistentium partium concursus certo cognoscatur permistu factus. Huc pertinent septem metalla; tum metalla imperfecta: gemmæ pellucidæ, & opacæ:

Lapides, Terræ, Salia, Sulphura. B. *Steinstoffen* / *Mineralen*. G. Mineralen. Gall. *Mineraux*. A. Minerals.

MINIUM, est Plumbum forti igne calcinatum, & in pulverem rubrum redactum, ponderosius quàm ante erat, virtutis mirè refrigerantis, si externè apponitur. B. *Minie*. Gall. *Mine de Plomb*. A. Red-lead.

MINYANTHES, sunt qui Millefolium exponunt. Si à *μύρια* mille, & *ἄνθος*, millefolium denotat. Si à *μινύειν* prodere, indicare, quòd flore suo prodat; an à phœniceo colore seu purpureo floris, tum derivatio esto à Minyum?

MIRABILIS PERUVIANA, vide *Jalappa*.

MIRACH, Arab. vox, idem est quod *Epigastrium*.

MISCE, scribitur plerùmque per M simplex in fine formularum, & denotat mixtionem duorum vel plurium medicamentorum.

MISERERE MEI, idem quod *Iliaca passio*, & *Chordapsus*.

MISTIO, idem quod *Mixtura*.

MISY, est minerale, sive potius chalcitidis efflorescentia, colore aurum imitans, aureisque scintillis, dum frangitur, splendens, natum super chalcitim & ex chalciti, non secus ac ærugo nascitur super æs & ex ære.

MITELLA, est species fasciæ sive linteum, in quo brachium læsum sauciumque suspenditur. B. *Gen-arm-band* / *arm-zwachtel* / *dwale* / *daar men de zerre arm in draagt*.

MITHRIDATIUM, à Rege Mithridate compositum, & pro Antidoto habitum ad depellenda è corpore venena, ab antiquis plurimi æstimatur, verùm quia constat ex simplicibus, quoad effecta, contrariis, nunc temporis non tanti venit: nam si *Opium* & pauca calida demerentur, tota compositio viribus esset orbata. Hujus variæ dantur descriptiones. B. *Mithridaat*. G. Idem. Gall. *Mithridaté*. A. Idem.

MITRALES VALVULÆ, vide *Episcopales*.

MIVA, est caro sive pulpa mali cydonei cum saccharo in consistentem spissam cocta. Vide *Marmelata*.

MIXTURA, MISTURA, MIXTIO, MISTIO, CRAMA, CROMA & CHRAMA, est substantia *Solida* vel *Liquida*, ex variis medicamentis commixta. Mixturæ pro scopi, quem habet Medicus, diversitate variæ admodum sunt;

sunt : Guttis maximè, vel Cochlearibus, quandoque Haustu usurpandæ, conficiuntur vel ex Liquoribus solis, quales sunt præcipuè Aquæ destillatæ, spiritus & olea, quovis modo inter se mixtis, sic ut aquæ misceantur aquis, olea Oleis, Aquæ Spiritibus, &c. vel ex iisdem cum Syrupis convenientibus, Pulveribus, Confectionibus, Opia-
tis, sive Omnia concurrant, sive Unum aut Alterum tantum adsumatur. B. *Gen mengsel.* G. Vermischung. Gall. *Mixtion; Mixture, Melange.* A. A mixture.

MNA, idem quod *Mina*.

MOCHLIA, est ossium luxatorum restitutio, μόχλιον enim vectis est, & μόχλιον parva vectis.

MODIUS, Gr. μόδιον, est mensura continens sedecim sextarios.

MODIOLUS, est *Trepanum*, sive *Anabaptiston*; quo utimur in profundis ossium corruptionibus, contusionibus, fissuris & fracturis: non faciliè tamen adhibendum, nisi primo ossium prominentiæ & frustula pungant. 2. Cum suprema tabula integra, sed depressa & infima disrupta sit. 3. Cum sanguis extravasatus, corruptione suâ, hominem jugularet. *Modus* perforationis hic est, derafis capillis, cutis in formam crucis usque ad pericranium, prudenter musculos temporales & futuras cavendo, est incidenda, & pro hac vice vulnus obligandum, nisi sanguinis profusio tam pauca sit, ut simul etiam pericranium à sub-
jecto cranio diduci possit: deindè post aliquot horas, ægri auribus obturatis, Modiolum masculinum sumito; cujus cuspis firmiter in cranio est collocanda, sed tam procul à fissura sive fractura, ne dentibus suis eam, multo minùs futuram attingat; quanquam nonnulli futuras non magnopere vitent, & nos certiores reddant, se eas tam feliciter, quàm aliæ quævis loca perforasse. Tum modiolum manu sinistrâ fortiter teneto, eum dextrâ circumducendo, donec circulum mediocriter profundum incideris, postea foeminam (in cujus medio nulla cuspis) accipe, & eandem ut ante circumducito: interim scobem auferto & modiolum ad lubricandum & refrigerandum in oleo & aqua tingito & madefac. Sanguis jam apparens, signum est te ad secundam tabulam penetrasse, & tum leniùs premendum, ne meninx incautè lædatur, ubi vacillare incipit officulum, vectim inter crepidines inserito, dissolvito,
&

& illud voffella eximito. Gr. *χοινικὸν* & *χοινικὸς*. Een been-
boor / een trepaan / panboor / boor-fchypf. G. Ein
boehrerlein. Gall. *Un Trépan*. A. A Borer, or Trepan.

MOGILALOS, eft is, qui cum difficultate loquitur,
ex μόγῃς vix & λαλίῳ loquor. B. *Zwaar befpraaft*.

MOLA, PATELLA, feu ROTULA, eft os rotun-
dum & latum, imponitur articulationi femoris & tibiæ,
ubi genu, membranofe ligamento cingitur, exceptâ mo-
lâ. Gr. *κόγχη* *κόγχη*, *Μαλὴ*, *Ἐπιγοατὶς*, *Ἐπιμυλὶς* Hip-
ποκ. *μυλακρὶς* Hipponacti. B. *De knie-fchypf*. G. Die
knie-fcheibe. Gall. *La Rotule*. A. The knee-pan.

MOLA CARNEA, eft fubftantia carnofa quandoque
etiam fungofa fine offibus & vifceribus; fapè inftar fan-
guinis concreti, nigra; & nonnunquam duriffima, loco
foetûs in utero producta. B. *Een zuiger / bleifige Mis-
dragt*. G. Mondkalb, mutter-gewächs, mutter-kugel,
mon-kind, mutterkalb. Gall. *Mole*, *faux germe*, *corps*
mollace. A. A mole or deformed birth.

MOLARES, feu MAXILLARES DENTES, Gr. *μό-
λοι* & *γόμφιοι*, vide *Dentes*. B. *Backanden*. G. Die Back-
ken zähne. Gall. *Dents mafchelières*. A. The cheek tooth.

MOLLIENTIA, vide *Emollientia*.

MOLLUGO, eft Aparines fpecies, ob mollitiem dicta,
quod ut Aparine, prætereuntium veftibus non adhæreat.
B. *Zagt-kruud*. G. Meyer-kraut.

MOLOPES, *Vibices*, *Enchymoma*, *Sugillationes*, idem
funt, dicuntur rubores vibicum inftar in febribus malig-
nis, & peftilentialibus producti, Gr. *μόλωψ* vibex. Vide
Enchymoma.

MOLY, Gr. *μῶλυ*, eft Allii aut cepæ fpecies, omnia ut
in Allio, fed odor fuavis, aut non graveolens; dicitur ἀπὸ
μὴ καὶ ὄλλω, five ὄλλυμι, quod ab interitu confervet, vel
ἀπὸ τοῦ μωλύειν τὰς νόσους, à mitigandis, fedandisque morbis,
aliud tamen Etymon Ptolomæus Hephæftion adfert. De
Moly deindè herba apud Homerum agit, quam è fanguine
interfecti, in Circes infula gigantes, enatam ferunt, habe-
reque candidum florem. Circes autem in pugna Socium so-
lem, etiam gigantem interemiffe dicitur, atque indè, quod
μῶλ pugnam fignificet, inditum herbæ nomen.

MOLYBDÆNA, feu PLUMBAGO, Planta eft, Per-
ficaria, fortè dicta ob maculas, quibus maculatur, plum-
beas, à *μόλυδος* plumbum. Mo-

MOLYBDÆNA, seu **PLUMBAGO**, duplex **Dioscoridi** est : *nativa & factitia*. Illa nihil aliud esse videtur, quàm lapis, sive plumbi minera, seu potius minera Plumbi & Argenti simul. Factitia est species lithargyrii, videlicet est illud recrementum quod in argenti aurique purificatione cum plumbo, minerave plumbi instituta, fornacis folio concretum, & perustum adhærescit. **B. Porloot.**

MOLYNSIS, idem quod *Miasma*.

MOMORDICA, est planta, quæ habet caules exiguos, sarmentosos, angulosos, striatos, scandentes : folia Bryoniæ, sed minora, caulibus longis adhærentia, saporis acris & amari : flores sunt monopetali, campaniformes, quinquefidi, lati, expansi, coloris flavi, albescentis : post florem sequuntur elegantes fructus longi vel rotundi, magis minusve turbinati, cavi, carnosì, elasticà vi rupti, & semina explodentes oblonga, vel ovata, rubicunda, obducta caliptra plana, margine denticulato : radix est parva, fibrosa : hæc planta colitur in hortis ; est planta officinalis, refrigerans & astringens, cujus fructus pomiformis est in usu, Balsaminæ quoad faciem similis, quamvis prorsus ab eo distinguenda. **B. Balsam-appel. G. Balsam-apfel. Gall. Pomme de Merveille. A. Male Balsam apple.**

MONOCEROS, idem quod *Unicornu*.

MONOCOLUM, est *Intestinum cæcum*.

MONOHEMERA, sunt morbi qui uno die curantur, ut *Ephamera* febris, ex *μία* sola, una, & *ἡμέρα* dies. **B. Eendaagse ziekte. G. Eine fieber das nur einen tag wæret. Gall. Maladie d'un jour. A. A disease of one days duration.**

MONOPAGIA, vide *Monopegia*.

MONOPEGIA, est acutus capitis dolor, unum locum occupans, ex *μῆκος* solum, & *πηνύω* compingo. **B. Enzypdige hoost-ppn. G. Hauptwehe an einer seiten des haupts. Gall. Migraine. A. An acute fixed pain of the head.**

MONS VENERIS, nominatur superior pubis muliebris pars, præ reliquis nonnihil eminentior, & crispior, quàm in Veneris castris militaturi omnium primo conscendere debent. **B. Venus-berg. G. Venus-berg. Gall. Eminence, ou Montagne de Venus. A. Mountain of Venus.**

MONSTRUM, Gr. *τίγας*, nihil aliud est quàm foetus, five

five homo perversè enixus, hoc est, capite duplici, pedibus aut manibus deficientibus, vel abundantibus, ita ut perfecto homini similis non sit. B. *Gen monster*. G. Eine Wundergeburt. Gall. *Monstre*. A. Monster, or de formed birth.

MORA BACCI, MORA BATI, MORA VACINIA, MORA VACCINIA. vide *Rubus*.

MORBILLI, quasi parvi morbi, sunt maculæ rubræ quæ à contagio aëreo in sanguine contracto excitantur, quæ neque in molem attolluntur, neque suppurantur, sed cum epidermide desquamantur, cum febre, tussicula, &c. decurrentes; à variolis, ut magis & minus tantum differunt, ab Arabibus *Bothor* vocantur. B. *Maze*. G. Die masern, die purpulen, à colore purpureo, kinds blattern, durchschlechten, bocken. Gall. *Rougeole*. A. The measles.

MORBUS, Gr. *Νόσος*, *Νόσος*, à *Morte* dicitur, undè est propinqua dispositio ad eam: etenim quicquid morbi nomine venit, non potest non initium esse, & velut gradus ad mortem, undè patet differre morbos, juxta majorem vel minorem propinquitatem: diciturque esse ejusmodi corporis constitutio, quâ actionibus Naturalibus, Vitalibus, Animalibus rectè obeundis simus inepti: Morbus est duplex, *Pravæ Conformationis*; vel succorum *Incrassatorum*, vulgò *Intemperiei*: *prava Conformatio*, est sextuplex; consistit enim in Numero, Magnitudine, Figura, Cavitate, Superficie & Situ. *Intemperies* sive succorum inspissatio est venenata sive contagiosa & pestilens; vel Benigna, & sunt morbi vulgares, ut per Idiopathiam, Protopathiam, Deuteropathiam & Sympathiam. Item morbus est Simplex, Compositus, Multus, Complicatus, Connexus, Disjunctus, Magnus, Parvus Benignus, Malignus, Brevis, Acutus, Longus, Continuus, Intermittens, Salutaris, Dubius, Lethalis, Sanabilis; Insanabilis, Exquisitus, Spurius, Hæreditarius, Nativus, Adscititius, Sanguineus, Bilarius, Pituitosus, Melancholicus, Vernus, Æstivus, Autumnalis, Hybernus, Pandemius, Epidemius, Sporadicus. B. *Ziekte*/ *krankte*. G. Kranckheit, eine feuche. Gall. *Maladie*. A. A Maladie, Sickneße, diseafe.

MORBUS GALLICUS, vide *Lues Venerea*.

MORBUS HISPANICUS, vide *Lues Venerea*.

MORBUS

MORBUS INDICUS, idem quod *Lues Veneræ*.

MORBUS REGIUS, idem quod *Icterus*.

MORETUS, mulierculis nostris usitatissimum potionis genus aromaticum est, quod parari faciunt, ubi præsumptio imprægnationis adest, persuasum nimirum sibi habent, falsam imprægnationem eo exturbari, veram corroborari. Moretum dicitur, à Moris seu Diamoro ingrediente. B. *Ein Moerbezie drank*. G. Ein Maulbeeren tranck, ein edes gemengtes effen. Gall. *Potion de Meure*. A. A Mulberry drink.

MORIA, *Stupiditas, Fatuitas, Stultitia, Stoliditas &c.* est judicii & intellectus defectus; oritur præcipuè ab imaginationis & memoriæ deliquiis, à *μωραιω* stultè ago. B. *Irakzinnighept*. G. Thorheit. Gall. *Folie, Stupidité*. A. Stupidity.

MOROSIS, idem quod *Moria*.

MORPHÆA, idem quod *Alphus*.

MORPIONES, vocantur, pediculi illi lati, qui ad pubem genitalium, imò & sub axillis in crinibus hospitantur. B. *Platlupzen*. Gall. *Morpions*.

MORSELLI, idem quod *Morsuli*.

MORSULI, seu MORSELLI, TABULÆ, medicamenta sunt quadrata figura ut plurimum, parata ex pulveribus, & similibus saccharo soluto exceptis, superque tabulam ligneam, lapideam, cupreamve effusis, ut consolidentur. B. *Koekjes*. G. Zelt-lein, morsellen. Gall. *Tablettes*. A. Morsels or tablets.

MORSUS CANIS RABIDI, vide *Cynanthropia*.

MORSUS DIABOLI, idem quod *Ornamentum Foliaceum*.

MORSUS DIABOLI seu SUCCISA, vulgus superstitione quâdam motum credit cacodæmonia, tantæ efficacæ radicem hujus plantæ invidere hominibus, atque hac ratione ubi succreverit, statim eam undiquâque circumrodere. B. *Quibels beet*. G. Teufels abbisz. Gall. *Le Succisa*. A. Divils bit.

MORSUS GALLINÆ, est Alfinæ species, sic dicta quòd gallinis gratum pabulum subministret. B. *Hoender-beet*. G. Huener-bisz. Gall. *Morgeline*. A. Chickweed, Henbit.

MORSUS RANÆ, est Nymphææ minoris species :

sic appellatur, quod Ranæ ejus morſu gaudeant. B. *Eschebet*. G. *Froschen-biſz*. Gall. *Eſpece de Nenuphar*. Frog-bit.

MORTARIOLA, ſeu CAVERNÆ, Loculamen-
ſunt quibus ſinguli dentes ſunt infixi. *Βότρυς Galeno*, *ὀ-
πλοχοι Poll. Ruſo*. B. *Caandſ hollen*. G. Die *hoelen d'
zæhne*. Gall. *Les Alveoles des dents* A. Caverns of the
Teeths.

MORTARIUM, eſt vas ex marmore, ære, ferro, li-
no, vel vitro confectum, in quo piſtillo ligneo, vitreo
ferreo, æreo, vel lapideo res quædam contunduntur. B.
Ein mortier / byzel. G. Ein *mœrfel*. Gall. *Un Mortier*.
A. A Morter.

MORTIFICATIO, idem quod *Sphacelus*.

MORUM, idem quod *Pladoroſis*, vel *Thymus*.

MORUS, MORUM, eſt arbor magna & ramoſa, cu-
jus truncus ſatis eſt craſſus, tortuoſus, nodofus, cortice
craſſo & aſpero obductus : lignum eſt durum, intus ſi-
vum : folia ſunt inſtar manûs ampla, oblonga, acuta, ſe-
rata, dura & tactu aſpera, ſaporis dulceſcentis & viſcoſi
Bombycibus pabulum inſerviunt : flos eſt amentaceus
plurimis nempè ſtaminibus è calice quadrifolio ſurgentibus
conſtans, ſed ſterilis : Embryo autem abit deinde in
fructum nigrum, ſuccum viſcoſum dulcem habentem, &
è glomerulis ſquamarum, ſuccum viſcoſum & dulcem
continentium compoſitum, quæ ſemen amplectuntur ſul-
cotundum : an à morando ? Proinde cum hanc germina-
re viderimus, frigus minimè timendum ſit. Sunt qui
Græco hoc nomen derivent, *Μόρον* enim nigrum denotat
quodd ejus fructus ob ſaturum colorem rubicundum, nigri
appareant. Gr. *Μορία*, *Συναμνία*, & *Μόρον*. B. *Moer-
bezien-boom*. G. Maulbeer-baum. Gall. *Meurier*. A. Mul-
berry-tree.

MOSCHATA NUX & MUSCATA, duplex habetur
Oblonga nempè, quæ & *Mas* dicitur ; alia eſt *Rotunda*
quæ *Fæmina*, differentię gratiâ, appellatur. Naſcitur ar-
bor in Inſula *Banda* Indiæ Orientalis : proceritatem ha-
bet arboris pyri : folia perſicæ malo haud aſimilia, ve-
ut veriùs dicam, breviora, & magis ſubrotunda, imò &
latiora ſunt. Fructus appoſitè malum perſicum reſert : cu-
jus cortex externè per maturitatem inſtar juglandis nor-
tan

ntum dehifcit, fed eo incolæ quoque vefcuntur. Hâc motâ, fequitur *Macis*, conftans ex variis fubrubicundis liolis: hæc item durum corticem inveftiunt, qui ipfam nucem Moſchatam incluſam ſervat. Leguntur Noces māræ, lectæ remotis putaminibus aquâ marinâ conſperſuntur, & ſiccantur ad ſolem, ſiccatis adimitur macis, poſtea nuclei lavantur calce, ut eo meliùs à corruptione ſerventur. Integram unam cum cortice exteriori ſervo. Dicitur & *Nux Aromatica*, *Mofchocaryon*, *Mofchorydion*, *Nux Myriftica*, ſeu *Unguentaria*. B. *Mofcaat* Root. G. Muſcat-nuſz. Gall. *Noix Muſcade*. A Nutmeg. MOSCHELÆUM, eſt compositio ex moſcho & oleo. MOSCHUS, quidam eſſe ſaniem ex tumore circa umbilicum alicujus animalis promanantem volunt: alii teſticulos ejuſdem, alii aliud quid cenſent. Moſchiſera caprea, capræ minoris ſpecies eſt, dentibus duobus verſus ſeriora prominens, quadrupes, ungulis biſectis, ſine udda. Pilorum colore variegatus ex luteo caſtaneus, & oculis quaſi ſuperbit: Pili in abdomine cinerei, in caete ex albo & cinereo caſtanei, ſunt & longiſſimi. Carum in abdomine non longè à poſterioribus pedibus, eminentia quædam eſt, rotunda & dura, ovi gallinacei mediocris magnitudine, pilis albis, iſſque non flexuoſis, ſed rectis, & ad folliculi ſaſtigium porrectis obſita. Circa hujus partem inferiorem unica utrinque caruncula apparet, qualis etiam, licet paulò major, non longè ab iſtis in niſtro conſpicitur latere. Ea autem eminentia, ſive tumor nihil aliud eſt, niſi folliculus quidam in quo moſchus nieri inſtar, colligitur. Eſt & alia ſpecies ſed longè vilior. Colligunt enim hujus animalis ſanguinem, quem quieti aliquandiu exponunt, deindè ſerum ſupernatans decantant, animali mortuo cutim detrahunt, & exenterant; reliquum minutim conſcindunt, cumque ſanguine miſcent, hancque maſſam pelli ejuſdem animalis includunt, terræ committunt, & per aliquot dies urina perfundunt, donec materies putrefacta ſit; hanc mumiam exſiccata pro Moſcho venditant. Nonnulli inteſtina unà cum ſæcibus adjiciunt. Venit ex India orientali de Tonquin non procul à China. B. *Muſhus*. G. Biſem. Gall. *Muſc*. A. Moſch.

MOTOS, eſt linteum carptum, quod ulceribus inditur, quo etiam ſanguinis fluxus ſiſtitur, vulgò *Carpi*. B. *Mulus*.

fel/ à *μωτάω* linteamentum vulneribus iudo. Gall. *Charp*

MOTUS CONVULSIVUS, est convulsio, quæ alternatim fit inter musculos, vel fibras antagonistas sive oppositas. Hic verò motus convulsivus multa complectitur, in multis morbis tragædiam suam exhibet, vulgo quidem cum vix intuentur, nisi in una illa specie, quam vocant *Epilepsiam*, quæ ferè universalis est, sed altera quædam particularis occurrit, cum in his illisve musculis, et maxime in fibris motricibus, quæ longè, longèque frequentior est. B. *Strup-trèkkinge*. G. Das glieder spannen. Gall. *Les Mouvements convulsifs*. A. The convulsive motions or fits.

MOTUS PERISTALTICUS, vide *Peristalticus motus*.

MOXA, venit ex China & Japan. Lanugo quædam ab inferiore parte Artemisiæ foliis accrescens, quæ seipso abraditur, & postea caro pretio venum exponit. Intervit ustioni, eodem modo ut in Ægypto gossypium & olim Hippocratis tempore fungi seu *Μυκάρες*, similes sed magis fuscam lanuginem ex America allatam, videtur. Conficitur ex Artemisiæ vulgaris (latifoliæ) adhuc de recentis foliis exsiccatis, longo tempore in aëre suspensa & obsoletis: colligitur verò ad Moxam eliciendam Artemisia non omni promiscue tempore, sed certis tantum diebus ab Astrologis indicatis. Præparatio Moxæ nullo artificio absolvitur: tunduntur primum impigro pistillo folia ad mollitiem rudioris stupæ; dein utrâque manu agitantur & fricantur assidue, ut priori contusione jam attritis deinde duriores fibræ, & recrementa membranacea: quibus excussis, remanet desiderata illa insignis teneritatis lanu-
mogenea & purissima lanugo, quæ tenellam Regii nominis Artemisiam præ cæteris herbis ditare natura studuit. Lanugo illa coloris cinerei est, concipiendo igni aptissima, eoque admissa moderatè gliscens, scintilla minus conspicua, ardore temperato, progressu lento, donec in villam tota depasta sit.

MUCCUS, idem quod *Mucus*.

MUCAGO, MUCILAGO & MUCUS, est extracta viscida mediante aquâ ex seminibus, gummi, radicibus &c. facta. B. *Slpm*. G. Schleim. Gall. *Mucilage*. A. *Slip*

MUCARUM, idem quod *Mucharum*.

MUCHARUM sive **MUCARUM**, vocabulum est Ba

rum, quo nonnulli infusionem rosarum per se, alii infusionem cum saccharo in syrupum coctam intelligunt, tñ illud *Mucharum* significabit saccharum.

MUCILAGO, idem quod *Mucago*.

MUCRO CORDIS sive APEX, est inferior pars cordis cuspidata. B. *De punt van 't hert*. G. Die spitze des hertz. Gall. *La pointe du cœur*. A. The point of the heart.

MUCRO, est acumen, in quod pars quaecunque desinit. Sic foliorum multorum, filiquarum quarundam, & binarum omnium extrema in mucronem acuminantur.

MUCRONATA CARTILAGO, vide *Ensisformis Cartilago*.

MUCRONATUM OS, vide *Ensisformis Cartilago*.

MUCUS, Gr. *μύξα*, *βλεννα*, *κόρυζα*, est excrementum quidam, crassum & viscidum, quod ad nares & palatum defluit, & secretum fuit ex glandulis membranae nares earumque sex cavitates investientis. B. *Snor*. G. Butten, der unflat, so durch die nasen gehet, rotz. Gall. *tituite*, *Mucosité*, *Morve*. A. Snevil or snot.

MUCUS INTESTINORUM, est quaedam visciditas, ex glandulis exsudans, interna obliniens, ne intestina facile ab acribus aut duris ingestis laedantur. B. *Warmthum*. G. Schleim der dærme. Gall. *L'Humeur visqueuse ou muqueuse que l'on trouve dans les intestins*. A. The Slime of the Guts.

MULIEBRIA, vide *Cunius*.

MULOMEDICINA, idem quod *Veterinaria*.

MULSUM, idem quod *Hydromel*.

MUMIA, ejus habentur quatuor species, *Arabum* nempe, quæ est liquamen seu liquor concretus exsudans in sepulchro e cadaveribus Aloë, Myrrhâ, Balsamoque conditis. Altera *Ægyptiorum* est, sive liquamen ex cadaveribus pissasphalto conditis. Nimirum, hoc condiebantur cadavera & villioris fortis, adeoque & ipsamet cadavera nonnunquam eo modo condita prostant. Tertia, *Pissasphaltum factitium*, id est mixtum pici bitumen, quod pro *Mumia* venditant. Quarta, cadaver sub arena solis æstu torrefactum. Fitque in Hammoniorum regione, quæ est inter Cyrenarum regionem & Alexandriam, ubi arenarum Syrtes ventorum turbine sublatae incautos viatores obruunt, undè horum cadavera à flagrante solis æstu tor-

rentur & exarescunt. Omnium præstat prior species.

MUNDATIO, sive PURIFICATIO, est, quæ medicamenta à pulvere, corticibus aliisque immun purgantur. B. *Zuiberinge*. G. Das saubern, reinig
Gall *Purification*. A. Purifying.

MUNDIFICATIVUM, est tale medicamentum, quod ulcera fordibus purgantur. B. *Zuiberende dingen*.

MURALIS HERBA, idem quod *Parietaria*.

MURIATICA ACRIMONIA, est acredo humorum in corpus humani quibusdam morbis peccans, uti in scorbuto, melancholia &c. quæ omni signo se accedere Naturam salis marini, vel ammoniaci manifestat sese, quæ sapor in ore falsus semper, sitis assidua & inger siccitas & rigiditas corporis; urina falsa, tardè putrescens cum sedimento spisso, & cum pellicula tenui pingui in tante.

MUSCÆ CAPUT, idem quod *Mycephalum*.

MUSCARI, est Hyacinthi botryoides species; quæ habet folia longa, angusta, striata, sat crassa, succo pleno intra quæ assurgit caulis erectus, sat crassus, rotundus sine foliis: flos est hermaphroditus, monopetalus, urceolatus, vel arbuteus, ad oras in sex crenas reflexas divisus, atque in fastigio caulis in racemum congestus, denudum agmine aggestum, odoris aromatici & valde grati ferè instar moschi: flori succedit fructus sat crassus, triangularis, divisus in tres loculos continentes semina rotunda, nigra: radix bulbosa, albescens, habens multas tunicas saporis amari: sic appellatur quod ejus flores Moschum oleant.

MUSCARIA, in vegetabilibus sunt in orbem radiata herbarum comæ, cacuminaque in fascies coacta, à flabii similitudine, cujus ventilatu muscæ in conviviis abiguntur, dicta.

MUSCIPULA, est species floris Armerii, seu *Viscaria* eo dicitur, quod caules ejus visciditate obducuntur, quod de causa muscæ advolantes visco illo capiuntur. B. *Bliegenet / Keikens*. Gall. *Atrape-Mouches*. A. Catech-Fly.

MUSCULUS, est pars corporis animalis Organica vasis Sanguineis, lymphaticis, Nervis, duobus tendinibus, & fibroso seu carnoso ventre instructa, cujus officium est, membra mobilia, appensa movere. Motio illa seu

seu contractio fit, quando à cerebro, cerebello, vel medulla spinali, per nervos ad fibras musculosas spiritus animales fluunt, & simul in sanguine major est determinatio ad easdem partes, tum muscoli venter incipit tumere, adeoque partes longitudinales abbreviantur, & tendines ad se invicem accedunt, & pars annexa mobilis ad minus mobilem attrahitur; hæc autem determinatione spirituum & sanguinis cessante in fibras musculares, & liquidis per extrema vasorum suorum oscula effluentibus, omnia iterum flaccescunt. Veteres muscoli corpus in caput, ventrem & caudam diviserunt, accipientes pro capite, musculi extremitatem parti, ad quam fit contractio, connexam; pro cauda, muscoli finem seu portionem, parti movendæ insertam, pro ventre denique partem muscoli intermediam, quæ carni mole tumidior conspicitur; deinde pro motu obeundo, supponebant muscolum, circa caput & ventrem intumescere, & deinde quoad longitudinem decurtatam, partem appensam sibi propius attrahere, sed quo ritu id fiebat, magnum apud illos silentium est. Musculi sunt vel cavitatibus vel artubus destinati, qui omnes à figuris, locis & actionibus variis diversimodo denominantur. Gr. *Μῦς*. B. *Gen spier / de muis / muskel*. G. Die fleischmäutz oder mausz. Gall. *Muscle*. A. A muscle.

MUSCULOSA EXPANSIO, vide *Myodes platysma*.

MUSCUS, Gr. *Βρύον*, & *Μύιον*; quibusdam *Σπλάγχχον* & *Σφάγγον*, *Υπνον*, *Δορκαδία Βοτάνη*. Arab. *Usnea*, sunt plantulæ parvæ sui generis, arboribus, lapidibus &c. accrescentes, fortè à mucore appellatur, quòd instar mucoris efflorescat. B. *Mosch*. G. *Mosz*. Gall. *Mousse*. A. *Moss*.

MUSTELLANCI, vide *Galiancones*.

MUTUS, vide *Aphonia*.

MYACANTHA, seu RUSCUS, aut BRUSCUS, sic appellatur, quod ejus folia rei conservandæ appendantur, ne mures ob acutas spinas, eam lædant, ex *μῦς* mus, & *ἄκανθα* spina. Vide *Ruscum*.

MYAGRUM & MYAGRIUM, Est planta, quæ habet caules rotundos, duros, politos, ramosos, medullam albam habentes: folia sunt oblonga, & aliquomodo Isatidis cultæ similia, sed pleraque sunt laciniata, & inprimis inferiora: flores sunt exigui, quadrifidi, in crucem dispositi, flavi: post florem succedit fructus rotundus, acu-

minatus, trilocularis eâ lege, ut locus primus contineat semen obrotundum, oblongum, & rubicundum, bini vero vacui apparent : radix crassa, alba, uno tantum anno durans, crescit in pratis, præsertim in regionibus calidis : nomen accepit, quod insistentes, vel prætervolantes muscas glutine suo implicet, & retineat, nec non captet, à *μύια* musca, & *ἀγρεύω*, capio. G. & Gall. *Cameline*. A. Gold of Pleasure.

MYCETÆ, MYCETES, sunt fungi : *Μύκης* Gr. *Μύκητας* vocârunt, ab ensis capulo, vel summo vertice vaginam occludente : *μύκη* ensis Theca, Gladii Capitulum, à *μύω* claudio.

MYCTERES, sunt nares, five humorum pituitosorum receptacula. B. *Snot-ontfangers*. G. Die butzen empfangersz, die nasen löcher. Gall. *Receptacles de la morve, ou de Pituite*. A. The receptacles of pituitous humors.

MYDESIS, est corruptio five putredo, ex nimio calore, à *μυδιάω* nimio humore & uligine vitior.

MYDRIASIS, est nimia pupillæ dilatatio, & diffusio, visui hebetudinem adferens, ex *ἀμυδρῶς* obtusè, & *ὀρεῖν* videre. B. *Een stomp gezicht*. G. Bloed gezicht. Gall. *Vue foible par la trop grande dilatation de la Pupille*. A. Dim singht.

MYELOS, idem quod *Medulla ossium*, vel *Cerebri vel Medullæ spinalis*.

MYLE, idem quod *Mola genu*.

MYLOGLOSSUM, est pars musculorum quod circa dentium molarium postrema oritur, & ligamento linguae inferitur, linguamque fursum convertere perhibetur, & *μύλη* mola five dens molaris, & *γλῶσσα* lingua. B. *De kauw-tandens tonge-spier*. G. Der backen zæhnen-zung mauz. Gall. *Myloglosse*. A. Idem.

MYOCEPHALUM, est inchoatus uveæ tunicæ prolapsus, in nigro oculi, ab exulceratione ortus, muscæ capiti similis, ex *μύια* musca, & *κεφαλή* caput. B. *Een mug-gehuys-oog*. Gall. *Tête de Mouche*.

MYODES PLATYSMA, est musculosa expansio, lata, à claviculis sternoque incipiens, in collo densissima, menti totiusque ferè faciei cutem movendo dicata, nam immediatè sub panniculo adiposo decurrit, ex *μῦς* musculus, *ἰσθῆ* forma, & *πλατὺς* latus.

MYO-

MYOLOGIA, est illa pars Anatomices, quæ tradit structuram, situm, functionem omnium muscutorum totius corporis, sive hæc describendo, sive diffecando & demonstrando fuerit occupata, ex $\mu\upsilon\varsigma$ musculus, & $\lambda\acute{\epsilon}\gamma\omega$ narro.

MYOPIA, est quædam visus in rebus distantibus cer-
nendis obscuritas vel abolitio, sed tamen in propinquis
perspicacia, orta ob oculum anteriùs nimis globosum,
oculum nimis longum, vel quòd lens crySTALLINA sit rotun-
dior: hinc radii lucis ab objectis remotis emissi, ob refra-
ctiones per tres humores se secuerunt transversim ante-
quam in retina colligantur, cui medendo appropinquatio
objectorum, vel vitrorum concavorum applicatio conve-
nit: ex $\mu\upsilon\varsigma$ mus, quia murium visum referunt, & $\omega\psi$ ocu-
lus. B. *Spziende / stikziende*. G. Ein kurtz gesicht, der
nicht in die lange oder ferne sehen kan. Gall. *Myopie, la*
Vene courte. A. Pur blind.

MYOPIASIS, vide *Myopia*.

MYOPS, est qui *Myopia laborat*.

MYOSOTIS, id est muris auricula, dicitur sic ob so-
liorum formam, ex $\mu\upsilon\varsigma$ mus, & ς auris: est planta, quæ
habet caulem exiguum, lanuginosum, repentem: folia
sunt obrotunda, crassa, lanuginosa: flores amæni, lactes,
quinque petalis in medio aliquo usque unica divisura in-
cisis, & striatis compositi, quos foris ad basin totidem hir-
suta viridantia foliola sustinent, in medio verò stamina &
stilis colore luteo: floribus succedit capsula sive fructus
coma bovili æmulus, apice dehiscens, seminibusque fæ-
tus exiguis, plerumque subrotundis: radix est alba, re-
pens, fibrosa: crescit hæc planta in montibus. B. *My-
sen ooz*. G. Mause ohrlin. Gall. *Oreilles de souris*. A.
Common Mouse-Ear.

MYOSUROS, est parvula planta, quæ habet folia gra-
minea, Coronopi instar, sed non laciniata: caules sunt
parvi, tenues, rotundi aut cylindrici, nudi: calix quin-
que folius, singulis foliis appendice instructis, deorsum
tendente: flosculi herbacei, staminibus præditi multis ex
ambitu fundi ovarii, semina in spica longa, tenui, acuta,
muris caudam referente: radix annua, fibrosa: hæc plan-
ta habet saporem acrem, & crescit in pratis: Myosurus
vocatur à $\mu\upsilon\varsigma$ mus, & $\epsilon\tau\alpha$ cauda, quasi cauda muris,
Oo 5 quia

quia spica hujus plantæ muris caudam refert.

MYRACH, Arabica vox est, & idem sonat quod *Epigastrium*.

MYRACOPUM, est Unguentum lassitudinem auferens, ex *μύρον* unguentum, & *κόπος* labor.

MYRICA, est arbuscula, dicitur *ἀπὸ τοῦ μύρεσθαι* à lugendo : sed quid impedit quòd dicamus à contrario, quòd Melancholicis proffit, tristitiamque & luctum omnem, quæ Melancholiam comitari solent, pellat ? Vulgò *Tamariscus* vocatur. Gall. *Tamarisc*.

MYRINGA, MYRINX, est *membrana Tympani*.

MYRIOPHYLLUM, est *Millefolium*, ex *μυρία* numerus infinitus, & *φύλλον* folium.

MYRISTICA NUX, idem quod *Moschata Nux*.

MYROBALANI, propriè significant glandes ungenterias, ideòque procul omni dubio Veteres Medici aliud quid sub hoc nomine intellexerunt: componitur enim vox ex *μύρον* unguentum, & *βάλανος* glans. Qui nobis in usu sunt, prunis exoticis annumerari debent, Veteribus græcis incogniti, ab Arabibus primum inventi, suntque *Chebuli*, *Citrini*, *Bellerici*, *Indi*, *Emblici*. *Chebuli* omnium maximi sunt, oblongi, intùs nucleum continentes, externè colore fusco. Vocantur *Quebolia* & *Quebuli*, *Cepula*, *Chepula*, *Chebula*, maximi, oblongi, angulosi. *Citrini*, externè sunt colore citrino, & teretes, oblongi & ventricosi, dicuntur lutei, flavi, citrei Gr. *Ξάνθοι* Arab. *Delegi azfar*, intùs nucleum habent. Ipsius arbor folia instar Amygdali habet. *Bellerici* etiam oblongi sunt, cucurbitam referentes, ejus arbor folia habet instar lauri. Vocantur *Belleregi*, *Bellilegi*, *Bellegu*. *Indi*, sunt oblongi & nigri, prioribus minores; folia habent instar Amygdali, vel ut alii volunt salicis. Fructus sunt octangulares. *Emblici* rotundi quidem sunt, sed semper ferè in frustra fissi. Folia habent tenuia, in modum ferè salicis. Appellantur *Emblegi*, *Imblegi*, *Ambegi*, *de Seni*. Omnes illæ species pruni sunt, & inter eas censeri debent, quamvis foliis, regione & fructuum figura ab invicem differant: omnes quoque purgant & astringunt, ferè uti Rhabarbarum. Gall. *Myrobolans*.

MYRMECIA, est verrucarum species, sunt thymo duriora, humilioraque, quæ radices altius agunt, majoremque

de dolorem movent, infrà lata, suprà autem tenuia, mis autem sanguinis mittunt : magnitudine vix unquam pini modum excedunt. Nascuntur in palmis aut in inferibus partibus pedum, à *μύρμηξ* formica. G. Breyte-
rtze.

MYRON, idem quod *Unguentum*.

MYROPOLA, est Unguentarius, qui unguenta vendit, ex *μύρον* unguentum, & *πώλειω* vendo. B. *Pen zalf-
thoper*. G. Ein salben-kramer. Gall. *Vendeur d'onguents*.
A. Salve seller.

MYRRHA, cujus arboris sit gummi adhuc incertum est. Est tamen Resina Gummea (concretus gummi resinosus succus) cujusdam arboris exoticæ, quæ, cortice vulnerato, Myrrham profundit, partim in subscratas teges destillantem, partim circa caudicem concrecentem. Purissima asseritur ex Arabia, tum etiam ex Regione Ale-
xim, quæ Æthiopia est. Debet esse friabilis, levis, undique concolor, minutis glebis amara, acris, odorata & quæ contracta, venas unguum modo candidas & leves ostendit. Antefertur *Trogloditica*, colore pallescens, seu abviridis, splendens ac mordax. Inutilis est ponderosa, & coloris piceæ seu nigra. Gr. *Σμέρμα* B. *Myrrhe*. G. Myr-
then. Gall. *Myrrhe*. A. Idem.

MYRRHIS, est planta, cujus caulis altus, ramosus, villosus, intus excavatus; folia sunt magna, ampla, striata, cicutam aquaticam referentia sed magis albescentia, & sæpè maculis sibiris notata, mollia, parum villosa, coloris & odoris *Charophylli*, & saporis anisi : flos rosaceus, & umbellatus, plurimis scilicet petalis constans inæqualibus, in orbem positis, & calici insidentibus; qui ab initio fructum ex duobus seminibus compositum, oblongis ple-
rumque striatis, sæpè levibus, aliquando hirsutis, quæ licet hirsuta, semper sunt striis excavata, nigricantia, gra-
tum gustum anisi præbentia : radix longa, crassa, alba, mollis, fungosa, aromatica. Dicitur & *Cicutaria*, sic dicta, quod cicutæ similis sit; an nomen à Myrrha, propter odorem, qui tamen non convenit, habeat, non aude-
rem affirmare : aut à *μύρον* unguentum suaveolens. B. *Wilde
kerwel*. G. Wilder-kerwel. Gall. *Cicutaire*, *Perfil d'Asne*.
A. Hemlock.

MYRTOCHEILIDES, dicuntur extremæ pudendi
mu-

muliebris margines carnosæ, quæ quoque *Alæ* appellantur.

MYRTUM, est caruncula in muliebri pudendo, circumrimam, à corrugatione vaginæ excitata.

MYRTUS & MURTUS, est arbuscula semper viridis & odora, quæ habet caulem ramosum, flexilem : foliis buxi, sed minora, acutiora, polita, splendentia, odorati : flores ex foliorum alis crescentes, singuli quinque folia in umbellam desinentia habentes, albi, odorati, calicem incisum continentes : calix postea fit bacca ovalis, aut oblonga, coronam habens : hæc bacca est viridis post maturitatem nigra, succulenta, polita, habens semina dura, albescentia, compacta saporis adstringentis : hæc arbuscula crescit in regionibus calidis. Gr. *Myrtos*, *Μύρτις*, à Myrsine Athenienti puella, pulchritudine robore insigni; amica Palladi, in quam, occisa, conversa fuit : at quibusdam sic dicta, propter æmulam Myrtil quandam odoris gratiam, quæ in baccis recentibus observatur. B. *Myrten-boom*. G. *Myrten-baum*. Gall. *Myrte*. A. *Myrtle-tree*.

MYSTAX, est labium superius, ejusque pili in labiis excrecentes, à *μαστόμα* mando. B. *De knevels*. Der knebelbart. Gall. *La Moustache*. A. *Muschadoes whiskers on the upperlip*.

MYSTRUM MAGNUM, est Antiquorum mensura continens tres uncias, & octo scrupulos vini, & olei triuncias.

MYSTRUM PARVUM, est Mensura Antiquorum continens viginti Scrupulos vini, vel sex drachmas olei.

MYURUS, est pulsus decurtatus aut mutilus, sensu decrepescens, vel accrescens, instar caudæ muris, ex *μῦς*, mus, vel *μῦς*, pars divisa, & *ῥα* cauda.

MYXA, est mucus sive humor pituitosus, ex cavernis frontalibus, maxillæ superioris, ossis sphenoidis, & convolutionibus 4. ossiculorum spongiosorum membrana glandulosa investitis ad nares descendens. B. *Snot*. G. *Rotbutzen*. Gall. *Morve Pituite*. A. *Snevel*.

MYXA, MYXARIA, vide *Sebesten*.



N.

No. Designat apud Medicos numerum, ex gr. β. Jubarum N^o. VI. hoc est *Numero sex*.

NÆVI, sunt quædam maculæ nativæ, eæque duplices, protuberantes & planæ, quæ sunt figurâ variâ & colore diversimodo. Hæ gravidis ex imaginatione falsa, irietate, ecstasi &c. eveniunt. B. *Moeder-blekken*. G. *n angeborenen maale am leib, flecken*. Gall. *Tache que les fans ont en naissant*. A. A Mole, marcke in nativitie.

NAKIR, describitur à *Schenkio*, quod sit status furiosus, qui transit ab uno membro in aliud, cum dolore. B. *ocari potest*. B. *Een vliegende wind*. G. *Fliegende ind*. Gall. *Vent volant*. A. *Flying winde*.

NAPELLUS, est diminutivum à *napus*, sic dictus, quod *Napellus* radicem habeat quodammodo tuberofam.

Wolfs-wortel / munniks-kapjes. G. *Eisen-huetlein*, wolfs-wurtz, kappenblumen, narren-kappen, tufels-wurtz. Gall. *Napel*. A. *Wolf-bane*.

NAPHA, sic propriè in officinis vocatur aqua destillata ex floribus arantiorum.

NAPHTHA, est colamen bituminis Babylonii, consistentia liquidum, ignis rapacissimum, colore nunc albo, nunc nigro : procul dubio est idem quod *Petroleum*.

NAPTA, idem quod *Natta*.

NAPUS, est *Raparum* species : & eadem vox est cum *Rapus*, vel venit à *Νέπι* seu *sinapi* : dicitur etiam *Bunias*.

Stek-raap / parpsche raap. G. *Steckrueben*. Gall. *Navet*. A. *Navew*, Long rapes, Turneps, Wild navew.

NAPY, vide *Sinapi*.

NARCISSUS, est planta, quæ folia porri habet : caulis est excavatus, striatus, nudus : flos est liliaceus, monopetalus campaniformis in sex partes sectus, medietullium ejus coronæ instar cingentes : calix autem, qui prodit plerumque è vagina membranacea, abit deinde in fructum oblongum, vel subrotundum, trigonum, trifariam dehiscens, in tria loculamenta divisum, feminibusque factum subrotundis : radix est bulbosa, extus nigra, intus alba, viscosa, amara : nomen illud derivare student à *Narcisso* adolescente in florem sui nominis converso, vel quia torporem (qui Gr. *ναρκη* est) nervis incutiat, gravedinemque torpidam idcirco *Sophocles* ipsum vetus mag-

norum Deorum cöönamentum appellavit. B. **Uplod**
Paas-lili. G. Narcisz , zeit-lofs , hornungs-blum. C
Narcisse. A. Daffadil.

NARCOSIS , est stuporis inductio , ut fit in paral
 vel ex opio, aliisque stuporem inducentibus, à *ναρκώω*
 porem induco. B. **En verdobinge**. G. Unempfindligk
 Gall. *Affoupissement*. A. stupiditie.

NARCOTICA, sunt medicamenta, quæ stuporem
 ducunt, & dolorem sistunt, à *ναρκώω* concilio : Lat. 7
por, Stupor & Hebetudo sensûs motûsque. Gr. *Νάρκη*
Νάρκημα, *Νάρκησις*. B. **Verdobende middelen**. G. A
 neyen, welche schlaff bringen, und enempfindlich i
 chen. Gall. *Narcotiques*.

NARDUS, Gr. etiam *Νάρδος* & *Νάρδοςάχνη* a Naardo
 be syriaca Euphrati contermina nomen accepisse, mul
 rum est opinio. Aliis *Νάρδοςάχνη*, quam inter aromata Di
 corides recensuit. Duplex hæc species prostat in officin

NARDUS CELTICA, vide *Spica Celtica*.

NARDUS INDICA, sive SPICA INDICA, in Ja
 magnâ quantitate crescit, ejusdem in culina apud Javar
 usus est, qui calami aromatici, ac junci odorati. Puta
 ex locis circa Gangem & Syriam quoque adferri. Cres
 ferè ut cæpa aut allium, cujus inferior pars fibrosa e
 exindè, tanquam basi aliquot bulbi sive spicæ se erigut
 anne hæ infra terram lateant, uti videtur, an supra pi
 mineant, mihi adhuc incertum est. Singulæ spicæ su
 quasi fibrillæ sibi invicem connexæ, castanei coloris, od
 ris Cyperi : saporem habet nonnihil amaricantem, & ar
 maticum. B. **Spikenard van Indien**. G. Indianisch sp
 canarden. Gall. *Spica nard*. A. Indian Spickenard.

NARES, Gr. *ῥιναῖ*, sunt partes concavæ nasi utrin
 que positæ, quæ meatum præbent aëri in respiratione
 odoribus, & exitum concedunt excrementis mucosis.
Neus-gaten. G. Die nasen-lecher. Gall. *Narines*. A. TI
 Nostrils.

NASA, idem quod *Natta*.

NASALIA, idem quod *Errhina*.

NASCALIA, sunt globuli, ex eadem substantia qu
 pessaria formantur, qui matricis cervici immittuntur. D
 stinguuntur à *Pesso* & *Pessario*, quod *Nascale* sit penici
 lus in nodi effigiem molissimus, ex cottonis vel lanæ flocc
 culo &c. qui exsuccatur vel succo idoneo vel unguent
 convenienti. B. **Moeder-zetsel**, NA

NASTURTIIUM vulgare, est planta, quæ habet caules ramosos, rotundos, solidos : folia oblonga, profunde trifida, saporis acris, sed grati : flores in summitate ramorum crescentes, exigui, quadrifidi, cruciformes, coloris albi vel purpurei : post florem succedit fructus ovalis, compressus, divisus in duo loculamenta, continentia semina obrotunda, parva, oblonga, sublutea, aliquantulum compressa, in cacumen pallidum definentia, saporis acris, aromaticantis : radix fibrosa, simplex, lignosa, alba : hæc planta in hortis colitur : Nasturtium verò aquaticum est species sisymbrii. Fortè à nascendo, quòd citò crescat. Alii autem appellari volunt à naribus torquendis, quòd dolore & seminis acrimonia sternutamenta provocet. Gr. *καρδαμον*. Vide *Cardamon*. B. *Kerffe / starkkost*. G. *Kress*. Gall. *Cresson*. A. *Cresse*.

NASUS, est media faciæ prominentia ; estque externus vel internus. Intus constat ex duabus cavitatibus, nasus dictæ, ossibus, cartilaginibus. *Externus*, habet partem superiorem immobilem & continet radicem, dorsum, sinum, & inferiorem magis mobilem : dividiturque in *lobulos*, *Alas* & *Pinnas* &c. Estque odoratus instrumentum. *Nasus* pro diversa conformatione varia accepit nomina, dicitur parvus, simus, aquilinus, acutus, magnus &c. Gr. *ῥίς* & *ῥίον*. B. *De neus*. G. *Die nase*. Gall. *Le nez*. A. *The Nose*.

NATA, idem quod *Natta*.

NATES, est infimi ventris posterior & inferior pars maximè carnosa, quâ sedemus. Gr. *γαστροί*. B. *Billen / arsg-billen*. G. *Die arsbucken*. Gall. *Les fesses*. A. *The Buttocks*, vel *Buttocks*.

NATES CEREBRI, sunt duæ prominentiæ orbiculares, post nervorum opticorum Thalamos, quæ superioris caudicis medullaris parti accrescunt, in homine minores sunt, in brutis verò Majores. Gr. *γαστροί*. B. *De bil-*
cu. G. *Des hirns arsbucken*. Gall. *Les Nates*. A. *The Buttocks of the braine*.

NATTA, est tumor magnus & mollis, sine dolore & dolore, in dorso præcipuè excrefcens, quandoque tamen in humero & aliis partibus erumpens, ex tenui quidem radice pendens, ita tamen incrementum sumens, ut aliquot libras pendeat & Melonis vel Cucurbitæ quantitate

tem æquet, ejus materia est adiposa, ideòque ad stematica referri debet. B. *Een speck-aposteum / wennec.* Ein speckgeschwulst. Gall. *Steatome.* A. Idem.

NATURA, Græcè φύσις dicta, à φύω cresco, nasci. Hujus vocis in medicina autor est Hippocrates, quæ luit, prout ex ejus scriptis colligendum, *Complexum omnium partium tam solidarum quàm fluidarum corpus, male constituentium simul sumptarum, in suo motu quiete, prout benè se habent*: undè non est ens distinctum & singulare à corpore, verùm ipsum corpus, ejus omnia simul: Verùm prout vocibus variæ attribui solæ significationes, hinc postea sumpta fuit pro Deo ipso, omnibus quoque ejus operibus: à Physicis pro illa corporibus conditione, quæ solâ positâ ponitur corpori quâ sublatâ tollitur; Vulgò sumitur pro nascendi vi, idque partes genitales utriusque sexûs appellarunt *Naturam.* B. dicitur *Natuur.* G. Die natur. Gall. *La Nature.* A. Idem.

NATURALES FACULTATES, sunt in corpore mali illæ, quæ faciunt, ut heterogenea alimenta assumpta fierent iterùm pars corporis animalis, seu ejus naturæ cum enim corpus perpetuò deteritur per suum motum requiritur ut detritum restituatur, id fieri nequit nisi assumantur, quæ nondùm sunt illud corpus animale (hæc heterogenea) quæcunque igitur actiones in corpore nati sunt illa heterogenea, ita ut abeant in corpus ipsum, vocantur *Facultates Naturales.* Sunt igitur hæc Actiones Masticationis in ore, concoctionis ciborum in ventriculo, & Intestinis; concoctorum per lactea & ductum Thoracicum in sanguinem delatorum, in corde & Pulmonibus compressio, attritus, mutatio; applicatio in locum partium detritarum &c. B. *De natuurlyke werking.* G. Natuerliche wurckung. Gall. *Les Facultez ou Fonctions naturelles.* A. The natural faculties.

NAVICULARE OS, dicitur & Σκαφοειδὲς & Cymbæ forme, est tertium os tarsi in utroque pede. B. *Het scheepbeentjen.* G. Das schiff gleiche beinlein. Gall. *Os naviculaire.* A. Ship bone.

NAUSEA, Gr. Ναυτία, est Fastidii species & ad vomitum conatus, qui aut subsequitur aut non, labiis interioribus tremore actis, & plerùmque humore ex ore fluente.

